




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3796/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3796/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3796/A


3796/A














42599
ARS MEDICA,

CONVCCINCTE ET PER-
SPICVE EXPLICATA.

AUTHORE

WILHELMO DVNCANO LIDDELIO

Joanni SCOTO. *Joannis Scoti*

Medici Altera editio emaculatio. *Petitissimi*



Cum Gratia & Privilegio S. Caf. Maieft.

HAMBURGI,

Ex Bibliopolio FROBENIANO.

M. CD. XVII.

Handwritten text, possibly a signature or date, in dark ink.

Handwritten text, possibly a signature or date, in dark ink.



CHER

IA

MAG

PL



quis
cypri
non
vult
& or
cullu
pau



SERENISSIMO ET P O-
tentissimo Principi

I A C O B O I.
MAGNÆ BRITANNIÆ,
FRANCIÆ ET HIBERNIÆ
R E G I, &c.



*I*ea una omnium maximè
inter cunctas disciplinas
humanas jure laudanda,
ceterisque anteponenda sit,
quæ operum supra alias ad-
mirabilium præstâtia, ex-
quisita multiplicium longèq; nobilium & ar-
canorum rerum scientia, antecellit, cui nisi
uni soli medendi disciplina palmam tribue-
mus? cum ejus tanta sit dignitas, eaq; gloria,
& oculis omnium exposita magnitudo, ut
nullius laudibus & commendatione indigeat,
sed ipsa sibi ipsi suo splendore & gratia abunde
):(2 satis

DEDICATIO.

*satis magnam admirationem apud omnes pa-
 riat. Nam sanitatis & tuenda & restituenda
 gratia, divino quodam munere concessa est
 medicina; sanitas autem apta omnium par-
 tium humani corporis constitutio, vite hu-
 manae perfectio, actionumque integritas est,
 quâ nihil utilius aut præstantius, nihil junc-
 dius, aut suavius esse queat, sine qua nulla cæ-
 terarum rerum voluptas, aut ut in hymno
 suo canit Orpheus, Πέντ' ἐστὶν αἶψα Φεληὶ ἀνθρώποισι.
 Quod si igitur salus, vitæ ipsa omnibus cha-
 rissima sit, præcipuum vereque divinum do-
 num; necesse erit artem, quæ eam præsentem
 tuctur, conseruat, & labefactatam restituit
 & curat, ac insensissimos vitæ nostræ hostes,
 morbos, propulsat & depellit; omnium huma-
 narum disciplinarum præstantissimam, di-
 gnissimam & divinissimam esse. Quapro-
 pter eius originem Græci & Aegyptii Diis
 ascribunt: Syracides uni Deo omnium re-
 rum conditori; eamque singulari studio inge-
 niosissimi & eruditissimi omnium ætatu
 viri, laudatissimi nonnulli Imperatores
 & Reges excoluerunt. Nam ex cunctis hu-
 manis rebus nil ad Dei potestatem & beni-
 gnitatem propius accedere videtur, quàm ar-
 tis*

DEDICATIO.

*tis medica præstantia excellere, & morbis ad-
 venientibus obviam ire, invalescentes mi-
 nuere, & naturæ labenti succurrere & subve-
 nire. Nec in his tantum universa artis medi-
 cæ præstantia consistit, sed etiam in exquisita
 multiplicium rerum cognitione eximia quæ-
 dam dignitas elucet. Nam cunctas facultates
 difficultate variarumque rerum cognitione
 longissimis citra ullam controversiam spatius
 vincit; cum angustis finibus circumscripta
 non sit, nec una aut altera, sed omnium propè
 disciplinarum consortio, & innumerabilium
 rerum notitia perficiatur. Non enim boni
 medici est vulgari rerum cognitioni, fallaci-
 busque nonnullis experimentis confidere, sed
 in totius naturæ adyta acri iudicio & ingenio
 penetrare, ac primum elementa, elementor-
 umque transmutationes, variasq; permix-
 tiones contemplari, animæ naturam, vires,
 functiones singulas considerare, admirabilem
 totius humani corporis fabricam, singularum-
 que partium structuram, conformationem,
 situm, consensum, usum explicare & tene-
 re; hinc ipsos insensissimos vitæ nostræ hostes,
 morbos, morborumque omnium causas, &
 accidentia, siue symptomata explicare, accu-
):(3 rateq;*

DEDICATIO.

rategꝫ dignoscere, & quæcunqꝫ latent in corpore humano manifestare, quæ futura sunt, prævidere & prædicere. Deinde singulis exploratis ut sanitas inculpata conservetur, amissa vel labefactata curetur, morbi causæque morborum è corpore submoveantur, præter exquisitam methodi medendi cognitionem, singularem experientiam & prudentiam, requiritur, ut omnium rerum naturas viresqꝫ quatenus salutes, aut perniciosæ sunt, acri iudicio exploret, & cognoscat, ut herbarum, stirpium, omniumqꝫ terra nascentium, quadrupedum, volucrum, insectorumqꝫ species & qualitates expendat; metallorum, mineralium, lapidum, gemmarum omnium, naturam viresqꝫ inquiret & examinet; piscium differentias omnesqꝫ maris divitias scrutetur & dignoscat: Aëris, aquarum, regionum, ventorumqꝫ spirantium naturam, mores cōsuetudinesqꝫ hominum perpendat, syderum motus, motuumqꝫ varias vicissitudines contempletur & observet, ex cælo futuras temporum mutationes, morbosqꝫ prævideat & præcognoscat. Quare medico necessaria est totius naturæ contemplatio, & universa philosophiæ cognitio, ut semel finiam omne quodcunque

DEDICATIO.

que pulcherrimus hic complexu suo coerces mundus, ad hominis salutem & incolumitatem prudenter accommodare & referre eum oportet, qui boni excellentisq; medici nomen dimereri cupiat. Munus pulcherrimum, sed arduum, multi laboris & industria, magni ingenii & iudicii. Quæ etsi ego in me nullatenus agnosco, tamen cum à primis annis extra patriam philosophiæ, ac huic præstantissimæ facultati me totum fere devovissem, & docendo bonam ætatis partem consumpsissem, primum in aliis Germaniæ Academiis, postremò in Academia Iulia annis nunc decem & septē stipendio Serenissimi Principis HENRICI IULII Ducis Brunsvicensis, &c. omnium literarum & literatorum fautoris & Mæcenatis eximii, mei officii esse statui, in gratiam studiosæ iuventutis exercitationes & lucubrationes nonnullas medicas in publicum emittere, quæ præter meam expectationem non solum ab artis nostræ tyronibus, sed etiam à viris nonnullis doctissimis comprobata, & tanto applausu accepta fuerunt, ut brevi tempore quotquot apud typographum exstabant exempla, distracta sint. Quare cum non deessent, qui novam editionem urgerent, nonnulli

):(4 viri

DEDICATIO.

*vir eruditissimi (quorum iudicia utinam me
 falsa spe non admodum frustrentur) opus ali-
 quod magis absolutum & locupletatum à me
 flagitarent, etsi me a tenuitatis mihi conscius
 sum, mihiq; ipsi in pluribus non satisfacio, ne-
 que in me eam industriam agnosco, quæ in tan-
 tis tamque arduis rebus immensam iudicio-
 rum varietatem & intemperantiam, exple-
 at, cōsultum tamen esse putavi eorum aquis-
 simæ petitioni morē gerere. Proinde quacun-
 que à me prius concinnata fuerunt, retexui,
 plurima adieci, quæ non satis arrisērent, mu-
 tavi, atque in isto opere omni studio & labore
 conatus fui, præcipua artis medicæ fundamē-
 ta à primis naturæ elementis deducere, par-
 tesq; ejus omnes adumbratione quadam ex-
 primere, ac compendiariam rationem seu me-
 thodum discētib; proponere, perueniendi
 ad veram medicinam.*

*Etsi autem initio indignum propè esse
 existima verim, ut hoc opusculum, aut ullum
 tam exile minusq; elaboratum ingenii monu-
 mentum ad Tuæ Maiestatis manus perueni-
 ret, tamen fretus T. Maiestat. singulari cle-
 mentia & benignitate erga literas & litera-
 rum omnium cultores: confirmatus præterea
 auto-*

DEDICATIO.

*autoritate & cōsilio doctissimorum virorum,
 constitui non levibus de causis hoc quicquid
 est laboris & industriae Tuae Majestati conse-
 crare & nuncupare. Quemadmodum enim il-
 li qui diuturna peregrinatione exterarum remo-
 tasq; regiones obierunt, cum in patriam re-
 deūt, rara aliqua & inusitata suis deferre so-
 lent, & si qua selecta & pretiosa videantur,
 regibus, principibusq; potissimum offerre; ita
 me quoq; in patriam redeuntem post exactos
 annos fere octo & viginti in exterarum regi-
 onum Academiis, decet, aut horum consue-
 tudinem emulari, aut si nil singulare rarumq;
 aut M.T. dignum occurrat, rusticos aut pau-
 perculos imitari, qui modò pomis, interdum
 aviculis, aut alio symbolo voluntatis suae sig-
 nificationem testari solent, atque has ingenii
 mei fruges minimè raras, aut selectas Tuae
 Majestati potissimum offerre: cui mea omni-
 umq; tuorum subditorum studia laboresq; o-
 mnes meritò servire debent. Nam primum à
 Tuae Majestatis salute & incolumitate tot
 regnorum dignitas, ac omnium tuorum sub-
 ditorum salus & incolumitas dependet. De-
 inde cum amplissima potentia in Tuae Maje-
 state conjuncta est summa clementia & tam
):(5 erga*

DEDICATIO.

erga externos, quàm subditos tanta beneficentia & benignitas, ut omnium bonorum animos tibi quotidie devincias. Nec ob has solum Regias animi tui dotes te suspiciunt, & admiratur omnes, sed quod in te fulgent singularis sapientia & prudentia, eximia eruditio, & doctrina, omniumque virtutum ornamenta, eaque jam toti mundo ita nota, ut commemorare & celebrare supervacaneum sit. Ac summus ille Regum meritò censeri debet, ceterisque vera gloria pralucet, qui ortus ipse à priscis magnisque Regibus, natura quaedam divinitate & ingenio præditus, recta vita ratione confirmatus: pietate, doctrinae excellentiâ, & optimorum consiliorum copiâ instructus, denique omnibus Regiis virtutibus illustratus: summa clementia cuncta piis justisque legibus moderatur, bonos tuetur, malos ferocesque coercet, ac præ ceteris rebus studia literarum, per quæ religio & pietas, pax & tranquillitas publica conservatur, singulari amore prosequitur, & tuetur, ac insigni munificentia promovet. Nam non alia causa olim summi laudatissimique Imperatores & Principes in hoc toti fuerunt, ut literas foverent, & in suo splendore conserva-

DEDICATIO.

*servarent, Scholas & Academias maximis
 sumptibus erigerent, quam ut ipsi pie pruden-
 terque singula administrarent: & animos
 subditorum bonis moribus imbuerent, & ad
 veram pietatem omnemque virtutem assue-
 facerent: in quibus universa cujusque regni
 & reipubl. salus & dignitas sita est. Quem-
 admodum enim stirpes ferae & agrestes cultu-
 ra mitescunt, & in aliam propè naturam
 transeunt, ita hominum animi feroces, rudes,
 barbarique; literis, doctrinâ, bonaque educa-
 tione mites, humani, & ad pietatem, omnem-
 que virtutem, ac debitum in Magistratus ob-
 sequium, proclives & idonei efficiuntur, sub-
 latis verò liberalibus disciplinis, honestaque
 educatione ad ferociam & inhumanitatem
 statim vergunt, & necessario ruunt. Huius
 rei, ut peregrina omittam, apertissimum lu-
 culentissimūq; testimonium & exemplum
 habemus in Insulis Hebridibus, & conter-
 minis Britannia, Hyberniaque populis. Cum
 enim non multis interjectis annis à tempori-
 bus Apostolorum religionem Christianam bo-
 narumq; literarū studia suscepissent: in vale-
 scente primū persecutione Decii, Diocletia-
 ni, aliorūq; Imperatorū adversus Christia-
 nos,*

DEDICATIO.

nos, deinde post Theodosiū Magnum vastatis
passim alibi Ecclesiis & scholis; extinctisque
omnibus ferè literarum studiis, bellorum ra-
bie gentiumq; assiduis migrationibus & in-
cursionibus, hūc quasi in asylum pii doctiq; ma-
gno numero confluxerunt: itaq; hic pietatis
christianæ optimarumq; literarum studia, nul-
la philosophiæ parte omīssa, ita floruerunt, ut
Scotis illis monachis aliquot subsequentibus
seculis nil sanctius, nil eruditius fuerit. Nam
in Hy Insula, teste Beda, quæ nunc Iona exi-
stimatur, & alibi quoque cœnobīa illius ætatis
celeberrima, aut scholæ Apostolicorum vi-
rorū fuerunt, ad quas, ut hodie ad optimè con-
stitutas Academiās, ita ex remotissimis re-
gionibus innumeri pietatis & eruditionis
studio undique confluxerunt: ex quibus pro-
dierunt sanctus Columbanus, Gallus, Kilia-
nus, Ardanus, Florentius, Fridelinus, ne sim
longior, integra examina sanctissimorum &
eruditissimorum virorum: greges philoso-
phorum, qui per uniuersam ferè Germani-
am, Gallias, vicinasque omnes Europæ pro-
vincias, religionem Christianam summa de-
votione, multaue eruditione propagarunt,
Ecclesias seminarunt, omniumque propè di-
scipli-

DEDICATIO.

sciplinarum scholas aperuerunt, vitamque Christo donârunt, ac tantam sui admirationem concitârunt, ut laudatissimi reges non aliunde, quàm ex Britannia, Insulisque illis Britannicis, pios eruditosque doctores petierint. Vnde Carolus Magnus fundaturus Academiam Parisiensem ab Achaio Scottorum Rege, præter alios, Mailrosium & Clementem impetravit; qui primi Parisiis philosophiam bonasque literas docuerunt. Sed statim post diuturnis bellorum cladibus, & Norvegorum incursionibus, assiduisque seditionibus, schola illa vastata, funditusque deleta fuerunt: hinc restinctis pietatis literarumque studiis, sublatisque omnibus liberalibus disciplinis, secuta sunt in illis locis tempora multò infelicia: atque ipsæ regiones hanc tuam salutare opem, præsensque auxilium multis seculis desiderârunt: nunc verò summa spe foventur, gaudioque exultant, & tibi pro maritis gratias agere gestiunt. Quid situr pro solita benignitate & clementia perrexeris, non solum cuncta piis, justisque legibus moderari, sed etiam literarum studia in suo splendore conservare & augere, illamque pietatis & eruditionis gloriam multis seculis
in non-

DEDICATIO.

in nonnullis regnorum tuorum partibus ex-
tingam resuscitare: non modo Deo gratissi-
mun officium prestabis, sed etiam tua floren-
tissima regna, virtute, gloriâ, omniumq; bo-
norum affluentia illustrabis, ac docti quoque
certatim tuas regias dotes, eximia planeque
divina merita, & singulare in Ecclesiam to-
tamque Rempublicam literariam studium
perpetuo celebrabunt, summisque laudibus in
cælum efferent. Sed ut revertar, unde di-
gressus sum, à Tua Maestate submisse nunc
peto, ut hoc debita subjectionis & observan-
tiae meae ^{καταδουλοῦμαι} serena fronte, tranquillog;
animo suscipiat, & istam primam operum
meorum medicorum partem sub patrocinio
nominis sui in lucem prodire sinat: cuius voti,
si me compotem Maest. Tua reddiderit, cal-
car mihi in posterum adjiciet accelerandi ca-
teros ingenii mei fructus, modo vitæ usuram
mihi Deus omnipotens indulserit: quem to-
to pectore oro, ut Tuam Maestatem cum
tota Regia domo diutissime incolumem con-
servet suaque benedictione coronet, ac heroi-
carum tuarum virtutum laudem sempiterna
gloria florentem cumulatè adaugeat, ut sub
tuo praesidio & imperio felicissimo, vera reli-
gio,

D E D I C A T I O .


gio, justitia, literarumque studia perpetuo flo-
reant, regna tua sarta tecta maneant, & pie-
tate, omniumque virtutum splendore ceteris
praluceant.

Tuae Maiestatis

obsequentiss.

Duncanus Liddelius
Aberdonensis Medici-
nae Doctor.





ARTIS MEDICÆ

LIBER PRIMVS:

CONTINENS INTRO-
DUCTIONEM IN TOTAM ME-
dicinam.

C A P. I.

*De Medicina definitione & prin-
cipiis.*



CITVM Galeni est lib. I. de usu par-
tium: omnibus animantibus ap-
tum à natura animæ moribus &
facultatibus corpus esse: Bruta au-
tem sua munimenta & operimenta
à natura tantum habere, & in quos
usus animæ suæ facultates sunt destinatæ, sine do-
ctore præsentire, ac naturali quodam instinctu suas
operationes exercere; Hominem verò ut corpus nu-
dum: ita animam omnibus illis naturalibus artibus
destitutam, sortitum esse; Verùm pro nuditate, ma-
nus omnium artium organa, quibus corpus munire
& perire queat; pro naturali imperitia, rationem, qua
disciplinarum omnium capax efficitur, illisq; habiti-
bus & disciplinis informatur, quibus non modo bru-
tis imperat, sed etiam à brutali sorte ad divinam vi-
tam quàm proxime accedit.

Disciplinæ autem illæ, quibus anima humana potissimum perficitur, sunt triplices: Aliæ enim in
nuda veritatis cognitione consistunt, quæ à Galeno
visio.

A

artes

artes contemplativæ vocantur: Nonnullæ in praxi occupatæ sunt, & vitam moresque dirigunt: Cæteræ in *ποιήσῃ* sive effectione, quæ corporis necessitatibus potissimum destinantur, ut artes propriæ dictæ. Deinde inter disciplinas effectivas magna dissimilitudo est. Quædam enim certis duntaxat operationibus perfunguntur & opus non relinquunt, ut ars saltatoria, &c. quæ practicæ minus proprio nomine à Galenicis dicuntur: Aliæ operatione sua id, quod prius productum fuit, acquirunt, ut Piscatoria, venatoria, quæ *κτείνουσι* ob id vocantur: Nonnullæ ex operatione suâ certum opus post se relinquunt, & vel aliquid integrum, quod prius non erat, efficiunt; vel ex parte vitiatum corrigunt, quæ speciale nomine *ποιντίζουσι* à Gal. 1. & 2. c. de Const. art. & ad Thrasylb. de san. c. 30 vocantur. Harum omnium disciplinarum effectivarum non eadem perfectio est, nec eadem ratione (testis Averrho. in Cant.) addiscuntur. Nam aliis, ut addiscantur, exercitatio seu operatio sufficit, ut in fabrilibus similibusque artibus evidens est. Aliæ præter exercitationem certas demonstrationes & definitiones exigunt, quibus actio dirigatur, quæ artes digniores perfectioresque merito æstimantur. In harum numero est Medicina artium præstantissima, cui, teste Porphyrio, sese omnis sapientia debet, ac in illarum quoque, quæ aliquid novi non faciunt, sed ex parte vitiarum corrigunt.

*Tria primū
in omni arte
consideranda.*

*Medicina
subiectum
Finis.*

Operantur omnes effectivæ artes in materia finis alicujus gratia. Quare in iis primū consideranda erunt. 1. Subjectum in quo operantur. 2. Finis cuius gratia fit operatio, qui subjecto introducitur, & ex operatione sequitur. 3. Instrumenta, modusque operandi, quæ omnia in arte Medica occurrunt.

Nam subjectum Medicinæ in quo operatur, est corpus humanum; non absolutè, sed quatenus sanabile: Finis Medicinæ propositus est sanitas: causa à

quâ

quâ, functionum integritas, quam eatenus solum Medicus considerat, quatenus vel præsentem in corpore humano conservat, vel absentem restituit. Instrumenta Medicinæ varia sunt, & modus operandi unus non est. Officium n. medicinæ est, appositè curare gratia sanitatis tuendæ restituendæque. Nam curationem latè nunc accipio, & curare hic voco non solum quæ noxia sunt in corpore actiones lædentiæ, submovere, quæ significatione curare à Gal. com. in 22. Aphor. secundi, & 8. Methodi, propriè accipitur, sed etiam omnia mala quæ instant præcavere, ac in summâ, quæ deficiunt in corpore addere, quæ redundant subtrahere. Unde ab Hipp. lib. de flat. Medicina adjectio subtractioq; describitur. Verùm eo Medicina à cæteris artibus differt, quod maximâ ex parte naturæ operâdi subministret, & in operatione, naturæ motum respicere debeat: unde Medicus naturæ minister dicitur, atq; etiam corrector, quod nonnulla interdum efficiat quæ naturæ possibilia non sunt.

Officium.

Quare ante omnia Medicus corporis naturam, omniaq; principia & causas, intelligere debet, quibus non modò sanitas conservatur & immutatur, verùm etiam ipsum corpus humanum constituitur. Proinde autor libri, qui Medicus inscribitur, triplicia Medicinæ principia esse dicit: Inventionis, constitutionis, & interpretationis. Inventionis primum & antiquissimum principium fuit experientia. Redigendi verò in artis constitutionem & perfectionem, ratio & experientia. At interpretationis & demonstrationis singulorum, naturalis speculatio. Nam à naturæ consideratione auspicari, & à Physicâ, prima principia & omnium demonstrationum fundamenta accipere Medicus debet. Artifex enim ut artifex sua principia non demonstrat: sed assumit, ubi sunt demonstrata: quo nomine Medicina Physicæ subiicitur. Assumit autem Medicus à Physico corpus hu-

*Principia
medicinæ.*

I.

manum, principia, causas, & accidentia ejusdem: seorsim differunt ab invicem, quod Physicus ea absolutè, universalia naturalia sunt, tantum contempletur: Medicus verò eatenus tantum cognoscat, quatenus inferri possunt ad morbos pellendos & sanitatem conservandam, ut testatur Gal. de San. ad Thrasib. cap. 28. 29. Verùm his Physicæ principiis, & solius rationis ductu Medicina absoluta non fuit: sed subindè, aliorum pernecie aliorum salute, perneciosa à salutaribus discernente, experientia usum & vires multorum medicamentorum, aliaque non pauca, subministravit & primam inveniendæ Medicinæ occasionem præbuit.

*Definitio
Medicina.*

Ex his omnibus quæ dicta sunt, apparet, quòd Medicina sit *ars propriè effectiva, experimento & ratione sanitatem in corpore humano conservans, & morbum omnem sanabilem removens.* Dico effectivam, quòd vocabulum artis à Galeno aliisque pluribus plerumque communiter sumatur: & non solum disciplinæ effectivis quibus propriè convenit: sed etiam theoreticis & practicis tribuatur. Verùm (ut Gal. 1. de constit. art. c. 1. & 2. ad Thrasib. cap. 30. demonstrat) Medicina non est ars contemplativa nec practica: sed propriè effectiva, ut supra diximus. Deinde dico, *in humano corpore*, propter veterinarios, & eos qui curam animalium suscipiunt, quæ ab officio Medici aliena sunt, & diuersa consideratione indigent. Præterea annectitur, *Morbum sanabilem removens*, propter eos qui à morbis victi sunt. Nam (ut scribit Hipp. lib. de arte) omnia mala corporis Medicina non tolluntur. Cum enim Medicus naturæ minister sit, iis succurrere non potest, nec manum temerè admoveere debet, qui à morbis planè victi sunt. An vero victi sint, Medicus est intelligere. Nam, (ut docet Gal. 3. Meth. c. 2. art. 1.) etiam opus est scire, an sanitatem, id scilicet quod tendis, sperare debeas: Quòd si nequeas, ut admo-

ne

net 1. Prognosticorum Hipp. ægri prognosticis sunt potissimum relinquendi. Quarto additur, *Ratione & experimento*, quæ duo instrumenta & principia sunt, quibus salubria eligimus & insalubria vitamus: quibus etiam Medicina Rationalis sive dogmatica, omnium perfectissima ab Empirica, & Methodica distinguitur.

CAP. II.

De Sectis Medicorum.

Constat ars medica ex coacervatione dogmatum verorum, sese mutuò consequentium, & ad finem medicinæ tendentium, de quibus non consentiunt Medici, ideoque ex dogmatum diversitate in varias Sectas divisi sunt. Est enim Secta secundum medicos consensus multitudinis in doctrina, sive in coacervatione dogmatum, quæ ex certis principiis se mutuò consequuntur aut consequi putantur. Ex triplici autem dogmatum diversitate tempore Galeni tres Sectæ medicorum fuerunt, Empirica, Methodica, & Rationalis, quæ per excellentiam Dogmatica appellatur, quibus accessit hoc seculo quarta non spagyrica, quæ artificiosa medicamentorum præparatione illam medicinæ partem, quæ *φάρμακον ποιητική* dicitur, auxit: variisque egregiis remediis Dogmaticam instruxit, sed Paracelsistica à Philippo Theophrasto Paracelso, qui rejectis veterum rationibus, principiis & causis evidentissimis, sua principia novæque causas & qualitates excogitavit, & in medicina Monarchiam affectavit, novamque Sectam constituit diversam à veterum Spagyricorum, Avicennæ, Gebri, Rhasis, Villanovani, & aliorum, qui omnes Dogmatici fuerunt, Hippocratis & Galeni Sectatores: assumptis principiis & fundamentis, primum ex operationibus & effecti-

Quid Secta secundum medicos.

Quatuor Sectæ medicorum.

I. Secta Paracelsistica.

Paramiri lib. I. c. 1. Definitio medicina. bus Spagyricis, in quibus exercitissimus fuisse videtur: Deinde ex similitudine & concordantia partium & transmutationum in toto mundo, & in homine: tertio ex Magorum veterumq; nonnullorum Philosophorum opinionibus; atq; ut fidem quoque faceret nonnulla sententiis sacrarum literarum confirmare studuit.

Severinus in Idea c. 2. Unde non solum medicinam, sed etiam omnem veterum Philosophiam convellere, & pro iis novam

Quercetanus in praefat. lib. de priscorum medicina. quandam Philosophiam & Medicinam substituere conatus fuit. Nam primum medicinam non pro arte, sed pro medicamento propriè accipit: & ex medicina medicum fieri, & in medicinae natura, omnem medici scientiam, artem, theoreticam, practicam consistere arbitratur. Medicinam autem definiunt

Paramir. lib. I. c. 2. Lab. rinth. Medic. l. 4. Quid sanitas & morbus. Lib. de trib. essentiis c. 5. Paracelsistæ essentiam quandam in natura collocatam depromptam ex materia vegetabilium mineralium & animalium, quæ arte Spagyrica debite præparata, & ab impuritatibus separata humani corporis morbos auferre potest. Separatis verò impuritatibus explicantur & manifestantur tres primæ substantiæ ultima cuiusque rei materia, quæ Sal, Sulphur, & Mercurius ab iis vocantur. Existimat Paracelsus primum ex his tribus constare non solum

Paramir. lib. 2. cap. 4. 5. 6. Prima gene a morborum. Lib. de entibus morborum. res cæteras totius universi, sed etiam hominem, quoad corpus Physicum. Deinde ex illis omnia bona & mala, sive sanitatem & morbos habere; Sanitatem autem si hæc tria in unum corpus coeant, planeque consentiant; morbum verò oriri, si dissolvantur & rupto fœdere unum eorum à cæteris, aut omnia tria inter se dissentiant: quod fit quando ab astro virilia aut astralia redduntur, sive in exaltationem deducuntur, ubi Sal resolvitur, calcinatur, reverberatur; Mercurius destillatur, sublimatur aut præcipitatur; Sulphur accenditur, coagulatur, resolvitur, &c. Causam autem efficientem ens & astrum plerumque

quæ vocat, ac entium quinque præcipua genera ponit, ut ens astrale, ens naturale, ens veneni, ens spiritale, ens deale. Quare concludit verum medicum debere in omnibus corporibus trium primorum compositionem, statum, & dissolutionem scire, & primum in majori mundo omnia probare arte spagyrica, igne, qui res occultas in lucem profert. Deinde accommodare totam majoris mundi dispositionem Microcosmo, & in homine (ut sanitas & morbi intelligantur & curentur) considerare omnia omnium creaturarum genera, species, motus, motuumque omnium vicissitudines & leges. Nam pro confesso accipit homines Microcosmum dici, quia reipsa secundum speciem in se complectitur, quæcunque in toto mundo continentur, nimirum elementa (quæ matricæ & nuda receptacula vocat) & quæ elementis continentur sydera, meteora, mineralia metalla, &c. ac etiam omnes eorum mutationes & causas, ac proinde artem medicam & philosophiam unam scientiam esse. Deinde corpora omnia ex tribus constare, Sale, Sulphure & Mercurio, & in ea resolveri. Tertiò generationes & transmutationes omnes à semine fieri ope spirituum. Nam in semine continere putat spiritus mechanicos & tincturas universæ Anatomix suæ speciei, ac semen singula administrare prædestinationes & officia motuumque leges distribuere: Spiritus verò corpora astralia & invisibilia, functiones omnes & transmutationes perficere, inter se contrarios esse, pugnasque excitare, &c. 4. Corpora generari, si semina digestis temporibus ex Abyssu elementorum præcedentia, si bi ex consentaneis principiis novum corpus fabricent: Corrupti si deposito illo corpore rursus sese in eandem abyssum recondant. 5. Secretione consentaneorum principiorum corpora ex corporibus nasci, illa quæ omnia actu alimentis inesse, quæcunque;

Causa morborum.

Paramir. lib. I. c. 1. 2.

Paragran. lib. I. Tr. 1.

Labirinth. Med. c. II.

Fundamenta Sectæ Paramir.

Paragran. lib. I. Tr. 3.

Labirinth. Med. c. 3. 4.

Lib. de Tartaro c. 12.

De modo Phar. Tr. 2.

De meteoris cap. I.

Labirinth. Me. c. 5. 8. 10.

Lib. ad Athenien. c. 1.

Labirin- in corpore ex alimentis oriuntur. 6. In Micro-
thus c. 5. 3. cosmo non alias quam Macrocosmo mutationes se-
De modo cundum aut præter naturam existere, nec alias illa-
Pharm. c. 3. rum mutationum omniumque effectuum (veluti sa-
 nitatis & morborum) causas. 7. Doceri debere
Paramir. quid in homine sit, non ex homine sive in humano
lib. 1. c. 2. corpore, sed ex majori mundo certa experientia
De gradib. arte chymica per ignem singula examinando & re-
medicorum solvendo in ultimam materiam. 8. Vires medica-
lib. 2. c. 3. 4. mentorum ascribendas non esse qualitatibus evi-
 dentibus, quæ rellolaciæ sterilesque signaturæ sunt,
Paragran. & accidentia innata solius corporis medicamenti
lib. 1. Tr. 3. gratia, in quibus nulla confluentia est cum astris
Lab. rint. morborum, sed proprietatibus consubstantialibus
c. 5. 10. naturæ cheirionix sive arcanis viribus, in quibus sci-
Paramir. entia & prædestinatio sanationis viget. 9. In omni-
lib. 1. c. 12. bus corporibus venenum partesque inutiles excre-
Archidox. mēticias & noxias reperiri, quas ut Vulcanus naturæ
lib. 1. aut Archeus arte chymica ope ignis sive caloris na-
De modo tivi separat (quemadmodum in nutritione animati
Pharm. corporis apparet) ita verus medicus imitatur natu-
Tract. 1. ræ eodem artificio medicamenta à prima materia ad
Labirynth. ultimam deducere, & venenum omneque inutile
med. c. 9. ab utili veraque medicina separare debet. 10. In spi-
 ritu veram medicinam esse, non in corpore medi-
 camenti. 11. Similibus (quæ eandem signaturam
Lib. de trib. veræque Anatomix concordantiam habent) similia
essent. c. 5. curari, ut morbos mercuriales mercurio, sulphu-
Paragr. lib. reos sulphure, salinos sale, &c. 12. Medicinam dis-
1. Tr. 2. rigendam semper esse contra hostem, sive proprie-
Lib. de Tar- tatem astrorum veluti in tartari generatione spiri-
taro c. 15. tum salis coagulationis causam vincendum esse, ne
 amplius coagulare queat, &c. 13. Tandem singulas
Labirynth. res suis formis & imaginibus præditas esse, in qui-
cap. 10. bus illarum vera Anatomia sita est docens conjun-
 gere, quæ conjungenda sunt. Nam ubi medicina

Ana

anatomiam cognoverit medicus, discet Anatomiam quoque morborum, ac unà reperiet concordantias eorum quæ cognata sunt, & conjungi debent. igitur quod prodest matrici, id præditum est matricis Anatomia, ac in hoc quoque omnium morborum Anatomia continetur. Quare ut veteres illi methodici Sectam suam definierunt cognitionem viventium communitarum, ita Paracelsistæ suam quoque definire poterunt cognitionem concordantia Microcosmi cum Macrocosmo. Attamen fateatur Paracelsus cum Dogmaticis se experientia & ratione niti, licet morbos, causas & Symptomata eorumque confundat, & methodum medendi cum indicationibus more Empiricorum rejiciat, quo in Empiricum se esse probat. Deinde aut cum experientia rationem confundit, aut consistere solum putat in nuda similitudine & concordantia rerum. Nam libro de Physiogn: medicinam nil aliud esse asserit, quàm experientiam: & lib. I Paragran: morbos à remediis discendos, & juxta remedia distinguendos: lib. I. Paramir. duplicem esse nostram cognitionem, unam quam nostro ingenio habemus audiendo & legendo, sed hanc medicum non facere, alteram quam experientiâ addiscimus; quæ duplex illi vicissim est; una fortuita, error & fallacia: altera certa, medici unicum fundamentum & magister, quam arte chymica ex igne tantum discit: Hac experientia absolvitur medicus, & inveniuntur tres primæ substantiæ cujus sunt naturæ, proprietatis & conditionis per totum mundum in omnibus creaturis; hinc propter concordantiam in homine. Nam docetur homo ex majori mundo non ex homine. Deinde medicina & id cui medetur eodem modo cognoscuntur cum eadem utriusque sit Anatomia. Ex hac concordantia oritur perfectio medici, cognitio morborum unâ cum in-

Lib. de Physiogn. morb. c. 1. Lib. de figuratur. rerum De perficaria. Paramir. lib. I. c. 5.

Paragran. lib. I.

Lib. I. Paragran. Tr. I. De Physiogn. morb. c. I. Lib. de podagra.

ventione veræ medicinæ, quâ absoluitur curatio
De hac Secta de quæ Paracelsi philosophia & medicina
cina peculiari tractatu Deo favente dicemus.

I I.

*Empiricorū
doctrina.*

Qui ab experientia Empiricos se vocarunt, posthabita omni indicatione, & rejecta corporis humani, causarum internarum, & facultatum cognitione, quæ omnia illis incomprehensibilia erant, solam observationem & experimentorum noticiam ad salubria eligenda, & insalubria vitanda sufficere iudicarunt. Ad curationem verò triplici experientia genere utebantur: quorum primum casu, alterum consulto agentibus obvenit, tertium, cum imitantur, quod fieri viderunt: hoc genus imitationis artem eorum maximè constituit. Nam reliquum memoriam præcepta esse dixerunt, & congeriem ejusmodi præceptorum Medicinam; qui verò ea congescit Medicum vocarunt: Ac semper quod quisque congescit *αὐτοψία* quam definierunt memoriam eorum, quæ sæpe ejusdem quæ modi videntur sunt: Idem quoque experientiam nominarunt ejusquæ narrationem, historiam. Quod enim *αὐτοψία* est à quo aliquid observatum fuit, idem alteri est historia qui illud didicit. Histórias autem sive aliorum experimenta didicerunt & descripsérunt imitationis gratia, ut in omnibus morbis remediis abundarent: Nam uni Medico impossibile videtur in omnibus ægris concursum signorum observare. Quia autem evenerunt sæpe affectus incogniti, quorum explorata illis non erant remedia instrumentum excogitarunt, transitum ad similia.

I I I.

*Methodicorū
doctrina.*

Qui verò à compendiaria artis ratione se ipsos falso nomine Methodicos vocarunt, solis evidentibus communitatibus utebantur, rejecta experientia, contemptâque loci affecti, causarum, facultatum, & similium cognitione, solam indicationem

ra ab affectu sumitur sufficere ad curationem
 estimarunt. Proinde sectam suam cognitionem
 identium communitatum finem Medicinæ se-
 nentium definierunt, satisque putarunt commu-
 a quædam morborum intueri, quorum triage-
 ra statuerunt: Duo simplicia: unum astrictum,
 terum fluens, & tertium ex his compositum:
 einde, utilem indicationem in astrictis laxatio-
 em, in fluentibus adstrictionem, in mistis verò, ei
 mod maximè urget occurrendum. Atque ita non *Tale est ar-*
 erbotenus solum ab aliis sectis discreparunt: sed *tificium Ræ-*
 ovandi etiam studio aliqua immutarunt, & multa *mistarum*
 aliena & superflua rejecerunt, eamque maximam *in cunctis*
 ethodicae sectæ virtutem esse gloriati sunt. Qua *disciplinis.*
 Hippocratem, qui vitam brevem artem longam
 ixit, reprehendunt: rem enim omnem contra se
 abere affirmant, ut brevis illa sit & vita longa. Dem-
 tis enim quibus ars juvari falsò putatur, & obser-
 atis morborum communitatibus nec longam Me-
 icinam esse difficilem, quæque sex mensibus disci o-
 niscelerimeque possit: ut de illis testatur Gal. lib. de
 ctis.

Verum Dogmatica sive rationalis Medicina *I V.*
 inter has duas sectas medium quodammodò tenet. *Medicina*
 Nam rationales medici neque omnia utilia ex ob- *dogmatica*
 servatione deprehendi dicunt, quemadmodum vo-
 unt Empirici, neque rursus omnia ex indicatio-
 ne, ut statuunt Methodici, sed nonnulla ex obser-
 vatione, veluti deleteria & nonnullorum medica-
 mentorum vires: aliquâ ex indicatione ea videlicet
 quorum causæ reperiuntur. Causæ verò ut causæ
 sensui evidentes non semper sunt, sed ratione ple-
 numque judicantur, Quare cum experientia ratio-
 nem conjungunt & naturæ cognitionem, unde ra-
 tionales vocantur, ac ad curationem necessariam
 esse demonstrant, cognitionem non modo reme-
 dio.

diorum sed etiam causarum tam latentium quam evidentium & signorum. Item corporis totius, loci affecti, partium singularum, & facultatum. Præterea regionis, aeris, ætatis, sexus, cæterarumque circumstantiarum: ut videre est apud Gal. in libris de Sectis, de Opt. Secta. Item, Meth. Med. &c. De hac dogmaticâ medicinâ ex monumentis Hippocratis & Galeni, aliorumque principum Sectæ hujus in hoc opere potissimum agemus, & primum de partibus medicinæ Dogmaticæ in genere, deinde de singulis in specie.

CAPVT III.

De Partibus Medicina.

Partes Medicina.

CUM finis Medicinæ sit sanitas, quatenus eam præsentem in corpore conservat, vel absentem restituit, ut supra demonstratum fuit; duæ præcipuissimæ & primariæ Medicinæ partes erunt, ad quas cætera quæ in Medicina proponuntur tendunt. Quas Galenus primò de San. i. c. i. & ad Thrasyb. de San. c. 30. primas & maximas vocavit.

Principales Medicina partes duæ.

Una *ὀγινη* aut *φυλακτική* quæ sanitatem in corpore tuetur & confirmat, ac ab imminenti- bus malis conservat. Altera *θεραπευτική* quæ appositâ remediorum administratione dextroque usu humanum corpus à morbis liberat, & sanitati restituit. Quia verò nec sanitas conservari, nec morbus è corpore submoveri à Medico ritè poterit, si ne ipsius subjecti corporis, partium, facultatum, &c. similium, quæ à natura corpori humano insunt, consideratione: deinde sine morbi & sanitatis cognitione, differentiis, causis, & accidentibus: Præterea nec hæc, sine signis, quibus etiam, eventum morbi

morbi, & quid de ægro sit sperandum Medicus præcognoscit. Proinde præter illas duas partes principales, quæ in operatione consistunt, (unde à nonnullis, practicæ, ab aliis factivæ nominantur) ad artis Medicæ constitutionem aliæ tres partes requisitæ *Tres minores principales.* erunt; quas, quia per se ad opus non tendunt, sed potius cognitione sua duabus partibus principalibus inserviunt, theoricæ nonnulli vocarunt: nimirum, φυσιολογική, παθολογική, σηµειωτική. Est autem φυσιολογική, ut hîc intelligitur, non omnis rei naturalis in Medicina cognitio, sed solis humanæ naturæ, & eorum quæ secundum naturam homini insunt, consideratio: qualia sunt septem illa quæ res naturales dicuntur: scilicet Elementa, temperamenta, humores, spiritus, partes, facultates & quæ à facultatibus proficiscuntur actiones, & usus. Deinde παθολογική quæ αἰτιολογική quoque dicitur, est accurata eorum explicatio quæ præter naturam corpori humano insunt: talia sunt tria: Morbus, morbi causa & symptoma. Tertiò σηµειωτική est, quæ ex signis non solum de præsentī & præteritâ constitutione causisq; ejusdem judicat, sed etiam futurum morbi eventum præcognoscit. Quare totius Medicinæ quoque partes erunt, quibus omnia artis Medicæ membra continentur.

An verò duabus illis partibus principalibus à *An pars* fine sumptis, tertia addi debeat, quæ neutris conveniat, dubitari poterit? Nam sanitatis magna latitudo est, & inter sanitatem & morbum, medium siue *aliqua Medicina debeat* neutralitas quædam est, eaque duplex potissimum, *beaturneum?* una decidentis, quando scilicet corpus in termino sanitatis existens semina quædam morbi concipere incipit, ut faciliè causarum progressu in morbum labatur: altera convalescentis, quando ex morbo in sanitatem tendit. Utriusque cura Medico incumbit.

bit

bit: & huic resectio aut resumptio, illi præservatio convenit. Verum cum neutra constitutio quæ actiones producit, vel non satis firmas, leviter offensas, vel ejus occasione corpus nunc morbo, nunc sanitati subicitur: si sensibilis actio num sit læsio, ad θεραπευτικὴν: si verò actiones sanæ firmæ non sint, sed sine sensibili læsione, ad ὑγιεινὴν illa neutrius constitutionis cura refertur. Corrigenda enim magna & evidentia vitia θεραπευτικὴ: parva & minus sensibilia, ὑγιεινὴ. Nihilominus præservatio quædam est, quæ soli therapeuticæ debetur in morbis qui adhuc fiunt, & à causa fovetur quæ simplex non est: sed cùm curatione propriè dicta conjungitur. Nam curatio propriè quantum morbi genitum est tollit: præservatio viribus consulit & progressum causarum nocentium impedit. Gal. 22. Aphor. 2. & 9. Meth. cap. 13. Quæ si igitur valetudo intra limites sanitatis contenta sit, omnis ejus cura ad ὑγιεινὴν siue φυλακτικὴν referenda erit, quæ à subjecta materia in tres species dividitur. Nam sanum corpus triplex est: primum sanum καὶ σχέσιν: 2. καὶ ἔξιν 3. δὲ ἐκτικὴν Gal ad Thrasibul. cap. 30. 40. Quare una pars Medicinæ salubris, δὲ ἐκτικὴ dicitur, quæ perfectè valentem accipiens, in eo hoc ipsum gradu conservat. Altera nomine generis ὑγιεινὴ vocatur, quæ sanitatem in habitu & inculpatum non perfectam, tuetur & confirmat: Tertia ἀναδραστικὴ resectrix dicitur, quæ valetudinem non satis firmam & in habitudine solutam accipiens, ad meliorem statum perducit, aut saltem à morbo defendit. Hæc majora graviora quæ mala quàm cætera duæ corrigit: & sub ea contineri poterunt illæ partes quæ neutrius constitutionis esse dicuntur: nimirum, ἀναληπτικὴ, quæ à morbis jam liberatos reficit: Deinde quæ facultatem huic operi possit

Divisio
ὑγιεινῆς.

positam habet προφυλακτική, ut supra diximus;
Tertiò γερωνομική; quæ senum curam suscipit, qui
licet non ægrotent, firmâ tamen valetudine non u-
tuntur: Præterea επαναρροτική quæ corpora & mem-
bra debilia, morbo nondum detenta, paulatim corri-
git & reficit. Gal. de Opt. Secta. cap. 4.

Materiæ auxiliiorum, sive operationum Me- *Materia*
dicarum instrumenta tria possimum sunt: Primò *auxiliorum*
Dιατα, quæ comprehendit considerationem & cū- *duplex.*
tam sex rerum non naturalium: eæ autem sunt: Aër,
cibus & vigilia, excreta & retenta, motus & quies
somnus & vigilia, animi pathemata: Secundo loco
sunt Medicamenta propriè dicta: Tertiò manuum
operatio sive administratio.

Ex istis operationis & instrumentorum diver- *Partes pra-*
sitate tota practica Medicina in tres species dividi- *ctica Medi-*
tur. *cina tres*

Quarum prima est διατητική, quæ adhibitâ con-
sideratione sex rerum non naturalium unicuiq;, cer-
tam vivendi rationem præscribit: Huc etiam refertur
Gymnastica, non illa athletarum, sed veterum, cujus
meminit Plato.

Secunda, est φαρμακευτική, quæ apto & conveni-
enti Medicamentorum tam simplicium quàm com-
positorum usu morbos e corpore tollit, & pristinam
sanitatem restituit. Sub hac natura, vires, & usus o-
mnium medicamentorum continentur, ac etiam il-
la artificiosa ratio, præparandi medicamenta in usus
medicinæ; sive ea fiat vulgari & usitato modo, sive
arte (pagyrica; quæ uno nomine φαρμακοποιητική di-
ci poterit.

Tertium est χειρουργική, quæ, manuum ad-
ministracione imponendo, secando, urendo, & si-
milibus, corpori affecto medetur. Quia verò com-
modâ victus ratione, non solum sanitas conserva-
tur,

tur, sed etiam morbi non rarò sanantur, tam *ἡγεμονικὴ* πικρὴ quàm *ὕμειν* suam *διατητικὴν* postulare videtur. Verum *ὕμειν* commodâ victus ratione potissimum absoluitur, quare *διατητικὴ* ei primariò tribuitur, cognitio sex rerum non naturalium, quæ causæ salubres, circa quas ars conservativa sanitatis versatur, à Gal. cap. 85. art. Med. dicuntur. Nam ubi modum servarint in qualitate & quantitate, salubres sunt, ubi ab hoc modo recesserint morbosæ efficiuntur. Chirurgia verò & *φαρμακευτικὴ* propriè ad *ἡγεμονικὴν* referuntur: nihilominus in his penè omnibus mutuas operas sibi *ἡγεμονικὴ* & *ὕμειν* præstare videntur. Poterit Medicina aliter quoque, idque non incommode dividi, ut Gal. de Opt. Secta. cap. 4. admonet: dummodò nullum ejus membrum omit- tatur, omniaquè unum illum finem in Medicina respiciant. De his partibus legitimo ordine & methodo dicemus, si prius demonstratum fuerit, quid & quotuplex sit methodus, ac quâ methodo ars medica proponi debeat.

CAP. IV.

De Methodis.

VT ea omnia, quæ in arte medica traduntur, ritè proponi & accuratè intelligi queant, certa methodus requiritur, nam ut scribit Galenus 1. Meth. cap. 4. Aliquid Methodo invenire & judicare, ei ex adverso opponitur, quod fortuitò & temerè.

*Methodus
in genere
duplex.*

Methodus verò non uno modo semper accipitur: Nam interdum sumitur pro quavis scientia aut arte Methodo disposita; propriè verò pro instrumentum tantum logico, docente, procedere in disci.

disciplinis ab uno ad aliud, cognitionis gratia. Tais progressio duplex est; una quæ res in artibus docendas ita disponit, ut dextrè & facillimè percipiantur; Altera quæ à noto ad ignoti cognitionem nos lucit: Illa, ordo & à Galeno i. c. Art. med. *πίσις διδασκαλίας* & aliquando *διδασκαλία*, vocatur, ac totam aliquam artem spectat: Hæc, proprio nomine Methodus dicitur, & veritatem in singulis artis partibus & Theorematis respicit. In disciplinis autem omnibus duo sunt termini & extrema; unum causæ primæ aut principia, quæ naturâ notiora dicuntur, quia naturâ prius extiterunt, & non quia universalia semper sunt; Alterum finis est Effectus ultimus nobis notior sensibusquè evidentior. Horum terminorum respectu ars ordinem habere potissimum dicitur.

Nam ordo est habitudo plurium ad unum. Hoc inum, vel est alterum horum terminorum, vel quod utrumque cum omnibus intermediis virtute continet, & in quo velut in medio & cetro omnia cocunt; Quod medium nonnullis videtur certa quædam Definitio: unde à Galeno tres ordines doctrinæ constituuntur, nimirum Syntheticus, Analyticus, & Definitivus.

Est autem ordo Analyticus, qui docet omnia in arte ad unum finem ordinare; Hic à fine ultimoquè effectui initium sumit, ac finem in media ducentia ad finem; effectum in suas causas: compositum in sua principia & elementa resolvit, ac à fine ad proxima consequenter, vel ad totam artem, omnesquè ejus partes, ducit. Quare hoc ordine procedendo artes primum inventæ sunt, ac ut inventæ, ita aliquando traduntur: Nam principium rei non est semper principium cognitionis ut Arist. 5. Meth. c. 1. testatur. Hoc ordine traditus est à Galeno lib. de constitutione Artis medicinalis.

B

Ordo

*Ordo
compo-
sitivus.*

Ordo compositivus est, qui docet uniuersa a prima principia ordinare, siue à primis causis, simplicissimisque principiis & elementis, ad ea quæ inde oriuntur, nullo transposito vel prætermisso procedere, donec ad finem peruentum sit. Hoc potissimum utimur in iis disciplinis tradendis & demonstrandis, quorum causæ sunt exploratæ, & veritas Resolutione inuenta: Nam in Resolutivo ordine à posterioribus & effectis nobis notioribus procedentes inuenimus naturæ priora; E converso in compositivo, à naturâ prioribus procedentes reddimus causam posteriorum. Quare compositivus ordo quasi generatio quædam est, quæ à natura prioribus semper procedit.

Ordo definitivus.

Tertiò ordo Definitivus à Galeno dicitur, non quia definit, vel definitionibus utitur, vel à definitione quovis modo auspicatur, sed quia artis ipsius primùm generalem definitionem proponit, quibusdam veluti capitibus, omnes partes artis illius continentem; quæ capita in alias partes rursum resolvit, & has iterum in alias atq; ita deinceps, donec omnia ad artem spectantia declaraverit.

Unde hic ordo, nunc definitionis dissolutio, nunc explicatio & explanatio, nunc divisio dicitur. Præterea à fine aut principio non auspicatur, sed memorie gratia extrema cum intermediis includens, sola capita & conclusiones eorum, quæ alibi latius demonstrata sunt, brevibus proponit. Quare certus & necessarius hic ordo non est, nec initium ejus, definitio scilicet, statâ & firma: Nam nihil verat, ex varia divisionis ratione, uni arti varias definitiones inservire, modò ipsas artis partes maxime universales comprehendant; deinde definitio talis præmium potius quàm pars artis videtur, quo nomine à nonnullis rejicitur; ab aliquibus autem idem cum cæteris, aut quam proximè ad compositivum accedere

ere putatur. Hoc ordine traditus est à Galeno libellus de arte medicinali. Ex quibus omnibus apparet compositivum ordinem ad docendum ac perfectam scientiam acquirendam, magis inservire: Resolutivum ad inveniendum necessarium esse; Definitivum verò ad memoriam solum & comprehensionem prodesse. Verùm id diligenter observandum est, in singulis artis aut scientiæ cujusque partibus non eundem, qui in toto, semper ordinem esse. Nam interdum tota disciplina Synthetico ordine proponitur, ubi pars aliqua, vel ob facilitatem; vel quia Methodus demonstrativa postulat, Resolutivo docetur. Quemadmodum incipiendo à Physiologia, tota medicina compositivo ordine à Galeno & Avicenna tractatur, sed pars curatrix semper Resolutivo.

Methodus verò propriè est instrumentum logicum docens in disciplinis progredi à noto ad ignorum theorematum perfectè cognoscendorum gratia.

Quid Methodus propriè dicta.

Significat enim Methodus viam ab alio ad aliud, scilicet à noto ad ignotum, quæ sine illationis necessitate non est. Quare Galenus 1. Method. capit. 4. viam & ordinem esse dicit, qua in disquisitione aliquid sit primum, secundum, tertium, atque ita deinceps, donec ad id sit perventum, quod est quæsitum. Hæc disquisitio & progressio à noto ad ignotum, quatuor modis à nonnullis fieri dicitur. 1. Divisione, per differentias descendendo; 2. Resolutione à nobis notioribus ascendendo; 3. Definitione; 4. Demonstratione. Quæ omnes non ab Ammonio & Eustatio solum, sed etiam à Galeno interdum Methodi dicuntur, & instrumenta necessaria videntur ad disciplinas rectè percipiendas.

Verùm cum Methodus propriè sit, quæ ab
B 2 alio

IV.

*Methodus
proprie
duplex.*

*Methodus
inveniendi
et tradendi
artem Me-
dicam.*

alio ad aliud ducit cum illationis necessitate, demonstratio propriissime Methodus erit. Demonstratio autem duplex est; una *di' n*, quæ ex causis primis & immediatis proprium *modus* de suo subiecto concludit; Altera *on* priori opposita, quæ ab effectis ad causas procedit: Utraque demonstratio Methodus dicitur, ac quoque processus sive continuata series demonstrationum tendentium à noto ad ignotum, verum illa demonstratio Methodus Synthetica; Hæc Analytica, ac inventionis dicitur. Nam ubi definitio demonstratio *on*, ibi per regressum incidit *di' n*, quod in methodo medendi observatur, quæ ab effectis procedit; nam teste Galeno II. Meth. cap. 10 quod in resolutiva methodo est ultimum inventum, id in curatione est primum peragendum. Principium autem curationis est morbi cognitio; morbi verò vel sanis tatis cognitio ex propriis accidentibus manifestatur redditur. Verum cum morbus sit accidens, in subiecto erit, & propriam inhaerentiam causam habebit. Quibus omnibus resolutiva methodo inventis regrediendo per compositionem affectio quævis de suo subiecto per causam proximam demonstratur. Et hæc demonstratio positu terminorum à definitione causali illius affectionis tantum distinguitur. Hoc igitur modo, omnium affectionum in humano corpore cognitio, per demonstrationem invenitur & explicatur, ut Gale. I. Meth. & passim alibi postulare videtur.

Ex his colligitur ad perfectam disciplinæ cognitionem & constitutionem, methodo & ordine opus esse; methodo, ut singula seorsim perfecte intelligantur & iudicentur; ordine verò, ut omnia apte disponantur & consentiant. Quare ubi scientiæ perfecte proponuntur, methodus cum suo ordine coniungitur, & utrumque uno nomine methodus communiter dicitur.

DE

DE PHYSIOLOGIA

LIBER SECUNDUS.

CAPVT I.

De Elementis, Elementorum mutua permutatione & Mixtione.

Uemadmodum literis primis vocis elementis incognitis, syllabas aut voces nemo perfecte didicerit: Ita teste Galeno, li. contra Lycum: cui scientia elementorum, siue primorum corporum incognita sit, multo minus eorum quæ ab illa veniunt, compositorum nimirum corporum scientiam noverit. Proinde ut omnium mutabilium corporum causas intelligamus, necesse erit imprimis ipsa Elementa elementorum quæ mutuatam transmutationem & permixtionem intelligere: Nam aut generatio & corruptio nulla erit, aut in his elementis, & in iis quæ ex elementis componuntur apparebit. Unicuique autem generationi & corruptioni aliqua necessario subiecta materia est, cum ex nihilo fieri & in nihilum redire, nullum corpus naturale queat; ex qua cum inexistit omnia corpora naturalia gignuntur, & in quam per corruptionem iterum redeunt.

Eiusmodi materia in compositis corporibus sunt prima simplicia corpora, quæ elementa vocantur. Nam elementum proprie ad aliquid dicitur, nimirum ad compositum, quod ex elementis oritur, quo nomine ad genus causæ materialis pertinet, & in eo, proprie est cuius est elementum, sicut materia in eo cuius est materia. Nam id ex quo aliquid fieri dicitur, si rei effectæ non insit, sed depereat, non materiæ sed privationis modum habet. Aliquid

*Elementa
in genere
quid &
quod duplex*

B 3

autem

autem ex aliquibus dupliciter componi dicitur; vel nullis ullo modo immutatis, vel permixtis & immutatis. Itaque elementa duplicia dici poterunt, alia compositionis, alia mixtionis. Compositionis autem elementa, non absolutè sed illius tantum compositi respectu dicuntur, cuius sunt elementa & partes. Nam teste Galeno (lib. de natura humana) vocabulo elementi abutentes simplices in cuiusque rei fabrica partes, prima illius elementa appellamus. Ita Plato centum, ait, plaustrum esse dicta Elementa ab Hesiodo. Similiter animatorum sanguine partium, nunc humores, nunc partes similes elementa dicuntur. Eodem modo totius universi elementa sunt, non solum ignis, aer, aqua, terra, sed & ipsum cœlum, quod ab Aristot. i. Meteor. primum elementum vocatur.

*Elementum
proprie dictum.*

Mixtionis verò elementa sunt corpora simplicia, prima & communia, à natura condita gratia generationis mixtorum, nimirum ut mixtorum omnium communis materia essent ex quibus primò componi, & in quæ ultimò resolvi omnia mixta naturaliter debeant. Talia corpora revera & proprie elementa dicuntur.

*Definitio
Elementi.*

Quia igitur ex elementis componi, & in elementa iterum resolvi mixtum corpus naturaliter debet, utriusque ratione ab Aristot. definitur. Nam compositionis respectu 5. Metaphys. definitur id ex quo componitur aliquid inexistens, specie indivisibile in aliam speciem: Sed resolutionis & divisionis ratione 3. de cœlo: Corpus simplex in quod cum in sit corpora dissolvuntur, ipsum autem in alia quæ specie differunt dividi nequit. Quare differentiarum locum indivisibile in aliam speciem utrobique ponitur, quod sensu à Galeno elementum definitur, minima pars ejus cuius est elementum; Nam magnitudinis divisio, (teste Gal. 8. de placitis) nullum hujusmodi minimum habet.

habet, sed quæ aliquando sistat terminumq; reperiat speciei sectio sit, qualis in elementis non datur. Elementa verò non sensu solum sed & ratione partium penitus similium absolute intelliguntur. Hæc elementa licet ad genus causæ materialis referantur; prima tamen omnium corporum materia non sunt, sed prima simplicia solum corpora, & non absolute simplicia, quia composita sunt ex actu & potentia, materia nimirum & forma, quæ per se speciem non habent, sed quæ complexu utriusq; oriuntur corpora. Verum elementum quodvis speciem simplicissimam habet, & in partes specie discrepantes divisibile nullo modo est. Alia verò corpora, quæ ex elementis componuntur, si non sensu ut mixta homogenea, ratione saltem in partes specie distinctas divisibilia esse judicantur.

Talia autem elementa infinita numero non sunt, cum differentiæ quibus distinguuntur corpora finitæ sint, & sub sensu cadant, ac infinitorum scientia nulla esse queat: Nec magnitudine indivisibilia, ut quidam voluerunt, cum ex indivisibilibus nullum corpus componatur, aut in indivisibilia resolvatur: Nec unum aliquid, alioquin omnia quæ eo uno constarent, unam naturam, unumque motum haberent, & quia unum contrario caret, in eodem statu omnia semper permanerent: Præterea nec plura impatibilia & penitus impermutabilia, alioqui mixtio & mixti corporis generatio nulla foret. Nam ubi ex pluribus quicquam componitur, quæ, qualia per se sunt, talia ad extremum durant nunquam, teste Galeno 1. de elementis, novam formam adipiscitur, quæ in iis non præfuerat ex quibus constituebatur. Relinquitur ergò, plura elementa esse, numero finita, magnitudine divisibilia, & natura sua patibilia.

Numerus verò & distinctio elementorum
B 4 aliun-

*De numero
Elemento-
rum.*

I.

*Elemento-
rum nume-
rus unde &
quomodo in-
quirendus.*

aliunde sumenda non erit, quàm ex communibus omnium corporum mutabilium affectionibus. Haec elementis primis corporibus primò insunt, & ab iis propriè dependent. Nam quæ ex elementis & principiiis aliquibus oriuntur, naturam illorum semper referunt & sapiunt. Deprehendimus autem omnia corpora sublunaria primum ad locum naturaliter moveri: Deinde alterationibus, generationibus & corruptionibus obnoxia, ac proinde qualitatibus duplicibus, locomotivis scil. & alterativis prædita esse. Quare hæ qualitates elementis primò inerunt, ac his qualitatibus distingui & intelligi elementa debent. Verùm ex qualitatibus motivis esse solum quatuor mundi elementa locis naturalibus distincta (ex quibus inferior mundus componitur) intelligimus: ex qualitatibus alterativis naturam, finem & usum elementorum deprehendimus. Ac primum esse plura simplicia corpora, ex discrepantibus simplicium corporum naturalium motibus sursum à medio mundi, vel deorsum ad medium manifestum est: Nam primum simplici corpori simplex motus convenit; & composito motus simplicis prædominantis. Deinde nihil præter naturam sursum aut deorsum moveri dicitur, cui alius naturæ proprius ei oppositus non convenit. Præterea quod loco naturaliter movetur ad locum naturæ suæ accommodatum, qui forma quodammodo est, & perfectio corporis contenti, velut ad finem semper tendit.

*De qualita-
tibus loco-
motivis.*

Hunc impetum ad naturalem locum efficiens & continuans causa, est qualitas motiva, gravitas scilicet vel levitas, quæ formæ elementorum non sunt, ut aliqui voluerunt, sed internum principium cum forma semper conjunctum, quod manente forma nunquam aboletur. Moventur quidem elementa sursum & deorsum à levitate vel gravitate, ac mixta quoque motu prædominantis elementi,

sed

sed non ut animalia. Nam in animalibus inclina-
 tio ad motum est appetitus, elementis inclinatio
 ad locum est gravitas vel levitas. Deinde ut in ani-
 malibus aliqua appetitus causa est ad movendum
 primum excitans: Ita in ipsis elementis gravitatis &
 levitatis causa ejusmodi nulla est: Sed quæ elemen-
 tum generavit cum forma ista inclinationem tri-
 buit, cujus nixu ad locum naturalem nisi impedia-
 tur continuo movetur: Proinde ex se propriè ele-
 menta non moventur, sed animalia solum, quod ani-
 malia ubi quieverint, motum inchoare queant, sine
 ulla causa generante vel impedimento tollente,
 quæ in elementis cæterisque inanimatis necessariò
 requiritur. Grave autem & leve duplex est, aliud
 simpliciter & absolute, aliud cum alio compara-
 tum. Simpliciter leve est, quod à medio in superio-
 rem locum ad concavum lunæ semper tendit: Con-
 tra simpliciter grave, quod in imum mundi locum
 pondere suo semper decumbit. Alterius verò res-
 pectu grave & leve, quod cum æquali mole, qua ali-
 quid præditum sit, celerius sursum vel deorsum
 incitatur. Nam quæcunque sursum vel deorsum
 ad locum naturalem moventur, ea superioribus gra-
 viora, inferioribus leviora sunt. Quod autem levius
 rariorem, quod gravius densiorem magisque com-
 pactam substantiam habet. Quare cum ignis supra
 omnia maximè emineat, terra verò ad imum mun-
 di præcipuè decumbat, erit ignis absolute levis, ter-
 ra absolute gravis. Cum autem ab extremo ad ex-
 tremum per medium in quo vis motu transitus fiat,
 & ubi natura conatur referre unitatem, extrema
 interventu mediorum, miro artificio semper con-
 jungat, medium inter hæc duo, non unicum sed
 geminum erit, quod partim eminere, partim subesse
 debeat, ac proinde unum quod ad naturam ignis
 propius accedat, nimirum aer: alterum quod ad
 B s natu-

naturam terræ, nimirum aqua. Mixta autem ex his quatuor elementis corpora motum prædominantis elementi semper sequuntur, & ad locum prædominantis elementi naturaliter moventur, ut ibi confluentur & quiescant. Proinde ex gravitate & levitate non naturam & causas elementorum, sed esse solum quatuor prima corpora locis distincta intelligimus. Consequens est, ut elementorum naturam & causas quatenus sunt elementa & mixtorum materia cognoscamus.

Natura Elementorum.

Ac primum natura elementi ex fine æstimator, finis autem elementorum est propter generationes mixtorum, ut ex definitionibus supra traditis apparet: Proinde huic finali causæ & formam & materiam correspondentem habebunt. Materia autem communis formis elementorum substrata, est illa prima, subjectum omnis mutationis primum. Hæc licet omnium formarum per vices capax sit, nec formam propriam habeat, à formâ tamen alicuius elementi nusquam separabilis esse poterit. Verum cum mixtio non sit pura generatio, quæ eorum tantum est, quæ in pura potentia, neque pura compositio, quæ eorum quæ in actu perfecto, sequitur mediorum esse, quæ ab actu perfecto reducuntur ad actum imperfectum. Proinde elementa mixtorum materia, formas & actus habebunt, quæ ab esse imperfecto ad perfectum possunt reduci, & conditiones materiæ in mixtis obtinere. Hæc formæ elementorum (ut Scaligeri verbis utar) actus materiæ quæ quæ suæ sunt, quæ materiæ, quia ad operosiores compositionem à natura destinatae sunt, factum est, ut sicut & ipsæ, ita & formæ earum commisceri queant. Verum quia formæ istæ elementorum ignotæ sunt, ac elementa gratia generationis mixtorum, quæ sine mutua actione & passione non fit; contrariis illis qualitatibus sensibilibus quæ tum activæ tum passivæ

Forma Elementi.

passivæ sunt describenda, determinanda & distinguenda elementa erunt. Tales autem sunt præcipuè tactiles qualitates, non omnes tamen, sed primæ solum illæ quæ alterativæ dicuntur, ad quas cæteræ tactiles qualitates reducuntur, & per quas τὰς στοιχειώδεις elementa distinguuntur & intelliguntur, nimirum caliditas, frigiditas, humiditas & siccitas.

Hæ quatuor qualitates non sunt ipsæ formæ elementorum substantiales, quibus inesse specifico constituuntur, ut Alexander & medicorum non pauci opinantur; sed propriè accidentia consequentia formas, cum quod unius respectu sit substantia, alterius accidens esse nunquam queat: Nihilominus ut sunt præparationes materiæ pro singulis elementorum formis educendis cum præviæ alterationes materiam proximam efficiant, principia & materia elementorum dicuntur. Deinde quia vi & mediante actione harum qualitatum, simplices illæ substantiæ miscentur, & elementa mistorum efficiuntur, nunc formalia principia, nunc formæ, nunc principia constitutiva elementorum vocantur, & non raro tam ab Aristotele quàm Galeno pro ipsis elementis sumuntur. Non omnium harum quatuor qualitatum licet contrariarum, vel in agendo, vel in resistendo æqualis virtus & efficacia est. Nam caliditas ad agendum potentissima est, & efficacissima; ad resistendum verò omnium maximè infima. Deinde frigiditas, tertio humiditas: omnium verò ad agendum inefficacissima siccitas, ad resistendum verò firmissima, deinde humiditas, tertio frigiditas, quarto caliditas: quod à natura mira ratione factum fuit. Nam si elementum ignis, in quo viget calor, in resistendo tantum, quantum in agendo, valeret, omnia ab igne nunc consumpta forent. Proinde ut elementorum certa quædam proportio esset, natura vim contrariarum qualitatum in agendo &

resist.

De qualitatibus primis alterativis.

resistendo proportionē quadam libravit & compen-
 savit. Omne autem contrarium in contrarium suum
 primò agit, & contrario primò patitur. Agit au-
 tem, si contrarium quantum fieri poterit in suam
 naturam convertat, quod fieri nequit, nisi aliquo
 modo perimat. Talem actionem & passionem & in
 simplicibus & in mixtis istæ quatuor qualitates ha-
 bent, unde tam activæ quàm passivæ dici merentur.
 Nam calidum in frigidum calefaciendo; & frigi-
 dum vicissim in calidum refrigerando agit: Pari ra-
 tione humidum in siccum humectando, & vicissim
 siccum id quod humidum exsiccando, in suam
 naturam convertit. Proinde ubi qualitates contra-
 riæ, planè impares concurrunt, imbecilliorē va-
 lidior superat, & in suam naturam convertit: Sed
 si viribus quodammodò pares fuerint, altera alterā
 in suam naturam convertere nequit, sed mutua a-
 ctione & passione sese mutuò contundunt & con-
 temperant, donec sub communis formæ imperio
 devinctæ perfectè uniantur. Talis unio tantum in
 mixtione conspicitur ex illa duplici quatuor quali-
 tatum pugna, ubi nova oritur actio, quæ non est
 contrarii in contrarium, sed velut artificis in mate-
 riam. In hac actione quia humiditas & siccitas ma-
 teriam obedientem actioni caloris & frigoris faci-
 unt, passivæ qualitates dicuntur: Calor verò & fri-
 gus quia efficientis causæ materiam determinantis
 rationem habent, activæ vocantur, quibus viribus
 ab Arist. potissimum definiuntur. Nam calidum de-
 finitur, quod per se homogenea congregat, ac pro-
 inde ex accidente aliena & heterogenea secernit: Fri-
 gus verò, quod tam homogenea quàm heterogenea
 in unum confundit & cogit. Dux verò reliquæ qua-
 litates, patiendi facultatibus definiuntur. Nam hu-
 midum est quod alieno termino facilè, suo difficil-
 limè continetur: Siccum contra, quatenus siccum
 pri-

primò, quod suis terminis facile coercetur. Deinde caliditas omnium qualitatum non solum actuosissima est, sed & præstantissima, æmula virtutis cœlestis sive potius virtutis cœlestis proximum instrumentum. Nam ut homogenea in unum cogit, & heterogenea dissolvit, proxima compositionis sive generationis mixti, & resolutionis causa judicatur. Proinde caloris respectu cæteræ qualitates vicem materiæ quodammodo obtinet, peculiariter verò frigiditas rationem privationis & interitus habet; Non tamen frigiditas absoluta privatione caloris intelligitur, sed propriam actionem habet. Nam per se homogenea & heterogenea in unum cogit, constipat, & ad motum corpus ineptum reddit. Deinde calorem contemperat, & externam determinationem mistis interdum superaddit. His duabus qualitatibus in agendo inferiores, in resistendo firmiores sunt siccitas & humiditas, præcipue verò siccitas, ut supra dictum est. Unde nonnulli nullam actionem per se nisi mediante calore & frigore, siccitati & humiditati tribuunt. Verum calor non per se sed ut vapores excitat, humectat: ut humidum absorbet, exiecat: Contrarium verò, si potentius sit in contrarium semper agit. Erit igitur propria aliqua actio humiditatis & siccitatis ut dictum est. Peculiariter verò natura humiditatis est, primum calorem, deinde frigus obrundere, ac siccitatem in mixtione formabilem reddere; siccitatis verò est calorem & frigus acuire, ac humiditatem fluidam in unum cogere.

Cum igitur quatuor sint primæ qualitates alterativæ; sex earum combinationes enumerari poterunt, quarum duæ in natura locum non habent. Nam contrariæ in uno simplici non conjunguntur. Quare quatuor qualitatum combinationes erunt quibus elementa, prima qualitatum subiecta, distinguuntur. Nam agentes tantum patientibus copula-

*Numerus
elemento-
rum.*

vide.

ri debent. Ita elementum calidum siccum est ignis calidum humidum aer, frigidum humidum aqua, frigidum siccum terra. Ex his quidem elementis quodlibet duas qualitates intensas secundum omnem latitudinem habet, id est, sine ullius contrarietatis permixtione, sed non secundum omnem agendi vim & efficaciam. Ac proinde ut ad mixtionem secundum has agendi vires concurrat elementum, alteram qualitatem in summo, alteram in remisso habere dicitur cum in quolibet genere unum reperiatur, quod ceterorum sit mensura. Si igni caliditas, aeri humiditas, aque frigiditas, terræ siccitas primò tribuitur. Et licet sine contrarii permixtione in igne & terra siccitas sit utrumq; tamen eodem modo siccorum principium dici non debet, sed id quod mediâte sua siccitate primo & per se exiccat, licet fortasse absurdum non sit ignem vocare siccorum tenuium principium, ut terram crassorum. Hæc elementa locis seorsim distincta, & talia absolutè non sunt, qualia intelliguntur, & describuntur, sed ob vicinitatem contrariorum suis qualitatibus nõ penitus affecta, imò impura & multis modis permixta, maximè verò duo intermedia aer & aqua. Proinde qualia per se sunt ipsa mundi elementa, & qualia quoque sint elementa quatenus mixtorum sunt materia, ordine considerabimus.

De elemento ignis.

Ac primum ignis naturâ calidissimus est ac ob id siccissimus, omnisque humiditatis expers, quæ caloris vim obtundere solet: proinde omnium elementorum ad agendum efficacissimus, sed resistentiæ minimæ. Nam forma ignis actuosissima est, quod qualitatibus actuosissimis sit prædita. Quod verò minimæ sit resistentiæ ratione maturæ accidit. Nam forma materialis in tantum resistit, vel cedit corruptioni, quantum subjecta materia patitur: Materia autem ignis cum paucissima & rarissima sit, & ob raritatem dispersa, facilimè se totam viribus agentis exponit.

xponit, quod non faceret, si constipata & densa fo-
 et. Ob hanc eandem causam ignis levissimus erit, ac
 ius naturæ, ut apud nos nulla vi contineri possit,
 quin continuo evolet & statim corrumpatur. Quare
 it cōservetur pabulo continuo indiget, ex quo con-
 tinua successione generetur & velut flumen è fonte
 in sublimi feratur pauloq; post desinat ob imbecilli-
 tatem, corruptus ab aëre & vicinis corporibus. Pa-
 bulum autem illud proximum ignis apud nos est va-
 por aëreus, terrestri siccitate permixtus: Hic à corpo-
 ribus combustilibus resolutus statim ab igne cor-
 ipitur & flamma efficitur, quæ è fonte illo unde va-
 por resolvitur continuo fluens & ad superiora evo-
 ans, paulo post decedit: Nam flamma naturam ignis
 proximè refert, cum ignis hic noster, qui vel flamma,
 fumus aut carbo est, in aliena materia semper sit. E-
 lementum vero ignis inter elementa mundi supre-
 mum locum tenet, sub concavo orbis lunæ, quò na-
 turaliter ignis tendit. Hic tenuissimæ flammæ com-
 parari poterit, quæ sine pabulo in propria materia
 conservatur: Nam ignis sublunaris proprie nihil ali-
 ud est quàm fervoris vis intensissima, in materia te-
 nuissima & rarissima; ac proinde nisi accesserit mate-
 ria densior, non videtur, nec ut ignis noster urit, sed
 ad nostrum ignem qui sine pabulo non subsistit, eam
 rationem habet, quam aqua ad glaciem. Circumfer-
 tur ignis isti in naturali suo loco ad motum cœli, ver-
 tiginè quadam in qua licet aliæ partes sursum, aliæ
 deorsum devolvantur, aliæ incrassentur, aliæ resol-
 vantur ac totus ignis impuretur; quia tamen motus
 iste ab interno principio non est, neque ab externo
 quòd ignem corrumpit, sed quòd fovet, & conser-
 vat; Proinde erit hic motus nec proprie naturalis,
 nec violentus, sed quia necessarium instrumentum
 est causæ superioris, quo inferiora cōservantur, supra
 naturam ignis dici potius merebitur: Elemento ignis
 aër

I.
De elem.
Aeris

aer maximè cognatus est, non omninò levis, pro-
nior ut à naturali suo loco, non aliter quàm aqua
deorsum quàm sursum impellatur: Quod à natura
teste Averroë, mixtionis gratia (quæ circa terram
fit,) factum fuit. Naturâ suâ aer, ut elementum
calidus & humidus propriè est, licet ab humiditate
prædominante caloris vis obtundatur. Dominatur
enim in aëre naturaliter, & non in aqua humiditas
propriè dicta, quæ alieno termino non facilè con-
tinetur, altiusque penetrat & permeat, non ex acci-
dente, quæ ob densitatem subjecti sui magis sentit
tur & adhæret. Nam minor qualitatis intensio in
subjecto densiore magis semper agere potest, ut in
ferro candente manifestè apparet, quod vehemen-
tius quidem quàm flamma urit, sed secundum ele-
mentariam & qualitatis intensiorem minus calet. Ve-
rùm aer hic noster, qui sphaerâ ignis undique con-
cluditur, nusquam purus est, & his qualitatibus pla-
nè affectus, sed primùm quia substantiæ tenuis &
versatilis est, ac ad patiendum habilis, contagione
vicinorum facilimè afficitur: ac sub contrariis qua-
litatibus magis quàm ullum elementorum, ad cer-
tos usque terminos subsistere potest. Deinde ob per-
petuas exhalationes & multiplices impressiones su-
periorum, varias vices sustinet, & ubique eisdem
qualitatibus non afficitur. Quare tota aeris sphae-
ra in tres partes sive regiones distinguitur, quarum
suprema & maxima, ob continuam coeli circumgy-
rationem & vicinitatem ignis, calida & sicca, non
absolutè sed in comparatione solum dicitur; Infima
verò variam constitutionem habet: nam nunc sicca
nunc humida est, ut vapores & halitus excipit; nunc
calida quando radii solares reflexi magis uniuntur
ut æstate; nunc frigida, quando ob distantiam soli
à vertice radii obliquè disperguatur, ut hyeme.
Hæc regio non ultra se extendit, quàm reflexio illa
radio

DE ELEMENTIS.

33

radiorum solarium. Media aeris regio, quia nec radiis reflexis, nec conversionibus superiorum corporum incalescit, frigida est, & à vaporibus contentis humida.

Comprehendit aer terrenum glebum, intra cuius cavitates aqua, quæ alieno termino semper includitur, ita continetur, ut ultra terræ superficiem nusquam emineat. Hæc duo elementa respectu aeris & ignis, vicem materiarum in mixtis quodam modo obtinent. Utenim terra consistentiam mixtis perfectis tribuit, & formas simul impressas diu retinet: ita aqua ad impressiones & formas facile suscipiendas idonea efficit. Est autem aqua natura sua magis gravis quàm levis, & frigidior quàm humidior, Imò principium frigidiorum, qualis aqua mente potius comprehenditur, quàm alicubi seorsim reperitur. Elementum aquæ Arist. Mare vocat, ubi maxima aquarum copia, licet intra terræ viscera, & in specubus subterraneis ac in fluminibus & similibus, non minima aquæ portio contineatur, quæ tamen nusquam pura & suis qualitatibus affecta; alioquin omni sapore prorsus careret.

*De elementis
to aqua.*

Terra in imo mundi posita, ubi coeunt effectus syderum, velut mater omnium mixtorum, maximeque viventium est. Hæc naturâ suâ sicca, frigida & gravis, proinde maximè densa, constipata & adnotum inepta & opaca. An verò pura alicubi terra sit & vel in centro, ut quidam volunt, dubitari non injuria poterit. Cogunt ceterè cœlestia vim suam in animum circa terram, eamque variè alterant, & cum aliis elementis permiscunt, præcipuè cum aqueo humore, qui partes terræ unit, qua actione varix exalationes excitantur, materia lapidum, metallorum, conitum & simplicium; quibus universa ferè terra conferta est, An verò terra, licet velut sponsia sit aqueo humore perfusa ad aquam eam proportionem habeat

*De elementis
to terra.*

habeat quam aqua ad aerem, & æqua in singulis elementis materiæ portio sit, rarioribus tantum & densioribus dimensionibus expansa, id discutiendum relinquimus.

*Quare elementa mundi
ai sint im-
pura.*

Hæc sunt illa quatuor elementa ex quibus velut partibus inferior mundus componitur, quæ tamē ut diximus, nusquam pura & impermixta sunt, nec si essent, ita perdurare possent, cū ob contrariarum qualitatū pugnam; cū ob cōtinuam celestium vim & efficaciam. Quod à summo rerū opifice sapientissimè provisum fuit, qui terram, aquam & aerem ita temperavit, ut apta mixtorum domicilia essent. Nam si ista mundi elementa summis prædita qualitatibus forent, nullum animatum vivere, aut mixtum perdurare posset. Nihilominus in his elementis impuris, aliisq; substantiis permixtis illa prima & simplicia elementa, mistorum materiae necessariò intelligenda erunt, nec alibi separatim quaerenda.

Ex his omnibus jam dictis colligitur, elementum quodque ut elementum simplex, corpus esse, compositum ex materia & forma simplici, ac habere suam gravitatem vel levitatem, quibus ad locum naturalem moueatur, habere item duas qualitates primas, quas Symbola vocabimus, quarum causa agit & patitur. Hanc autem actionem & passionem elementorum consequitur elementorum mutua permutatio, sive utrò citroque generatio, ac mixtio, mixtiq; generatio de quibus restat dicendum.

*De mutua
elementorū
transmuta-
tione.*

Ac primum permutatur elementum unum in aliud, si duo viribus ita imparia concurrant, ut quod validius est, alterum in suam naturam convertatur. Convertit enim permutato symbolo vel symbolis quibus ab altero distinguitur. Nam duo elementa à se invicem, vel uno solū contrario vel duobus

sive duplici contrarietate distinguuntur. Quare elementa quæ communione unius qualitatis conveniunt, ac una contrarietate solum dissident, faciliiori & celeriori transitu permutantur: Quæ verò duplici contrarietate pugnant, planèque contraria sunt, difficiliiori & tardiori. Fit autem interdum, ut ex duobus contrariis elementis una utrobique qualitate permutata, medium aliquod elementum generetur.

Mixtio verò fit, quatenus omnia elementa vi-
 ribus quodammodo paria concurrunt. Hæc gene-
 ratio aut corruptio non est, licet sine mixtione &
 elementorum *συμμεσος*, mixti perfecti generatio,
 & sine elementorum *ἀλλομεσος*, naturalis mixti cor-
 ruptio nulla fiat. Nam generatio propriè eorum
 est, quæ in pura sunt potentia: mistio verò miscibi-
 lium, quæ aliquo modo existere debent. Quæ e-
 nim absolutè corrupta sunt, nec ullo modo subsiste-
 re intelliguntur, permista dici nunquam poterunt.
 Veluti cum lignum in ignem convertitur, & ardet,
 ignem cum ligno misceri non dicimus, sed lignum
 corrumpi, ignem generari. Eadem ratione de ali-
 mento quod non miscetur cum corpore, sed in sub-
 stantiam corporis convertitur. Mixtio verò com-
 positio dici solet, & compositio interdum mistio,
 licet vocabulum compositionis multis natura dif-
 ferentibus tribuatur, & pro quavis unionem non ra-
 tio accipiat. Nam quæ propriè componuntur
 misceri quodammodo dicuntur, & quæ permista
 sunt composita corpora vocantur. Deinde ut mi-
 stio, ita compositio propriè dicta eorum est, quæ
 actu separatim subsistere & cum aliis conjuncta esse
 possunt. Proinde mistio & compositio propriè di-
 cta, non erit formæ cum materia (quæ teste Alexan-
 dro unio solum dici debet) aut subiecti cum acci-
 dentibus, aut accidentium inter se; sed corporum

De mixtio.

ne.

I.

præcipuè illorum quæ faciliè dividi & terminari possunt. Nihilominus ipsa mistio idem quod compositio propriè non est, nec composita omnia mista. Nam mista perfectè contemperata sunt, composita verò non. Deinde compositio eorum dicitur, quæ actu perfectò sunt, sive quæ actu naturali sub sua formâ propriè subsistunt, & unum ens formaliter non faciunt. Sed unum per accidens, ob continuationem terminorum & confusionem partium non perfectè contemperatarum. Qualis compositio non a natura solum fit, ut in metallis aliquando videmus, sed & ab arte, quando vel liquida liquidis, vel sicca siccis, vel sicca liquidis permiscentur aut venius junguntur, sive confunduntur. Mixtio verò propriè dicta, est corporum quæ non solum junctæ & unita sunt, sed & ita contemperata, ut unum ens formaliter faciant: Proinde mixta sub sua formâ propria non subsistunt, nec actu suo perfectò, ut voluit Avicenna, sed formas habent refractas & confociatas, ac unius formæ imperio devinctas & mancipatas. Qualis mistio propriè artis non est, sed ut Galeno credimus, Dei & naturæ opus. Finis autem misionis est miscibilia ad perfectam unitatem reducere. Quod non fit si miscibilia vel similia fuerint; vel in partes ad sensum minimas divisa quoquo modo uniantur; nec si tota per tota dividantur, ut Stoici voluerunt; verum ut fiat perfecta mistio, requiritur primum: ut miscibilia dissimilia sint, & ex contactu agant; nimirum ut communem materiam habeant, & vel contraria vel contrariis qualitatibus prædita sint, quibus in se mutuo agere & à se mutuo pati queant: Deinde ut illæ vires quodammodo pares sint: Tertiò ut miscibilia *evocata* sint, id est, faciliè dividi & terminari queant, ac in mixtionem determinationem suscipere, quam per se non habent: Quartò ut unum in alterum non corrumpatur,

tur, sed omnia eodem modo permaneant, & misto
 non potentia solum & virtute, ut latini voluerunt,
 sed revera insint, ac iterum separari queant. Talia
 miscibilia propriè sunt illa quatuor elementa, pro-
 xima mistorum materia. Nam ubi elementa ista
 quatuor viribus paria concurrunt, propter commu-
 nem materiam & contrariarum qualitatum pugna,
 ita se mutuo refrangunt & contundunt, ut cõtem-
 peratis eorum actibus, velut materia proxima com-
 muni formæ sive actui sese substernant, & ad me-
 dium quoddam reducta novam speciem constitu-
 ant. Nam finis missionis est, ut diximus, plura di-
 versa ad unitatem reducere, quæ reductio sine mu-
 tatione eorum quæ miscentur & reducuntur fieri
 nequit. Ea autem mutatio, generatio & corruptio
 non est, sed propriè alteratio. Proinde definitur ab
 Aristotele mistio, miscibilium alteratorum unio.
 Ista alteratio miscibilium sive elementorum perfe-
 cta esse debet, si perfecta sit mixtio, quæ sine accu-
 rata singulorum diuisione, nova particularum con-
 tinuatione, aliarum rarefactione, aliarum conden-
 satione &c. fieri nequit. Hac mutua actione elemen-
 ta ita franguntur, sibi mutuo complicantur & con-
 sociantur, ut sub suo esse perfecto nunc non con-
 servantur, sed sub illa misti forma, quæ contempe-
 ratis elementorum viribus subito emergit, diversa
 determinans & perfectè uniens, cujus formæ re-
 spectu, formæ elementorum conditiones materia-
 les solum obtinent, & ut necessaria instrumenta illi
 missionis formæ subserviunt. Nam (ut eleganter
 Scaliger) ad misti generationem, necesse est elemen-
 torum formas inter se suis domitas qualitatibus,
 pristinum naturæ rigorem, sub unius potioris im-
 perio deposuisse. Huic permissioni & illi permuta-
 tioni elementorum materia aliqua communis, ni-
 mirum illa prima, de qua supra diximus, subjecta
 est,

est. In qua actione primarum qualitatuum elementa ita permiscuntur, ut nulla pars misti dari poterit, quæ mista dici non debeat, nullave pars actu reperiatur, in qua elementa omnia non sint, & ex qua secretionem elici minime queant. Nam nisi omnia in quovis mixto perfecto elementa fuerint, mixtio perfecta esse non poterit, & cum omnis mixtio circa centrum mundi sit, terra necessario inerit: Si terra, & aqua quoque, quæ terræ siccitatem continet, & formabilem efficit. Si terra & aqua: & horum contraria, ignis scilicet & aer, alioqui perfecta mixtio & misti dissolutio nunquam erit. Verum in mistis quæ consistentia prædita sunt, terra aquam mole superat, in cæteris non item. In omnibus autem terra & aqua, ut præcipua materia, mole sua ignem & aerem excedunt sed non virtute. Nam igni prima virtus & efficacia tribuitur, quæ homogenea in unum cogit; Deinde aëri, qui tenuitate sua massam ex terra & aqua penetrat, temperat, & quasi fermentat, aded ut aer terræ & aquæ permixtus, idoneum pabulum igni suppetat: & calor igneus cum aërio junctus, totam illam massam permeare, permiscere, definire & concoquere queat, ac ad eum finem deducere quem natura intendit. Causa autem, quæ finem & formam intendit, est illa efficiens, quæ actiones primarum qualitatuum moderatur ac dirigit. Nam primæ qualitates in agendo per se modum servare nequeunt, nec mixtionis aut generationis ullius causa dici poterunt, sed instrumenta solum illius causæ, quæ actiones earum gubernat, & ad certum finem dirigit. Dirigit quidem mixtionem & generationem in animatis anima, aut plastica vis in semine: Tamen cum finis mixtionis & generationis sit continua & perpetua substantiarum naturalium successio, à motu continuo mixtio & generatio dependebit, & causam

natu-

naturalem continuam ac perpetuam habebit. Motus autem continuus nullus esse potest, nisi circularis, natura, tempore ac dignitate primus. Causa autem naturalis perpetua corpus illud solum erit, quod hoc motu circumfertur, nimirum cœlum. Igitur illarum substantiarum mutationes efficientia & motu cœlestium gubernantur & existunt. Verum cum effectus sint contrarii, causas contrarias habebunt, & ab uno motu ortus & interitus, elementorum *οὐρανίου & ἀγναίου* propriè non dependebunt. Nam horum contrariorum effectuum causa duo continui & oppositi motus in cœlo sunt, & partes discrepantes discrepantibus motibus præditæ, quæ ad consimilem positum haud unquam redeunt. Quare ortus & interitus, mixtio & dissolutio, quamdiu mundus durabit, nunquam deficiet, ac ad mutationem cœlestis motus quasi in orbem perpetuo ibunt. Haftenus de elementis elementorum permutatione & mixtione; De Temperamentis verò & cæteris, quæ propriè consequuntur mixtionem, nunc dicemus.

CAPUT II.

De Temperamentis.

IN perfecta mixtione, ex mutua contrariarum qualitatum actione, oritur, quod græcis *κρῆσις*, latinis temperies, temperatura, aut temperamentum propriè dicitur: & quia plura in se complectitur, à nonnullis Complexio vocatur.

Quomodo in mixtione ex primarum contrariarum qualitatum pugna, *κρῆσις* oriatur, & quid propriè sit, non omnes consentiunt. Alii volunt ex illis quatuor qualitatibus planè corruptis, oriri vel duas medias qualitates, ut recentiorum nonnulli, *currant in* vel unam communem, potestate cæteras quatuor *temperamento-*

C 4

con- mento-

continentem, quæ temperamentum dicitur: ut Avicenna, contra Fernelius ex qualitatibus summis, junctis, & permanentibus, oriri *κρᾶσι* putavit.

*Relicitur
opinio Avi-
cenna &
Fernelii.*

Cum autem temperamentum omnium consensu sit, quod ad actiones benè vel malè obeundas mixtum disponat, qualitas dici poterit, orta, non ex primis qualitatibus planè corruptis: sic enim & mixtio & mixti dissolutio nulla erit, ac medium illud unius potentiaæ semper permaneret, sed ex primis confusis & ad eam unitatem reductis, quæ formæ illius mixti propriè convenit. Non tamen ex qualitatibus extremis, junctis, & permanentibus *κρᾶσι* oritur, ut Fernelio videtur, sed ex qualitatibus mutua actione & passione primum alteratis, remissis, & refractis deinde unitis: alioqui consequeretur, unum contrarium in aliud nunquam trāsire, & cum Empedocle, elementa incorruptibilia semper permanere, nullamquè mixtionem esse, quæ miscibilium alteratorum unio definitur. Nam propriè mixtio non est, ubi qualitates extremæ in summis gradibus permanent; aut ubi una qualitas alteram planè vincit, & in suam naturam convertit; sed ubi mutua actione & passione contrariae qualitates sese contundunt, & reprimunt, donec ad concordiam & unitatem deveniant, quod non fit sine alteratione totius per totum.

*Distingui-
tur tempe-
ramentum
à mixtione.*

Hæc unio & concordia temperamentum propriè est, & mixtis perfectis tantum tribuitur. Ut enim unione substantiarum elementorum fit mixtio, mixtiq; generatio; ita unione qualitatū *κρᾶσις*: & ut substantiæ elementorum sunt materiæ mixtionis, ita qualitates elementorum sunt materia temperamenti: qualitates elementorum dico, ut vires illorum proprias, & non simpliciter qualitates, quæ pro modo subjecti sui vires variant: Nam eadem
calo.

caloris in aëre & igne vis non est, nec frigoris in terra & aqua: præterea, nec pari mole omnia elementa ad mixtionem concurrunt ut alibi diximus.

Medici verò nonnulli temperamentum cum mixtione confundunt: Nam aliqui temperamentum ipsam mixtionem, aut mixtionis rationem dicunt: alii in mixtione duplex temperamentum statuunt, unum ex permixtione substantiarum, alterum ex qualitatibus. Galenus 1. de Element. cap. 9. temperamentum vocat, ipsam elementorum commoderationem, & secundum potestatem æqualitatem: verum passim in lib. de tem. qualitatem vocat, alibi, ut de usu part. c. 9. substantiam & formam.

Cum autem temperamentum sit propria & proxima actionis causa: actio enim omnis à forma; forma verò sine necessariis instrumentis efficax non est: Nam quatuor sunt quæ in animato corpore coherent, functio à facultate, facultas à forma mediante partis temperamento ut dispositione necessaria: proinde Galenus temperamentum alibi qualitatem vocavit, quatenus est *actio orta ex mixtione elementorum*: sine qua efficax non est forma. Alibi ipsam substantiam & formam appellavit, quatenus substantiam partium determinant, ut necessaria conditio & materia dispositio pro forma educenda & conservanda, sine qua non subsistit, & per quam propriè operatur, & tum ut Medicus proximam evidentem, instrumentalem causam propriam sumit. Nam medico forma, qua pars agit aut patitur est temperamentum, & ut Gal. 7. Meth. cap. 3. scribit, conservare temperamentum est conservare actionem & formam. An verò forma, aut principalis aliqua virtus sit, dans esse temperamento; Philosophi magis est, quàm medici, inquirere.

Finis igitur temperamenti est, non solum quoeunque modo operationes formarum adjuvare,

Temperamentum Galeni nunc qualitas nunc substantia forma.

Temperamentum

C 5 sed

*Proprie est
instrumen-
tum forma
& harmo-
nia prima-
rum quali-
tatum.*

sed instrumentum necessarium esse sine quo non operatur ulla substantia aut pars; habent quidem formæ omnes naturales ingenitam agendi vim quam non exerunt nisi in subiecto aptè disposito & præparato: aptè disponitur temperamento vel proprio instrumento: quare, ut diversa sunt partium temperamenta, ita forma exercet suas facultates, ad diversas & discrepantes edicactiones, quod Gal. 7. Meth. cap. 3. innuit, ubi actionem partis propriam ab alterius ita efferre dicit quemadmodum temperatura à temperatura. Quare temperamentum proprie ut instrumentum ad aliud semper dicitur, & qualitas simpliciter non est, nec unione primarum qualitatum tantum definitur, sed unione in ea proportionem quæ inseruit formæ mixti tanquam primario artificii: similitudine concentus in voce & similibus. Nam ut uniuscujusque cantus sua est vocum harmonia, ita in generatione mixti, contrariæ elementorum qualitates coeuntes temperamentum non efficiunt, aptum actionibus illius formæ nisi in concordi harmonia mediocritate coeuntes ad tantum gradum reducantur qualem mixti perfecti in suo genere forma postulat.

*Definitio
tempera-
menti.*

Ex quibus colligitur, quod temperamentum sit harmonia sive unita quædam proportio, quatuor primarum qualitatum orta ex mixtione perfecta in hunc finem, ut sit velut instrumentum necessarium ad omnes mixti illius perfecti actiones. Quia verò in hunc finem, ut sit velut instrumentum necessarium in mixtione perfecta, calori naturali vis agendi primario tribuitur, ut ab Arist. 4. Meteor. c. 1. demonstratur, in eo præcipue temperamentum consistere videtur (licet omne calidum non dicatur) quo calore corrupto mixtum necessario resolvitur. Calor autem naturalis duplex est: unus *σύνθετος* sive com-plantatus, mixtis homogeneis & partibus similari-

bus

is proprius, qualis calor ex quavis perfecta mix-
tura oritur: alius $\epsilon\mu\phi\upsilon\tau$ sive innatus & vivificus,
proprio animato proprius, ut practica seminis in pri-
ma generatione productus ut proximum animæ in-
strumentum. Hic, ut ab anima dirigitur commu-
nicat omnium partium vinculum est, ac toti animato
corpori largitur tale temperamentum, quale illa a-
nima species postulat.

Tempera-

Quare alia temperamenti ratio est in inanima-
tis, ut mineralibus & metallis: alia in animatis: *ratio in ani-*
tam in metallis, gemmis, & aliis corporibus homo-
matis, alia
matis aut similiaribus, totum & singula partes uni-
in inanima-
tis sunt temperamenti: In animatis verò, diversa
tis.

unt singularum partium temperamenta, ob diver-
sum calorem partibus similiaribus connatum, diver-
samque structuram: & totum in quavis specie ex
diversis partium temperamenti, unum tempera-
mentum obtinet, propter illum unum calorem
connatum partes continentem. Hujus ratione anima-
lia calida & humida dicuntur, non absolute, sed
ad demortua collata & stirpes in quibus calor in-
natus non adeò viget, ut Gal. 1. de temp. c. 5. voluit.

Verum in animalibus duplex apparet tempe-
ramentum, unum fixum, innatum, sive radicale;
ortum in prima conformatione ex semine & ma-
terno sanguine, sub quo sexus temperatura contine-
tur: aliud fluens, ortum, non tam in prima confor-
matione quam post, ex iis quæ extrinsecus acce-
dunt. Hoc perpetuò mutabile est ob res non natu-
rales, licet non semper transeat limites sanitatis:
deinde, facile restituitur: verum radicalis tempe-
ratura licet ætatum decursu, caloris nativi in hu-
midum actione, & gravissimorum morborum in-
cursu varietur, penitus tamen ante dissolutionem
mixti non extirpatur, nec facile aut unquam resti-
tuitur, ut in febris hectica apparet. Hæc radicalis

*In anima-
libus duplex
considera-
tur tempera-
mentum.*

*Radicalis
& fluens.*

tem-

temperatura in animatis est, de qua hic propriè agimus.

*Differentia
tempera-
mentorum*

Temperamenti divisio ex vario contrariorum concursu sumitur. Quot enim modis variantur in mixtione elementorum vires, tot temperamentorum differentia oriuntur. In mixtione, aut mensura elementorum omnium æqualis concurrit, sive qualitates primæ viribus pares, aut impares vires & inæqualis mensura facultatum elementorum: Ubi autem æquales contrariorum vires occurrunt res

*Tempera-
mentum ad
pondus.*

frangentes sese in puncto medio, inter extremam mixtum quoddam exquisitè & simpliciter medium oritur, & temperamentum absolutum quoddam vocatur: ac quoque temperamentum quo ad pondus.

*Tempera-
mentum ad
iusticiam.*

Ubi autem qualitatis viribus impares, & elementorum inæqualis mensura ad mixtionem concurrit, mixtum absolutè temperamentum non oritur, nec temperamentum absolutè medium, sed quiddam alicui naturæ, & functionibus eius tantum accommodatum; distans in quadam latitudine à medio quo ad pondus, intra certos terminos: aliud enim accommodatum est uni naturæ omnibusque eius functionibus; aliud alteri. Quare, tale temperamentum in ea mediocritate est, quæ ad potestatem tantum refertur, & unicuiquè pro dignitate & naturæ modo convenit: quale quid iusticiam esse dicimus, quæ suum cuique pro dignitate tribuit unde temperamentum ad iusticiam vocatur. In ista inæquali qualitatum concursu, aut una qualitas cæteras vincit, sive excellit; aut duæ cæteras duas; nunquam autem tres unam: si una semper qualitas intelligatur cæteras vincere, quatuor simplices oriantur poterunt temperaturæ, nimirum, calida, frigida, humida, sicca: si duæ, cæteras duas: quatuor compositæ sive conjugatæ, nimirum calida sicca, calida

humida

DE TEMPERAMENTIS.

45 G A P.
II.

humida, frigida sicca, frigida humida. Quare ex sen-
tentia Galeni, novem erunt temperamenta, unum
absolutè medium. εὐκρατον dictum, octo illius medii
spectu δυσκρατα sive intemperata.

Tempera-
tura no-
vem.

Nihilominus tam philosophi quam medici sim-
plicia quatuor temperamenta una cum medio omi-
erunt, & aliqui duo tantum temperamenta cali-
um siccum, & frigidum humidum posuerunt. Cæ-
teri iique illustriores, quatuor composita tempera-
menta: & Athenæi sectatores, temperamentum per-
fectum sub calido & humido comprehendidixerunt.
xistimarunt fortasse (ut Averrhoës) activas quali-
tates in mixto sine suis passivis non consistere. Ve-
rùm, cum omnis mutatio a contrariis, & ex con-
trariis, fiat, in contraria: in mixtione quatuor qua-
tatum contrariarum fieri posse videtur, ut unum cō-
trarium ab altero vincatur, cæteris duobus ad æqua-
tatem revocatis, tamen tale medium absolutè non
est, sed sensibile solum, & quo ad nos, parvo tempo-
re durans. Nam una δυσκρατία sola non diu durat;
quare de temperamento medio ad pondus quod
ab calido comprehendere nequit, ut rectè demon-
strat Galenus, an revera in natura sit; & an tempe-
rumentum dici debeat, quod ad actiones tantum
refertur, dubitari non injuria poterit.

Varia opi-
niones de nu-
mero tem-
peramento-
rum.

Tale quoddam medium temperamentum dari
posse, mixtione artificiali ex aqua ferventissima & in natura
frigida: item ex aqua & cineribus Galen. 1. de tempera-
temp. c. 9. ostendere conatur: cum tamen miscere m-
t Dei & naturæ opus, & temperamentum illud, quoad pon-
tantum sensibus tale videatur, nec perfectum sit. dus.
erum 1. de Sanit. Tuen. c. 9. medium tale vix inveni-
, & si inveniatur, propter infinitas mutationes, ne
momento quidem subsistere fatetur. Quare ima-
inatione potius concipitur, quam revera sub-
sistit,

An detur
in natura
mentum
pon-

sistit, ut norma & mensura excessuum & defectuum
cujus mensuræ consideratio necessaria judicatur
non solum ut per hoc medium, tanquam per men-
suram alias temperaturas examinemus, & intelligamus:
sed etiam, ut in hoc medium, velut in normam
intenti, unicuique convenientem diætā præscribamus,
& statum corporis intemperatum corrigamus.
Quare Galenus temperamentum ad pondus
statuæ Policleti comparavit, quam canonem artifices
vocatunt, quod partium omnium competentem
am ad unguem haberet. Verum cum temperamentum
propriè aliquid in natura sit, & ad actiones referatur,
& functionum gratia dicatur, illud temperamentum
perfectissimum erit, à quo perfectissimæ
functiones, quale non est temperamentum ad pondus,
regulatantum excessuum & defectuum in imaginatione
consistens: sed illud ad justiciam, actionum causa,
propinquum tamen canoni, temperamentum
scilicet ad pondus.

*Temperamentum
perfectissimum
quo perfectissimæ
actiones.*

Deinde illud in toto animatorum genere perfectissimum
temperamentum habebit, quod præstantissimas & perfectissimas
actiones edit; Præstantissimas autem actiones edit homo, igitur
in toto animatorum genere humana species temperamentum
perfectissimum habebit. Præterea in humana specie ille,
qui functiones, tam animi quam corporis præstantissimas
habet, *εὐτατικός* sit temperatissimus erit, cujus respectu cæteri
homines intemperati dicuntur calidi nimirum, frigidi, humidi,
aut sicci. Ex quibus apparet, (ut docet Gal. 1. de Temp. cap. 6.)
εὐτατικός multis modis dici, sicut quoque intemperatum,
calidum scilicet, frigidum, humidum, siccum, quæ elementis
absolutè quidem insunt, mixtis vero in comparatione tantum
tribuuntur. Quare ubi de temperamento alicujus mixti
quæritur, absolutè respondendum non est.

Nam

Nam medium sive *σύνμετρον* aliud absolutè consideratur in toto substantiarum genere, æstimando pares elementorum vires, & non actiones, quale medium; ut diximus, norma tantum est excessuum & defectuum, verùm ut Gal. demonstrat, huic in natura correspondere videtur cutis hominis temperati, in primis vola manus; instrumentum præcipuum tactus, & regula sensioilium.

Deinde aliud medium consideratur in universo animatorum genere, ex actionum perfectione & dignitate: id ut diximus est homo aut humana species, cujus collatione, aut animalia alia dicuntur calida, alia frigida, alia humida, alia sicca.

Tertiò quælibet animata species propriam temperaturam habet, naturæ suæ convenientem, in magna latitudine; quare in quavis specie, medium sive *σύνμετρον* aliquod consideratur, quod ex actionis præstantia judicatur, & illud in quavis specie dicitur, quod optimè se habet, & functiones suas perfectissimè exercet. Hoc *σύνμετρον* diversimodè consideratur, aut enim ratione omnium gentium omniumvè climatium, quomodo sub quarto climate temperamentum perfectissimum erit: vel ratione certi alijus climatis & regionis: Nam alia est constitutio Scythiis qua sani sunt; alia Indis: atque hoc respectu medium in quovis climate erit, cujus ratione alia corpora dicuntur, & intemperata calida, frigida, humida, vel sicca.

Præterea individuum aliquod temperatum aut intemperatum dicitur, ad quodvis obvium conferendo: vel etiam sui respectu propter temporis, ætatis, diætæ & similium diuersitatem.

Eadem in partibus consideratio est vel respectu totius, vel ad se invicem. Nam homo respectu omnium partium in toto aut æquabiliter temperatus dicitur, aut inæquabiliter: *Æquabiliter autem, non*

I I.

σύνμετρον
quadrupli-
citer consi-
deratur.

I. Absolutè
in toto sub-
stantiarum

genere.

II. In toto
animatorum
genere.

III. In qua-
libet anima-
torum specie.

IV. In min-
tua compa-
ratione.

Homo ratio-
ne partium
vel est æqua-
biliter tem-
peratus vel
inæquabi-
liter.

non

non quia omnia membra unius sunt temperamen-
ti, sed quia omnium membrorum diversè tempera-
torum debita proportio & competentia est: quæ
competentia, si fuerit partium singularum perfectè
temperatarum, non solum æquabiliter, sed etiam
perfectè temperatus dicitur: Inæquabiliter vero
temperatus vocatur, si non sit omnium partium
naturalis ἀναλογία, sed aliæ justo calidiores, aliæ
frigidiores, ut Galen. 2. de temp. c. 6. explicat. Deinde
de ubi partes inter se comparantur, aliæ temperate
judicantur, aliæ intemperatæ, calidæ nimirum, frigi-
dæ, humidæ, vel siccæ. Eadem ratio est in ætate
bus, temporibus anni, alimentis, medicamentis, &
in summa in rebus naturalibus & non naturalibus
quæ omnia vel actu talia sunt, vel potestate: quæ au-
tem actu talia sunt, horum prompta est cognitio
utpotè quæ tactu propriè discernuntur: quæ vero
potestate, id quod dicuntur, parva intercedente
mutatione fieri possunt; ac ratione potissimum æstim-
mantur, ut Galen. 2. de tem. c. 2, demonstrat.

*Partium
singularum
humani cor-
poris tempe-
ramenta.*

*Partes ca-
lidæ.*

Verum ut à partibus incipiamus, primum in-
tenendum est, omne molle vel durum, mediocri ca-
lore præditum, humidum vel siccum esse. Deinde omne
imne exangue frigidum: contra, omne sanguine
abundans, calidum, verum sanguinis vocabulo, &
venalis & arterialis intelligitur. Quare quæ pars inter
hæc medium locum obrinet, temperatissima erit
talis est cutis in homine, maxime æque in vola ma-
nus & in summitatibus digitorum, ut ex usu & com-
positione ejusdem Galen. 1. de temper. c. 9, ostendit.
Quare cum hac collatæ aliæ partes intemperatæ di-
cuntur calidæ, frigidæ, humidæ, siccæ, ac primum
ex partibus cor, licet ob compositionem minus cali-
dum videatur ob sanguinis & spiritus copiam pars ca-
lidissima judicatur. Deinde jecur, hinc caro mu-
culorum, lien & renes.

Deinde

Deinde partes frigidae aliae simul durae siccaeque sunt, aliae humidae: frigidissimus autem & siccissimus est pilus & quae extra prominent: deinde os & cartilago, hinc *χρῆστος*, post tendo, deinceps membrana, arteria, vena, tandem nervi duri: Nervi verò molles, frigidi quidem sunt, sed mediam in siccitate & humiditate naturam obtinet, ut cutis: frigida simul & humida sunt primum adeps, quia frigore concrevit, deinde medulla ossium, hinc cerebri & spinalis medulla. Verum à cute incipiendo, primum, humidi sunt nervi, sensum deferentes, deinde, cor, jecur, lien, caro simplex, pulmo, hinc spinalis medulla, cerebrum, tandem ossium medulla & adeps.

*Frigida
sicca.*

*Frigida
humida.*

Præterea inter contenta humano corpori necessarij sunt humores, qui ex elementis per media alimenta gignuntur, & quatuor elementis compantur. Nam flava bilis, igni; pituita, aquae; sanguis aëri; melancholia terrae correspondet, & similibus qualitatibus prædita sunt. Verum præter calorem, partibus singulis connatum, sive temperamentum ex mixtione genitum, à corde, velut fonte caloris innati, per arterias in totum corpus omnesque partes, diffunditur, calor, sive spiritus vitalis, natura calidissimus, ejus appulsu vita existit: excessu, metum temeris supervenit, & in corpore singularum partium vires in actum deducit, & unit, omniaque regit ac moderatur. Hæc omnia ad corporis humani constitutionem requiruntur, & ex his temperamentum totius quoque æstimatur. Homo autem temperatissimus judicatur, à corpore, & ab animo, facultatibusque animi: A corpore verò, corporisque habitu; si apta omnium partium sit constitutio, imprimis verò trium partium principalium, cordis, jecoris, & cerebri: Deinde, si habitus medius sit, inter crassum & gracilem, mollem & durum, calidum & frigidum.

*Humorum
tempera-
menta.*

*Vnde æsti-
metur tem-
peramentum
totius cor-
poris hu-
mani.*

*Signa homi-
nis tempe-
ratiissimi.*

D

& fri-

CAP.
II.

& frigidum, hirsutum & glabrum: Præterea, si corpus vividū sit, apteq; perspirans, & pilos habeat colore medios inter album & nigrū, sed cum puer esset magis rufos, cum juvenis, magis nigros; Ab animo verò, si animo medius sit, inter timidum & audacem, cæterosq; affectus. item si prudens, perspicax, alacer, humanus: præterea, si benè alimenta concoquat, & digerat, omnesquè actiones tam animales quàm naturales inculpatas habeat, & medius sit inter somnolentum & pervigilem.

Signa hominis calidi.

Qui ab hac mediocritate discedunt, intemperati judicantur; Nam calidi latas venas habent, oleum jecoris cordisq; calorem: sed pingues non sunt, pilisq; abundant, & capillo magis nigro sunt, & acris calore præditi, animo verò magno, iracundo, & audaci: verum, si sicci simul sint, corpore erunt gracilior, magisq; nigro, hirsuto & duro; deinde animus magis præceps ferus & implacabilis, cū actionū promptitudine, præterea pervigiles: Si calidi simul & humidi, erit corpus magis carnosum, molle, colore ex albo & rubro, obnoxium putridis morbis: animus verò præceps, sed nec ferus nec implacabilis.

Hominis frigidi.

Qui verò frigidi sunt, angustas habent venas ex quibus quod in sanguine pingue est extra decidens concrevit, & non discutitur, unde pinguioribus sunt magis quàm carnosum, & natura desides, corpore glabro, calore miti, pilis magis albis, animo demissioris & timidioris. Verum, si simul humidi fuerint, erit corpus mollè, magis obæsum, & debile, deinde segnities, ingenii stupiditas, & somnolentia major: Si frigidi simul & sicci, erunt corpore durior & gracilior, animo constanti, sed tristi & timido.

Requisita inconsideratione tempera-

Verum in temperamento totius æstimando singularum partium, temperamenta prius observanda erunt, præcipuè verò trium principum partium, ut Galenus lib. artis medicinalis declarat: Deinde nisi æqua-

DE TEMPERAMENTIS.

51

C A P.

II.

menti cu-
insque.

quabile temperamentum sit, ex una parte solum
on est conjectandum: nec etiam ex solis mori-
us. Præterea distinguenda est partis naturalis
emperies, à non naturali, & videndum, ex qui-
us, & in quæ mutationes factæ sint. Nam ali-
quando præsens nota est index prioris tempera-
menti, quare ante omnia sexus & ætas consideran-
da erunt.

Sexus autem sua constitutio sive temperamen-
tum proprium est; Nam Galen. 2. de semine, non
ia ratione marem aut feminam generari dicit, ni-
ob caloris copiam & inopiam: copia enim calo-
is est, quæ membra genitalia in maribus solis ex-
rudir: quare naturali constitutione, mares sem-
per calidiores, siccioresquæ feminis sunt, quod pi-
orum multitudo, excrementorum natura, actio-
um robur & celeritas, aliaquæ plura manifestè ar-
uunt. Verùm, illa sanguinis menstrui in feminis
edundantia, caloris copia non fit, ut quidam vo-
uerunt, sed potius à debilitate caloris, non perfectè
concoquentis & digerentis suum alimentum.

Tempera-
mentum
sexus.

Deinde, ætas nihil aliud, quàm spacium vitæ,
uo actione nativi calidi in suum humidum, cor-
oris constitutio manifestè mutatur, Mutatur au-
tem corporis constitutio statim à prima generatio-
ne, pro qua mutatione alii aliter ætates numerant,
& aliqui tres potissimas, juxta præcipuas mutatio-
es, Adolescentiam, florentem ætatem, & declinan-
tem sive senilem: Hippocrates libr. 1. de carne. se-
tem ætates ponit, easquæ distinguit juxta anno-
um septimanas. Alii verò ut annum, ita vitam in
quatuor quadrantes dividunt, adolescentiam sci-
ficet, quæ infantiam, pueritiam, pubertatem, & ado-
lescentiam propriè dictam comprehendit, ad vicesi-
mum quintum aut tricesimum ætatis annum: Dein-
de juventutem sive florentem ætatem ad 30. aut 40.

Temp. &
tatum.

D 2

Ter-

Tertiò, consistentiam ad 45. aut 50. Quartò senectutem, quæ ingravescentem ætatem & decrepitas continet, & extenditur ad finem usque vitæ. Quæbet ætas suum temperamentum habet, ac primum quia formatio animalis ex semine & sanguine rebus calidis & humidis fit, quibus sicciscentibus, partibus continuè formantur & perficiuntur donec animal in lucem prodeat, edito verò animali velocissimè augetur; erit igitur infantium temperamentum calidissimum & humidissimum, cum in alio conformatio & auctio fieri nequeat: procedente verò ætate, animal siccius efficitur, calore naturale humidum suum depascēte, ad extremum usque senium ubi maxime cescit. In medio extremæ humiditatis & siccitatis est florens ætas, sed non frigoris & caloris. Nam a infantia ad consistentiam usq; æqualis quodammodo calor manet, differēs à puerorum calore tantum qualitate, quæ ex diffusus impuritate creatur. Nam puerorum calor est blandus, vaporosus, substantia purus & copiosus. Iuvenum verò acris, mordax, & ex alieni admistione impurus: qui duo calores tamē, non aliter differunt, quam idem calor, in solli aqua, & balnei aere. Quæ ætas florentem sequitur, frigidior, sicciorquē semper evadit, quare: extremum senium in frigiditate & siccitate consistit, viaquē ad interitum est, unde naturalis tabes dici poterit: verum illa senum siccitas, est secundum substantiam solidarum partium omnium, & non ratione excrementorum; Nam senes ob debilitatem caloris nativi, non concoquentis alimenta, excrementorum copia humidi sunt, licet in partibus solidis siccissimi sint. Consideratur quoque temperies in rebus non naturalibus, à quibus alteratur nostrum corpus, ac primum aër nos ambiens variatur, vel ratione temporum anni, vel regionum & locorum.

Qua

DE TEMPERAMENTIS.

53 CAP.

I I.

*Tempera-
mentum re-
rum non
naturalium
Temporum
anni.*

Quatuor anni tempora in se considerari de-
bent ex vicinibus in unoquoque qualitatibus &
in collatione mutua. Dividitur quodlibet anni
tempus, in initium, medium & finem. Medium sta-
bilem constitutionem, & qualitatem naturalem
continet, Initium aliquid naturæ temporis anni præ-
cedentis adhuc retinet, finis sensim ad qualitatem
temporis consequentis inclinat. Verum autem natu-
raliter dispositum, calidum & humidum non erit,
cum ea constitutio putridis & pestilentialibus mor-
bis maximè opportuna sit, Verum verò, (Hipp. 3. Aphor.)
saluberrimum est, morbisquè, exitialibus mini-
mè obnoxium, quare erit in medio omnium exces-
sum, & etiam medium ferè inter æstatè, quæ natu-
raliter sicca calida est, & hyemè, quæ frigida humi-
da; Præcipuè veris medium, licet ob Solis acces-
sum, qui terræ meatus referat, multosquè vapores
humidos suscitet, verum ad caliditatem & humiditatem
potissimum inclinaret, unde à Gal: interdum calidum
& humidum existimatur. Autumnus verò æstatis &
hyemis respectu temperatus videri poterit, cum
inter gravissimos morbis sit opportunus, quod inæ-
qualitati caloris & frigoris tribuitur, ut Hipp. 3. A.
Aphorismorum 4. hac sententia significavit: Cum eo-
dem die modo frigus afficit, modo calor urget, au-
tumnales morbi expectandi erunt: nihilominus sic-
cior est quàm humidior, quare siccus meritò judi-
catur, sed ex calore & frigore mistus sive inæqualis.

Deinde regiones & loca terræ aërem & cor. Temp. regio
tempora quoque contenta immutant & variant. Diffe-
rentur autem regiones pro ratione climatū & positus
cœli: quare regiones sub Ursa, frigida, humi-
daquè sunt; sed teste Galeno 2. Sanit. tuen. c. 7. ho-
mines ibidem inæquali temperamento præditi sunt.
Nam exteriora frigidiora sunt, ideoquè corpore mol-
li, pingui, albo & glabro magis sunt, capillo recto.

D 3 rus.

II.

ruffo, aut ad album declinante: Interiora verò immo
modicè calent, undè moribus sunt magis agrestes,
feroces, austeri & inhumani, item simplices & incauti.
Qui verò in calidis regionibus degunt, ob ambien-
tem æstum exteriora torrentur, & calor naturalis
foras extrahitur, undè cutis sicca & nigra est, corpus
gracile, capillus niger, crispus & fragilis, moribus
sevi & crudeles, ingenio subdoli & astuti: Verùm,
qui in temperatis regionibus degunt, naturaliter in
medio omnium excessuum sunt, & totum corpus
magis temperatum habent, ut supra dictum est. Præ-
terea natura ipsius regionis corpus animumq; variè
disponit, & aliter montosa, aspera, aliter curva,
pratensis, aliter plana: itidem aliter tenuis aër ali-
ter crassus vel impurus; Eadem ratio est in consuetu-
dine & vitæ studio, ut Hipp. de aqua & aëre demon-
stravit.

*Potestate
temperata
vel intem-
perata.*

Quæ hætenus proposita sunt, omnia actu ta-
lia sunt, qualia dicuntur. Potestate verò talia vo-
cantur, quæ id ipsum quod esse dicuntur, nondum
sunt, sed possunt evadere, si exhibita aut corpori ad-
mota à calore nativo leviter immutentur, cujus gene-
ris sunt medicamenta, quæ corpus nostrum immu-
tant, & alimenta quæ in substantiâ corporis vertun-
tur, quæ omnia temperata aut intemperata dicuntur
collata ad humanum corpus potissimum. Verùm
temperata nulla dicuntur, quia idem prorsus cum
humano corpore temperamentum habent, ita enim
corpora humana essent, sed quia à calore nostro in
actum deducta qualitatem hominis temperati non
supergradiuntur. Quæ verò una vel duabus quali-
tatibus superant, intemperata vocantur idque ab
illa qualitate, qua supergradiuntur calida, calida, fri-
gida, humida, sicca. Sed de his aliisque medica-
mentorum facultatibus suo loco
dicemus.

DE

CAPVT III.

*De Anima eiusdemque Facultatibus
in genere.*

Quia functiones humanæ, à facultatibus ori-
untur: facultates, aut ipsa anima sunt, aut ab
essentia animæ promanant: ut functionū cau-
sæ intelligantur ordo postulare videtur, ut animam
animæq; facultates primum cognoscamus. Deinde
ut corpus partesque corporis in quibus facultates
subsistunt, & à quibus functionum integritas & læ-
sio. Esse autem animam, ex actionibus, quibus ani-
mata ab inanimatis distinguuntur, omnibus teste
Galeno perfectè notum est, idq; notissimo axioma-
te, quo nihil sine causa fieri æstimamus. Animadver-
tunt enim omnes, animatum corpus nutrirî & au-
geri, deinde animalia à seipsis moveri & extra se po-
sitæ speciem percipere; quæ omnia in defunctis sub-
lata causâ abolentur.

Verùm quæ illa causâ sit quæ anima vocatur, *Philosopho-*
sive quid ipsa anima aut animæ natura, pauci vete-*rum & Me-*
rum Philosophorum, excepto Arist. aut etiam Me-*dicorum o-*
dicorum explicarunt. Nam relictis veterum opi-*piniones de*
nionibus, quas i. de anima Arist. refellit, Hippocra-*natura ani-*
tes essentiam animæ non explicavit, & ut Stoici fe-*ma.*
rè, cum calore naturali confundit. Nam i. de Die-
ta ex aëre & igne eam componit, 6. Epidem. ca-
lorem nativum vocat, alibi verò naturam appel-
lat. Galenus licet passim ingenuè fateatur, se igno-
rare quid anima sit, tamen cum Hippocrate libro de
Tremore & palpit. calorem naturalem sive spiritum
primogenitū & insitum vocat, eumq; naturalium o-
perationū autorem esse dicit, quo extincto vita perit.
Proin-

Proinde 7. *de Placit.* ex duobus alterum necessarium esse ipsam animam, vel quoddam fulgidum & quasi æthereum corpus esse, scilicet spiritum naturalem (ad quod asserendum velint nolint, consecutione cogente, coguntur Stoici & Aristoteles) vel incorpoream quandam substantiam, uti tamen hoc corpore velut principali vehiculo. Nihilominus libro *Quod animi mores &c.* ipsam animam corporis temperamentum esse concludit: observavit enim functiones à functionibus ita differre, ut temperamenta à temperamentis. Deinde servato temperamento functiones servari & facultates permanere, præterea animi mores corporis temperamentum sequi, proinde in corporis temperamento defixus, functiones ab ipsius corporis temperamento, ut prima & principali causa oriri existimavit. Verum *cap. ult. de foet. & form.* fatetur se veritum semper fuisse animæ substantiam definire, immo 6. *Epidem. com 5.* qui aliquid de ea, de quæ immortalitate animæ affirmarint, audacia magis quàm sapientia antecedere. Præterea eam cognitionem ad medicinam usum nullum habere, satisquæ esse scire, tres animæ partes five facultates sedibus distinctas in humano corpore existere, (*lib. de substantia natur. facult.*) & si aliqua immortalis sit, ancillari tantum eorum naturis, quæ ex mixtione temperata sunt. Nam quamdiu naturalis temperies corporis servatur, impossibile erit eam sejungi. Quamquam autem perfecta animæ cognitio Medico necessaria non sit, philosopho tamen utilis & dignissima videtur, à quo Medicus principia sua & animæ cognitionem mutuatur: deinde, Philosophus proxima operationum instrumenta à prima operationis causa semper distinguere debet.

*Refelluntur
qui dicunt*

Nam si anima id sit, quod totum corpus omnesquæ ejus partes perficit & gubernat, ac motum sen-

sensumquē tribuit, corpus certē non erit, siue spiri-
 tus naturalis, alioqui anima illa, quo dirigeretur &
 contineretur, vinculo indigeret, & per se tantarum
 operationum causa nunquam foret. Verū ut A-
 rist. 2. de Generat. animal. testatur, spiritus ille ab a-
 nima dirigitur, & non est ipsa anima, sed operatio-
 num animæ comes & instrumentum. Deinde corpo-
 ris harmonia aut temperamentum anima non erit.
 Nam in quovis animato una propriè est anima, ut
 pòst apparebit, sed tot mistiones, quot partes: nec
 etiam aliquid erit ex elementis ortum, sed quiddam
 superioris naturæ quàm elementa, quippe cum per-
 ficiat, augeat, loco moveat corpora ex elementis
 composita. Denique cum ipso corpore anima non
 mutatur, & senectus aliæquē affectiones animato-
 rum non fiunt, quia anima aliquid passa est, sed quia
 corpus, quemadmodum in ebrietate & morbis e-
 venit: & licet ira, gaudium & similia, animæ inter-
 dum tribuantur, animæ tamen motus non sunt,
 sed ab anima proficiscuntur, & corpus afficiunt, ac
 ad totum hominem pertinent, quales sunt ceteræ
 actiones præter intellectus, quas sine corporeo in-
 strumento anima per se exerit. Quamquam autem
 anima corpori ita deincta sit, ut sine apto & dispo-
 sito corpore nec operetur, nec etiam inexistat; cor-
 poris tamen temperamento non ancillatur, sed con-
 tra corporis temperamentum, ut idoneum instru-
 mentum ipsi animæ subservit. Nam ut anima in
 corpore subsistat & facultates animæ exerceantur,
 requiruntur instrumenta certo modo disposita &
 temperata. Quare rejectis veterum Medicorum o-
 pinionibus, animæ cognitionem ex Aristotele, &
 veris Philosophiæ principiis potius æstimabimus.

animam
 corpus aut
 tempera-
 mentum es-
 se, aut spiri-
 tū innatū,

Ratio co-
 gnoscenti
 essentiam
 anima.

Ac primum cum perfectè omnibus notum sit
 animam existere: necesse erit eam aut in numero
 substantiarum aut accidentium esse. Verū cum

C 5 acci-

accidens vi substantiæ, in qua subsistit, uno determinato modo propriè agat: anima verò tot tantarumque operationum per se causa sit, accidens cerè non erit. Quod si igitur substantia, aut materia, aut forma, aut ex utraque compositum quiddam. Verùm cum materia per se τὸ δὲ τί non cōstituat, sed δυνάμει solum sit, & passionis principium, nulla vi agendi per se præditum, aptum tantum, ut ab alio perficiatur, materia non erit anima: neque etiam compositum, nam animatum compositum quiddam est ex anima & corpore, corpus verò in eorum numero non est, quæ in subjecto sunt, sed potius ipsum subjectum & materia. Quare relinquitur, quod ipsa anima sit forma sive ἐντελέχεια, eaque prima, proprius substantiæ actus & forma materiam informans, ac actiones producens, qualis ἐντελέχειæ habitui & scientiæ comparatur, non autem ἐντελέχεια secunda, ut contemplatio, aut quemadmodum Ciceroni videbatur, ἐνδολέχεια agitatio & motio: quæ duplex est, una inchoata & imperfecta, formam præcedens, altera perfecta effectus consequens formam. Perficit enim anima corpus, non ut ars eternū actionis principium, sed quasi natura & principium insitum corpus physicum, non omne sed aptum actionibus animæ, quæ actiones vitæ nomine comprehenduntur. Nam vita à Philosophis actionū omnium unio & communio dicitur. Verùm cum facultas illa, quæ vitæ particeps, nulli insit, nisi corpori organico, qua differentia ipsa natura animatum ab inanimato evidenter distinxit, corpus aptum actionibus animæ, necessariò pluribus partibus cōstabit, quæ ita naturaliter dispositæ erunt, ut facultates animæ suscipere & ut idonea organa certo modo moveri, functionesque debitas obire queat. Nam anima duò præstat, primò informat, complect

& per-

& perficit corpus organicum, sive animatum in esse specifico constituit: deinde utitur corpore jam informato & animato tamquam organo: utriusque actui corpus aptum actionibus animæ habile esse debet. Verum prioris respectu ex anima & corpore, ut ex actu & potentia, animatum constituitur. Deinde, ipsa anima essentia & ratio corpus organici iudicatur, & sine anima, nullum corpus physicum, organicum dicitur: perinde ac si fingatur, instrumentum aliquod artis alicujus, ut securis corpus à natura formatum esse, quemadmodum foetus humanus in utero per novem menses: essentia certe illius securis erit id, ratione cuius dicitur securis, forma scilicet, organum illud, quatenus organum, informans, veluti anima: qua separata, homonymie solum securis diceretur. Verum cum ab arte securis fiat, & corpus physicum non sit: essentia eius ratio anima non erit, sed potius sumpta similitudine, à corporis animati partibus, de toto iudicandum erit, veluti si oculus fingatur animal, ipsius anima erit facultas videndi, *ἐντελέχεια* prima oculi, qua sublata oculus non erit oculus nisi homonymie, ut oculus pictus aut lapideus.

Ex quibus colligitur, quod anima propriè sit, *Definitio*
ἐντελέχεια prima corporis physici, potentia vitam *anima*.
habentis, & talis, cuius partes sunt organa. Manifestior animæ cognitio evadit, si propter quid animæ corpori insit, nimirum si ex propriis operationibus intelligatur, quas facultate insita de se promit. Ab anima autem vita proficiscitur, ut diximus, illaque vitam habere dicuntur, quæ vegetantur, quæ sentiunt, quæ loco moventur, & quæ intelligunt: quibus veluti gradibus animata inter se distinguuntur. Quare horum fons & principium erit anima, & id quo alimur, sentimus, intelligimus & movemur primo.

Hæ

III.

De facultatib. anima.

Hæ functiones in homine à diversis facultatibus unius animæ proficiscuntur, quæ diversæ animæ non sunt, nam una in quovis vivente anima est, quæ in partes natura discrepantes non dividitur. Sunt autem facultates vires quas anima de se promit ad munerum functiones, hæ in unoquoque vivente originaliter in una anima sunt, à qua promanant, ut diversæ operandi rationes, & agentis conditiones sive proprietates, sed in corpore, ut in subiecto recipiuntur. Cum igitur facultates functionum causa dicantur, quot sunt opera & functiones in quovis animato, tot erunt animæ facultates, at quatuor primæ functiones sunt, vegetatio nimirum, sensus, motus & intellectus. Quare in homine quatuor facultates enumerari poterunt, quarum prima ab Aristot. nunc *φύλην*, nunc *θετικήν* nunc *ψυχικήν* dicitur, & à Stoicis facultas naturalis: secunda sensitiva, tertia motiva, quarta intellectiva. Verùm motiva à sentiente facultate separata non est, ut alibi dicemus. Quare tres primæ facultates erunt, naturalis, sentiens & rationalis, quibus etiam veluti gradibus animata inter se distinguuntur.

Tria animarum genera.

Nam tria sunt genera animatorum, primum & infimum genus, quod unica solum facultate prædictum est, nimirum vegetativa, ut stirpes: secundum quod cum vegetatione vel sensum solum, vel sensum & motum habet, ut animalia: tertium & perfectissimum, quod omnibus facultatibus instructum est, ut homo. In his tribus animatorum generibus, tres distinctæ sunt animarum species, quæ ob inopiam vocabulorum iisdem appellationibus, quibus facultates ipsæ, semper designantur, cum tamen, ubi eadem facultas, ibi eadem animæ species non semper sit; nam facultas intelligens in homine cum sen-

*An plures
anima in
homine?*

sentiente necessario conjuncta est, & in brutis senti-
ens cum vegetante. Attamen eadem animæ species
vbiq̃ue non est, nec etiam in animalibus distincta est
anima vegetans à sentiente; aut in homine intel-
ligens à cæteris, sed vna tantum est, & simplex ani-
ma in homine, à qua omnes hæ potentia proma-
nant, & quæ in se ut totum potestativum, omnes
potentia includit, non aliter ferè quàm pentago-
nus, quæ figura simplex, tetragonum & trigonum
potestate continet. Nam ut in cæteris formatis, for-
ma necessario in toto est, ita in singulis animatis una
anima in toto omnibusquè partibus erit, licet prin-
cipaliter in uno membro, ubi primario residet sive
radicatur; deinde, quia ab una illa anima promanât
omnes facultates uniuscujusquè animati: anima ut
potestativum quiddam: secundum omnes potentias
simul junctas, in quavis parte erit, nimirum origi-
naliter omnes facultates in toto omnibusquè parti-
bus erunt, quemadmodum ipsa anima. Nam ubi ef-
fectiva, ibi agendi facultas. Verùm cum nihil reci-
pitur, nisi aptum natum sit recipi, in quacunque
parte quælibet facultas subjectivè non erit. Nam
quælibet facultas (excepta intellectiva) organum re-
quirat certo modo temperatum & dispositum, in
quo recipiatur, & per quod exerceatur. Quare fa-
cultas indistincta & indifferens, à proprio faculta-
tis organo determinatur & contrahitur, ut ubicum-
què anima invenerit organum, ibi facultas opere-
tur, nec alibi propriè dicatur: nam in organo fa-
cultas perficitur. Præterea facultas, quæ ratione sui
impatibilis, ratione organi variatur, & interdum de-
pravatè agit, aut munere suo frustratur, unde Arist.
i. de Anima, si senex acciperet oculum juvenis, vide-
ret ut juvenis. Intellectus verò in homine propri-
um organum non habet quo perficiatur, nihilomi-
nus, quia imaginatione utitur, ibi propriè intelli-
gitur,

*Anima ut
potestati-
vum in to-
to & sin-
gulis par-
tibus at fa-
cultates
subjectivè
ubi ope-
rantur.*

CAP.
III.*Sedes ani-
mae cor.*

tur, ubi imaginatio. Quoniam verò inessentialiter ordinatis ad primum aliquod semper deveniendum erit, omnisquæ pluralitas ad unitatem aut unum aliquod primum revocari debet, in quo plura communicant & conspirant, omnia in quovis animato membra ad primum aliquod colligari & conspirare debent, non aliter ferè, quàm omnes facultates ad unam animam. Quare erit unum membrum in corpore primum, radix animæ & fons caloris innati, à quo cætera membra vitam suscipiunt, alioqui si plura principia prima essent, totum corpus conspirabile non diceretur. Tale membrum, cor necessario in animatis corde præditis erit. Nam cor omnium consensu, est fons vitæ & caloris innati, deinde adminiculo & vi caloris innati partes omnes in corpore facultates exerunt, & in actum deducuntur. Unde spiritus ille ab Hippoc. pro anima ipsa accipitur: atque ita cor facultate sua cæterarum partium vires suscitatur, perficit & complexu suo fovet.

*Medicorū
opinio de
facultati-
bus ani-
mæ, earū-
quæ sedib.*

Galenus, Hippoc. & Plato, tres differentias animæ constituerunt, & non omnem animam ut Aristot. sed humanam dividerunt, & Plato in ἐπιθυμητικὴν, θυμικὴν & λογικὴν quas Galenus, naturalem, vitalem & animalelem vocavit. Proinde vitalem facultatem à vegetativa distinguat, & sub animali sensitivam & rationalem comprehendunt. Præterea has animæ differentias, certis sedibus in corpore humano distinguunt, nam naturalis sive appetitiva in jecore, vitalis sive irascibilis in corde animalis sive rationalis in cerebro sedem habere dicitur, ac ab his tribus velut fontibus vires in totum corpus diffundere putantur quibus animal regitur. Deinde libro *Quod animi mores* cap. 2. existimat Galenus, quamlibet harum facultatum appetitu suo ad agen-
dum

dum impelli, & naturalem appetitu cibi, potus & rei veneræ: vitalem, desiderio vindictæ, gloriæ, libertatis, &c. rationalem, appetitu cognitionis, veritatis, solertiæ &c. Quare ut facultas, ita triplex appetitus Galeno erit, naturalis, vitalis, animalis. Præterea Galenus s. de placit. ex decreto Hippocratis & Platonis affirmat, animam humanam non modò facultates multas in se habere, sed etiam ex partibus illis diversis genere, naturaquæ differentibus compositam esse. Verum, an hæ differentię novam animæ speciem constituent, an anima in partes ita dividua sit, meritò dubitatur. Nam primo vitalis nullam animati speciem constituit, nec appetitus differentię, species aut facultates animæ sunt. Præterea ex se junctis partibus anima composita non est, sed simplex forma, omnis coagmentationis experta; nam si tot animæ distinctæ in homine essent, quot facultates, in unum non conspirarent, & quo continerentur vinculo indigerent. Verum continet anima ipsum corpus, ut forma essentialiter individua, quod verò dividatur, id per accidens sit, ratione facultatum, vel quia corpus continet. Nam ubique una animæ species in toto & singulis corporis partibus existit, quod vel ex surculis ab arbore avulsis apparet, qui eadem animæ specie, subjecto discriminante vivunt: cujus contrarium in perfectis animalibus evenit, quia distinctiora organa requirunt. Deinde in perfectioribus animatis ubicumque superior facultas est, ibi necessariò est inferior. Quare in uno animato genere, hæ facultates non origine, sed ratione & instrumentis distinguuntur, in diversis verò animalium generibus, & ratione & origine.

Nihilominus ut admonet Galenus accuratè animæ cognitio Medico necessaria non erit; sed tantum facultatum, ut in corpore velut subjecto perscrutari.

Qualis cō-
sideratio

*anima Me-
dico neces-
saria sit?*

perficiuntur & existunt: & quanquam ipsa anima u-
nà cum omnibus facultatibus suis radicaliter in
corde sit, nulla tamen peculiariter in corde perfici-
tur aut manifestatur, excepta vitali sive pulsifica, qua
cor in centro microcosmi subsistens, ceteris partibus
radios vitæ subministrat, & vires distribuit, ac sin-
gularum partium facultates in actum educit. Nam
ibi formaliter & propriè facultas dicitur, ubi in sub-
jecto perficitur & manifestatur, quod in corde non
fit, nam si omnes ibi perficerentur, impedirent actum
primum & præstantiorem, nimirum vitam. Et licet
ultima perfectio sanguinis in corde sive à corde sit
fine qua nulla vegetatio, prima tamen ejus genera-
tio alteri principio adscribenda erit, nimirum jecori.
Quare Medicus, ut artifex, cui cura corporis de-
mandata est, in proprio subjecto singulas facultates
considerat, ac ratione subjectorum facultates distin-
guit: & licet sine vita nulla sit vegetatio, quia tamen
vitalis facultas & cordis actiones læduntur sine ma-
nifesta læsione facultatis naturalis aut animalis, vi-
talem ab utraq; distinguit. Deinde, quia sine sensu
ratio non exercetur, rationalem facultatem cum
sensitiva conjungit. De singulis facultatibus in spe-
cie infra dicemus.

CAP. IV.

*De natura & differentiis partium huma-
ni corporis.*

Quia functiones humanæ à facultatibus animæ
perficiuntur mediis instrumentis, expli-
catâ naturâ animæ & distinctione facultatum,
consequens est, ut instrumenta, nimirum corpus
partesq; corporis humani cognoscamus.

Pars

DE NAT. ET DIFF. PART.

65

CAP.
III.

Pars autem uno modo non semper sumitur, nec unâ ratione corpus humanum dividitur: nam omne quod naturaliter in corpore continetur & ad constitutionem ac conservationem ejus requiritur, pars communiter vocatur. Ita Hippocrat. 6. Epidem. 7. corpus humanum dividit in continentia, contenta & impetum facientia. Continentia sunt partes solidæ, in quibus residet facultas; contenta humores, qui à facultate naturali gignuntur: impetum facientia sunt spiritus, qui facultates deferunt & conservant.

Pars communiter
sumpta.

Propriè tamen partes humani corporis sunt continentia, scilicet solidæ partes, quæ ad numerum permanent, & in quibus residet facultas ut in subjecto, pro quarum constitutione facultas operatur. Nam si partium solidarum naturalis constitutio fuerit, bonas actiones; sin vitiata, læsas actiones producit. De his igitur partibus solidis tantum agemus. Galenus, locum, membrum, partem & particulam, ut Aristoteles distinguere non videtur; sed communiter omne quod totum complet, partem, particulam & membrum vocat. Pars propriè in comparatione ad totum dicitur. Verùm quidvis in corpore pars corporis dici non metetur, sed quod ad totius constitutionem facit, & ab anima regitur, communesquè facultates suscipit, ac sanitate præditum, morbisquè obnoxium esse per se poterit.

Pars propriè dicta

Quare pars propriè sumpta definiri poterit, Definitio corpus toti cohærens communi vitæ conjunctum & ad illius functiones usumvè comparatum. Excluduntur ergo è numero partium, non solum quæ præter naturam corpori adhærent, ut tophi, verrucæ & similia; ac quoque contenta & impetum facientia, ut supra dictum est: sed etiam ungues & cili, quorum teste Galeno cap. 9. Art. Med. genera-

partis propriè dicta.

E

tio

CAP.
IV.

*Comunis
partiu di-
visio: in
membra
& parti-
culas.*

*Propriadi
visio
I. Ratione
substantia
in simila-
res & dis-
similares.*

ratio quidem est, sed nullum regimen. Nam propriae non nutriuntur & accrescunt; sed materia ad rationes appositae in longum tantum proferuntur, & certis terminis non definiuntur: Deinde excluditur ossum medulla, quae partis alimentum est & non pars. Nam pars eadem numero manere debet. Eadem quoque ratione adeps est numero partium remouetur, quia tempore inedia partes nutrit & absumitur, ac certis terminis non definitur: nihilominus ungues, medulla, adeps ac etiam pili, licet innutriuntur propriissime, communi partis appellatione non rationem tam a Galeno, quam Aristotele continentur. Galenus vero in *de Usu part. cap. 2* partes describit, quae undequaque circumscriptionem propriam non habet, nec undequaque aliis conjunctae sunt: sed (*ibi dem cap. 8.*) quae ad totius alicujus constitutionem concurrentes sibi ipsis compatiuntur & consentiunt, siue in famulatum unius actionis omnes conspirant. Actio autem illa vel est totius animalis vel certi alicujus organi: quare partes duplices primum erunt. Nam quae in famulatum actionum totius animalis conspirant, magnae quidem & totius animalis partes dicuntur, & ab Aristotele membra vocantur, veluti, pes, manus, oculus. Quae vero ad totius alicujus organi actionem referuntur, minoris partes siue particulae proprie dicuntur. Ita oculus ex multis constat particulis, quae omnes ad unam actionem scilicet ad visionem conspirant.

Considerantur vero & distinguuntur partes vel ratione substantiae suae, vel ut ad actionem referuntur. Ratione substantiae dividuntur partes omnes corporis humani, in simplices, quae similes, homogeneae, primae, primigenae partes, & sensibilia corporis elementa interdum vocantur; & in compositas, quae dissimiles & heterogeneae, & non raro organicae partes & organa dicuntur.

Partes

Partes verò ut ad actionem referuntur, vel organa sunt, vel ad organi perfecti constitutionem concurrunt: organum autem ab operatione proprie dicitur, & 1. *Metk. cap. 6.* definitur, pars cujus perâ communem toti actionem edere possumus. Deinde Galen. *libello de Different. morb.* alia organa vocat prima & simplicia, ut arteriæ & venæ, quæ affimularibus annumerantur; alia secunda & composita, ut partes dissimilares. Quare organa non estimantur ex substantiæ similitudine & dissimilitudine, sed potius ex debita figurâ cum justâ magnitudine & positu, vel quia ad actionem idoneam omnium partium competentiam habent, quæ omnia magis in dissimilares reperiuntur quàm in similibus, ut post apparebit, unde dissimilares partes erè semper organicae vocantur.

Pars similis ut Aristoteles 1. *de Hist. animal.* definit, est quæ in partes sibi similes dividitur, sive ut Galen. 8. *de Placit.* cujus partes inter se totique similes sunt. Nam annumerantur similes, mixtis homogeneis, quarum universæ particulæ eandem minò formam & temperiem habent. Quare deniri poterit pars similis, mixtum homogeneum, ve corpus unam parilem substantiam habens, ortam à facultate generatrice in semine per suam altricem, & definitum proprio temperamento, hunc finem, ut certæ alicujus actionis causa sit. Dico mixtum homogeneum, non solum ob elementa, ex quibus similes partes componuntur, sed etiam propter dissimilares, quæ ex similibus. Nam ex his tribus triplici diversâ compositione ratione humanum corpus componitur.

Oriuntur quidem similes partes ex semine *Guaissa &* materno sanguine, sed quatenus elementis correspondent. Nam hæc duo teste Galeno 1. *de Sanit. similariis.*

CAP.
IV.

Tuen. quatuor elementa in se continent, ex quibus per mixtionem similes partes componuntur, singulae debitum temperamentum acquirunt. Quomodo verò oriantur partes ex semine & materno sanguine, alibi dicemus. Deinde dico à facultate generatrice &c. quia autore Galeno *1. de Nat. Facult.* cap. 6. generatrix vis per suam alteratricem miscet & substantiam partium similarium constituit. Deinde quia quævis similis particula, ut similis, suam alteratricem propriam habet in primâ constitutione: verum generatrix per suam formatricem particulas unit apteque componit & nihil otiosum relinquit. Quare quæ pars corporis nulli alteri facultatis formatricis implicatur, ea simpliciter similis dicitur.

Vsus similarium.

Tandem dico, definitum temperamento, ut sit certæ alicujus actionis causa, quod temperamentum primario & per se similibus, secundario & per accidens dissimilibus tribuatur. Deinde quod actiones sequantur temperamenta, & à partibus similibus primo actiones prodeant, ut Galen. *lib. de differ. morb. cap. 6. & 3. de locis cap. 5.* statuit. Nam quælibet similis suam propriam habet actionem.

Numerus partium similarium.

De numero partium similarium non consentiunt medici, plerique tamen decem numerant, ut sunt; os, cartilago, ligamentum, membrana, nervus, arteria, vena, tendo, caro, cutis, quibus adduntur interdum adeps, unguis, medulla & pili; licet propriissime partes non sint. Nihilominus Galen. *lib. 1. de Inaqu. Intemp.* è numero similarium excludit venas & arterias, quas alibi annumeravit. Quare non eadem significatione pars similis semper sumitur. Nam plerumque simile dicitur quod nobis tale videtur: sive ad sensum tale, qua significatione omnes illæ partes supra enumeratæ similes

es dicuntur. Interdum verò simile dicitur, quod
vera tale est, sive mixtum absolute homogeneum,
um alio nullo vi formatricis facultatis compo-
um & in partes diversæ rationis non dividuum :
njus generis videntur septem illa, quæ Galen Com-
ment. in lib. de Nat. Hum. recenset, nimirum os, car-
tilago, ligamentum, membrana, fibræ, adeps, ca-
ro simplex. Verum membrana, quia sensu prædita
nervis non caret & compositionem habet, deinde
adeps propriè pars non est : sicut nec pili & ungues,
licet absolute similia corpora sint, præterea caro
simplex, & sine fibris in corpore non reperitur, ni-
si fortè parenchymatum. Tot quidem numeran-
tur partes similes in corpore ; quarum singulæ
numero differentes sunt, ex quibus totum corpus
præcipuè componitur : Attamen præter has aliæ
nonnullæ deprehenduntur, quæ reipsa similes
sunt, sed nec numero differentes, nec pluribus
communes, verum in uno tantum membro repe-
riuntur, ac unius actioni propriè destinantur : cu-
jus generis sunt partes illæ, quæ instrumentariæ
vocantur, ut substantia cordis, cerebri, hepatis
lien, renum, pulmonis, testium, penis, humo-
res oculi &c. quæ à nonnullis sub carne continen-
tur, licet à carne musculorum, & ab invicem to-
to temperamento propriisque actionibus distin-
guantur.

Pars dissimilis ex diversis mixtis homoge-
neis sive similibus corporibus componitur, unde
composita dicitur, idq; ratione nostri potissimum,
& describitur, quæ in partes diversæ rationis divi-
ditur.

Verum dissimilis pars, ut ad actionem re-
fertur, vel quatenus perfectam actionem edere
potest, organum & organica pars dicitur, & tunc
definitur, pars composita ex similibus debito

numero in decentem formam & iustam magnitudinem coeuntibus, cum idoneo situ & consensu, facultate plasticâ, ad certam aliquam actionem perfectè edendam. Debetur quidem unicuique parti corporis sua naturalis unio sive continuïtas; verum in dissimilaribus, ut perfecti organi rationem habeant præter unionem requiritur apta compositio, nam ut temperies primariò similaribus, ita compositio dissimilaribus tribuitur.

*Requisita
in perfecto
organo qua-
tuor.*

Apta compositio quatuor postulat. 1. debitum partium numerum, & ne quidquam deficiat aut redundet. 2. iustam magnitudinem, sive ne major aut minor sit, quàm ratio instrumenti requirit. 3. Debitam conformationem totius membri in se, sub qua continentur idonei meatus & cavitates, convenientis forma & superficies ac debita figura. 4. Legitimum cum aliis partibus consensum & in toto situm. Quorum omnium si unum desideretur, bona compositio organi violatur, & pars morbo instrumentali afficitur.

Finis & usus organi.

Dico ad certam actionem perfectè edendam: quia actiones à similaribus primò prodeunt, sed à dissimilaribus perficiuntur. Conspirant enim, ut supra dictum est, uniuscuiusque organi particulae in unius actionis famulatum, sed non uno modo.

Partes organici perfecti, una principalis; cetera subministrantes.

Nam in quolibet organo perfecto, una particula principalis reperitur, cui in universo corpore nihil per omnia simile est, nec simili facultate præditum. Hæc est illa pars à qua primum actio oritur, radix sive domicilium facultatis; quâ posita ponitur facultas. Ceteræ verò huic subministrant, & in illius unius actionis subsidium concurrunt & conspirant. Tales triplices Galeno sunt *de usu part. cap. 8.* Aliæ enim sunt sine quibus non præstatur actio; aliæ, quibus melius; aliæ denique quibus tutius sive quæ ad conseruationem communem posita.

ita sunt. His omnibus organum absoluitur, à quo perfecta actio.

Partes totius corporis quatenus functionum aut officii ratione inter se conferuntur in principales & minus principales dividuntur.

Est autem principalis pars Galen. 7. de Vsu part. tamquam ad vitam per se necessaria est, sive quæ primariæ facultatis sedes & origo est, quam cæteris parti-

bis mediante spiritu transmittit. Eiusmodi sunt tres sicut tres primæ facultates, nimirum jecur sedes fa-

cultatis naturalis: cor vitalis: cerebrum animalis. Quibus tribus individuum propriè conservatur.

His addit Galen cap. 9. Art. med. testes, quia ad conservationem speciei seminisque generatione necessarii requiruntur, licet aliunde vires suscipiant, nimirum à tribus principiis, præcipuè vero à jecore, quod materiam seminis & vires nonnullas suppeditat.

Minus principales sunt cæteræ humani corporis partes, quæ ad principalium ministerium necessariae aut utiles judicantur. Hæ triplices sunt, nã quædam in se vires habere dicuntur, quæ nulli principi parti peculiariter inserviunt, sed toti magis communes sunt, ut ossa quæ totum corpus stabili-

unt, sustinent, & varia de articulatione voluntario motui serviunt. Deinde cartilagine, quæ articulos muniunt, & ad quarundam partium tutelam constru-

ctæ sunt. Tertiò mēbrana & ligamenta, quæ singula arctè connectunt, copulant & firmāt. Quartò cutis, quæ totum corpus contegit, & ab injuriis defendit.

Tandē caro simplex, adeps & adenes. Aliæ peculiari principi parti subministrant, & ad ejus ministerium requiruntur. Hæ duplices sunt vel nã à principe aliqua parte oriuntur, sive dispensationis & radicationis in itiu in ea sumunt, & vires aliunde emanantes solū suscipiunt. Harū munus propriū est, ut ab alia principali parte aliqd deferat. Ita spinalis medulla & nervi

Divisio organicarum partium.

Partes principales corporis tres.

Partes minus principales triplices.

*Sedes trium
facultati.*

à cerebro: arteriæ à corde: venæ à jecore, originem sive dispensationis initium habere intelliguntur: & vasa spermatica à testibus. Vel denique à certa principe parte non oriuntur, & dispensationis initium sumunt, sed actione sua alicui principi parti subserviunt, & vires tam proprias, quam aliunde emanantes habent. Harum munus est ut viribus infitis vel principis partis actionem adjuvent, vel aliquid ei præparent, vel certum munus absolvant. Ita ventriculus & intestina materiam idoneam jecori præparant, lien, vesicæ & renes illius actionem nimirum sanguificationem adjuvant, separando inutilia à sanguine. Sed instrumenta quinque sensuum & musculi instrumenta motus transmissa sive communicata illis facultate à cerebro per nervos, sensus externos, & motum voluntarium absolvent. Dividitur totum corpus communiter in ventres, ubi resident facultates; & artus, qui voluntario mutui potissimum serviunt. Ventres autem duos tantum veteres numerarunt, superiorem nimirum thoracem & inferiorem sub septo transcurso: Recentiores vero caput addiderunt, ac in his tribus illas primas animæ facultates residere putant. Nam natura non solum tres facultates, tria quæ præcipua instrumenta animalibus concessit, sed etiam cuique pro dignitate convenientem locum assignavit: Cerebrum enim in capite superiore, digniore quæ loco collocavit quasi in specula, cui assistunt exteriores sensus, & à quo in totum corpus distribuuntur nervi gratia sensus motusque voluntarii: Iecur cum cæteris visceribus, quæ illi ministrant, & membris facultatis generatricis in inferiori ventre esse voluit, ne actiones cerebri offenderet. Medium ventrem assignavit cordi, quod focus caloris nostri est, ut pariter partes omnes tam superiores, quam inferiores calefaceret. Singulos ventriculos continent & muniant

membranz, ligamenta, ossa, cartilagine tan-
temq; muscoli, carnosa membrana, ac cutis cum cu-
ricula, quę totum corpus contegit: Atq; hactenus in
genere de differentiis partium humani corporis. De
ecurata in omnium singularumquę partium descri-
ptione non est nostri instituti hoc loco agere, nec
Historiam Anatomicam contexere. De usu singula-
rum partium latius in sequentibus capitib. agemus.

CAPVT V.

DE CALIDO INNATO
ET SPIRITIBUS.

CUM à natura omnibus animalibus tributum
sit, ut vi caloris insiti vitam agant, & spi-
ritum habeant, qui hunc calorem conti-
neat, cujus adminiculo facultates in corpore defe-
runtur, & cōservantur, explicata distinctione facul-
tatum animę & partium humani corporis, conse-
quens est, ut caloris innati & spirituum considerati-
onem proponamus.

Ac primum calor unus ab alio specie non
differt, (ut quidam arbitrantur,) sed cum calor in-
strumentum sit, quō agens principale utitur, di-
versus calor judicatur diversorum utentium respe-
ctu; ita calor ille qui comes & proximum instrumē-
tum animę est, cujus participatione vita, extinctio-
ne mors (Autore Aristotele libro de Vita & Morte) lor.
definitur, *ἰνφύλῳ*, sive innatus dicitur, & eo respectu
non solum à calore non naturali, qui rem corrumpit
sed à calore influente, ac etiam *συμφύτῳ* sive con-
nato, mixtis homogeneis proprio distingui-
tur.

Calor innatus quid.

Calor autem innatus nomen habet, quia à pri-

E 5 mo

mo ortus principio animatis innascitur, & qua id, quod nascitur, & natum est, auget, fovet, & conservat: verum ut Galenus innuit *Libro contra Lycum*, calor innatus & calidum innatum distinguuntur, licet indifferenter pro uno eodemque non raro sumantur. Nam calidum innatum subiectum significat, & corpus denotat, calore innato affectum; at ipse calor innatus ut forma & qualitas per se intelligitur. Corpus autem perfusum hoc calore, vel in quo calor subsistit, substantiæ tenuis & fluxilis esse debet, quæ variè diffundi, caloremque conservare potest: tale corpus non est ignis, nec aër, sed mixtum quoddam referens naturam aëris, eximiis viribus præditum, & cœlesti corpori similitum, quo cuncta in animatis illustrantur, perficiuntur, & in actum deducuntur: hoc corpus, quia tenuissimum est, oculos fugiens, & facilè permeans, omnesque humani corporis partes illustrans (ut post apparebit) Spiritus vocatur: verum spiritus hic quivis non est, sed primigenius omnibus partibus insitus & complantatus, & causa aliorum spirituum, quem tamen veteres nonnulli spiritibus non annumerarunt. Spiritus autem vocabulum homonymum est, & pluribus natura differentibus tribuitur: tribuitur enim & substantiis quibusdam corporeis & omnibus incorporeis: verum ut spiritus rebus naturalibus annumeratur, communiter definitur corpus mixtum ex vapore genitum à natura, gratia conservationis facultatis animæ in corpore. Facultates duplices sunt in corpore: aliæ enim disseminatæ sunt per singulas totius corporis partes, omnibusque similiter insunt, conservationis gratia, quæ insitæ dicuntur: aliæ in certo organo sedem & domicilium habent, unde velut à fonte & principio, quemadmodum radii à Sole, in totum corpus diffunduntur & emanant.

Definitio
spiritus.

Quare

Quare duplex erit spiritus, unus qui insitus, innatus, & complantatus dicitur; alius influens & emanans, qui triplex judicatur, sicut tres principales facultates: nam unicuique facultati suus est spiritus, instrumentum, sine quo non conservatur, nec etiam agit, de his omnibus spiritibus ordine dicemus.

Ac primum spiritus insitus, sive calidum innatum, est præcipuum & communissimum conservativum instrumentum omnium facultatum animæ in corpore, unde pro ipsa anima interdum sumitur, & autor omnium operationum à Galeno vocatur, ab aliis nonnullis vinculum animæ & corporis; nam autore Galeno 5. *simplic. cap. 9. & 1. de Locis cap. 7.* omnes totius corporis partes hoc spiritu fruuntur, & vivunt, & 1. *Aphorif. 15.* hic spiritus initio partes format, auget, & ad terminum vitæ conservat, quare sublato hoc custode facultas cessat, & corpus aptum actionibus animæ non erit.

Producitur enim fœtus humanus in utero ex semine & materno sanguine, semen autem spiritu plenum est: his tribus in utero unitis oritur conceptus, & in conceptu resultat spiritus insitus, sicut calidum innatum, huius spiritus calor initio organum generatricis fuit, residens in semine, spumosoque corpore, unde Plasticus calor à nonnullis dicitur: verum dum producitur fœtus, fundatur in humidiori perfectiori, pinguiori, & tenuiori seminis portione, ut in proprio pabulo, quod humidum primigenium & radicale vocatur, & per omnes fœtus partes disseminatur (Galen. *libr. contra Lycum cap. 5.*) ut communis omnium facultatum custos & instrumentum, sed copiosius & efficacius in corde consistit, unde cor fons & origo insiti caloris à Galeno 9. *Method. c. 9. & 3. de Vitis respir. capit. ult.* dicitur.

Qua-

V.

*Calidi in-
nati partes
duæ.*

*Quomodo
cōveniat &
differat à
calore ignis.*

Quare spiritus insitus, sive calidum innatum duobus constat, nimirum humido primigenio, perfuso calore innato, unde flammæ aliquo modo comparari poterit, perpetuoquè in se mobilis existit, & insitus calor calori igneo aliquo modo similis erit: nam calor natus in agendo semper occupatus est, humidum suum depascens, ac quoque materiam *superius* caloris, ac proinde ejus ratione corpus quasi *superius* quoddam, in perpetuo de fluxu consistit. Deinde tamdiu Spiritus insitus viget, quamdiu ipsum humidum radicale, quod ardore sua depascit: quo consumpto ipse spiritus resolvitur & calor evanescit, ac animal interit. Verum in aliis calor insitus calori igneo dissimilis est: nam non tantum humidum & materiam similarium partium consumit, & in halitus dissolvit, sed etiam vegetando & nutriendo materiam deperditam subinde reficit, & restituit, qua restituta individuum ab interitu aliquandiu vindicatur, & certo tempore conservatur; tanta enim est vis innati caloris in consumendo suo humido, ut si id, quod defluxit, non reparetur, (autore Hippocrate libro de Natur. pueri.) ultra septem dies vita humana durare naturaliter vix queat, itaque reficitur perpetuo humidum primigenium alimentario humido, atque hoc modo calidum innatum & substantia corporis animati conservatur.

*In quibus
plus & mi-
nus calidi
innati.*

Quare calidum innatum, ut voluit Hippocrates, in pueris & iis qui crescunt copiosius sua substantia est, & purius; in senibus contra, in quibus sensim, deficiente nativo humido, marcescit, unde naturalis interitus necessariò consequitur; verum violenter calor insitus interit, si frigore perimatur, vel excrementorum copia suffocetur, vel alieno calore (ut in Hæcticis) humidum radicale absumatur.

Move-

Moveretur autem in se spiritus innatus, & non solum fomite, sed etiam eventatione indiget, & qualitatem suam à fonte scilicet à corde quoquo versum diffundit; nisi prohibeatur, ut in rigore evenit, ubi repressus ad suum principium refluit, sesequè colligens variè insurgit adversus ea, quæ transitum ipsius occupant; totum corpus frequenter agitans & commovens, ut in libro de Tremore & palpit. Galenus ostendit.

Ex quibus colligitur, quod calidum innatum *Definitio*
sive spiritus insitus sit corpus mixtum, calore infi- *calidi innati.*
to perfusum, genitum à facultate generatrice, ex perfectiori, tenuioriquè substantia seminis & sanguinis materni portione, subsistens in omnibus corporis animati partibus, sed efficacissimè in corde; ut in fonte, gratia conservationis omnium facultatum animæ in corpore. Dico mixtum corpus & non æthereum (licet cœlesti aliquo modo proportionale sit, & similes vires habeat) quia alimentis & respiratione conservatur, & reficitur; quod cœlesti corpori non tribuitur. Inest quidem spiritus iste facultatum conservandarum gratia omnibus partibus, ut eas foveat, regat, & conserveat, sed in omnibus eodem modo se non habet. Nam in singulis partibus variè determinatur, & limitatur, ad propriam ipsarum partium facultatem conservandam; & in singulis permistam habere debet substantiam illarum facultatibus appropriatam: ita in oculis spiritus insitus visum facit, si crystallinus humor permistum habuerit spiritum animale, quare Galenus 7. de Placit. cap. 7. spiritum oculorum (qui alius nullus quam insitus) à spiritu animali lucidum fieri dicit.

In corde verò maximè viget spiritus insitus, *Fons calidi innati*
unde fons & origo illius vocatur. Nam cor præcipuè spiritu & calore præpotente præditum est, ut cor.

non

V.

non solum seipso gubernando det operam, sed alium quoque spiritum generet, scil. vitalem per arterias in totum corpus diffusum & promanantem; Idem quoque facere judicatur jecur gignendo spiritum naturalem, & cerebrum animale.

*Opiniones
de nume-
ro spirituum
influen-
tium*

Verum spiritum illum unicum à corde influentem nonnulli sufficere arbitrantur, cumq; non solum per arterias in corpus diffusum, partes omnes vivificare, sed etiam omnis vegetationis causam esse, præterea ad cerebrum ascendere, perque nervos descendere, & sensum motumque excitare, atque ita a seipso specie non differre, licet aliter atque aliter se habeat. Alii verò duos solum spiritus influentes enumerant, vitalem scil. & animale re-
jecto spiritu naturali, vel quod nullius usus videatur, & singulae partes insita vi insitoque spiritu alimentum suum trahant, & concoquant, vel quod nullum generationis suæ locum aut cavitates habere judicetur; & si aliquid tale sit, spiritus nomine indignum videatur. Verum cum discrepantes actiones à discrepantibus formis prodeant, & naturæ diversæ species differentes pariant, ac forma acquisita ut in fine natura semper acquiescat; unus idemque spiritus in arteriis & nervis non erit. De naturali verò spiritu à jecore influente, an & quid sit, meritò dubitari poterit.

*Andetur
spiritus
naturalis*

Vivunt quidem partes omnes proprio calore, & insitis facultatibus, quarum si permanens esset essentia (ut testatur Galen. i. de *Vsupart. cap. 16.* & i. de *Locis. cap. ult.*) nullo ad vitam indigerent: verum quia alimento indigent & custodire oportet caloris insiti *ovumque*, venis & arteriis indiguerunt; nam venæ à jecore alimentum deferunt: arteriæ à corde cum sanguine spiritum vitalem & vim conservatricem caloris insiti in partibus. Aristoteles, & Averrhoes partium nutritionem ex utroque sanguine, ve-

ne, venali scil. & arteriali commisto & contempe-
rato, perfici putarunt. Deinde venarum sangui-
nem vice materiæ illi esse, qui ex arteriis à corde
promanat, & hunc vici formæ, quia alterum illum,
ut crudum & inconcoctum, concoquit, perficit, &
actu alimentum reddit. Quare naturali aliquo spi-
ritu, à jecore influente, corpus indigere non vide-
tur: præterea existimant vim à qua pulsus, altricem
esse dividendam & calorem impartientem, eumquæ
unâ cum altrice conservari. Galenus sanguinem,
qui per venas à jecore diffunditur, nutrimentum
per se putat, sed an spiritus aliquis ei detur, cu-
jus sedes in jecore sit, 12 *Method. cap. 5.* dubitat, & 1.
de locis cap. ult. naturalia instrumenta ab animalibus
distinguit, quod naturalibus insita actionis vis sit,
animalibus verò à principio, ut lumen à Sole in-
fluens, unde accidit, ut illæsis instrumentis ani-
malibus actio non raro pereat: illæsis verò natura-
libus, nunquam. Attamen Gal. 5. *aphor. 53.* sine spiri-
tu nullas actiones fieri dicit, deinde pluribus in lo-
cis affirmat, virtutem sanguinis effectricem ab epate
venis influere; quod sine spiritu fieri non videtur,
quare ut cæteræ duæ principales facultates habent
calidum innatum pro organo ut miscetur spiritui
animali & vitali, ut post apparebit, ita vis sanguifi-
catricis pro organo obtinere putatur calidum insi-
tum mixtum cum spiritu naturali in jecore.

Quare hic spiritus longè à natura aliorum spirituum
differre decet; Idcirco primo aereus non est, nec adeo
purus ut cæteri duo, sed caliginosus, & sanguineus,
aut potius vapor sanguinis, proportionatus ipsi je-
cori, cujus actio, sanguificatio, maximè naturalis est,
unde spiritus actionis illius instrumentum. min^{us} efficax,
magisq; terrestris judicatur. Nā quo facultas ignobi-
lior est, eo crassiores minusq; efficaces spiritus sibi vè-
dicat Deinde non indiget cavitatibus aliis, q̃ jecoris,

aut

Quomodo
detur spi-
ritus na-
turalis.

CAP.
V.

aut venarum in jecore, in quibus oritur, quia materia ejus, ut cæterorum spirituum cum aëre attracto non permiscetur. Præterea à jecore propriè venis communicatur, sanguificationis gratia, ut sanguinem perficiat, distribuatur, & sua vi sursum evahat cum natura sua sanguis crassus & terrestris sit; distributo verò sanguine, singulæ partes insita vi alimentum suum attrahunt & perficiunt: præterea in se vire judicatur, ut materia sit ex qua gignatur spiritus vitalis.

Definitio
spiritus
naturalis

Hoc modo definiri poterit, corpus mobile genitum ex vapore sanguinis, sive ex optima, tenuiorique portione, vi insita jecoris, gratia sanguificationis, ut sanguis perficiatur, meliusque per venas in totum corpus distribuatur.

De vitali
spiritu.
Causa
spiritus
vitalis.

Vitalis spiritus manifestissimus est, ejusque actio evidentissima, unde unicus solusque spiritus nonnullis judicatur. Nam pulsatur, impetuque movetur, & calorem evidentissimum habet. Oritur hic spiritus in corde ex spiritu naturali, ut aliqui arbitrantur, vel ex tenuioris sanguinis portione fluentis ad cor, sive ex humorum vapore permixto cum aëre opere respirationis attracto, ut Galenus 7. de *Placit.* cap. 3. & 12. *Method.* asserere videtur. Est enim cor fons innati caloris, cujus vi sanguis attenuatur, vaporque excitatur, qui dilatatione cordis, in sinistram cordis sinum attrahitur & colligitur, ubi cum aëre attracto ex respiratione & arteriarum dilatatione, permiscetur, & vi insita cordis in flammean substantiam convertitur, qui spiritus vitalis dicitur. Nam cor, quàm diu animal vivit, perpetuè movetur, ac peculiariter vim vivificam habet junctam pulsificæ, unde dependet generatio sanguinis & spiritus in corde ac conservatio caloris naturalis. Fit enim pulsus ab ipsius cordis expultrice & attractrice facultate, & perficitur motu distensionis

& con

DE CALIDO INNATO.

81

CAP.
V.

& contractionis primo cordis, deinde arteriarum, quæ cordi continuantur, & cordis motum imitantur. Nam dilatatione sua cor, & arteriæ ex vicinis materiam convenientem attrahunt, & implentur; eaquæ materia attracta, vi vivifica cordis in spiritum transmutatur; contractione verò sua expellunt, & spiritum cum sanguine distribuunt. Quare non dilatantur arteriæ quia implentur, sed implentur quia dilatantur, & vis dilatandi tunicis arteriarum à corde communicatur, licet spiritus per ipsas arterias deferatur.

Finis spiritus vitalis primo in ipso corde est, ut permixtus calori insito cordis, reddat facultatis vitalis appropriatum instrumentum, Deinde extra cor, quatenus per arterias delatus calorem à corde influentem in omnes partes defert, ad conservandam *superficiæ* caloris insiti in cæteris partibus: inseruit præterea ut sit materia apta, ex qua spiritus animalis gignatur.

Finis spiritus vitalis.

Quare definiri poterit, corpus mobile à corde per arterias in totum corpus diffusum, genitum in sinistro cordis ventriculo, vi insita cordis, ex aëre cum sanguinis vapore commixto, ut facultas vitalis conservetur & deferatur, ac calor innatus in sua temperie custodiatur.

Definitio spiritus Vitalis.

Restat spiritus animalis, proximum conservativum facultatis animalis instrumentum; hujus domicilium & fons est Cerebrum, sedes animalis facultatis. Gignitur autem hic spiritus ex vitali spiritu potissimum per arterias in retiformem contextum delato, permixto unâ cum aëre ope inspirationis attracto, & in cerebrum, cerebrique ventriculoseffuso, cerebro se dilatante & materiam idoneam attrahente, ubi postea vi propria cerebri absolvitur, & formam ultimam acquirit.

De spiritus animalis.

Causa

Munus hujus spiritus primùm in ipso cerebro

Munus

E

est

C A P.
V.
*spir. ani-
malis.*

est, ut permistus cum spiritu innato ejusdem, idem
neum & appropriatum sit facultatum principium
sive sensuum interiorum instrumentum. Deinde
extra cerebrum, quatenus à ventriculis cerebri per
spinalem medullam & nervos irradiando & perme-
ando in totum corpus diffunditur, ut facultates
sensus motusquè deferat & custodiat. Nam spiritus
hic tenuissimæ substantiæ est, & instar radiorum
Solis per nervos citissimè diffunditur, nisi impedi-
tur, & nervos ipsos perficiens, & per nervos sensum
& motum partibus tribuens. Igitur ad sensationem
partes propria facultate & duplici instrumento, scilicet
nervo & spiritu animali indigent.

*Definitio
spiritus
animalis.*

Cōclusio.

Quare colligitur, quod spiritus animalis
corpus mobile, genitum in cerebro ex spiritu
tali cum aëre permisto, propria vi cerebri & per ner-
vos in corpus diffusum, ut facultas animalis conse-
vetur & distribuatur.

Ex quibus omnibus apparet, universum ani-
malibus principalibus facultatibus, totidemque
facultatum vehiculis, spiritibus scilicet influentibus
gubernari, & sine his nullam partem calorem innu-
tum & facultates ab ortu insitas conservare: Præter
rea omnes partes corporis & insito spiritu & in-
fluentibus viribus vivere, facultatesquè suas con-
servare. Consequens est, ut singulæ facultates in spe-
cie proponantur.

C A P. VI.

*De Naturalibus Facultatibus in Genere:
Et in specie de altrice, auctrice &
vitali facultate.*

EX illis animæ facultatibus, quibus velut gradibus viventia cuncta distinguuntur, communissima est naturalis facultas, quæ non solum cæteris quasi fulcrum quoddam subternitur, sed etiam per se separatim existit, infimumquæ gradum viventium, nimirum *φύρον* constituit. Nam plantæ è terra, certa definita ratione producuntur in quæ ea nutriuntur & augentur, insito quodam vitæ principio. Hoc insitum principiū ab Aristotele nunc *δυνάμεις φύσει*, nunc *ὀρεπτικῇ* dicitur: à Platone *ἐπιθυμητικῇ*: à Galeno plebeia consuetudine *φύσιν* ejus functio vegetatio communiter dicitur, quæ nihil aliud est, quam individui & speciei conservatio: nam facultas naturalis propriè est illa animæ vis, qua instrumento caloris nativi ex alimento corpus animatum nutritur, augetur, & simile secundum speciem generatur. Principium autem omnium functionum anima in quolibet vivente unica tantum est, licet ratione functionum, quas ex diversis sedibus profert, multiplex esse videatur: Unde Plato & Galen. tres animas sedibus distinctas in corpore constituerunt, eademquæ animæ concupiscibilis in jecore, unde alimentum materia ex qua fit omnis vegetatio.

Facultates autem illæ animæ ex functionibus suis deprehenduntur: nam quot sunt functiones, tot sunt illarum functionum causæ, & totidem quoque opera. Causa autem est ipsa facultas animæ naturalis: functio verò est activus motus à facultate profectus, ut sanguificatio, nutritio, procreatio: opus est, quod jam completum est, post actionem facultatis, ut sanguis, caro. Proinde hæc tria ex se mutuò intelliguntur. Functiones autem illæ animæ vegetatæ in corpore primæ tres sunt, totidemquæ opera. Primum enim animatum corpus nutritur:

F 1

dein

*Definitio
facultatis
naturalis*

*Tria se
mutuo con-
sequuntur,
facultas,
functio &
opus.*

VI.
Tres fa-
cultates
naturales.

deinde augetur: tertio aliud sibi simile gignit; quare tres primas facultates habebit, nimirum altricem sive nutricem, secundo auctricem, tertio generatricem sive procreatricem. Additur à Galen. lib. Diff. sympt. facultas vitalis, fons caloris nativi, sine quo nulla fit vegetatio, quam alibi à naturali sedibus distinguit.

Triare-
quisita ad
quamlibet
functio-
nem natu-
ralem.

Ad has functiones perficiendas quælibet facultas tria necessario postulat, nimirum materiam instrumentum, & facultates auxiliiarias sive ad ministras. Objectum autem hujus facultatis aut materia ex qua omnis vegetatio, est alimentum, quo nutritur & augetur animatum corpus primo, & ex quo proxima generationis materia, ut infra latius dicemus.

1.
Obiectum
2.
Instru-
mentum.

Deinde instrumentum, per quod functiones illas anima proximè exerit, est calor insitus, cuius quæ parti propriè destinatus, & in qualibet parte determinatus, qui perpetuo calore à corde influente excuscitatur & fovetur, ut alibi demonstratum esse videmus.

3.
Faculta-
tes auxili-
ares qua-
tuor.

Tertio subserviunt, & ad has facultatum functiones perficiendas, actiones & opera sua confecturunt, in singulis partibus quatuor auxiliariæ ad ministræ facultates, quarum prima insito appetitu id quod parti conveniens & familiare est, attrahit: attractrix, Altera, quod attractum est, retinet: retentrix. Tertia retento fruitur, & vi insita retentum perficit & immutat: concoctrix sive alteratrix. Quarta, id quod parti molestum & supervacaneum est, expellit: facultas expultrix. Ejusmodi facultates quatuor naturales, duplices in corporeprehenduntur: aliæ enim cuique parti propriè addictæ sunt, quatenus sibi soli servit & nutritur: aliæ partibus illis tantum competunt, quæ communes dicuntur, & publico munere funguntur, quales primum sunt ventriculus & jecur, quatenus alimen-

tum

um toti corpori præparant : deinde quæ illis in-
serviunt, ut œsophagus, intestina, renes, vesicæ,
uterus, quæ præter quatuor proprias functiones a-
lias obtinent, quatenus toti inserviunt. Tot faculta-
tes auxilias omnibus partibus necessarias esse,
hinc manifestum evadit. Inest enim, auctore Galen.
de Natur. facult. singulis partibus desiderium con-
venientis, & alieni odium, quod autem desiderant,
attrahunt, quod averfantur, à se propellunt, nisi
impediantur. Quod si desiderium in omnibus parti-
bus sit, erit fructio, Nam nihil naturaliter attrahit,
nisi eo aliquo saltem modo fruatur, & nihil frui po-
test, nisi id retineat. Peculiari verò secretrice fa-
cultate hic opus non esse videtur, ut Averrhoës ar-
bitratur, sed secretio partim ab attractrice, partim
ab expultrice perficitur. Deinde appetendi facul-
tas, quæ convenientis desiderio excitatur, ab attra-
ctrice diversa non est. Perficiuntur facultates istæ
quatuor potissimum in partibus, quæ publico mu-
nere funguntur, fibris sive villis quibusdam : nam
attractio absolvitur fibris rectis per membri longi-
tudinem extensis, retentio propriè fibris obliquis,
quæ obliquè, & ad impares angulos feruntur : ex-
cretio transversis, quæ ad pares rectosquæ angulos
incidunt : Concoctio verò licet omni staminum
genere uti aliquando dicatur, propriè tamen à vi in-
fusa, mediante calore naturali absolvitur. Adjuvant
has facultatum functiones qualitates quædam pri-
mæ. Nam caliditas instrumentum concoctionis,
omnibus functionibus naturalibus per se inseruit,
nisi immodicè augeatur. Frigiditas verò ex acci-
dente solum. Ariditas ad attractionem, reten-
tionem & expulsionem conducit. Humiditas, li-
cèt his adversa sit, concoctioni tamen & nutritio-
ni accommodata videtur. Hæ auxiliariæ faculta-
tes omnibus tribus illis functionibus animæ vege-

*Instrumenta
facultatū
ministran-
tium.*

*Definitio
vegeta-
tionis.*

*Sedes fa-
cultatis
naturalis
eiusq[ue] par-
tes.*

tantis famulantur, sed in nutritione evidentissimè
conspiciuntur,

Ex his colligitur, quod vegetatio sit actio or-
ganorum naturalium in alimentum, à facultate
vegetante, instrumento caloris nativi, ut median-
te alimenti attractione, retentione, concoctio-
ne, ac supervacanei expulsionè, quod è substantia
corporis animati defluit, reparetur, & ipsum cor-
pus ad terminum, à naturâ præfixum, perducatur,
ac aliud ei simile gignatur. Peripatetici principium
facultatis vegetatricis, facultatis & vitalis cor esse
statuerunt. Cum enim calor nativus sit author o-
mnium naturalium operationum, ut Galen. 8. de
Placitu cap 7. & alibi testatur; consentaneum erit,
cor fontem nativi caloris sedem, primumque instru-
mentum esse illarum functionum, quæ à nativo ca-
lore proficiscuntur. Verùm ut alibi demonstratum
fuit, ibi facultas propriè residet ubi functiones e-
jus exercentur & manifestantur. At sanguis pri-
mùm in hepate elaboratur & generatur, ibique for-
mam & nomen accipit, licet à corde vim conco-
ctricem hepar suscipiat, aut sanguis ultimam abso-
lutionem consequatur. Nam si omnes actiones,
quæ à calore nativo proficiscuntur, in ipso corde
perficerentur, impedirent actiones ejus primas &
præstantiores. Quare sedem hujus facultatis me-
dici ventrem infimum esse arbitrantur, quod ibi je-
cur cæteraquè membra continentur, quæ publico
munere in alimenti concoctione & generatione
funguntur, & sibi non tantum servant. Hic ven-
ter totum illud spatium comprehendit, quod sub
Diaphragmate ad ilia inguina & pubem porrigitur:
cujus partes continentur ab anteriore parte potissi-
mum *ἡ κοιλία* Latinis Abdomen vocatur, latera
verò Abdominis, quæ cartilaginibus costarum sub-
jacent, hypochondria. A posteriore parte lumbi
sunt,

sunt, qui ab extremis costis ad sacri ossis extremum extenduntur. Componitur autem Abdomen ex cute primū: Deinde carnosā membrana cum multa pinguedine, præcipuè in obesīs, quibus subjacent quatuor musculorum Abdominis conjugationes; hæc tandem membrana firmissima, quæ quod universæ inferiori ventri circumtendatur, & totam interiorē ejus cavitatem tegat; viscera quæ omnia contineat. Peritonæum nominatur: cui ab anteriore parte adhæret, Omentum, imo ventriculo & superiori regioni intestinorum obtensum, ut insitum illorum calorem tueatur & foveat. Partes contentæ sunt viscera quæ publico munere funguntur. Nam alia nutritioni, alia procreationi famulantur & inserviunt. Nutritioni autem, quæ vel toti alimentum parant sive concoquunt, veluti primariò jecur; Deinde ventriculus: vel deferunt ut venæ & œsophagus: vel ab inutilibus expurgant, ut intestina, lien, vesicæ, renes. Procreationi verò destinantur testes, vasaq; spermatica & deferentia: Peculiariter in viris, penis; in feminis uterus. His præmissis consequens est, ut primū de nutritione agamus, deinde de procreatione.

CAPVT VII.

De Nutritione & accretione.

Communissima animæ vegetatis functio est nutritio. Nā non solum cæteris functionibus subternitur, & in ipsa augmentatione & generatione requiritur, licet ab utraq; revera distinguatur, sed etiā omnibus animatis, quāmdiu vivunt, necessaria est conservacionis gratia. Cum enim substantia cor-

poris animati in continuo defluxu sit, nisi quod defluxu illo deperditum est, reparetur, diu subsistere non potest. Quare necessaria ante omnia erit nutritio, quæ id, quod deperditum est, restituit, & individuum, quantum natura patitur, ab interitu conservat.

*Definitio
nutritionis.*

Est autem Nutritio propriè naturalis partium animati corporis defluxus restauratio, à facultate altrice, ex alimento in substantiam partium planè converso sive assimilato. Quare in nutritione tria primariò concurrunt. Primò quod convertitur, & quo fit nutritio, alimentum. Deinde in quod conversio fit, sive quod nutritur, corpus animatum secundum omnes partes. Tertiò quod convertit animæ facultas altrix mediante calore, & auxiliariis facultatibus.

Quid alimentum.

Est autem alimentum per se primò corpus, & potentia animatum: nam actu ipso, initio dissimile, sed potentia simile est nutrito corpori, quæ similitudo non est tantum ratione temperamentis & materiæ, (nam siccis sicca, & duris dura &c. conveniunt) sed potissimum ratione formæ & ipsius substantiæ, quæ nutritur. Quare ut quod dissimile est simile reddatur, mutatione quadam indiget, qua in actum illa potentia deducatur, & in substantiam nutriti absolutè convertatur.

*Alimentū
triplex.*

Hæc mutatio in animatis sanguine præditis: triplici concoctione perficitur, ut post apparebit quare alimentum non uno modo sumitur, sed secundum prius & posterius dicitur; Nam Hippocrati triplex est alimentum: Unum futurum alimentum non elaboratum, quod ab ore in ventriculum recipitur, ut elaboretur: Aliud quasi alimentum transmutatum, primùm in ventriculo: Deindè ita elaboratum in jecore, ut toti corpori idoneum sit ad omnes partes nutriendas, nimirum sanguis, qui
co no-

nomine ab Aristotele ultimum nutrimentum
 vocatur: Tertium est verum alimentum, cuique
 parti proprium, non toti commune, nimirum por-
 tio sanguinis maximè familiaris, quam singulæ par-
 tes ex venis attrahunt, sibi què apponunt; Deinde
 agglutinant tandem què perfectè alterant sive assi-
 milant, quibus omnibus absolvitur nutritio. Hæc
 omnia à facultate altrice perficiuntur subsidio qua-
 tuor facultatum ministrantium, ad quarum fun-
 ctiones exercendas certa destinata sunt in corpore
 membra. Alia enim attractum alimentum alteran-
 do præparant, alia inutilia separant, alia suscipiunt,
 alia expellunt, nonnulla salubres succos in totum
 corpus transmittunt & distribuunt. Ac primum,
 cum ex alimento assumpto, nec sanguis nec ex san-
 guine statim nutritio fiat, nisi debitis intervenienti-
 bus mutationibus & concoctionibus: in animali-
 bus sanguine præditis triplex naturalium faculta-
 tum series, & concoctionum sibi mutuo succeden-
 tium, tres gradus erunt, prima *χύλωσης* altera *αι-
 μάτωσης*, tertia *ομοίωσης*, harum prior postero-
 ris gratia, semper requiritur, quare ultima perfe-
 ctissima erit, unicuique parti propria, quatenus sibi
 servit & nutritur, cæteræ verò actiones sunt com-
 munes communium instrumentorum, ut chylifi-
 catio ventriculi, sanguificatio jecoris, quæ toti ido-
 neum alimentum parant. Alimentum autem per-
 fectè elaboratum toti commune est sanguis, cuius
 officina est hepar, ut infra apparebit. Ideo inter na-
 turalia instrumenta Medici principatum jecori me-
 ritò ascribunt; cui reliqua ministrant, ac ipse
 quoque ventriculus, dum chylum parat, ut ex eo
 facilius sanguis fieri queat. Quia verò nihil in con-
 trariam qualitatem simul totum migrare potest, in
 qualibet concoctione aliquid naturæ inutile & su-

E s per-

pervacaneum necessariò redundabit, siue qualibet concoctio sua extremita habebit, quæ duplicia sunt. Unum tenuius: alterum crassius: licet utrumq; illius concoctionis ratione, excrementi rationem non semper habeat, sed ibi, ubi manifestatur, ab utilibus separatur & excrementum efficitur; ut serũ, quod secundam concoctionis excrementum dicitur, quia post secundam concoctionem à sanguine separatur, licet à prima initium suæ generationis suscipiat. Hæc excrementa vi excrettricis facultatis primum ab utilibus separantur, deinde extra corpus per debitas vias rejiciuntur.

De conco-
ctionibus in
specie.

Causa na-
turalis se-
cundæ fa-
mis.

I. Conco-
ctio.

Restat ut totam nutritionis seriem & concoctionem sibi mutuo inservientium ordinem proponamus. Ac primum in partibus solidis defluxus ille naturalis propriè existit, unde ex defectu alimenti, siccum nimirum humido temperati, appetitus naturalis oritur. Quare ad illum defectum reparandum, & appetitum restringendum, ex venis partes illæ alimentum trahunt, & à ventriculo communi receptaculo venæ, ubi si humidi fuerit defectus, ex suctionis sensu excitatur animalis appetitus humidi, qui sitis, si defectus siccus fuerit, ex sensu suctionis oritur appetitus qui fames vocatur.

Imperfectissimus primusquæ omnium coctio-num gradus in ventriculo est *χύλωσις*. Fit autem chylicatio, ubi alimentum per os assumptum, præparatum, & in ventriculum commune receptaculum, per œsophagum attractum, vi insita ipsius ventriculi se undique constringentis, ac suo vicinorumquæ calore alterantis, in succum cremorisque ptisanæ non absimilem convertitur. Peracta concoctione segregationem per inferiora molitur. Verum dum aperto pyloro in intestina protruditur, melior portio per venas mesaraicas attrahitur, impuriore parte, siue fecibus ad crassiora intestina dimissis, ubi tandem reservantur, donec recluso mu-

sculo

ventriculo rectum intestinum ambiente universim ege-
 atur. Οισόφαγος Latinis gula & stomachus, per
 quem cibus dentibus effractus, & in ore præpara-
 tus in ventriculum recipitur. Exoritur à faucibus
 ab capite asperæ arteriæ, & secundum thoracis ver-
 tebras descendens, & diaphragma penetrās implan-
 tatur in superius & sinistrum os ventriculi; quod
 ceteros Græci καρδίαν vocarunt, ubi ob exequitum
 sensum sedes est animalis appetentiæ cibi & potus,
 sive famis & sitis. Ventriculus autem ut gula ex dua-
 bus propriis tunicis distendi contrahi quæ idoneis
 in rotundam oblongam figuram formatus est, cum
 multis venis, arteriis & nervis intertextis, quibus
 cedit tertium involucrum à peritonæo; situs est
 immediatè sub diaphragmate, inter lienem & jecur,
 secundum transversum oblongus, ac in sinistra su-
 periorique parte amplior quàm in dextra ima quæ, u-
 bi à jecore tegitur; posterior pars tota spinæ incidit,
 in dextra parte, ubi sub jecore se abdedit, est infi-
 mum orificium pylorus dictus, quod quasi janitor
 alimenta proludentia à ventriculo cohibeat; in
 quem usum assistunt ei duo glandulosa corpora. Ab
 hoc orificio incipiunt intestina corpora teretia con-
 structa, ut ventriculus, ex duabus propriis tunicis, &
 tertia à peritonæo, quæ tortuoso ductu variisque
 gyris ad podicem usque continuantur. Dividuntur
 intestina primùm in gracilia & crassa, & utraqûe vi-
 sissim in tres partes. Nam ut à ventriculo oriun-
 tur, primùm ex gracilibus est duodenum duode-
 cim digitis longum, secundum posteriora ventricu-
 li ad dorsum reflexum, cui implantatur vas, quo
 bilis ex vesicula expurgatur: Huic continuatur je-
 junum ita dictum, quod ob bilis affluentis acrimo-
 niam inane semper sit. Tertiò Ileum omnium lon-
 gissimum & tenuissimum est, & multis variisque gy-
 ris

*Secunda cō-
coctio sive
sanguifica-
tio eiusq; in
strumenta.*

ris Ilia partemquē circa ventriculum implet. Illa
continuantur crassa intestina, & primum appendi-
culum quoddam uno ore donatum sive egressui in-
troitum adversum habens, unde Cœcum dicitur.
Deinde Colon, quod multis circumductionibus om-
nia ferè tenuia intestinacingat. Nam à dextri re-
nis sede, ad jecoris cava ascendit, & hinc secundum
ventriculi fundum ad lienis & sinistri renis sedem
prorepens non longe ab offis sacri initio devolvi-
tur, ubi incipit ultimum intestinum rectum, quo
recta ad anum pergat, cujus inferior pars orbicula-
tim ambit & claudit musculus sphincter dictus, ne
nobis invitis excrementa exeant. Intestina autem
continent dorsoquē alligant duæ membranæ mul-
ta pinguedine & glandulis refertæ, quæ Mesenterii
constituunt, inter quas præter arterias & nervos
confertæ sunt multæ venæ ab intestinis ad jecur di-
rectæ, nimirum propagines venæ portæ, quæ à ca-
vo jecoris exoritur. Nam ubi vena portæ è substan-
tia jecoris quatuor surculos emisit, truncus ejus in
duos ramos primum dividitur, quorum propagi-
nes & surculi variè distribuuntur in ventriculum
intestina, lienem & omentum. Propagines verò qua-
ventriculo & intestinis tenuibus implantantur, ex
chylo id quod optimum est, & sanguini efficiendo
idoneum exagunt, ac ad jecur deferunt: unde ori-
tur secunda concoctio, quæ αἱματώδης Latini
sanguificatio dicitur. Perficitur hæc concoctio in
hepate, ubi illa optima chyli portio à ventriculo te-
nuibusquē intestinis attracta & præparata, ad porta-
truncum & hinc ad trunci radices per jecoris sub-
stantiam numerosa serie sparsas defertur, ibiq; ela-
boratur, & insita jecoris proprietate in sanguinem
transmutatur: qui aut per diapedesin aut anastomo-
sin primum in radices venæ cavæ attrahitur; Dein
de in ejus truncum, tandemquē per ramos in totum
corpu

corpus singulasque partes distribuitur gratia nutri-
tionis ut alimentum elaboratum toti commune.
Sic autem est hepar sub septo transverso, cui va-
lidissimo vinculo alligatur in dextra abdominis sede,
i. e. ventriculo magna ex parte incumbat: supra ca-
vum, infra gibbum est; substantia ejus Græcis
ραγέχυμα dicitur, quia nil aliud videtur quam
sanguis concretus compluribus venis, & nonnullis
arteriis intertextus. Nam componitur ex multarum
venarum implexu, quibus circumfusa est caro con-
creta sanguini similis. Concretum autem est tenuissi-
ma membrana, quæ nervulum à sexto pari suscipit.
Venarum autem illarum quæ per substantiâ jecoris dis-
persæ sunt, duplex est series; una ad jecoris cavum per-
tinet, quæ caudicem venæ portæ constituunt: altera
ad gibbum tendit, quæ radices sunt trunci ipsius venæ
cavæ; ab hoc trunco in omnes partes corporis rami-
cæ quæ canales disseminantur, ut sanguinem à jeco-
re gratia nutritionis distribuant. In hac cōcoctione
sanguinisque generatione & distributione, tria excre-
mentorum genera redundant, quæ à natura ad cer-
ta membra religantur, ut sanguis eò purior relin-
quatur pro corpore alendo: Quorum duo in jecore
ex sanguinis elaboratione propriè oriuntur, dum
materia ebullit, & concoquitur, nō aliter ferè quàm
in vino. Nam unum leve tenueque est quasi flos vi-
ni, nimirum bilis flava, quam vesicula fellis attrahit;
Deinde ad duodenum intestinum transmittit, ubi
feces suo colore tingit, & intestina ad excretionem
stimulat: Alterum grave feculentumque est, feci-
bus vini correspondens, quod melancholia dicitur,
quam lien ex jecore per ramum venæ portæ allicit,
ut concoquat eoque nutriatur, & partem, quam si-
bi aptare nequit, aut ad ventriculum transmittat pro
appetitu excitando, aut ad intestina aliasque vias
expellat. Tertium excrementum à prima cōcoctio-

ne

*Vena quæ
radicatur
in iccore,
ut vena
portæ.
Vena cavæ.*

CAP.
VII.*Vesicula
fellis.**Lien.**Renes.*

ne initium aliquod suæ generationis suscipit, licet
 in tertia separetur, nimirum serum vehiculum san-
 guinis, quod à renibus attrahitur, & excolatur, ac à
 quibus per ureteres in vesicam delabitur, ibique sen-
 sim colligitur, donec copia aut qualitate molestanti-
 recluso musculo cervicem vesicæ ambiente, foras ex-
 cernatur, in maribus per penem; in feminis per cer-
 vicem uteri. Vesicula illa fellis jecori adnata est, &
 cava dexteraque parte ejus propendet, constat sim-
 plici tunica, ac duos meatus proprios habet; unum
 à jecore, qui surculus est venæ portæ, quo bilem alli-
 cit; alterum ad duodenum intestinum, quo bilem
 redundantem detrudit. Deinde lien, qui fecem san-
 guinis redundantem suscipit, situs est in sinistro hy-
 pochondrio ex adverso jecoris, oblongus linguæ
 crassioris imaginem referens, cujus pars cava ventri-
 culum respicit. Constat ut jecur ex multis venis &
 arteriis, quibus melancholicum sanguinem allicit,
 quem ope arteriarum in suam substantiam conver-
 tit, reliquum aut per easdem venas ad intestina &
 hæmorrhoidas expellit, aut per vas breve ad ven-
 triculi fundum, aut per arterias ad renes deduci-
 tur. Sanguis ab his duobus propriis excrementis
 repurgatus, ut à portæ venis in angustissimas cavæ
 radices deduceretur, a quo sive teroso excremen-
 to vehiculi loco utitur, quod postea quia naturæ u-
 tile non est, à renibus attrahitur & excolatur: Re-
 nes autem utrinque singuli sunt in lumbis sub je-
 core, notisquæ costis ad latera venæ cavæ, & ar-
 teriæ magnæ, quibus incumbunt muscoli crura
 moventes, quos *vas* vocant. Horum figura Pha-
 seoli speciem imitatur, ac versus spinam gibbi
 sunt, versus viscera cavi. Substantia renum dura
 densaque est cordis similima, in cujus anteriore
 parte Vesalius ponit duos sinus membrana succin-
 ctos cum multis carunculis, Laurentius verò in
 homi-

hominem nullum sinum esse arbitratur, sed carunc-
culam tantum mammillarum papillis similimam,
quâ serum à sanguine excolatur.

Inferuntur verò renibus primùm venæ & ar-
terix emulgentes quæ serosum sanguinem ad re-
nes alliciunt. Deinde Ureteres vasa alba crassa, quæ
à renibus deorsum progrediuntur, & lateribus ve-
sicæ sinuoso reflexu implantantur: ut serum exco-
larum deferant. Vesica verò in imo abdominis si-
ta est sub osse pectinis, in coxarum antro, in viris
recto intestino affixa: figura ejus rotunda oblon-
ga; substantia nervosa crassa excepta cervice, quæ
penè carnea est, simulquæ angusta, quam cingit
musculus σφιγκτηρ dictus, qui urinam continet,
ne nobis invitis exeat. De ipsa massa sanguinis &
humoribus tam alimentariis, quam excrementitiis
sequenti capite dicetur.

Ureteres.

Vesica.

Supremus concoctionis gradus, cui commu-
nes illæ duc, ut præparaciones inserviunt, est in
substantia solidarum partium, & ὁμοιωσις appel-
latur, ac nutritio quoque interdum dicitur. Et sit,
dum partes singulæ primùm ex venis alimentum
debitum attrahunt, & sub totis specie apponunt,
deindè sibi agglutinant & ununt, tandemque per-
fectè assimilant, sive in suam substantiam omninò
alterant: Nam ad perfectam nutritionem tria ne-
cessaria sunt, 1. alimenti appositio, deindè agglu-
tinatio, tertio assimilatio, sive alteratio alimenti
in perfectam substantiam partis. Sub assimilatio-
ne ista comprehendi poterit, quæ tertia & quarta
concoctio à Galen. 3. de Symptom. causis capit. 2. dici-
tur, nam tertia quæ sit in partil us, quæ sanguis,
qui apponitur, alteratur, gradus quidam aut viæ ad
quartam putatur; nimirum ad perfectam alimen-
ti assimilationem, quæ à nutritione re ipsa sine &
oper

Tertia cō-
coctio.Triarequi-
sita in nu-
tritione

CAP.
VII.

opere non distinguitur. Quare assimilatio quæ fit alteratione alimenti in substantiam nutriti, dum omni ex parte nutrito affigitur, nutritio propriè vocatur, ut ex definitione nutritionis constat. Hujus concoctionis excrementa propria sunt, insensibilis transpiratio, & quod sordium specie cuti extrinsecus adhærescit, minus propria & non necessaria, sudores. Quia verò calor cunctis partibus insitus calore à corde infuso perpetuò fovetur & exsuscitatur, in nutritione necessariò cordis actio requiritur, nam cor cum calore præcipuum alimentum per arterias exhibet, quod sanguinem venarum in actum deducit. Proinde auctore Averrhoë sanguis arteriarum ad sanguinem venarum formæ rationem habet; deinde cum venis arteriæ per totum corpus disperguntur, & continuantur, ac utroque sanguine certa quadam proportionem partes nutriri videntur.

De Accretione.

Quæ in corpore nutriuntur propriè sunt partes solidæ, quibus resident facultates & à quibus functio: Impropiè verò spiritus & humores. Illæ si copiosiori alimento restauratæ fuerint, quàm quod defluxu naturali deperditum est, non modò animatum nutritur, sed simul quoque augetur. In omni augmentatione nutritio requiritur, sed non contra, verum à nutritione, ratione & tempore discernitur. Nam nutritio per totam vitam fit, & substantiam numero unam conservat. Per accretionem verò auctis in omnem dimensionem primùm similaribus, deinde dissimilaribus totum animatum augetur & ad determinatum vitæ tempus solum, quæ consistentia, perducitur.

Definitio accretionis.

Quare erit accretio insitæ magnitudinis accessio, in singulis corporis animati partibus à facultate auctrice, per extensionem ex alimento in substantiam converso, gratia termini à natura præfixi.

Igitur

DE ACCRETIONE.

97

C A P.

VII.

*Accretio-
nariare-
quisita*

Igitur in accretione tria præcipuè erunt, pri-
mum corpus animatum, unum idemquè numero
manens, cui secundum omnes illius partes, sed pri-
mum spermaticas, fit accessio, deinde alimenti co-
piofioris in illis partibus restitutio, tertio facultas
auctrix, quæ calorem insitum dirigit, & ad convē-
nientem illi animato corpori terminum & quanti-
tatem, quæ *in pñ* & consistentia dicitur, promovet.
Proinde accretio mutatione aliqua animæ altricis
non existit, sed corporis tantum animati, ratione
insiti caloris, humidum depascentis, à quo progres-
su temporis cum humido subinde diminuitur, un-
de corpus siccus, & ad extensionem ac incremen-
tum ineptius efficitur. Nam prima ætate ob calo-
ris nativi vehementiam, partes animati plurimum
alimenti transmutant, & ob humidi copiam,
quoquo versum extēdendo in sui substantiam fa-
cilimè convertunt, & incrementum celerrimè assu-
munt. Verum humido progressu temporis dimi-
nuto, ultra naturalis defluxus restitutionem, subin-
de minus minusquè partibus ad *in pñ* usque adjici-
tur, residuo alimenti aut in semen, aliaquè ejus
generis transmutato, aut acri illius ætatis calore
dissipato. Tandem verò paulatim ex defectu humi-
di tabescente calore, senium introducit, unde *De longi-
tudine vi-
ta.*
functionibus omnibus labefactatis, cum squalore
partium omnium, mors naturalis necessariò sequi-
tur. Omnibus quidem animatis vita & mors com-
munis est, propter duplicia contraria, nimirum ex
quibus constant, elementa, & quæ gignunt, ex-
crementa. Omnium tamen similis ætatum decur-
sus non est, nec vitæ ratio, sed ea longioris vitæ
sunt, quæ calidum innatum, in quo vita consistit,
quantitate copiosum, & qualitate temperatum
magis habent; Deinde quæ excrementis pauciori-
bus

CAP.
VIII.

bus abundant, ac breviter quibus calidum minus
 καὶ μαλακόν dissipatur, aut καὶ σκληρόν opprimitur &
 suffocatur.

CAPUT VIII.

De Humoribus,

*Humor
 communi-
 ter dictus*

Humor Græcis ὑγρὸν non uno eodemquæ mo-
 do semper accipitur: Communiter enim om-
 ne corpus liquidum & perfluens, non sua, sed
 aliena superficie contentum, humor vocatur: Hac
 significatione omnes succi & liquores dici poterūt,
 ac quoque in humido corpore, præter solidas conti-
 nentesque partes & spiritus impetum facientes, o-
 mnia liquida cavitatibus aut solidis partibus con-
 tenta. Talia unius generis non sunt, & non solum
 materia, sed etiam efficiente & fine distinguuntur.
 Nam nonnulla contenta naturæ sunt utilia, nonnul-
 la supervacanea aut planè noxia: Deinde aliqua ex
 prima concoctione gignuntur in vetriculo, ut chy-
 lus & feces, cum viscido humore oblinente intesti-
 na: Quædam ex secunda concoctione in jecore, ut
 chymus, massa scilicet sanguinis cum tribus excre-
 mentorum generibus: aliqua ex tertia concoctio-
 ne in partibus dum nutriuntur: præterea præter hu-
 mores illos nutritioni accommodatos & excremen-
 titios, superfluitates quædam in certis partibus gignuntur, aliis usibus necessariæ, quales sunt lac, se-
 men, &c. quæ omnia humores cōmuniter dicuntur.

*Humor
 medicis
 quæ d:*

Humoris vocabulum secundum prius & po-
 sterius à Medicis sumitur: verum à numero humo-
 rum removentur primum quæ in prima concoctio-
 ne generantur, ut chylus & feces. Deinde utiles
 nonnullæ superfluitates quæ in partibus quibusdam
 in

In tertia concoctione redundant ut lac & semen. Ac communi nomine humores plerumque vocantur corpora liquida, quæ in secunda concoctione ex chylo, in tertia ex sanguine oriuntur: unde dividuntur plerique humores in alimentarios & excrementitios. Alimentarios autem qui in corporis substantiam transmutantur: in primos; corpora ex quibus massa sanguinis componitur: & secundarios, qui in partium nutritione exprimuntur generantur: Excrementitios vero qui separantur à sanguine & à corpore expelluntur, in naturales, qui instituto naturæ fiunt, & non naturales, qui à causis præter naturam in corpore egignuntur.

Verum propriissimè nomen humoris competit 4. succis alimentariis ex quibus chymus sive massa sanguinis componitur, qui corpori alendo inseruit: secundariò illis succis qui ex primis oriuntur, & in partium nutritione considerantur, licet humiditates potius quam humores dici mereantur: Deinde humoribus excrementitiis naturalibus, quatenus alimentariis primis correspondent: tandem excrementitiis non naturalibus. De singulis ordine dicemus, & primùm de humoribus propriissimè dictis, id est, alimentariis primis, deinde de alimentariis secundis, tertio de generatione & alimentariorum & excrementitiorum, tandem de singulis humoribus, ut à naturæ modo recedunt.

Ac primùm humores propriissimè sunt corpora liquida in quæ chylus vi jecoris pro corpore alendo transmutatur, Dico corpus liquidum, nam necesse est alimentum fluxile esse & liquidum, si per meatus à natura destinatos ad partes nutriendas deferri debeat. Verum non omne liquidum tale est, nec omne in quod alimentum convertitur, sed quod corpori alendo & conservando idoneum est. Nam alimentum, ubi primùm ingeritur, in chylum primò

*Humor
proprius
me dictus*

*Definitio
Humoris
proprius
me dictus*

permutatur; at chylus nisi in chymum & massam sanguinis convertatur, inutilibus separatis, idoneus non est, ut corpus nutriat. Quare nec excrementa, nec chylus humor proprie erit, sed chymus & succus, qui alendo & conservando corpori iulerit. Licet his omnibus vocabulum humoris tribui soleat. Quia autem corpus iisdem generatur, quibus conservatur, Galenus humores proxima animalium sanguine præditorum elementa vocavit & Hippocrates ipsam naturam humani corporis. Nam ex humoribus corpus humanum proxime gignitur & nutritur: Deinde à *convergencia* humorum, sanitas; ab *divergencia* morbi dependent. Correspondent enim quatuor humores quatuor elementis, ut post apparebit, ac singuli humores ex singulorum elementorum qualitate constant.

*Opiniones
de numero
humorum
alimentario-
rum.*

Verum de numero humorum non consentiunt artifices. Nam ut testatur Hippocrates *lib. de Nat. hum.* nonnulli ex unico solum humore, corpus humanum fieri dixerunt, & cum Aristotele Averrhoes statuit partes puro tantum sanguine nutriri: cætera liquida excrementa solum esse. Plerique medici cum Hippocrate & Galeno quatuor humores alimentarios primos numerant, sanguinem nimirum pituitam, bilem flavam & melancholicam, ac ex his massam sanguinis oriri, quæ à potiori parti, sanguis dicitur, & hos quatuor humores, quatuor elementis correspondere, ex quibus generatur & nutritur corpus. Sunt nonnulli qui sanguinem non materia, sed formâ à cæteris tribus distinguunt, ac tres solum distinctos humores esse putant, (ut in lacte est caseus butyrum & serum) sanguinis verò formam, illorum trium mixtioni supervenire. Aliqui quatuor illis humoribus quintum, serum nimirum, addunt.

De

De Paracelsistarum opinionibus suo loco dicemus.

Verum cum serum propriè non nutriat, humoribus propriè dictis, sive alimentariis succis an numerari non poterit: Deinde si ex tribus distinctis humoribus, pituita scil. melancholia & cholera sanguis propriè componitur, colore rubro non erit, nec qualitate temperatus, sed frigidus: Nam frigus pituitæ & melancholiæ unius cholera calorem vinceret; præterea ex his tribus mixtio perfecta nunquam erit, nec tres humores quatuor Elementis correspondere poterunt. Quod si animalium sanguine prædicatorum partes ex solo sanguine constructæ forent, solus sanguis humor propriè dici mereretur, & ad nutriendum sufficeret; cum nihil nisi à simili proximè nutriatur. Nihilominus deprehensum est, secta vena non purum sanguinem, sed aliis tribus permixtum exire. Deinde ratio ostendit alias partes crassiore, alias tenuiore, alias frigidior, aut calidior alimento uti. Quare apparet, 4. humores alimentarios esse, ex quibus massa sanguinis componitur. Alii contra ex solo sanguine corpus nutriri putant, quod sanguis nature maximè familiaris sit, & omnium ultimo purgatione separetur. Deinde singulas partes similem earum substantiis alimoniam attrahere, alias tenuiorem aut crassiorem, alias frigidior aut siccior sanguinis portionem. Quare horum sententiam ipse etiam Gal. 2. de Elem. cap. 5. (ut qui rationabilia senserint) commendat; sed nature magis consentaneam esse dicit Hippocratis opinionem: Existimat enim Hippocrates, tantam in sanis secundum formam corporis varietatem contingere non potuisse, si unus esset humor Elementaris omnium hominum. Deinde partium naturas longè differentes, in uno eodemq; homine, neq; initio ex eadem substantia fieri potuisse, neq; uno spe-

*Examinā-
tur Opinio-
nes de nu-
mero hu-
morum.*

cie

CAP.
VIII.

*Quomodo
sanguinis
massa ex
quatuor
humori-
bus com-
ponatur.*

*Proportio
humorum
in massa
sanguinis.*

cic alimento uti: Quæ ratio necessaria videretur, si à sola materia generationis & nutritionis necessitas penderet, & non ab efficiente quoque & fine.

Nihilominus rationi consentaneum est, massam illam sanguinis, qua nutriuntur omnia in corpore, partes discrepantes habere, quæ quatuor Elementis correspondent, unde humores elementarii ac alimentarii dici poterunt. Nam bilis succus substantiæ tenuis, calidus siccus, igni correspondet; sanguis calidus humidus, aeri, pituita frigidus humidus, aquæ, melancholia humor frigidus siccus substantiæ crassæ, terræ. Verùm in illa massa humores, qualitates suas non planè servant, nec actu absoluto permanent, sed ut ex qualitatibus elementarium proportionem *negotii* oritur, ita ex iusta temperie quatuor humorum, oritur qualitas naturæ conveniens, cujus ratione totus sanguis in sanis dicitur, temperatissimus, & nutritione idoneus: Cæterum in massa sanguinis hominis sani plurimum est puri sanguinis, minus pituitæ, minimum melancholiæ & bilis flavæ: In non sanis pletumque hæc proportio violatur. Serum autem pars massæ sanguinis non est, sed vehiculum & excrementum omnibus ejus partibus cõmune. Nam tot species sunt serosi humoris, quot species succorum in venis; & quilibet succus suum serum habet, à quibus urina variè coloratur. Nam à sanguine prodit serum coloris rubri, à pituita albi, à cholera flavi, à melancholia subfusci, ut docet Gal. 4. de Sanitate Tuend. c. 4. & c. 2. lib. 6. Epid. text. 38. Dividit Avicenna humores omnes, in primos & secundos: primi sunt illi quatuor qui alimentarii dicuntur toti corpori communes, ex quibus massa sanguinis, de quibus jam dictum est, & infra latius in specie dicemus: secundi verò sunt qui primos consequuntur, & ex primis immediatè oriuntur: hi singulis partibus propriè destinati sunt nutritio-

nis

nis & conservationis gratia, quatenus alimentum suum præparant, & per gradus alterant, qui magis humiditates quàm humores dici merentur.

Galen. 7. *Metb. cap 6.* quatuor siccitates partium enumerat, quibus totidem humiditates opponuntur: Prima humiditas in extremitatibus exilium venarum continetur, quæ à sanguine parum aut nihil differt; Secunda ad roris speciem sparsa est, in spatiis similium intermediis, ex qua proximè nutriuntur, unde ros aut rorida humiditas appellatur; tertia carnosa aut adiposa species & humiditas, quæ fibris circumfusa est ex sanguine agglutinato & assimilato: quarta fibrosa aut membranosa partes spermaticas continens ex semine genita in utero ab ortu. Quare duæ posteriores humiditates absolute de substantia partium sunt, ac rorida humiditas media quædam dispositio videtur inter substantiam partium, & sanguinis ad naturam partium potissimum inclinans, ut quæ in extremitatibus exilium venarum continetur ad naturam sanguinis. Avicenna loco quatuor humiditatum quatuor humores secundarios ponit. Verùm Fernellius & alii nonnulli quatuor secundarios humores aut humiditates ad tertiam concoctionem sive ad nutritionem in partibus referunt. Prima autem humiditas omnium consensu est in extremitatibus exilium venarum & arteriarum, quæ singulis partibus appropriatæ sunt, easque irrigant. Ea oritur ex sanguine levem aliquam mutationem suscipiente à partibus circumstantibus: hæc proprio nomine caret, sed sanguineus humor nonnullis dicitur. Altera ex priori gignitur, dum in vacua membrorum spacia roris modo diffunditur, & singulis membrorum partibus apponitur, unde à similitudine ros appellatur. Nutrimentum ubi partibus appositum fuerit,

*Humores
secundarij
secundum
Avicennam.*

in isto calore cogitur, & concoctione primum ipsis partibus agglutinatur & affigitur. Deinde absolute & usquequaque assimilatur, sive in substantiam partis convertitur. Ex hac duplici operatione, duas posteriores humiditates colligit Fernelius. Verum Avicennas secundam humiditatem, rorem nimirum inservire solum putat, ut in nutrimentum promptè convertatur, quando corpus sufficienti nutrimento caret, & ut membra humectet, cum violens causa ea exsiccarit. Quod si corpus sufficienti alimento abundarit, ex primo humore tertium immediate fieri existimat: sin defecerit, à causa aliqua exsiccante, tum demum ex secundo tertium gigni. Opinatur enim ex concoctione primi humoris in tertium, elici subtile quoddam & roridum, quod natura provida indigentiae causa, quasi promptuarii quoddam in membris simplicibus recondit. Tertius igitur humor Avicennae est, verum nutrimentum, conversum in substantiam membrorum, ex parte complexionis, sed nondum ex parte essentiae completæ & similitudinis, atque hunc humorem, quia parum congelatus est, Cambium interpretes vocarunt. Quartus humor, juxta Avicennam, ex semine oritur, partibusque simplicibus innascitur in primo ortu, ut eas contineat, uniat & conserve, unde Gluten dicitur. Verum an hæ humiditates peculiares humorum species dici mereantur, dubitatur. Nam quod gluten vocatur, quia ad constitutionem partium necessario requiritur, partis substantia est; sicut quoque & Cambium: Nam nihil temperamentum membri habet, nisi pars ejusdem fuerit. Præterea ut Galenus 1. de semine testatur, alimentum exhalationis modo in membra transit.

*Humores
secundarii
Fernelio.*

Deinde qui à Fernelio humores secundarii vocantur, mediæ dispositiones videntur inter partes & sanguinem: sed quod partibus assimilatur, ad
narq.

naturam partis propriè accedit: Deinde quod agglu-
minatur; Quod verò in capillaribus venis est, adhuc
naturam sanguinis retinet.

Superfluitates verò & excrementitii humores *Humores*
illi dicuntur qui in corpore abundant, & à corpore *excremen-*
expelli & separari debent. Hi multis modis vari- *titii.*
antur: alii enim partim naturæ utiles sunt, ut fel ad
alvum irritandam & detergendos humores crassos
ab intestinis; melancholia ad excitandum appeti-
tum: Alii inutiles vel simpliciter ut stercus, lotium,
sudores, quæ impropriè humores dicuntur: vel planè
noxii qui præternaturales vocantur, quorum non-
nulli solo nomine ob similitudinem interdum con-
veniunt, qui tota essentia differunt, ut ex causis &
differentiis eorum apparebit, de quibus nunc ordine
dicemus.

Manifestum primum est in primâ concoctio-
ne ex alimentis chylum in ventriculo oriri, quem
Galenus recenti musto comparat, cujus dum in in-
testina protruditur, pars utilissima ad jecur per ve-
nas mesaraicas deducitur, ubi formam sanguinis re-
cipit, qui quatuor illos humores alimentarios con-
tinet. Nam ut ex musto, dum defervescit, quatuor e-
mergunt, ita ex chylo quodammodo, dum in je-
core concoquitur quatuor humores oriuntur, quo-
rum unus præcipuus est, & purissimo vino assimi-
latur, ut sanguis sincerus; alter fecibus, ut melan-
cholia: tertius floribus comparatur, ut bilis flava:
quartus crudis & inconcoctis in vino partibus, ut
pituita. Oriuntur hi quatuor in jecore naturaliter,
ab uno eodemquè calore, pro materiæ dispositio-
ne. Dum enim jecur calore insito in chylum agit,
mediocres partes in sanguinem, tenuiores calidio-
res in bilem, sicciore frigidiore in melancholiam,
frigidiore humidiores in pituitam commutat. Ve-
rùm ut flores à vino, ita cholera & melancholia à

Causa hu-
morum ali-
mentariorum
& excremen-
titiorum.

G s fan-

CAP.
VIII.

sanguine non planè separatur, sed utriusque pars
utilissima cum sanguine & pituita vi jecoris debite
permiscetur, ac in massam sanguinis coit, quæ postea
vehiculo serosi humoris pellente jecore, ac trahentibus
bus primo partibus, deinde venis, in totum corpus
distribuitur. Reliqua verò pars bilis & melancholica
redundans, ad vesiculam fellis & lienem relegatur.
Quare bilis illa, quæ in venis reperitur, sincera non
est, nec cæteris permixta eas qualitates, in sanis po-
tissimum, actu retinet, quas excrementitia in vesicu-
la fellis. Eadem ratio est melancholicæ excrementi-
titæ.

*Naturalis
sanguinis
notæ.*

Hi humores omnes, & seorsim singuli in corpore,
pore, vel naturaliter se habent, vel à naturali consti-
tutione discedunt. Ac primum sanguis ex quatuor
humoribus commixtus naturaliter se habet, si eade
debita proportionè quatuor humorum componatur
tur, deinde si temperatus sit, & substantiæ mediocri-
cris: verum ipse sanguis purus & per se naturalis ju-
dicatur, si calidus & humidus, sapore dulcis, & ex
tra vasa facilimè concreseat vi fibrarum, quas à ve-
noso genere accepit: nihilominus qui in arteriis con-
tinetur magis formæ rationem obtinet, cordis qui
calore absoluitur, unde calidior, subtilior, clarior &
flavior efficitur: Qui verò in venis, coloris rubri &
substantiæ crassioris est.

*Sanguis
non natu-
ralis.*

Non naturalis sanguis ab his naturæ legibus
discedit, vel quantitate, si vires premar, aut vasa di-
stendat, unde oritur plenitudo ad vires & vasa
vel qualitate, si calidior, frigidior, siccior aut humi-
dior reddatur, vel alieno humore copiosè perfun-
datur, quæ cacochymia dicitur: aut corrumpatur &
putrescat.

*Bilis na-
turalis.*

Secundò gignitur bilis ex calidissima & sub-
tilissima chyli parte, unde naturæ igneæ est, substan-
tiæ tenuissimæ & subtilissimæ, ac per se saporis
ama-

remari, coloris flavi, nisi seroso humore permisceatur, à quo pallida efficitur. Hujus portio utilissima jecoris cum sanguine permiscetur, ut cum sanguine membra calidiora alat, & humores frigidos calefaciat & extenuet. Reliqua pars ad vesiculam felleam, ac ut tandem ad duodenum relegatur, excretionem adjuvet, & intestina à crassis viscosis humoribus repurget.

Alimen-
taria.Excremen-
taria.

Non naturalis bilis quadruplex est: prima vitellina, ovi vitello similis. quam Avicenna ex commixtione bilis flavae & pituitae fieri putavit, & bilem majoris famae vocavit; sicut quae ex melancholia bili permista, minoris famae: Verùm illa pituitae permixtione, ad colorem vitellinum bilis pervenire non poterit, sed pallida potius erit. Oritur autem vitellina bilis ex flava bile, calore praeternaturali, tenues partes dissipante & increassante, ad consistentiam & colorem vitellorum crudorum ovorum. Ceterae tres species bilis non naturalis aliquo modo ad viridem colorem inclinant, & ex calidorum ciborum corruptione extra venas, aut à calido ventriculo potissimum gignuntur, rarissime intra venas ex bili vitellina. Veluti bilis *πρασινος* porro similis, deinde *ισαρος* æruginem referens: postremo *ισαρος* glauca, atidis colorem referens, sub qua caerulea quoque continetur. Hæc ex vehementiori adustione oritur, quàm æruginosa; & æruginosa quàm porracea.

Bilis non
naturalis
specie
quadruplex.

Melancholia naturalis ea est, quæ à Medicis plerumque *μελαγχολικός χυμός*, id est, ater succus vocatur, & non atra bilis. Hæc in jecore cum aliis humoribus gignitur, per residentiam quasi, ut fex in vino, ex maximè terrestri chyli portione, ejusque pars utilissima & benignissima cum sanguine miscetur, & per venas distribuitur, ad corporis nutri-

Melancholia naturalis alimentaria & excrementitia

nutritionem; imprimis verò partium crassarum, siccarum, frigidarum. Supervacanea verò & inutilissima pars, quæ acerbior magis & acida est, ad lientem propriam sedem præcipue relegatur. Portio verò ad ventriculum mittitur, ut ventriculum constringat, famemquæ excitet. Nam quo jecur & sanguis à redundant melancholia expurgetur, inferat lien: quare si lien minus quam oportet, ad se trahat, corpus melancholico humore redundabit, & decolor erit. Attrahit autem lien melancholiam, ut ea mutata & confecta perfruatur, unde quasi alterum sive sinistrum jecur ab Aristotele vocatur: quod verò in liene deinde redundat per ventrem naturaliter expurgatur. Præter naturam melancholia naturæ noxia & inutilis oritur, ex primis humoribus per adustionem, vel putredinem in cinerem quasi conversis, & non tam acida quam acris est. Oritur hoc modo: Primum ex melancholico succo, deinde ex cholera adusta. Nam bilis vitellina, quando adustur, primum in porraceam, deinde in æruginosam & glasteam, tandemquæ in atram convertitur. Verum quæ ex cholera, acrior multò est, quam prior: tantoquæ malignior, quanto bilis, ex qua gignitur, efficacior: Unde bilis atra exquisitissima dicitur. Nam saporem aceto acerrimo similem habet, quæ partes rodit, & gravissimè affligit, ac in ipsam etiam terram effusa, eam fermentat. Fit quidem melancholia ex sanguinis adustione, quando pars tenuior in flavam bilem, crassior, in melancholiam transit; sed hæc à superioribus diversa non est. Ex pituita dulci, acida: vel vitrea melancholia immediatè non oritur: ex salsa verò, quæ caloris non naturalis participes est, fieri interdum judicatur: sed an mediatè, & prius in bilem convertatur (ut Galen. 42. Aph. 7. innuere videtur:) an immediatè per adustionem aut putrefactionem tantum dubitatione aliqua carere non videtur.

Restat

Restat quartus humor, qui aquæ comparatur, & cæteris Græcis, excepto Prodicto, phlegma vocatur, à Latinis omnibus pituita. Hæc naturaliter humor alimentarius est, & in massa sanguinis portio crudior, quæ sanguis ex dimidio coctus vocari solet, ac per venas in totum corpus distribuitur, ut partes frigidiore humidiore, qualis est cerebrum, aliat. Per se separatim frigida & humida est, colore alba, saporis expers, sed si à calore naturali nonnihil alteretur, dulcis aliquo modo redditur. Verùm pituita alimentaris non est propriè illa superfluitas primæ concoctionis in ventriculo redundans, aut viscosus humor, qui intestina oblinat: neque etiam in ventriculo ex primâ concoctione perfectè generatur, licet à ventriculo initium aliquo modo sumat. Nam chylus ad omnes humores dispositio nem quandam habet, sed peculiariter ad pituitam, unde Galen. lib. de Atrabile & alibi, pituitosum humorem in ventriculo fieri dicit: nihilominus ut alimentaris fiat, necesse erit ut in jecore prius concoquatur, perficiatur & absolvatur, qua concoctione pars in sanguinem mutatur, reliqua sanguini cæteri quæ humoribus miscetur. Quare pituita redundans nullum peculiare membrum habet, quo à sanguine separetur, sed illa superfluitas primæ concoctionis, quæ intestina oblinat, à bile per duodenum intestinum expurgatur.

Pituita non naturalis variè sumitur. Nam quod lacreu rejicitur: Deinde tenuis ille humor, ac quoque viscosus (mucus nimirum) qui à capite in nares & os defluit, pituita plerumque vocatur, sed minus proprio nomine, ut Galenus 2. de Natur. fac cap ult. statuere videtur. Præterea in articulis, in oculorum palpebris & pulmonibus concrescit interdum materia, quæ gypsea pituita nominatur, sed ea tophus aut grando potius dicenda quam

Nonnaturalis pituita.

CAP.
VIII.

quàm pituita. Pituitæ autem excrementitiæ tres præcipuæ sunt species. Una acida pituita, naturalis multò frigidior & crudior. Nam præter primam in ventriculo confectionem, in jecore & venis viriditatem nullam alterationem & perfectionem accipit; unde ob defectum coloris extremè acescit. Secunda quia vitro fuso colore & substantia similis est, à Praxagoræ vitrea pituita primum dicta fuit, ab aliquibus simpliciter crudus humor. Nam multò crudior, frigidior, viscidior & crassior est, quàm acida & partibus adhærescens, ut intestinis, dolores colicos & cruciatus gravissimos excitare solet. Tertia salsa pituita vocatur, à cæteris viribus & materia diversa. Nam ut cæteræ, frigida non est, sed calida & siccatior. Oritur hæc non ex pituita naturali permixta cum bile amara, ut Avicenna opinatur, sed aut mixtionem salis serosi excrementi; aut à putredine pituitæ naturalis. Hi sunt humores alimentarii & excrementitii ex quibus corpus humanum nutritur, in se variè disponitur & afficitur, quæ varietas pro singulorum humorum diversitate, & constitutione evenire solet, quatenus in corpore vel augentur vel minuuntur. Augentur autem vel minuuntur pro temperamento, natura & constitutione corporis, pro ætate, diætâ, anni tempore, regione & similibus.

Refutatio
Paracelsi-
stæ.

Paracelsistæ, ut alia pleraque veterum, ita humorum doctrinam rejiciunt, & Dogmaticos inani titulo, ut ipsis videtur, cui res nulla subfit, humoristas appellant: negant enim non solum humores alimenta & nutrimenta corporis humani esse, sed etiam excrementa & morborum causas, aliaque principia & causas substituunt, ut ex eorum paradoxis apparet. Concedimus quidem in omnibus alimentis aliquid esse oportere nobis familiare, quod illi Balsamum fortassè appellant, sed primum

à ra

ratione alienum esse putamus in alimentis illa omnia actu esse quæ ex alimentis oriuntur, & non per transmutationem substantiæ gigni, sed tantum secretionem caloris nativi separari & manifestari: ita necesse erit cum Anaxagora confiteri, omnia in omnibus esse, & secretionem res nasci, confusione interire, ac proinde nullam simplicem generationem aut corruptionem esse, quæ omnia non solum ab Aristotele aliisque abundè refutata sunt, sed etiam cum experientia & sensu manifestè pugnant. Nam ut alia omittam, si ista secretio locum haberet, necesse foret idem alimentum omnibus sine discrimine, nimirum pueris, juvenibus, decrepitis, ægris & sanis eundem succum eademquè excrementa suppeditare: at constat experientia eundem cibum aliis in bilem, aliis in pituitam aut melancholiam, aliis in bonum sanguinem converti, atque eundem cibum in eodem homine sano & ægro eundem succum & excrementa non gignere, ac multa dulcia nimia concoctione primum salsa, deinde amara reddi, &c. Deinde nituntur falsis & absurdis principiis, nã impossibile est illa naturæ opera ut caro, ossa & similia, ignis ministerio fieri: absurdum ex artis operibus naturæ principia & causas æstimare: ridiculum hominem microcosmum vocare, quia actu in se omnia illa complectitur, quæ in toto mundo continentur, omnesquè illorum mutationes eodem modo sustineat. Concedimus quidem multas separationes Medico utiles arte perfici, & chymicos corpora dissolvere, & vi ignis nonnulla homogenea in unum cogere, quæ ab iis Sal, Sulphur, & Mercurius vocantur, verum negamus has resolutiones naturales esse, aut quod in his operibus ars naturam imitetur, aut natura artem, deinde ex omnibus alimentis artem Chymicam unam guttam sanguinis aut parti-

particulam carnis elicere posse, ut Paracelsus statuit, proinde ars naturam non adæquat, sed simia tantum naturæ est, & in aliquibus naturæ subseruit, in plerisque ea efficit, quæ actionibus naturæ nullo modo correspondent. Quare cum generationis & nutritionis nostræ elementa excrementa sensibus manifesta, amentis erit ex umbra illa artis naturæ opera & effectus æstimare, & manifestis relictis scrutari, quæ nemo unquam actu in corporibus nostris ostendere potuit. Nam nemini obscurum est ex alimentis sanguinem gigni, eoquæ corpus nutritur, deinde in sanguinis generatione, quæ ob copiam aut qualitatem aptè cum eo commisceri nequeunt separari, & excrementa fieri: unde ipse Paracelsus in Archidoxis & alibi concedit quatuor humores in humano corpore, & medicamenta præscribit, quibus utraque bilis & pituita expurgari queat. Dicitur quidem à Medicis humores nonnulli æruginosi, glastii, porracei, non quia actu æruginem, porrum aut Isatidem continent, sed quia colorem eorum referunt: Ita à sapore non à substantia humores salii, amari, acidi &c. vocantur. Cætera de humoribus suo loco explicabuntur, & peculiariter in Pathologicis, qua ratione humores morborum causæ dici debeant,

CAPVT IX.

De Generatione Hominis.

CUM animata omnia connatas interitus sui causas habeant, ut lib. 1. de San. Tuen. Galen. demonstrat, tamen divino quasi instinctu esse perpetuò appetant: præter altricem & auctricem tertia aliqua facultas naturalis illis insita

assita erit, nimirum generatrix, sive procreatrix, cuius beneficio quod ex se, & in individuo habere nequeunt, aliud sibi simile reponendo in eadem specie consequuntur. Hæc omnium facultatum naturalium divinissima, maximequæ naturalis est. Nam speciem ipsam & formam quæ natura materis, magisque divina est, quam materia ab interitu indicat eamquæ perpetuitatem animatis quam consequi possunt, attribuit.

Est autem facultas procreatrix propriè ea vegetantis animæ vis, qua quodlibet animatum in suo genere unum & perfectum, ex alimento redundante pro partium nutritione, quod semen vocatur, aliud sibi simile gignere potest. Dico unum & perfectum. Nam imperfecta in suo genere & quæ ex variarum specierum commixtione (ut muli & similia) nec quoque quæ ex putredine oriuntur, ista facultate plerumque destituuntur, & si quid gignunt, dissimilis naturæ, & sterile ferè semper existit. Deindè dico, sibi simile gignere potest: quod generatio communiter duplex sit, una propriissimè dicta univoca nimirum & homogenea, qua animatum aliud sibi simile iisdemquæ facultatibus præditum gignit, qualis est hominis generatio: alia æquivoca qua dissimilis naturæ animatum, vel ex dissimilium specierum commixtione gignitur: vel ex putredine solum oritur. De illa, de quæ hominis generatione hîc propriè agemus.

Vocabulum generationis sive procreationis in homine interdum communiter, interdum propriè sumitur. Communiter autem procreatio sub se omnes illas actiones comprehendit, quæ requiruntur, ut infans non solum generetur; sed etiam in lucem naturaliter producat, nimirum primùm, coitum sive congressum maris & foeminæ, qui perficitur seminis emissionem & tractionem in uterum.

*Definitio
facultatis
generatricis.*

*Generatio
communiter
quæ
actiones
sub se continet.*

H

Se.

CAP.
IX.Definitio
generatio-
nis propri-
ssimè di-
cta.

Secundò conceptionem, vivificationem foecun-
seminis vi uteri pro formatione foetus. Tertiò gen-
rationem propriissimè dictam, ipsam nimirum fo-
tus formationem, quæ est functio facultatis gen-
rantis, residentis in spirituosâ seminis portione, co-
pus seminis unâ cum utilissima sanguinis mater-
portione in utero alterantis, & transformantis
substantiam partium & exactam formam totius
corporis humani. Quartò perfectionem omnium
partium foetus necessariam ad robur & actionem
quæ post conformationem requiritur, ut foetus mo-
veri & extra uterum per os nutrirî queat. Postremo
partum sive infantis exclusionem ex utero. De sin-
gulis ordine dicemus.

Prima
principia
generatio-
nis mas &
fœmina.

Ac primum generationis principia prima, quæ
organa, instrumenta, materiam, & facultates ne-
cessarias conferunt, sunt duo; quorum unum formæ
& propter *δυνάμιν* efficientis causæ rationem habet
mas, qui facultate sua in alio gignit: alterum sub-
jecti & propter *ἐνέργειαν* materiæ rationem
magis sortitur, fœmina quæ in se ipsa gignit. Hæc
duo subiecto in plantis plerumque distincta non
sunt, sed quod utriusque congressu in animalibus
efficitur, in plantis plerumque miscetur. Ut igitur
mas in alio, fœmina in se ipsa gignat, natura utriusque
membra & instrumenta ordinavit: mas testes, vasa
seminaria, præparantia & deferentia, ac colem: fœ-
minæ vasa seminaria, testes & uterum: quæ hac r-
potissimum differunt, quod mas à natura dispositus
ita sit, ut semen proximum generationis instru-
mentum, in aliud ritè transfundant; fœminæ ve-
ut in se recipiant, foveant, & in actum deducant. Com-
respondet enim uterus, scroto; in principio con-
for-

Organa
generatio-
nis.

formationis consentiunt, licet absoluto foetu forma, magnitudine & situ differant. Nam membra illa genitalia quæ in maribus excluduntur, in fœminis intus conversa reperiuntur. Unde fœmina mas orbarus & occasionatus dicitur. Nam in procreatione ut mas in alio, fœmina in seipsa gignat, necessarius est veneris complexus, quo concurrant, singulique suas partes impleant, nimirum ut mas semen prolificum transfundat; fœmina suscipiat, & ex suscepto semine concipiat, foetumquæ in lucem producat. Quo verò singuli partes suas impleant natura idonea instrumēta unicuique attribuit. Nam in maribus primum ut semen prolificum elaboretur & conficiatur, requiruntur testes, deinde vasa præparantia, quæ materiam pro semine conficiendo ad testes deferunt; tertio vasa, quæ semen confectum suscipiunt, & ad penem deferunt, tandemque penis per quam in complexu venerico (ubi incitante appetitu a spiritu erigitur) ex vasis semen in cervicem uteri transfunditur & detruditur. In fœminis vicissim suscepto maris semine in se gignant, æqualis ferè partium numerus est. Nam & fœminæ quoque semen habent, sed imperfectum, crudumquæ, ut infra dicemus, & ad semen conficiendum testes exigunt. Deinde vasa præparantia, ac etiam in complexu venerico semen deferentia, sed non ut in viris extra corpus, sed in proprium uterum, ubi cum semine maris miscetur. Nam ut fœmina in se gignat necessarius est arvus fœcundus, sive locus semini excipiendo, fovendo & nutriendo idoneus; qualis est uterus, sive matrix, qui non tantum semen attractū suo sinu & complexu fovet, undè conceptio oritur, sed etiam per venas & arterias in proprium sinum terminādo, sanguinē suppeditat, ac toto tēpore, quo in utero est, nutritur & augetur. Deinde quia uterus

H 2

in-

CAP.
IX.Organa
generatio-
nis in vi-
ris.

intus reconditus est, requiritur via, per quam sinu
in complexu venero semen detrudat, quæ sinu
pudoris, aliquando cervix uteri dicitur. Testes au-
tem duos uterque sexus adipiscitur, qui in viris e-
minent, pendentquæ abinguinibus, proprio invo-
lucro conclusi ex cutè & nervosa membrana: In
fœminis unus utrinque utero affidet: substantia eo-
rum mollis, rotunda, rara, glandulis similis in viris
potissimum, in fœminis minores minusquæ rotun-
di & molliores sunt; pluribus tunicis integuntur,
sed paucioribus in fœminis illaquæ sola, quæ epi-
didymis dicitur cum parte peritonæi. Vasa autem
spermatica duplices sunt, quorum alia præparantia,
alia semen deferentia & ejaculatoria vocantur. Præ-
parantia quatuor sunt, duæ venæ, totidemque arte-
riæ. Vena dextra à trunco venæ cavæ sub emulgen-
te exoritur; sinistra ab emulgente; Arteriæ ambæ à
magnæ arteriæ trunco sub emulgente: hæc vasa in
viris primùm ad latera deflectuntur, deinde dum
descendunt in scrotum per peritonæi productio-
nem comitante musculo cremastere, dextera vena
dexterae arteriæ, & sinistra sinistrae unitur, tandem quæ
mirabili implicatione capreolorum vitis instar, in
corpus varicosum oblongum album degenerant,
ubi materia præparatur à testibus ac demùm in semen
transmutatur. Semen elaboratum ab utroque te-
ste suscipiunt vasa deferentia sive ejaculatoria, quæ
in exortu crassa & anfractuosa sunt, & ad postero-
rem testis sedem reflexa. Deinde in viris sursum ea
via in abdominis cavitatem ascendunt, quo descen-
derunt vasa præparantia, hinc reflectuntur, & sub
vesica feruntur, amplificantur, & dextrum vas sini-
stro unitur, varieque contorquentur & compli-
cantur donec in glandulosas parastatas, quæ ad pe-
nis & vesicæ fines collocantur, implantantur, ubi
communis meatus per penem pro urinæ seminisque
excre-

excretionem. Penis autem constat ex duobus nervosis oblongis cavisque corporibus, ortis ab infima ossis pubis parte, in quorum medio est meatus ille communis; substantia penis interior rara, fungosa, ut à spiritu replente erigi, rursusque flaccescere queat, ac in superiori parte, ubi ab illa cute tegitur & retegitur, quæ præputium dicitur, glandis modo tumet: accedunt his præter venas, arterias, & nervos, quatuor musculi, quorum duo erectioni penis, duo excretioni seminis servire putantur. Uterus sive matrix, alterum instrumentum procreationis, utriusque conditus est in ampla coxarum cavitate, medio loco inter vesicam & rectum intestinum, quibus alligatur: figura ejus rotunda oblonga est pyro similis, in angustum os definens, fundi forma antè & posterius nonnihil depressa, superius obtusa angulos ostendens similis fronti vitulorum, quæ cornua productura est, potissimum in brutis, unde cornua vocantur. Substantia uteri membranea est, ut ad foetus incrementum dilatari rursusque contrahi queat, ac proinde in virginibus & sterilibus uterus exiguus est. Constat simplici tunica satis crassa densaque, cui alia à peritonæo initium sumens obducitur. Utero utrinque accumbit unus testis ad quos vasa præparantia, ac etiam semen deferentia eodem modo, ut in viris, pertingunt, sed breviora, tenuioraque. Deinde vas semen deferens juxta cornua in latus uteri inseritur, & per corpus uteri ad os ejus usque disseminatur. Via à pudendo ad os uteri, quæ cervix uteri & sinus pudoris vocatur, corpus oblongum est, canalis aut vaginæ instar; & etiam membranosum & rugosum; ab anteriore superioreque parte vesicæ insertionem excipit; supra hanc insertionem à lateribus sunt duo processus nervei, quos κλειθρίδα Fallopius appellat: infra quatuor carunculæ membranosæ, quas nonnulli nymphas

*Organagenerationis
infæminis.*

CAP.
IX.

*Materia
proxima
principia
generatio-
nis.
Semē quā
variē se-
matur &
quid pro-
priē sit.*

vocant, cæteraque pudendi partes. Hæc sunt orga-
na, quibus perficitur generatio, & in quibus gignuntur & continentur proxima generationis nostræ principia, semen & menstruus sanguis. Semen autem ut ipse Galenus admonet *Prognost. com. ult.* æquivoce sumitur: & apud Aristotelem duo quoque significare videtur: primò id quod Medici *σπέρμα* vocant, Aristoteles *σπέρμα σπέρματι* & *ὄγκον* ac *πρωτομασπερματικόν*, nimirum humorem illum qui ex vasīs spermaticis excernitur. Hac significatione tam fœminis quàm maribus semen tribuitur.

Deinde propriè Arist. significat *ζῳόν* sive *δυνάμει* *ζωνητικὴν* & *λόγον σπερματικόν*. Hæc generandi via à generante procedit, participatione nativi caloris, & in illo seminis corpore continetur, proximum quæ procreationis instrumentū dicitur: ac ad corpus nascētis fœtus se habet, ut ad domum faber, ac lac coagulum. Hac posteriori significatione semē ab Aristotele accipitur, & fœminis denegatur, ut post apparebit. Nā vis gignendi primò & propriissimè semini maris, secundariò fœminæ tribuitur, quatenus maris semine movetur. Itaque ex utroque compositum corpus scilicet, quod à generante procedit, in quo vis generatrix continetur, semen propriā dicitur; secundariò quod ex vasīs spermaticis fœminarum excernitur.

Præterea *κύνημα*, quod ex utroque semine maris & fœminæ primum oritur, semen interdum vocatur, quod plantarum seminibus correspondet, in quibus sexus distinctus non est. Ad generationem seminis illius in homine quod attinet; Demonstrat Aristoteles *lib. 1. de Gen. animalium*. 16. semen propriè non esse *σπέρμα*, sive aliquid ex partium colliquatione; ne partē aliquam animati corporis, neque etiam ipsum alimentum propriè, sed quidquam

in

partium nutritione redundans, sive περιττώμα
προσέμνηστροφῆς καὶ τῆς ἐσχάτης inchoatum longa con-
coctio ne in capillaribus venis.

Illa redundantia quia (authore Aristotele)
ἐκ τῆς ἀλλήλων τὴν πεφυκὸς ἀρροσίναν πρὸς τὸ ἅπαν & non
quod à toto omnibusquè partibus abscedit, ne par-
tes colliquari dicamus; ad omnes partes proportio-
nem quandam habebit. Unde à toto corpore omni-
busquè partibus decisum dicitur, non quidem secun-
dum numerum, ut quidam voluerunt, sed secun-
dum speciem & facultatem; præcipuè verò materia se-
minis à tribus principiis, jecore, corde, & cerebro
oritur, in quibus spirituum maxima opia coquitur.
Hanc postea ut excrementum non natura & quali-
tate sed quantitate solum redundans, partes à se
transmittunt, testes unà cum vasis spermaticis at-
traunt & perficiunt, ac spiritibus à toto corpore
permixtis in semen, (corpus album & spumofum)
transmutant, adeò ut semen illud animati corporis
omnibus viribus ornatum, aptum sit ut similis na-
turæ animatum producat.

Modus ge-
nerationis
seminis.

Quare semen erit corpus album & spumofum,
calidum & humidum in testibus, elaboratum ex re-
siduis ultimi alimenti pro partium nutritione per-
mixtis spiritibus influentibus, ut animal perfectum
in utero generetur.

Definitio
seminis.

Deindè menstruus sanguis non est omnis per
muliebria effluens, sed naturæ superfluous: & ob de-
fectum caloris non perfectè digerentis redundans,
singulis penè mensibus à natura excretus, (nisi ætas
aut morbus impediat) sine ullo symptomate. Hic
sanguis licet crudus videatur pestilens tamen &
venenatus naturaliter non est, eoquè natura melio-
ris gratia in generatione utitur ut materia.

Menstru-
us sanguis.

IX.

*Facultas
generatrix
duas
sub se con-
tinet.*

His propositis restat, ut facultates illas proponamus à quibus generatio, deinde unde originem primo habeant. Ac primum ipsa generatio non est simplex actio, sed composita ab alteratione & formatione, cui etiam nutritio auctioque subseruit. Nam sub generatrice facultate duæ propriè continentur, alteratrix sive immutatrix, & διαπλαστική formatrix.

*Quid al-
teratrix
facultas?*

Alteratrix autem facultas materiam generationis immutat, & singula aptè commiscet ac substantiam omnium similarium partium constituit: proinde à Galeno tot dicuntur alteratrices facultates, quot similari corpora.

*Quid fa-
cultas for-
matriæ.*

Formatrix verò partes illas efformat, & inter se aptè componit, nimirum unit, distinguit, separat, variisque modis disponit, & exornat, atque nihil otiosum & inutile in fœtus formatione relinquit.

*Quid ge-
neratrix.*

Ipsa vis generatrix quæ ab Aristotele (communio nomine) Plastica dicitur, nihil aliud est quam virtus divina benedictione animatis insita, deinde semini proprio gignentium instrumento communicata, ut illa impressa motione, sine qua semen potentia tantum est, simile animatum gignat & producat. Hæc actio dispensatur & promovetur vi cœlestium corporum, à quibus dependent generationes rerum naturalium, unde illud Aristotelis, Sol & homo generant hominem.

*Instrumentum
facult.
generatri-
cis, calor
plasticus.*

Fit autem generatio, ut infra dicemus, quando à matrice facultas generatrix in semine exsuscitatur, & ad materiam alterandam insurgit, quod sine instrumento fieri nequit. Instrumentum commune est calor plasticus, non igneus corruptivus, sed proportionē correspondens virtuti cœlesti, consistens in tenuiori seminis virilis portione, unde spiritus dicitur, à quo prima operatio quæ ebullitio & spumifi-

ificatio vocatur. Hæc vis si consisteret in semine mulieris, nihil prohiberet, quo minus hanc alterationem, ac proinde conceptionem & procreationem ex seipsa efficere posset. Quare humor ille qui foeminarum testibus defluit, per se propriè non sufficit, ut ab Aristotele sumitur nec eodem modo semen dicitur, ut maris.

Nam necesse est primum, aut utrumque semen in conceptione efficientis rationem habere, aut alterum solum. Utrumque probabile non videtur, neque enim aliud à virili semine, aliud à muliebri foris constituitur, cum unum vitæ principium sit, & omnia in uno consistant, neque ab utroque primum commixto & contemperato, & ad communem formam redacto, vis generandi primum oritur. Nam illa mutua contemperatione nova generandi facultas non excitatur, nec ex duabus una oritur, sed potius materia præparatur & idonea actioni vius generatricis principalis in semine efficitur. Quemadmodum enim (autore Galeno lib. 2. de Nat. facult. c. 3.) Phydias ante facultates artis habuit, quàm materiam attingit, usus autem est ipsis in materia; nam sine materia competentis omnis facultas ociosa est: Ita maris semen facultates in seipso possidet: actionem non didicit à materia, sed circa hanc obit si competens sit, & nec plus nec minus quàm indiget, affluat. Quare consentaneum videtur, in ipsa conceptione primum, maris semen efficientis causæ vices implere: quòd verò in foemina semen dicitur, unà cum menstruo sanguine (qui ab Aristotele imperfectum quoque semen vocatur) materiæ magis rationem habere, & causæ sine qua non. Peculiariter tamen inseruit semen foemineum non solum ad recipiendum & distribuendum semen virile in uterum: sed etiam ut cum semine maris foetum constituat: & quia natura humidius

*Via gene-
rans & ca-
lor plasti-
cus in ma-
ris semine
propriè con-
tinetur.*

CAP.
IX.

& frigidius est, ut sit quasi quoddam alimentum virili semini crassiori & calidiori accommodatum, ac redundantem calorem seminis virilis contemperet, quemadmodum Galenus 2. de Sem. cap. 4. statuit. Nam ubi fit conceptus, semen foemina cum volupate & magna vehementia ejaculatur (licet ob impuritatem matricis non semper sentiat) ut cum semine maris permisceatur, ne alterutrum corrumpatur: cum alterum sine altero non subsistat, nec efficax sit, & maris scintillæ, foeminæ fomitis rationem habeat.

Quomodo
utrumque
semen
rationes
habeat
efficientis
& mate-
ria.

In procreatione quidem maris semen efficientis vices implet, à quo prima operatio, quæ ebullitio dicitur, & foemina materiam præcipue suppeditat, verum nihil impedit in compositione & formatione partium foeminam, foemineumque semen, actione sua aliquid conferte, & semen maris aliquam materiæ rationem habere. Nam ut gallinæ per se facultatem habent gignendi ova subventanea; ita foemina facultatem producendi formas inferiores, alteri subordinatas & subservientes, nimirum mixti alicujus similis vel dissimilaris. Atque hæc efficacia in iis animalibus maxime elucet, quæ ex specierum diversarum commixtione oriuntur. Deinde ingreditur semen maris foetus constitutionem, ut impressivum motus principium, à quo authore Aristotele 2. de Gener. animal. cap. 14. anima sensitiva, per quam animal, sed producto foetu non evanescit, licet plasticam vim non exerat; verum utilissima ejus pars in spiritus dissoluta materiæ embryonis commiscetur, omnibusquæ foetus partibus innascitur: reliquum præter id quod vi caloris in auras evanescit, cum foemineo semine aliis usibus destinatur, & partium constitutionem ingreditur: sed magis virtute quam mole,

Ex

Ex his manifestum est, quæ propriè requisita
sunt in procreatione hominis, ac procreationem
feri in utero à facultate generatrice per suam altera-
tricem & formatricem, ac residere potissimum in
semine maris. His facultatibus ministrant propriè
nonnullæ ante actum generationis aliquæ in actu
& post conformationem partium. Ante generationē
primum vis generandi seminis in testibus; & in mari-
bus vis per coitum seminis, ejicendi in uterum;
in fœminis vis attrahendi seminis primum in
uterum; Deinde comprehendendi, commiscendi
& exsuscitandi, sive vivificandi, actio conceptio
dicitur. In ipso autem actu generationis, inserviunt
attractiva vis menstrui & expultrix sudoris & uri-
næ, quæ etiam post conformationem requirun-
t. Quandiu fœtus in utero est, rur, ac præterea om-
nes facultates naturales ipsæque vis altrix & auctrix.
Ad formā modumque totius generationis quod
attinet, In coitu maris & fœminæ, cum mas &
fœmina simul semina effundunt, uterus naturali
desiderio flagrans ea attrahit; & in sinus uteri
recondit, ubi exquisitè permiscetur, quibus per-
mixtis uterus sese contrahens vim generatricem
conceptio propriè dicta oritur, quæ à Galen 1. de
Semin. definitur vivificatio seminis ad formandum
fœtum orta à proprietate uteri.

Incipit igitur conceptus sive κύημα (ut te-
statur ipse Aristoteles 10. de Histor. animal. c. 7. & 9.
& lib. 2. de Gener. animal. c. 4.) quando utrumque se-
men prolificum maris scilicet & fœminæ in unum
locum emissum, in uterum attrahitur, retinetur, &
fovetur. Attractum autem & retentum esse constat,
teste Hippocrate, si locus, deinde exlicceretur, quod
certissimum conceptus signum judicatur; si horror
aliquis ob uteri contractionē simul incutiat: quæ
tamen

Quid con-
ceptio, &
quando in-
cipiat?

CAP.
IX.

tamen ob impuritatem aliquam uteri nonnulla minus experiuntur. Fovetur verò quando calore uteri ad munus suum obeundum exsuscitatur, & actionem deducitur. Exsuscitata facultate latente in semine incipit generatio propriè dicta, partiumquè delineatio & conformatio, quæ secundum nonnullos sub se comprehendit quinque tempora & gradus, nimirum ebullitionem sive spumificationem, primam seminis actionem, 2. partium delineationem, 3. delineationis repletionem, 4. carnificationem, tandem absolutam perfectamque omnium conformationem. Galenus verò 1. de Sem. hæc eadem opera generationis quatuor temporibus distinxit, sub quibus conceptionem simul comprehendere videtur. Primum opus *πρῶτον* ab eo vocatur, dum species seminis in utero præpollet, tantumque semen nonnihil coagulatum apparet. Secundum *ὑπόμεινον*, quando nulla certa apparet delineatio, sed quasi massa informis. Tertium opus *ἐμβρυον*, in quo continetur delineatio. Quartum infans, in quo perfecta partium descriptio & conformatio animadvertitur, unde dignoscimus an puer, an puella, &c. & quod fœtus tum vitalis sit.

Ordo modusque generationis.

Munus autem primum facultatis generatricis in semine, est ebullitio, nimirum ut in illa seminis materia, spiritus instrumentum facultatis alteratricis & formatricis consocietur, deinde ut hoc instrumento vi alteratricis facultatis partes illius materię *συνσεύειν* consocietur; crassiores & inutiliores extra ad membranarum, quibus fœtus involvitur, generationem, puriores verò & spiritus magis participes intra ad fœtus ipsius constitutionem, atque hinc partium delineatio incipit. Membranae tres sunt; una quæ fœtum immediate involvit *ἐμβρυον*; altera à mucronata cartilagine ad ilia usque cingit

ingit zonæ instar, quæ à farciminis figura ἀλλαν-
 τειδης dicitur; tertia vasa umbilicalia fulcit, eorum-
 que interventu tota utero adhærescit, quæ quia cir-
 culi instar foetum ambit, aut continet, χοειον vo-
 catur. Dum autem ex puriore sanguine partes o-
 mnes adumbrantur, spiritus ille ad totius nutritio-
 nem & augmentationem, ac ad caloris contempe-
 rationem viam ad uterum, uterique vasa pro arte-
 riis & venis umbilicalibus facit; quibus formatis per
 venas in illas alimentum ex sanguine materno attrahi-
 tur, quo partes aliæ nutriuntur & augentur, aliæ af-
 fuso sanguine investuntur; per arterias verò cali-
 dus spiritus foras exit, & frigidus à matrice cum
 tenui sanguine & spiritu inspiratur. Nutritur enim
 & augetur foetus maternus, sanguine ex acetabulis
 & orificiis vasorum uteri, per venas & arterias um-
 bilicales quæ chorio fulciuntur. Quare cibum per
 os non capit, neque prima aut secunda concoctio-
 ne indiget, nec etiam alvum reddit; lotium tamen
 vehiculum sanguinis per ἀερον in ἀλλαντειδην
 deponit, ne foetus lædatur, aut uterus ad excretio-
 nem irritetur, sudorem verò amnios excipit. In
 procreatione autem non solum quatuor ministræ
 facultates subserviunt, sed etiam alitrix & auctrix.
 Ac sine his quod jam in utero adumbratum est à
 facultate generatrice, perfici & conservari nequit.
 Dum enim in conformatione omnium partium,
 aliteratrix & formatrix sedulo incumbunt, alitrix &
 auctrix actiones & opera sua conferunt.

Ab initio conceptionis ad septimum usque *Tempora*
 diem ebullitio spumificatioque absolvitur, deinde *generatio*
 partes adumbrantur & efformantur. Sed quemad- *modum*
 modum pictores rudioribus lineamentis imagines
 primum adumbrant, deinde vario pigmentorum
 genere illustrent & absolvunt, ita generatrix facultas
 perfecta

CAP.
IX.

*Tempus
motus in-
fantis in
utero.*

De Partu.

*Modus pa-
riendi.*

peracta spumificatione post sextum diem partes pri-
mum delineat; hinc lineamenta replet, & carnem
gignit, tandemque perfectè singula efformat ad 30.
aut 45. diem, quod longissimum formationis tem-
pus à nonnullis putatur, quo foetus vim vitalem ex-
erit, & infans esse incipit, unde ad summum spumi-
ficationi sex dies tribuunt; Delineationi 4; delinea-
tionis repletioni 8; carnis generationi 14; Confor-
mationi 13. alii tamen longissimum tempus for-
mationis assignant diem 50. Atque hæc tota foetus
fabrica, temporibus quatuor à Galeno de *Seminibus*
cap 9. dividitur, ut supra dictum est. Post hanc par-
tium formationem & constitutionem, reliquo tem-
pore ad justam magnitudinem formam producit, de-
articulata membra exsiccat & firmat, singulaque
ordine absolvit. Sensoriis autem perfectis sentire
incipit, deindè firmatis ossibus moveri, mas citius
ob caloris copiam, & ut plurimum tertio mense
fœmina tardius movetur, & plerumque quarto me-
se. Nam nec formationis nec motus certum & de-
finitum tempus est.

Tamdiu verò foetus in utero nutritur & con-
servatur, quousque robur acquirat, & per os nutriti-
queat ac majori loco, majorique aënis attractione
indigeat; & tunc calcitrando membranas & involu-
era rumpit: deindè suo impetu dilatante se utero
cum vicinis partibus, & matre viribus suis conni-
tente, maximè naturaliter in caput deorsum ruit, &
primum caput foras prodit; deinde cætera membra
sine periculo facilimè consequuntur. Aliæ figuræ
partus periculo non carent; nam si pedibus primum
exeat, periculum est, ne brachia distumpantur, un-
de qui sic nascuntur à veteribus Agrippæ vocati
sunt, quasi ægrè pariantur. Similiter si in manus ex-
eat, aut obliquus partus fiat, matri & infanti varia
pericula minatur.

Homi-

Homini præ cæteris animalibus incertum parturienti tempus datum est: nihilominus certum videtur tempus ultra quod partus naturalis non est, & ante quod vitalis esse non judicatur. Nam cum Hippocrate & Aristotele Galenus existimat, ante medietatem anni solaris, partum vitalem non esse. Si post hoc tempus fœtus satis robustus sit, septimo mense vitalem prodire; sin non, naturam in mensem nonum, aut decimum, aliquando ad initium undecimi retinere: sin octavo nascatur mori, (nisi in Ægypto, aliisque paucis regionibus) quia septimo mense imbecillis redditur, ob conatum exeundi frustratum. Verum maximè naturale tempus partus humani videtur, à decimo quinto die noni mensis, ad decimum quintum decimi, quo tempore plures nascuntur. An verò duodecimo mense infans naturaliter in lucem prodeat, dubitatur. Nonnulli ex tempore formationis tempus motus, & ex motus, tempus partus æstimant, ut scilicet tempus motus, sit dupsum formationis, & tempus partus triplum motus, quod Hippocrates 6. Epidem. innuere videtur. Verum hinc non intelligitur, cur ante medietatem anni partus vitalis non sit, deindè cur qui septimo mense prodit, sit vitalis, qui octavo, non. Quare aliqui hujus rei rationem ab Astrologis petunt, qui primum mensem sub dominio Saturni, secundum sub Lunæ, nonum sub Iovis collocant, qui duo vires & vitam impediunt. Præterea ex positu & motu Lunæ moram nati in utero æstimant. Mulieres ex numero purgationum intermissarum mensium numerum plerumque colligunt, & veteres qui in hanc considerationem diligenter incubuerunt, mensibus lunaribus synodicis usi sunt: Manifestum enim est, eundem mensem lunarem & purgationis muliebris, sed in partu, numerandi ratio à tempore conceptus inchoari debet quo.

CAP.
IX.

quocunque die post purgationem ceperit. Nam alia pluribus, alia paucioribus diebus purgantur, & quædam citius, quædam tardius concipiunt; & septimestris partus mulieribus plerumque videtur cum sex mensuris purgationibus caruerit, octimestris cum septem: nonimestris cum octo, &c. igitur mulier conceperit in medio mensis pro 162 diebus, octo horis, sex retentiones menstruorum numerabit. Quare mulieri fœtus septimestris videbitur, sed si rûm nascatur, vitalis non erit aut partus septimestris: quia perfectionem assecutus non est, nec assequetur, nisi edatur post medium mensis, in quo solebat mulier purgationes habere, exactis 20. diebus, complemento scilicet medietatis anni, & ramen revera medietas illa anni est quintus dies septimi mensis cum paucis horis. Ut H p. 166 de Septimest. voluit. Pari modo ubi mulier 15. dies post purgationem concepit; 266. die à conceptu tempus novem purgationum præterit, cum diebus 15. Quare si 280 die pariat, videbitur partus undecimestris, cum sit revera decimestris & 15. dies, 10. mensis. Unde illud Hippocratis libr. de Octimestr. decimestris & undecimestris partus ex septem quadragenariis eodem modo sunt quo ex dimidio anni septimestres.

Accidentia consequentia generatione.

Præternaturalia ut monstrum. Mola

Omnis partus secundum naturam est maris aut fœminæ, generis & speciei ejusdem. At præter naturam, errore formatricis, quatenus inordinatè movetur, & materiæ non ritè dominatur, aut ob materiæ excessum, defectum vel motum, oritur monstrum, vel ex diversis naturæ partibus, vel cum partium excessu aut defectu, vel denique cum non naturali formâ, situ & connexione.

Quod si post primam conceptionem non competens materia affluat, quæ primam delineationem perturbat, facultas licet debilitata, suo tamen munere

ere aliquo modo fungens cum nequit veram effigiem imprimere, præter naturam molam effor-
nat.

Acciden-

At non præter naturam ob copiam & divisio-
nem materiae in utero accidit plurium eo tempore
generatio; deinde ex peculiari uteri dispositione ad
novum conceptum recipiendum, interdum, sed ra-
tissimè superfœratio.

*tia natu-
ralia.
I. genera-
tio gemel-
lorum.*

Postremò nati similitudo triplex dicitur, in
specie, sexu & effigie. Similitudo speciei à faculta-
te generatrice in semine propriè oritur, quæ tamen
pro dispositione materiae effectus interdum variat,
ut ex supra dictis constat.

*II. Super-
fœratio.
III. Simi-
ludo na-
ti triplex.*

Deindè sexus à vi movente ratione materiae
provenit. Est autem materia in generatione maris
calidior sicciorquè, & virtus movendi efficacior.
Nam quando principium movens, vi caloris mate-
riae dominatur, partes exactè perficiens, membra
genitalia foràs excludit, unde oritur mas: at si non
dominetur, defectum quendam committit, & ad
perfectionem illam fœtum non perducit, sed mem-
bra genitalia intrus relinquit, ac necessitate finis fœ-
minam gignit, cum facultate appropriata.

*I speciei
similitudo.
II. genera-
tio maris
& fœminæ*

Tertiò ad effigiem quod attinet, insunt in se-
mine facultates, & gignentium, & maiorum, quibus
nati non solum similes parentibus, sed etiam avis,
proavis & atavis efficiuntur. Nam ubi motus facul-
tatis illius, quæ conatur patri vel matri similem red-
dere natum, robustior est & prævalet, patrem aut
matrem refert; si languidior, exsolvitur interdum,
& motus alterius introducit, nimirum avi, proavi,
aut atavi. Eadem quoque ratio partium in toto.
Nam insunt & motus quoque partium undè
calvi calvos gignunt, & ob defectum, ex man-
cis manca aliquando proveniunt. Verùm si motus
parentum aut majorum obliterentur aut confun-
dantur

*III. Cau-
sa simili-
tudinis in
effigie &
externis li-
neamentis*

CAP.
IX.

dantur, fit ut nulli parentum aut majorum natura similis sit, sed alteri alicui interdum, quod à vigore imaginationis ipsius prægnantis evenire videtur, qui spiritum & sanguinem quo nutritur foetus, hac imaginatione signat, & movet, ac talem effigiem foetus imprimat. Cæteræ verò diversitates in colore, duritie, mollitie, forma & similibus partim à materia & temperamento, partim à foetus situ in utero, aut externo errore, ac à causis etiam superioribus proveniunt; Nam communissima harum omnium vicissitudinum causa à cælo dependet, unde generationes rerum naturalium; quod pro diversis siderum constitutione nascentium corpora variè afficit, tantamquæ nascentium dissimilitudinem affert. Porro cum de matre foetus in utero vivat, non solum qua mater est valetudine, ea in utero vivit, sed etiam partium sanguinisquæ materni vitia in natum plerumque transmittit, deindè quam à parentum gignentium dispositione labem ipsum semen accepit, eam in foetum quoque derivat. Unde ut bonorum paternorum & maternorum, ita quoque morborum hæredes nati fiunt.

CAP. X.

*De Facultate Vitali Et Functionibus
ei inservientibus.*

Sub facultate naturali, Galeno. lib. de Differen.
Symptom. vitalem comprehendit quæ à Platone vocatur cujus sedes est cor, fons caloris nativi, quod situm est in thorace, medio loco inter jecur & cerebrum, quemadmodum ipsa facultas media est inter concupiscibilem, quæ beluinis voluptatibus delectatur & rationem

tionalem, quæ divinis honestisque studiis afficitur. *Sedes facultatis vitalis thorax.*
 Veteres in corpore humano duos solum ventres *Partes thoracis continentes.*
 numerarunt inferiorem & superiorem; Hip. 7. Aph. 38. & alibi teste Galeno: per ventrem superiorem thoracem intelligit, regionem vitalis facultatis, quæ à jugulis ad diaphragma & mucronatam cartilagine extenditur. Hic venter ut inferior in partes continentis & contentas dividitur. Continentes autem communes sunt, cutis & nervosa membrana, sub quibus continentur mammae glandulosa corpora, quæ incumbunt musculis, qui ad anteriora brachia movent; à posteriore parte sunt musculi, brachium retrorsum moventes, thoracem dilatantes: Sequuntur costæ, quæ ab anteriore parte per cartilagine ossi pectoris copulantur, à posteriore parte singulæ singulis vertebrae thoracis. Intra costas sunt musculi, qui intercostales dicuntur, ut Laurentius arbitratur numero 64. quorum 32. pectoris dilatationi, toridem constrictioni inserviunt; hi una cum costis utrinque membrana teguntur. Interior autem membrana, quæ Pleura dicitur, totam interiorem pectoris regionem investit, & ubi ad medium thoracis devenit, hinc inde duplicatur, & à spina ad sternum fertur inter jugulum & diaphragma, totum capacitatem thoracis in dextram & sinistram partem dirimens: unde Mediastinum dicitur. Ab inferiore parte thoracis est diaphragma, quod non solum quasi rotundum quoddam septum discernit thoracem ab inferiore ventre; verum etiam primum instrumentum respirationis est, musculique naturam obtinens, Thoracem liberè dilatans & constringens, ac etiam fecium expulsionem opitulans: cujus musculi caput in medio est, quod tendunt omnes fibræ, & in quod inseruntur nervi à spina. *Partes contentæ.*
 Partes contentæ in thorace sunt, primum cor, deinde pulmo cum aspera arteria cæterisque vasibus & o-

œsophago. Cor autem vitalis facultatis domicilium est, fons vitæ, calorisque nativi, quo languescunt te aut deficiente omnia languescunt, aut deficiunt, cuius etiam gratia conditi sunt pulmones, qui tanquam flabellum sunt, quo cordis calor refrigerari & in sua naturali temperie conservari queat. Cor autem figuræ pyramidalis est instar nucis pineæ, cuius basis medium ferè thoracis occupat, mucronem sensim ad sinistram latus inclinat infra levam papillæ lam. Deinde membrana crassa nerveaque clauditur, quæ Pericardium dicitur, à quo interventu humoris aquei non nihil distat, Præterea summis pulmonum fibris circumplicatur. Substantia ejus durat densa, solidaque est, triplici genere fibrarum intertexta; rectis, ut in diastole sanguis è cava in dextrum cordis ventriculum, & aer per arteriam venalem ex pulmonibus in sinistram cordis ventriculum attraheretur: obliquis ut retinerentur: transversis ut in systole vitalis spiritus in Aortam, fuliginosa excrementa in arteriam venalem; & sanguis per arteriam venalem in pulmones expelleretur. Nam cor duos sinus sive ventriculos habet, dextrum & sinistram: in quorum singulis orificia duorum valorum implantantur. Nam in dextro sanguineoque ventriculo, est orificium venæ cavæ, cui tria ostiola sive tres membranæ introrsum ductæ præficiuntur; & venæ arterialis, quæ habet membranas extorsum spectantes. In sinistro sive arterioso sinu est orificium magnæ arteriæ cum tribus membranis extorsum spectantibus; & arteriæ venalis cū duabus membranis introrsum vergentibus. In horum sinuum medio est septum crassum, sed multis foraminibus pervium, per quod transfudat sanguis ex dextro sinu in sinistram, ubi cum spiritu attracto ex pulmonibus permiscetur, & in spiritum vitalem convertitur. Ad latera cuiusque sinus appendices

mem-

membranosa sunt, quæ Auriculæ vocantur, ne vasa
 irumpantur, & ut promptuaria sint sanguinis &
 feris de repente irrudentis, ne cor suffocetur. Cordi
 annexus est pulmo gratia respirationis, qui reliquâ
 thoracis cavitatem implet. Substantia ejus rara spon-
 siosa est prætenui membrana obducta, ut follium
 instar à spiritu attracto distendi, rursusque emissio
 spiritu contrahi queat. Dividitur à Mediastino in
 partem dextram & sinistram, earumque singulæ vi-
 sibilissimè in duos lobos. Per pulmones tria vasorum ge-
 nera disseminantur, aspera arteria, arteria venalis, &
 vena arterialis. Aspera autem arteria, per quam spi-
 ritum attrahimus & emittimus à superiore parte, u-
 bi œsophago incumbit, cartilaginea est, ut voci fa-
 mularetur; ab inferiore parte membranæ, ubi in
 dextram & sinistram partem pulmonis dividitur,
 deinde multiplici ramorum serie per substantiam
 pulmonis disseminatur. Pari ratione vena arteria-
 lis à dextro cordis sinu; & arteria venalis à sinistro
 per pulmonem distribuitur. Vena arterialis, ut san-
 guis in pulmonem deferatur gratia nutritionis. Ar-
 teria venalis, ut aer in pulmone alteratus ad sini-
 strum cordis sinum deduceretur, & fuliginosi va-
 pores à corde ad pulmones per asperam arteriam
 expellerentur. Nam pulmo fuliginosos vapores
 per expirationem à corde expellit, & insita sub-
 stantiæ suæ proprietate aerem inspiratione attra-
 ctum cordis visibus alterat & aptat, qui in sini-
 strum cordis ventriculum deductus, & halituo-
 so sanguinis vaporibus permixtus, vi insita cordis in
 spiritum vitalem transmutatur, qui deinde per ar-
 teriam magnam in totum corpus distribuitur, ut
 supra capite de Spiritibus dictum est. Quare re-
 spirationis & pulsus idem usus est. His præmissis
 consequens est, ut primum de ipsa facultate vita-
 li, ejusque functionibus, deinde de respiratione

Pulmo.

X.

*Definitio
facultatis
vitalis.*

*Functio e-
ius praci-
pua vita.*

*Functioes
requisite
ad vitam
conservan-
dam.*

agamus. Definiri autem poterit facultas vitalis, vi
animæ residens in cordis substantia, qua ex sangui-
ne vaporoso cum aere in sinistram ejus sinum at-
tracto spiritus vitalis, sanguisque spirituosus genera-
tur; qui deinde per arterias in totum corpus motu
contractionis & distentionis distribuitur, ubi calor
nativus in sua temperie conservetur. Functio hujus
facultatis prima & præcipua est vita, quæ ut docuit
Arist. lib. de vita & morte, est participatio animæ in
calore nativo. Nam vi caloris nativi facultates ani-
mæ in corpore conservantur, & functiones perfici-
ciuntur. Cum autem cor omnium maximè calide
ingenito sit præditum, adeò ut fons & origo calo-
ris nativi merito dicatur, in quo maximè viget tum
quoad substantiam, tum quoad qualitatem & effi-
caciæ, deinde omnes partes ejus refocillatione
indigeant, idcirco natura cordi indidit facultatem
generatricem caloris cujusdam nativi influentis.
Nam cor calore insito per pulsum & respirationem
in sinistro suo sinu, spiritum simili vi & qualitate
præditum gignit, & per arterias in omnes partes
distribuit in eum finem, ut illarum insitus calor
foveatur & conservetur, ac partes singulæ ad actio-
nes suas perficiendas aptæ & idoneæ reddantur.
Deinde ut flamma conclusa & aere non ventilata
marcescit, ita & calor noster natus, qui flammæ
instar continenter movetur, & depascit. Nam testis
Hippoc. lib. de natura pueri, calidum omne frigidum
moderato nutritur, fovetur & conservatur. Quare
pro ventilatione & conservatione caloris nativi
primum corde, deinde in omnibus partibus ne-
cessaria est frigidi spiratio, quæ in animalibus, quo-
rum calor ingenti veluti flamma exardescit, duplex
est, una manifesta, qua spiritus sive aer per os, aspe-
ramque arteriam intro forasque fertur, quæ respi-
ratio dicitur; altera insensibilis, qua aer per totum
cor-

corpus trahitur, & emittitur pulsu sive contractione, & dilatazione arteriarum, quæ *Διπνον*, Latinis perspiratio aut transpiratio appellatur; hæc ab inferiori facultate cordis primum promanat; illa cordi propriè quidam subservit, sed à virtute animali perficitur. Functiones vitalis facultatis tres Galenus enumerat, totidemque facultates unde promanant, quarum prima & præcipua est spirituum vitalium generatio, à facultate vitali propriè dicta Secunda priori tantum subservit pulsum effectio, à vi pulsifica cordis; tertia cæteras consequitur, nimirum affectuum concitatio à facultate irascibili. De generatione spirituum vitalium capite de Spiritibus dictum est. Pulsus autem & respirationis usus communis est, similique modo perficiuntur. Nam finis utriusque conservatio caloris nativi in sua temperie, & spirituum vitalium generatio. Deinde utraque functio ex motu dilatactionis & contractionis componitur cum intermedia quiete. Præterea ut motus illi perficiantur, tria requiruntur; facultas movens; instrumenta, quæ moventur, & usus facultatum incitans. Verum pulsus functio naturalis est, omnibus communis, quæ cor habent; respiratio potius animalis, aut partim animalis, partim naturalis illis tantum communis, quæ pulmonem habent, & quorum calor ingenti velut flamma exardescit. Definitur autem pulsus functio cordis & arteriarum, quæ cordi continuantur composita ex systole & diastole cum utriusque intermedia quiete, orta à facultate pulsifica cordis, spiritus vitalis generetur & distribuatur, & calor natus in sua temperie conservetur. Facultas autem illa pulsifica comprehendit sub se vim attractricem, quæ cor dilaturatur & impletur, dum per fibras rectas attrahit, deinde expultricem, quæ dum contrahitur per fibras transversas à se expellit; unde pulsus quoque

*Functiones
vitalis fa-
cultatis
tres.*

*Pulsus &
respiratio
in quibus
conveni-
ant & dif-
ferant.*

*Definitio
pulsus.*

X.

*Partes.
pulsus &
quomodo
perficiantur?*

*Perspiratio
Alga-
non quo
modo fit.*

*Ad pulsum
trahere-
quisia.*

*Differen-
tia pulsus*

componitur ex motu contractionis & dilatationis
sive ex systole & diastole cum utriusque intermedia
quiete, qualis inter contrarios motus intervenire
solet, primum cordis, deinde arteriarum, quæ cor
di continuantur. Per diastolen autem cor impletur
dum sanguinem ex vena cava in dextrum ventricu-
lum attrahit, & aerem ex pulmonibus per arteriam
venalem in sinistram sinum deducit, ut spiritus vi-
talis generetur, & calor natus eventiletur: per mo-
tum contractionis, sive systolen ex sinistro suo sinu
cor, per arteriam magnam spiritum elaboratum in
totum corpus transmittit, simulque fuliginosas ex-
spirationes, aeremque calidum ad pulmones per ar-
teriam venalem expellit. Similiter ipsæ arteriæ per
orificia, quæ in cute finiuntur motu illo dilatatio-
nis ex ambiente aere aliquid attrahunt, & vicissim
motu contractionis fuliginosa excrementa expel-
lunt, quæ actio *Alga- non* vocatur, & respirationi
correspondet, cujus ratione in animalibus totum
corpus (teste Galeno *lib. de su pulsum*) conflatile
& conspirabile redditur. Verum illa animalia hæc
solâ contenta sunt, quæ languidum & debilem ca-
lorem habent. Ad hos motus perficiendos tria, ut
diximus, requiruntur: Primum facultas pulsfica mo-
vens, quæ in corde primario residet, deinde instru-
menta, quæ moventur, nimirum primum cor, dein-
de arteriæ, quæ facultatis impetum sequuntur: non
enim cor dilatatur, quia repletur à sanguine & spi-
ritu (ut nonnulli Philosophorum arbitrati sunt) sed
repletur, quia à facultate insita dilatatur; tertium est
usus, & necessitas facultatem ad agendū impellens,
nimirum spirituum animalium generatio calorisque
nativi sua temperie conservatio. Igitur prout spiri-
tus augetur aut deficit, quem cor pulsu refarcire co-
natur, sive calor natus à sua temperie recedit, aut
à fuliginosis vaporibus & humoribus obruitur.

ta vis pulsifica incitatur, ac instrumenta movet, ac
 lo vario motu varias pulsuum differentias excitat,
 e quibus in doctrina signorum dicetur. Tertia vis
 cordis Platoni & Galeno est irascibilis propriè dicta,
 unde procedunt Pathemata non omnia (nam cupi-
 ditatū, quæ ex cibi potusque, & rei venereæ deside-
 rio concitantur, ut cupedia & libidinis, fons & fo-
 mes est jecur, sedes naturalis facultatis, cui inserviūt
 ventriculi & testes) sed quæ consistunt in vindictæ,
 laudis, & similium desiderio, ut ira gaudium &c. vel
 contra, in mali alicujus, ut infamiæ, indigentia &
 similium, aversione & fuga, ut metus, mœsticia &c.
 Ut enim in libidine testes afficiuntur, ira in ira, dum
 animus injuria offensus, ultionis desiderio, concita-
 tur, spiritus in corde commoventur, & ad exteriora
 effunduntur: contra in metu aversione mali instan-
 tis ad interiora refugiunt. Verum quia affectus isti à
 cognitione oriuntur, & principia sunt motus volun-
 tarii, de his capite de facultate motiva dicemus. Re-
 spiratio licet vi facultatis animalis ope musculorū
 perficiatur, tamen exquisitè animalis non est,
 sed partim etiam naturalis. Nam finis respirationis
 est gratia cordis, & initium aliquod motus ipsius
 est à corde & facultate quadam aeris attractrice &
 expultrice in pulmone, qui proximum instrumen-
 tum respirationis est, in quo perficitur aeris suscep-
 tio & emissio. Pulmo autem sua natura licet prædi-
 tus sit facultate aliqua aeris attractrice & expultri-
 ce, tamen per se hunc motum absolvere non va-
 let, sed ad motum tantum thoracis. Nam dum
 pulmo, qui cordi copulatur, urgentem necessita-
 tem in corde præsentit, statim ipsius attractrix ex-
 citatur, ut aerem frigidum attrahat, deinde
 expultrix, ut fuliginosa excrementa expellat, non
 aliter ferè, quam in tussis generatione, sed
 cum hos motus perficere nequeat, facultas ani-

*Vis irasci-
bilis.*

R. spiratio.

*Definitio
respirati-
onis.*

*Partes re-
spirationis*

*Triare-
quisita in
respirati-
one.*

*Instrumen-
ta respira-
tionis tri-
plicita.*

malis incitata per musculos thoracem mover, & cum thorace pulmonem follium instar, qui dum una cum thorace dilatatur aërem inspirando attrahit, dum contrahitur expirando emittit. Quare definiti poterit respiratio, functio partim animalis, partim naturalis ex inspiratione & expiratione composita cum intermedia quiete, in qua pulmones à thorace dilatati aerem per os attrahunt, rursusque cum eodem contracti fuliginosos vapores excludunt gratia conservationis caloris nativi in corde & generationis spirituum vitalium. Componitur enim respiratio ut pulsus ex duplici contrario motu expiratione scilicet & inspiratione cum intermedia quiete Inspiratio autem oritur dum dilatato thorace, pulmo ut vacuo succedat, una dilatatur, extrinsecus per os nares laringe aerem attrahens: Exspiratio vero dum depresso thorace pulmo una contrahitur, aerem calidum, ac fuliginosos vapores per easdem vias excludens. Hi duo motus perpetua vicissitudine continuantur, quamdiu homo vivit. Ex quibus apparet, ad respirationem tria concurrere, quorum primum vis animalis est per musculos thoracem moventes, deinde instrumenta, quæ moventur, tertio usus & necessitas facultatem ad movendum impellens. Instrumenta autem respirationis triplicia sunt, alia spiritum tantum vehunt, ut os, nares, aspera arteria, alia suscipiunt pulmones, cætera movent, ut thorax & muscoli thoracem moventes, qui non semper eodem modo concurrunt ad respirationem. Nam respiratio duplex est; una libera; alia coacta & violenta. Pro libera respiratione perficienda sufficit septum transversum, cum quo concurrunt muscoli abdominis, qui expirationi potissimum servant: ad coactam, qui cum vehementia fit præter septum transversum requiruntur muscoli omnes inter-

intercostales, ac urgente necessitate tandem muscu-
li in simis scapularum.

CAPUT XI.

*De Animalī Facultate & Sensitiva
in genere.*

TRes esse primas animæ humanæ facultates,
quibus juxta medicos totum animal regitur,
& singulas sedes disjunctas habere, à quibus
mediante spiritu vires in totum corpus distribuun-
tur in capitibus de anima & spiritibus demonstra-
tum est. Cum autem de facultate naturali & vitali,
omnibusque requisitis ad earum cognitionem supe-
rius dictum sit: restat nunc, ut de facultate ani-
mali agamus, qua animal constituitur, & à cæteris
viventibus distinguitur. Sub facultate animali me-
dici non solum sentientem & moventem compre-
hendunt, quæ communes homini cum brutis, sed
etiam intellectivam, quæ homini propria est:
nam intellectus in homine cum sine imaginatione
functiones suas exercere nequeat, & circa phan-
tasmata sensum occupata sit, nullumque pro-
prium organum habeat, sed ibi subsistere intel-
ligatur, ubi imaginatio: proinde Galenus faculta-
tem sensitivam cum intellectiva conjungit, & se-
dem totius animalis facultatis in cerebro consti-
tuit. Nam cerebrum teste Galeno 3. *de Plac.* duplex
munus obtinet, ac duplici modo agit: uno per se
quatenus organum est principum facultatum, & a-
nimalem spiritum gignit: alio in relatione ad ali-
ud, quatenus instrumento spiritus animalis vis sen-
sus & motus per nervos cæteris partibus dispensa-
tur.

*Definitio
facultatis
animalis.*

*Communiss.
functio a
nimalis fa-
cultatis.*

Obiectum

tur & communicatur; atque hæ actiones priorum respectu subservientes dicuntur.

Quare facultas animalis secundum medicos est vis animæ residens primum in cerebro, quæ ab objecto ad agendum excitata mediante spiritu animalique in cerebri ventriculis generatur, & per nervos in organa sensus & motus distribuitur, functiones principis facultatis, sensuum exteriorum, & motus voluntarii perficit gratia vitæ melioris, nimirum ut res objectas cognoscamus, quæ bona videntur, persequamur & mala fugiamus. Sub functionibus principis facultatis comprehendit. Galen non solum functiones sensus interioris quæ ab Aristot. & Philosophis brutis attribuuntur, sed etiam mentis: cum tamen functiones mentis non sint animalibus communes, sed soli homini propriæ. Deinde mens per se corporis organo non utitur, sed phantasie adjunctæ muneris sui functionem præstat, ut in capite de intellectiva facultate dicitur. Quare proprium domicilium non habet, sed à medicis ibi domicilium ejus statuitur, ubi sensus interioris. Functio autem facultatis animalis nulla videtur communior, quam cognitio, concitatio nimirum facultatis animalis in cerebro & propriè perceptio, aut judicatio rerum externarum per suas species. Nam sensitiva facultas primum per species externarum rerum repræsentatas, in instrumentis sensuum exteriorum, deinde in cerebro functiones suas exercit, & vis intellectiva ex phantasmatibus illis notiones colligit, & per easdem species sub ratione boni vel mali, jucundi vel tristici, animal cum appetitu ad movendum insurgit. Nam sensus externi internos movent, & interni mentem, unde cognitionis nostræ principium constituunt sensus externi, interni medium, mens deinceps finem imponit. Id autem, quod vim animale ad agendum excitat, est obiectum, sive cognoscibile, & ut facultas ani-

animalis triplex est sensitiva, intellectiva, appetitiva
vel loco motiva: ita objecta tria erunt αἰσθητὴν, νοη-
τὸν & ἐπιθυμητὸν, ut alibi latius dicemus.

Domicilium fons & origo facultatis animalis est
cerebrum secundum substantiam, cui ceterae partes
inserviunt. Collocatum autem est cerebrum in su-
periora diguissimaque parte corporis formae cavitatis
calvariae, quam occupat, planè referens; in superfi-
cie, quae multos gyros & anfractus obtinet. Deinde
ab externis injuriis undique circumscriptum est osseo
tegumento, calvaria, variisque membranis: Nam ce-
rebrum obvelant & distinguunt membranae, quarum
quae cerebro proximè adhaerescit, & in omnes illius
exteriōres revolutiones se implicat, tenuis Meninx
vocalur, exterior verò crassa meninx; haec calvariam
succingit, fibraeque per suturas ejus emittit. quae cal-
variae involucrum cuti capitis subiectum, quod Peri-
cranium appellatur, constituunt. Deinde qua dupli-
catur, cerebrum dividit, primum in partem anteriorem,
quae totius nomen retinet, & posteriorem decup o-
ferè priore minorem, quod cerebellum nominatur;
ac utranque vicissim in partem dextram & sinistram.
Cerebrum 4. ventriculis donatum est, quorum duo
anteriores unus in dextra, alter in sinistra parte am-
plissimi sunt, formamque lunae falcatae referunt, ac su-
periori sede tenui quadam substantiae portione,
quam septum appellant, distinguuntur: hi duo utrin-
que secundum longitudinem cerebri ab anteriore
parte ad mediam usque procedunt; Deinde paululū
reflexi ad imam sedem detorquentur, ubi ab invicē
septo non distinguuntur, sed sub corpore camerato
fornicis instat, in communem sinum coeunt, qui
medius aut tertius ventriculus vocalur; ac etiam uno
in signi meatu recta deorsum per substantiam cerebri
feruntur, in pelvim ex tenui membrana instar infun-
dibuli exstructam, quā pituita à cerebro descendens
glandi

Sedes fa-
cultatis a-
nimalis.

Partes na-
pitae con-
tinentes.

Partes ce-
rebrum.

Ventricu-
li cerebri.

Duo an-
teriores
ventricu-
li.

Medius
ventricu-
lus.

*Quartus
ventricu-
lus.**Plexus
choroides.**Generatio
spirituum
animalium.**Spinalis
medulla.**Nervorum
structura.**Paria ner-
vorum ce-
rebrum.*

glandi pituitariae & ossi caniformi instillatur, & hinc per foramina ad nares & palatum defluit. Medius autem ventriculus per cerebri corpora natibus & testibus non absimilia, propè glandulam, quā *cardio* appellant, in quartum sinum omnium minimum contendit, qui communis est cerebello & initio spinalis medullae, ubi processus vermiformis conspicitur. In cavitate duorum anteriorum ventriculorum plexus est arteriarum & venarum extimo foetus involucri similis ex ramis carotidarum conscendentibus suffultis conario & testibus. In hoc plexu spiritus vitalis primum præparatur, deinde in ventriculis cum aere per nares attracto permiscetur, & insita cerebri proprietate in spiritum animale transmutatur; quod cerebrum partium utitur ad proprias functiones perficiendas, partim transmittit per nervos, qui à base cerebri & spinali medulla exoriuntur ad organa spiritui animali indigentia. Nam nervi duplices sunt, alii procedunt à base cerebri; alii à spinali medulla. Spinalis autem medulla cerebro continuatur, cerebrique naturam imitatur, unde cerebrum oblongum cerebri appendix & pars vicaria à nonnullis vocatur. Constat enim ut ipsum cerebrum substantia medullari, Deinde duplici membrana à pia & dura matre: Eodem modo ipsi quoque nervi naturam principii sui referunt, & ex iisdem partibus componuntur; ac per paria à base cerebri & spinali medulla oriuntur. Verum qui à cerebro molliores, & ad sensum aptiores sunt, qui à spinali medulla, duriores, & ad validos motus magis idonei. Paria autem nervorum, quæ à base cerebri oriuntur, sunt septem, quorum primum in oculos derivatur nervi optici; secundum in musculos oculorum; tertium in linguae superficiem; quartum in palatum; quintum in organa auditus; sexti paris nervi multiplici ramorum serie ad viscera in medio imoque ventre distri-

istribuntur, qui ubi aliquantulum in spatium
 thoracis proceſſerunt, ramulos retorquent ad la-
 ngis musculos, qui recurrentes ob id vocantur;
 optimi paris nervi in linguæ & laringis musculos
 otiffimum diſſeminantur. A ſpinali medulla per
 erthebras in cæteras corporis partes triginta con-
 gationes nervorum procedunt, nimirum ſeptem
 ervicis, duodecim thoracis, quinque lumborum
 ex offis ſacri: qui diſtributi in musculos motui vo-
 untario ſerviunt, in cutem ſenſum tactus commu-
 icant. Nam authore Galeno *ſ. de Uſu part* in di-
 ributione nervorum, ipſi naturæ tres ſcopi extite-
 unt; primus quidem ut ſenſoriis organis ſenſum;
 einde ut motoriis motum impertiret; tertio, ut
 mnibus aliis facultatem daret, quâ ſibi infeſta di-
 noſcerent. Accommodat enim natura interioribus
 erebri motionibus exteriora quædam ſubſervientia
 rgana, quibus facultas interior mediantibus ner-
 is ſe adiungit, ipſaque viciffim organa, pro varia
 ua conſtitutione, varias functiones & ſervitia præ-
 bent, & aut id exequuntur, quod interior facultas
 equirit, aut ejus internuncii ſolum ſunt. Exequun-
 ur autem instrumenta motus, muscoli & articuli,
 internuncii verò ſunt quinque ſenſus exteriores. De
 ingulis in ſpecie agemus, & nunc de facultate
 enſitiva primum in genere, deinde in ſpecie de ſen-
 ſibus exterioribus, & ſenſu communi, ſive primo
 ecundum medicos. In ſequenti verò capite de cæ-
 teris functionibus animalibus.

Senſitiva facultas animal propriè conſtituit, *De facultate ſenſitiva.*
 & omnibus animalibus ſtatim ab ortu ineſt, licet
 pſius actus non omnibus neque ſemper ineſt: ſed
 tum demum, quando ab objecto excitatur, quo no-
 mine à vegetativa facultate diſtinguitur; nam facul-
 tas hæc ſe habet ut intellectiva & habitus ſcintillæ.
 Verum ut intellectiva ſine instrumento corporeo
 non

*Paria ner-
 vorum ſpi-
 nalis me-
 dulla.*

**Definitio
sensitiva
facultatis**

non operatur, nec ut habitus scientiæ quandocumque lubet in actum deducitur, sed tunc demum quando ab objecto excitatur, & quod potentia sensitiva est, actu efficitur. Proinde sensitiva facultas definiiri poterit, vis animæ residens primum in cerebro, deinde mediantibus nervis in organis quinque sensuum exteriorum à natura in eum usum constructis, ut externarum rerum per medium delatarum cognitionem percipere queamus.

**Munus
facultatis
sensitivæ.
Sensatio 4
requirit.**

Cognitio igitur illa proprium munus facultatis sensitivæ est, & αἰσθητικὴν sive sensatio dicitur, quæ quatuorque requirit. 1. αἰσθητικὸν vim sentiendi, quaretenus est λόγος & potentia organum informans αἰσθητικὸς sensus scilicet vocatur. 2. αἰσθητικόν, organum bene dispositum, in quo subsistit illa vis, & per quod fit sensatio. 3. αἰσθητὸν sensibile, obiectum scilicet sive res externa quæ sentitur, & ipsum sensum in actum deducit. 4. Intermedium inter sensibile, & organum, propriè in sensibus externis.

**Facultas
sensitiva
et instru-
mentum
sensitivum
duplex.**

Vis sentiendi ut ex dictis constat ab anima promanat, & à cerebro primariò recipitur, ubi velut in propria sede & domicilio subsistit, à quo beneficio spiritus animalis, per nervos delati, aliis partibus, vim sensus & motus impertit. Quare αἰσθητικόν commune erit cerebrum, particularia verò quinque sunt, ut infra apparebit.

Sensibile.

Res externæ quæ sentiuntur, quia corporeæ sunt, naturam habentes à cognitione remotam, per se à facultate cognoscendi nequeunt, sed per species & imagines suas, quibus in ipso sensus instrumento, quæ extra sunt objecta representantur & recipiuntur, atque ita à facultate sentiendi judicantur.

**Sensatio
quomodo
fiat?**

Nam in sensatione duo sunt: primò representatio, qua species oblata in sensu recipitur & retinetur, deinde rei perceptio sive speciei illius judicatio.

Receptio autem fit perpeffione aliqua organi sensitivi à specie rei objectæ. Perceptio sive diffinitionis speciei fit in cerebro primo sensorio, licet parte instrumentaria initium habeat, unde Hippocr. qui parre aliqua dolent, & dolorum non sentiunt, iis mens sive sensus interior & cerebrum laborat. Deferuntur autem species sive imagines ad organa sensuum exteriorum per medium, & ut sensatio rirè fiat, quilibet sensus suum peculiare habet medium, externum aut internum, quo ad organum sensitivum imagines deferuntur, ut in specie infra dicemus. Sensatio autem receptione & perpeffione aliqua organi sensitivi ab objecto fit, quæ quidem perpeffio ejusmodi non est, ut contrarium habitum tollat, sed ut facultatem in organo perficiat; nam facultas sentiendi ab objecto in actum semper deduci debet alioquin potentia solum sensus erit.

*Differen-
tia sensi-
bilium.*

Sensibilia sive objecta quæ sentiuntur, unius generis non sunt, nam alia per se sensibilia sunt, alia per accidens. Per se sensibilia sunt, quæ nullo alio sensili interveniente percipiuntur: Horum alia propria uni sensui sunt, quæ uno solo sensu comprehenduntur, & in quibus percipiendis sensum aptè dispositum ad suum objectum errare non contingit: qualia quinque sunt, color, sonus, odor, sapor, & tactiles qualitates. Alia communia sensilia dicuntur, quæ non uno solum sensu, sed aut pluribus, aut omnibus percipiuntur, & circa quæ sentientem errare contingit. Ejusmodi sunt quinque quoque: Motus, quies, numerus, magnitudo, figura. Per accidens sensilia sunt quæ interveniente aliquo per se sensili, sentiuntur, & ut cognoscantur interiori aliqua facultate, sensu nimirum communi, indigent, ubi recipiuntur & determinantur objecta exteriorum sensuum. Nam sensus

K

dua.

XII.

Sensus duplex, interior communis.

Et exteriores quique.

Requisita in sensibus exterioribus.

duplices sunt philosophis: Interiores & exteriores. Interiores causa exteriorum sunt, & resident in cerebro, ubi etiam finiuntur externi sensus, ut alii dicemus. Sensus autem exteriores internuncii interiorum tot sunt, quod propria objecta, quibus designantur, nimirum quinque: Visus, auditus, olfactus, gustus, tactus.

Nam ab objectis sensus exteriores in actum deducuntur siue sentiunt, & ut perfectè sentiantur quatuor illa supra dicta requiruntur. Præterea omnibus sensibus hæc communia sunt. Primò, ut objectum speciem sine materia percipiant: Deindè, ut sensatio non emissione, sed receptione speciei solum fiat. Tertiò, cum sensus potentia & λόγος sit, sensorium informans, & ad sentiendum aptum reddens, ut inter sensibile & sensum proportio quædam sit. Nam excellens objectum, quod vehementius organum sensitivum movet, quam sensus ratio patitur, ipsum organum corrumpit, aut depravatam sensationem, siue dolorem in sensu efficit. His præmissis de singulis sensibus exterioribus ordine agemus.

CAP. XII.

De Sensibus Exterioribus.

De sensu visus.

Quid visus & visio.

Organum visus.

Perfectissimus sensuum est visus, vis animi resident primò in crystallino oculi, qua species rerum visibilium, nimirum coloris & lucis delatarum per medium diaphanum percipimus, in eum finem, ut varias rerum differentias cognoscamus. Igitur eius propria functio, nimirum visio aut inspectio, erit cognitio rerum visibiliū delatarū per mediū diaphanum ad crystallinū. Instrumentū autē adæquatū visus

est oculus, qui à cerebro facultatem per nervos opticos suscipit: pars instrumentaria humor crystallinus oculi, natura sua pellucidus, aptus ad colorem & lucem recipiendum, cui inserviunt ceterae partes: primò duo humores, aqueus ab anteriore parte crystallini situs, vitreus à posteriore parte; Deinde tunicae sive membranae sex, quarum tres praecipuae sunt, prima extremaque est adnata, orta à Pericranio; secundo cornea à dura meninge; tertia uvea à tenui meninge; in cujus anteriori parte est iridis foramen & pupillae initium, ceterae tres membranae humores continent & distinguunt. Præterea sex musculi oculum moventes, quatuor in rectum, duo in obliquum, quibus inseritur nervus secundi paris; tandem quæ oculos ab externis injuriis defendunt, ut palpebrae, cilia, supercilia &c.

Medium per quod fit visio est perspicuum sive diaphanon, quale est aer, aqua, cælum, vitrum & similia, quæ omnia communi nomine diaphane dicuntur, quia à lumine illustrari possunt. Verum corpora, quæ lumen recipiunt, & species triplicia sunt: alia purè proprieque diaphana, quæ species & lumen transmittunt Alia proprie emphana, ut specula, quæ recipiunt & non transmittunt. Alia partim diaphana, partim emphana, quæ species aliquatenus transmittunt, refrangunt. Objectum visus, est quicquid cerni potest. Cernitur autem color & lux, & quod colore & lumine non penitus vacat, qualia sunt, quæ in tenebris suo fulgore micant; sed interdum obscurantur. Color autem, ut objectum visus est, proptiè in extremitate corporis opaci est, & sine lumine non cernitur, sed in perspicuo actu lumine illustrato, per quod ad oculos defertur. Est enim lumen actus perspicui, quatenus perspicuum, proveniens à primo actu lucis: Et perspicuum vicissim est, quot vicissitudini luminis & tenebrarum obnoxium est. Lux verò

*Medium**Objectum*

CAP.
XII.

actu primò celestibus corporibus, igni & similibus inest, cujus in perspicuo præsentia lumen dicitur, absentia verò tenebræ. Illuminatio verò per lucide, & coloris perceptio in momento fit, speciei objecti in oculos recepta. Quare lumen media fortitur naturam inter qualitates purè materiales quales sunt sapes, & purè spirituales, ut sunt imaginæ colorum repræsentatæ in diaphano.

De coloribus.

Lumen in diaphano per se visibile non est, sed ratione terminationis in superficie corporis definiti, quæ nihil aliud videtur, quàm color. Verùm coloris nomen interdum latè sumitur, interdum propriè; communiter enim omnia colorata vocantur quæcunque aspectabilia. Sic diaphana licet interminata, & potissimum quæ variant speciem, colorata aliquando dicuntur, & multi colores oculis apparent, qui revera in superficie corporis definiti non sunt, sed ex refractione radiorum solis, aut luminis oriuntur, quales sunt colores iridis, & similia apparentium in cælo, colores oculorum, maris &c. Propriè verò & reipsa color est in corpore definito, & ita ad corpus definitum quodammodo se habet, ut lumen ad diaphanum. Nam lumen quasi color diaphani est, & color quasi lux aut fulgur per medium actu perspicuum ad oculos collustrans. Verùm color non est qualitas ut cæteræ mixtorum, quæ immediatè oriuntur ex temperamento quatuor primarum qualitatum, sed proximè ex commistione lucidi sive diaphani & opaci, habens per se actum sed incompletum, & ab externo lumine perficiendum, ut actu conspici queat. Quare color erit qualitas visibilis in superficie corporis definiti, qua ab actu pellucido tangitur orta ex commistione lucis & opaci.

Differentiæ colorum.

Differentiæ autem colorum ex proportionemixtionis opaci & lucidi oriuntur & extremi duo sunt,

nt, albus, qui habitui comparatur, in quo lucis purimum, unde visum disgregat, & niger, qui priationis lucis aut tenebrarum rationem habet, quia eo prævalet opacum, cujus ratione visum vehementer congregat. Intermedii colores plurimi sunt, & quinque præcipui, quorum rubens medius propemodum videtur ex æquali ferè portione lucis & opaci: cæteri à medio ad alterum extremum nonnihil declinant, & ad album flavus, ad nigrum ceruleus, viridis & purpureus. Cum autem in omni sensatione non solum requiratur passio & representatio, sed etiam perceptio, sive rei dijudicatio; in visione quatuor potissimum considerata eunt. 1. An fiat receptio. 2. si receptio alicujus rei, quid illud sit quod recipitur. 3. quomodo recipitur, id est, ubi & quando. Tandem post receptionem, qua ratione species recepta percipiatur & dijudicetur. De modo visionis triplex est opinio, una Platonis & optidorum, fieri emissionem alicujus ab oculo ad rem visibilem pertingentis, ut radiorum luminis &c. altera Aristotelis, nuda receptione speciei in oculum. Tertia Galeni, lib. 6. de Placit. c. 6. & 7. & alibi, partim receptione, partim emissionem fieri. Statuit enim Galeus ad visionem quatuor concurrere. 1. emissionem spiritus sive radii ad obiectum. 2. lumen externum. 3. conjunctionem luminis externi cum interno oculi, ut suscipiat visibile, nam arbitratur, aërem illuminatum fieri cognatum instrumentum oculi, si supervenerit lex in spiritu animali, à spiritu autem partim exeunte, partim contento radium defluere, qui illustrat aërem ambientem, sed aeri non commisceatur, unde concludit, aerem ambientem tale instrumentum fieri quo tempore videmus, quale in corpore est perpetuo nervus. Dicitur autem lux in spiritu ad differentiam radii & luminis, quæ passiones sunt corporis lucidi,

*De modo
visionis.*

K 3

nam

nam lux propriè est in corpore lucido, radius
hoc emittitur, lumen in diaphano consideratur.
Verùm qua ratione porrigatur visus, ut suscipiat
visibile non demonstratur à Galeno, tantum vult a
rem illustratum utroque lumine, quasi partem oculi
li esse, & in aere ita continuatam speciem recipi
oculum. Quare subjungit, aerem ab oculo ita pro
cedere, ut nervus ab oculo, & simul laudat Aristote
lem dicentem, species visibiles ad oculum defluere.
Hoc modo videtur Galeno Aristoteles cum Platon
nicis conciliari, verùm nos rationibus edocti cum
Aristotele credimus, ab oculo ad rem visibilem ni
hilemitti, quod visioni inserviat, non lumen aut ra
dium, aut aliud quidquam, sed sola receptione spe
ciei visionem fieri. Nam aer & oculus diaphana sunt
& naturaliter lumen recipiunt, & à lumine moven
tur, color autem aut lux non sine lumine. Ergò ubi
præfens fuerit color ipsi oculo, oculum movebit. Iden
autem quod recipitur movens oculum, est species
aut imago recepta, primùm in medio actu diapha
no ob præsentiam corporis luminosi, deinde in o
culo ubi repræsentatur, id est, dum recipitur, refre
ctitur & retinetur, unde præfente corpore colorato
& lumine, sine diaphani mutatione statim species
recipitur & repræsentatur. De loco autem ubi reci
pitur non consentiunt authores, nec sibi ipsi Galen.
Nam 10. *de usu part. c. 1.* ponitur crystallinus humor,
quoniam caloribus alteratur, quæ alteratio ad cere
brum usque pertingit. Verùm 11. *de usu part. c. 14.* ar
bitratur speciem recipi in iactuatione nervorum
opticorum, & hanc causam esse cur duobus oculis
una species videatur. Aliqui in aranea tunica istam
receptionem fieri volunt; Averrhoes in aranea &
crystallino. Verùm cum in repræsentatione tria
sint, receptio, refraction, & retentio, & triplicia illa
corpora in oculo, quæ speciem recipiunt, erit re
ceptio

receptio speciei in crystallino, retentio in aranea, quæ
 quasi superficies crystallini est, refractione in tunicis
 est crystallinum, unde per spiritum animale ad
 nervos opticos & cerebrum deducitur. In qua com-
 motione facultatis oculi & spirituum in cerebro fit
 receptio, sive speciei dijudicatio, in cruciacione ner-
 vorum opticorum, & in cerebro primo sensorio; atq;
 hoc modo perficitur visio.

Secundo, auditus est sensus, quo sonos per me-
 dium extrinsecum ad aures delatos percipimus, &
 auditio, cognitio sonorum delatorum per medium
 extrinsecum ad auditorios meatus, facta à facultate
 audiendi, dum aer congenitus in auribus ab exter-
 na aere membranas feriente, tria; officula impellē-
 tur, & commotus, sonorum species recipit, & ad audi-
 torios nervos, & hinc ad cerebrum transmittit. Ut
 in visione, ita in auditione tria requiruntur, obje-
 ctum, subjectum & medium. Obiectum est sonus
 qualitas aeris refracti ex collisione corporum duro-
 rum, solidorumque, continua successione ad aures
 delati. Corpora sonum vehementissimum excitant
 sunt solida dura; : excitant autem sonum, quan-
 do invicem collisa aerem intermedium verberant,
 ut quia aer cum impetu ad solida illa corpora col-
 liditur & verberatur : aer verò verberatus impul-
 siones ad undarum speciem patitur. Ut enim si in
 aquam lapidem injeceris, circuli oriuntur, quorum
 unus alterum excitat; ita in sono ex aeris percussio-
 ne quasi circulus in aere generatur, qui continua
 successione ad aures defertur, unde sonus unda vo-
 calis ab Avicenna vocatur. Sonus autem iste, dum
 hoc modo per medium fertur, si in solidum semel
 atque iterum impegit, & ultro citroq; commeave-
 rit aut resilierit, toties sonum illum ingeminabit,
 quæ geminatio Echo propriè appellatur. Sonorum
 autem prætipuæ differentia sumuntur à modo,

De auditu

Obiectum
auditus so-
ni.

*De voce
& loque-
la.*

*Instrumentum
voci.*

*Instrumentum
lo-
quela.*

*Lingua co-
positio &
us.*

quo auditu afficiunt, unde sonus omnis est magnus
aut parvus; gravis aut acutus; asper aut lenis, &
Peculiariter sonus, qui de instrumentis respiratio-
nis attollitur, vox appellatur; & vox articulata ex
instituto aliquid significans, sermo sive loquela.
Nam materia vocis est aer sive spiritus, quem ex pul-
mone per asperam arteriam, & os emittimus non
simplici expiratione, quando sensim spiritus effertur
motu diaphragmatis; nec per simplicem exuffla-
tionem, quando affatim foris effertur per actionem
musculorum intercostalium, neque per solam exuffla-
tionem strepentem motu musculorum in fauci-
bus, sed peculiariter motu musculorum, laryngem
claudentium & aperientium, quo spiritus affatim
erumpens ad caput asperæ arteriæ variè colliditur
& verberatur: Nam quinque sunt, quæ sese mutuè
consequuntur, exspiratio simplex exufflatio, strepens
exufflatio, vox & loquela. Instrumentum igitur vo-
cis erit larynx, sive caput asperæ arteriæ ex cartila-
ginibus compositum, quæ aeri facile resistunt, cum-
quæ reverberant, præcipuè verò epiglottis, quæ ri-
mæ laringis incumbit, quia impetum aeris erum-
pentis moderatur, dum per musculos laryngem
claudentes & aperientes via nunc latior, nunc an-
gustior redditur; in quos musculos nervi recurren-
tes distribuuntur, qui facultatem à cerebro com-
municant. Proximum instrumentum loquelæ sive
sermonis, est lingua, quæ vocem moderatur, & ar-
ticulatim distinguit, cui muneri serviunt quoque
palatum, dentes, nares, gurgulio & labia. Natura
autem linguam in varios usus construxit; Nam
proprium est tam gustatus, quam vocis articulatæ,
sive sermonis organum; præterea masticationi & de-
glutioni ciborum inservit: componitur enim ex
carne molli, rara, spongiosa, membrana tenuissima
recta, quæ palato & oris communis est, per quam

seminantur nervi tertii & quarti paris, quibus sa-
 orum discrimina dignoscuntur: Deinde musculos
 ovem habet, qui nervos à septimo pari suscipiunt,
 uorum beneficio lingua in omnem partem move-
 tur, & ob varios motus vocem articulatim distin-
 guit, ac etiam dum dentes cibum atterunt, ab uno
 atere in aliud volvit, & ad gulam tandem detrudit.
 Ex quibus apparet, aliam coloris quam soni ratio-
 nem esse, nam color subiectivè est in corporibus co-
 loratis, & in medio tantum repræsentativè sive spe-
 cies & imago tantum coloris: At sonus non est
 subiectivè in corporibus illis sonoris, sed propriè in
 medio scilicet in aere vel in aqua, atque eodem mo-
 do recipitur species ipsius, quæ defertur ad aures, ut
 fiat auditus.

Medium.

Ad instrumentum auditus quod attinet, duæ
 sunt, aures, ut oculi in homine, ob sensus necessita-
 tem & dignitatem, ex diversis partibus, quarum
 aliæ externæ sunt, ut auriculæ, quæ irruentis aeris
 sonum excipiunt, aliæ internæ in osse petroso, ubi
 antri modo excavatur, quæ quatuor sinibus constat,
 quorum primus semper patet foris obvius, & à se-
 cundo membranâ separatur, ortâ à dura meninge,
 quæ tympanum dicitur. In secundo sinu, qui pel-
 vis dicitur, continetur aer congenitus, in quo re-
 præsentantur soni. Deinde tria ossicula pulsationi
 inservientia, Malleus, Incus, Stapes, quæ tympano
 implicantur chordæ beneficio, unâ cum exiguis
 musculis. Hinc sequitur tertius meatus, labyrinthus
 dictus, ne soni repræsentati dissipentur, ac tandem
 ultimus extremæ cochleæ instar, intima auris pars,
 ubi nervus auditorius dilatatur, qui sonos ad cere-
 brum defert. Hanc extremitatem auris ubi dilata-
 tur nervus, Galenus statuit partem instrumentariam
 sive primarium organum auditus, Aristoteles au-
 tem aerem illum congenitum in secunda cavitate.

*Organum
auditus.*

K s

Ve-

Verum cum in auditione, sicut in visione duo sint. 1. specierum receptio, 2. dijudicatio, ut in oculis, ita in auribus pars primaria erit in qua species recipitur & repræsentatur, nimirum aer congenitus. Nam in auditione, dum aer externus soni qualitate imbutus per meatum foris obvium membranae alliditur, membrana percussa tria ossicula impellit, & similem soni speciem, aëri congenito imprimit. Deinde ad interiorum meatum species deferitur, & nervum auditorium, & tandem ad cerebrum ubi dijudicatur.

De olfactu.

Quid olfactus?

Tertiò, olfactus est sensus odores, per medium externum, ad suum instrumentum delatos percipiens. Et odoratio est cognitio eorum in rebus existentium per medium extrinsecum facta à facultate odorandi, in ea cerebri parte, quæ ad nasi summa pertingit.

Obiectum odor.

Obiectum olfactus propriè non est corpus, ut Avicenna aliquè voluerunt, nec exhalatio fumosa, licet cum exhalatione aliqua à corporibus odoratis specie per medium ad olfactum deferatur, sed qualitas realis in corporibus odoratis, ex sicco concocto per vim caloris in humido, sive affectio siccæ sapidi in humido. Hæc qualitas per quandam quasi resolutionem aëri aut aquæ communicata, ad organum olfactus deferitur, & quia est affectio quædam siccitatis in humido, proinde nominibus saporum, odorum differentiarum plerumque exprimuntur, (licet odor sit rei siccæ, sapor verò humidæ) cum hic sensus in homine sit obtusissimus, & nihil propriè olfaciat, sine sensu voluptatis & doloris.

Medium.

Medium autem per quod deferitur species in iis, quæ respirant, est aer, in piscibus aqua, quare instrumentum in omnibus eodem modo se non habet. Nam in piscibus extra prominet, in iis qui attracto spiritu olfaciunt, intra nares subsistit, nimirum ut opinatur

Gal.

Sal. duo processus nervo non absimiles, qui ab interioribus cerebri ventriculis mammillarum ritu extulerant, quanquam ad alterandum aerem, & recipiendam speciem conferat non tantum os spongiosum, sed etiam imprimis anfractus nasi interiores, qui membrana exquisiti sensus investuntur, & vapores continent maximè idoneos ad odores suscipiendos. Hires jam dicti Sensus per medium externum res obiectas cōprehendunt, ac obiecti species sine materia medium afficiunt: Verum in gustu & tactu secus evenit: nā gustus quemadmodū & tactus sine medio externo sentit, nam sapor propriè obiectum gustus linguam non afficit, nec gustum movet, nisi in humido sit, aut cum humido permisceatur, unde lingua arida saporē non rectè percipit. Quare gustus erit sensus, quo saporē mediante humido interno, instrumento linguæ & cæterarū partium oris percipimus: & gustatio ejus functio, est cognitio saporum per facultatem gustandi, instrumento linguæ, & cæterarum partium oris, ut nutrimenta utilia ab inutilibus discernamus.

Instrumentum autem præcipuum gustus est lingua, beneficio nervi à tertio pari, deinde cæteræ oris partes, ut palatū, labia, fauces, quæ à quarto pari nervos suscipiunt, unde hic sensus nutritionis gratia animalibus potissimum tributus est. Nam in nutrimento tria sunt, humor vehiculū nutrimenti, deinde siccum, quod nutrit, tertio sapor condimentum, qualitas scilicet orta ex sicco terreo diluto aqueo humore, quæ gustum in actum perducit.

Saporum species Aristoteles septem enumerat, quorum duo extremi ab eo dicuntur, dulcis scilicet, qui gustum jucundè afficit, & amarus, qui molestiam excitat, unde dulcis sapor naturæ familiaris est, & quicquid nutrit, ex genere dulcium putatur, quod latè patet, contra ratio est amari. Reliqui saporē quinque intermediū nuncupantur, nimirum sal-

*De gustu.**Quid gustus?**Organum gustus.**Obiectum**Sapor quid?**Differentia saporum.*

CAP.
XII.

falsus, acris, austerus, acidus, acerbus. Verum Platonis extremi saporis sunt austerus, qui linguam maximè contrahit, & amarus, qui maximè abstergit. Addunt his medici saporem pinguem, qui sub dulci plerumque continetur, & nonnulli (propter differentias medicamentorum) insipidum, qui sapor non est, sed sapido opponitur. Oriuntur hi saporis in mixtione, per actionem primarum qualitatum, pro varia materiae dispositione; proinde à medicis secundum qualitatis & materiae modum distinguuntur, ut latius dicemus in capite de Facult. medicament.

De tactu.

Tandem omnium sensuum externorum communissimus est tactus, omni animali communis facultas, nimirum animæ per totum corpus diffusa qua tactilium qualitatum cognitionem, instrumento ex nervis contexto percipimus, ut rerum temperamenta & similia, ex similibus discernamus. Obiectum hujus facultatis sunt tactiles qualitates, quæ non una contrarietate continentur, sed pluribus; quarum aliæ primæ sunt, ut caliditas & frigiditas, humiditas & siccitas; aliæ secundæ ex primis ortæ, nimirum durities & mollities, asperitas, levitas, crassities, tenuitas &c. de quibus agemus in capite de Facult. medicamentorum.

Organum
tactum.

Deinde tactus, ut cæteri sensus, in una sola parte non residet, sed per totum corpus diffunditur, cujus *αισθητικόν* constituunt nervi à cerebro & spinali medulla in omnes partes dispersi, peculiariter in membranas: cutis autem membranæ annumerari poterit externi tactus præcipuum organum, cujus adminiculo accuratè & distinctè qualitates tactiles percipimus. Medium, per quod exactè sentimus qualitates tactiles est connatum ipsi cuti, nimirum cuticula, & licèt ablata cuticula cutis sentiat, & nervi denudati vehementissimè dolcant, ta-

men

Medium

men non naturaliter, sed depravatè à qualitatibus afficiuntur, easquè distinctè & accuratè non percipiunt. Verùm tactus illi, qui omnes qualitates tactiles accuratissimè percipit, in organo temperatissimo esse debet, qualis in homine est cutis interior manuum, quæ exquisitissimè tactiles qualitates judicat. Proinde hoc sensu homo, quia temperatissimus, cætera animalia vincit. Tot sunt exteriores sensus, & non plures, quibus sensibilia propria & communia primum percipiuntur, & judicio sensus interioris submittuntur. Quemadmodum autem in ipsis animæ facultatibus perfectiores ab imperfectioribus non separantur, sed contra imperfectiores sine perfectioribus reperiuntur, ita in his quinque sensibus evenit: Nam primò solus tactus omnibus animalibus necessarius est, sed in iis quæ terræ affixa sunt, & *ζωόφυτα* dicuntur, sine cæteris sensibus reperitur. Quibusdam sensus gustus tactui adjunctus est: aliquibus olfactus sine visu & auditu: & nonnullis (ut talpis) auditus sine visu inest. Illa verò animalia, quæ pluribus sensibus prædita sunt, perfectiora semper judicantur. Deinde quo sensus aliquis tenuior est, eò perfectior; quò verò crassior, eò imperfectior, minusquè separabilis, sed magis necessarius; Omnium autem crassissimus est tactus, hinc gustus, post olfactus, tenuissimus verò est visus deinde auditus. Corruptit, tristemquè sensationem sine dolorem in quovis sensu efficit excellens objectum, ut supra dictum est, quatenus subito & affatim sensorium alterat & immutat, quæ mutatio in omnibus similis non est: nam tenuiores sensus quia citò dissipantur, minores cruciatus ferunt: Crassiores verò semper graviores; quia alterationes sine omnimoda corruptione facilius sustinent. Quare tactui, sensui crassissimo, gravissimi dolores per se proprièquè dicti, accidunt. Hactenus de
sensu

CAP.
XIII.

sensibus exterioribus, sequitur interior & communis. Ex supra dictis constat sensum fieri per alterationem & dignotionem: Alteratur autem sensus instrumentum, alteratio verò ipsa ab una eademque facultate omnibus sensoriis communiter impartita à principio emanante dignoscitur, quod quidem principium (juxta Galen. 7. *Placit. cap. 8.*) sive sensum communem, sive primum sensorum appellaveris, nihil refert: Verum functionem istam sensus communis, id est, dijudicationem Galeno. passim alibi phantasiæ tribuit. Sed de his plenius in sequenti capite agemus.

CAPUT XIII.

De Sensibus Interioribus, De Facultate Principe secundum Medicos, de facultate intellectiva & locomotiva.

DE animali facultate in genere, de quæ sensibus exterioribus in specie, superiori capite dictum est; restat, ut de cæteris facultatibus in specie agamus, quæ sub animali facultate tã à Philosophis quàm à Medicis comprehenduntur. Sub facultate autem animali ex opinione Galeni præter sentientem principem & locomotivam continetur, & sub facultate principe illæ vires animæ sensitivæ, quæ à Philosophis sensus interiores vocantur, communes homini & brutis, & præterea intellectiva animi facultas homini propria. Quare ut singula rectè intelligi queant, ex sententia Aristotelis & Philosophorum, primum de interioribus sensibus dicemus, deinde ex sententia Medicorum, de principe facultate:

recr.

tertiò de facultate intellectiva: tandem de loco-
motiva.

Constat ex iis, quæ de sensibus exterioribus dicta sunt, species rerum externarum receptas in instrumentis externorum sensuum, ibi non permanere, sed ulterius vehente spiritu animali progredi, & primùm ad sensum interiorem, principium & fontem, ad quem exteriores sensus tanquam inter-nuncii sua objecta omnia deferunt; primùm, ut ibi dijudicentur, & ab invicem discernantur; deindè ut conserventur; tertio, ut absentium rerum species repræsententur, & ex his novæ eliciantur. Hæ tres actiones ab una facultate promanant; nam una tantum animi est sentientis potestas, quæ pro functionum varietate, nunc sensus communis, nunc memoriæ, nunc imaginatricis facultatis nomen sortitur, & sensus interior propriè dicitur. Hujus sedes secundum Arist. est cor, radix animæ & fons omnium facultatum. Verùm cum sensus interior velut centrum sit, in quo sensus exteriores velut lineæ à circumferentiaeductæ terminantur, & præterea ibi propriè sedem habeat, unde promanat spiritus animalis, & oriuntur nervi, quo instrumenta exteriorum sensuum disposita sunt, & coeunt species delatæ à sensibus exterioribus: proindè proximum ejus organum erit cerebrum, ut alibi demonstratum est. Quare sensus interior erit vis animæ residens in cerebro, quæ mediante spiritu animali exterioribus sensibus vim communicat, & ad quam species exteriorum sensuum deferuntur, ut ibi dijudicentur, conserventur, & absentium imagines repræsententur, novæque effingantur.

*De sensu
interiori.*

*Definitio
sensus interioris.*

Deinde ex functionibus discrepantibus tres erunt vires sensus interioris, communes homini & brutis, nimirum sensus communis propriè dictus, phantasia, & memoria, de singulis ordine dicemus.

*Sensus interioris
tres.*

Ag

Ac primùm, cum non modo sensibus exter-
nis objecta percipiamus, sed etiam nos illa perc-
pere sentiamus, præter quinque exteriores sensus
necessariò interior erit, qui non tantum sensu
exteriorum sensuum, eorumquè objecta percipit
sed etiam diversa plurium sensuum objecta inter
conferat & dijudicat. Talis est sensus communis, qui
definiri poterit; Vis animæ sentientis, quæ exteriori-
bus sensibus vim animalem per nervos communica-
cat, & ad quam species repræsentatæ in sensibus ex-
terioribus deferantur, ut ibi dijudicentur & discen-
nantur. Hic sensus communis licet respectu inter-
riorum sensuum sit primus, ratione tamen exteriori-
um ultimus & supremus judicatur: in quo sensio-
nes exteriorum velut in centro terminantur, & coe-
unt: unde ratione termini unus, ratione sensuum
exteriorum, qui in eo finiuntur, multiplex esse judi-
catur: Nam sensus communis quasi centrum est in
medio circuli, à quo quinque exteriores sensus tan-
quam lineæ ad circumferentiam exeunt, & ut cen-
trum non est amplius punctum, ubi discedit à me-
dio, sed linea: ita sensus communis ut à centro exit
ad organa visus, auditus &c. non est amplius sensus
communis, sed visus, auditus &c. at contra si rece-
damus à circumferentia ad centrum, tum visus, au-
ditus, gustus &c. non amplius hoc nomine appella-
buntur, sed in centro coeuntes dicentur sensus com-
munes. Quare facultas sentiens una erit ratione es-
sentia, plures ratione organorum. Officium autem
sensus communis planè regium est excipere, & ju-
dicare quicquid sensus exteriores instar famulorum
& internunciorum retulerunt. Verùm duo præstat:
Primùm vim sentiendi per nervos sensibus exteriori-
bus communicat: deinde exteriorum sensuum
species dijudicat, & ab invicem distinguit. Nam
sensus communis exteriores omnes unit eorumquè
actio.

*De phan-
tasia.*

tionis perficit, ac nos sentire judicat: deinde com-
munia sensibilia discernit, & propria diversorum
sensuum objecta inter se comparat, illorumquæ pri-
oritates cognoscit. Præterea phantasiam excitat,
quæ sensibilia offert. Verum cum sensus sit tan-
tum rei sensibilis præsentis, & animalia de absenti-
is etiam judicent, alia requiritur facultas interior,
in absentium rerum species repræsentantur, & æ-
mulantur. Hæc quia à speciebus illis sensuum, quæ
in animo remanserunt, ut à luce excitatur, ex qui-
bus multa simulachra fingit, aliquid componit &
judicat, phantasia dicitur, & definitur, facultas a-
nimæ sensitivæ, quæ species, à sensibus perceptas,
præsentat, & ex iis novas imagines effingit, sive
attentiones elicit, ut id, quod sibi utile est, prosequa-
tur, aut noxium fugiat. Nam phantasia à sensu com-
muni movetur, & ubi finitur sensus communis, ibi
phantasia incipit, deinde auxilio memoriæ illi jun-
ctæ circa absentia operatur: & in somno quoque
non quiescit, præterea judicando objecta amica &
diversa, subnotiones addit, & appetitum excitat,
variasquæ operationes in brutis naturæ instinctu, in
homine mentis beneficio producit. Nam hæc facul-
tas in homine media est inter sensum & intellectum,
senti quæ proximè inservit: ac à mente vice versa
dirigitur, ut infra apparebit. In brutis verò præcl-
ara est, sed quæ æstimatoria continetur, quæ subno-
tiones addit, sive ex speciebus sensibilibus species
quasdam insensibiles amicas vel adversas colligit.

*De memo-
ria & re-
miniscen-
tia.*

Quia autem non solum species à sensibus ex-
terioribus diu absentes: sed & multis phantasmati-
bus olim præsentibus anima sentiens conservat: tertia
interior facultas erit, memoria nimirum, cujus admi-
niculo res sensibus perceptæ, velut picturam & ve-
tigium in anima sentiente relinquunt: atque animæ
specierum habitum acquirit: unde definitur interna

CAP.
XII.

animæ sentientis facultas conceptarum rerum imagines & notiones conservans, ac ex præteritis promptè repetens. Hæc facultas in homine cum phantasia menti inservit: ac mens quatenus ratiocinatione impressarum rerum imagines ordine movet reminiscencia dicitur.

De facultate principis secundum Medicos.

Medici verò de facultate animi cognoscendâ à Philosophis dissentiunt, & sub animali facultate ut dictum est, sensitivam, principem, & locomotivam comprehendunt, & sub principe non solum mentem, sed etiam sensus interiores. Verùm princeps non per omnia inter se consentiunt. Nam Gal. 8. de *Vsupartium*, & lib. de *Symp. diff.* tres tantum facultates principes enumerat sive rectrices *φύσις*, *λογιστική* & *πνευματική*, & facultates ex functionum læsionibus judicat. Læditur autem interdum phantasia sola illæsa cogitatione, ut in Theophilo Medico: vel cogitatio sola ut in Lanificii puero, cujus meminit ibidem Galenus: vel memoria ut testatur Thucydides in peste Attica.

Numerus facultatum iuxta Galenum.

Verùm lib. de *Symp. causis* c. 8. cum Aristotele vigilias & somnum sensorio primo aut sensui communi tribuit, & lib. 7. de *Plac. c. ultimo*. statuit in sensatione duo concurrere, alterationem & dignotionem. Alterari autem sensus instrumentum, dignotionem verò alterationis fieri, ab una eademque facultate omnibus sensibus exterioribus communiter impertita, quæ à principio scilicet à cerebro emanat & sensus communis aut primus dicitur. Verùm functionem istam sensus communis i.e. dignotionem eorum, quæ sensibus obijciuntur, Galen. lib. de *Symp. diff.* Phantasie tribuit, & lib. 4. de *Luc. adf.* c. 3. pro imaginatione sumit sensitivam noticiam; & phreneticos nonnullos, de iis, quæ oculis offeruntur, quantum ad sensitivam noticiam rectè judicare dicit, sed cogitando aberrare. Est autem phantasia

Galen.

Galeno, quæ species & formas ab exterioribus sensibus oblatas apprehendit, discernit & dignoscit. Ratiocinatio seu cogitatio, sub quæ æstimatoria in brutis est, quæ ex speciebus jam conceptis aliquid meditatur, & cogitat, scilicet componendo & dividendo, ut ab inutilibus utilia discernat. Memoria verò, quæ conceptarum species & notiones conservat, & ex præterito revocat. Hæc opinio Galeno videtur de principe facultate, verum sensus communis: sive ignotio sensitiva eorum, quæ sensibus externis obijciuntur, à phantasia omninò distinguenda erit: nam sensui communi debetur somnus & vigilia, & in somno planè quiescit sensus communis & exteriores; non semper phantasia, & cæteræ interiores potentia: sed in somno non nimis profundo potissimum, quando insomnia oriuntur phantasia libera aliqua ex parte est, & ratiocinatrix confusè agit, ut infra dicemus.

Quare Avicenna ex diversis operationibus *Numerus* quinque diversas facultates principes recenset: nimirum *facultatum* sensum communem, imaginationem, rationem *iuxta A-* quæ æstimatoria communiter dicitur, memoriam, *vicendam* & reminiscentiam: Deinde statuit communem sensum, objecta diversorum sensuum inter se comparare: deinde imaginationem, ex iis quæ sentiuntur incipere, & componendo ad impossibilia procedere, multa quæ aliena effingere, & tamen à speciebus sensuum non recedere: tertio ratiocinationem ex speciebus sensibilibus, insensibilium species elicere, nimirum secundum aut adversum, & similitum, quæ sub sensu non cadunt: Quarto memoriam species sensibilibus retinere, & res absentes recolligere: tandem reminiscentiam, ea quæ memoria exciderunt & ex iis quæ retinentur, colligendo & concludendo revocare & reducere. Verum reminiscentia non videtur aliqua facultas distincta à memoria; nam reminisci-

CAP.
XIII.

niscimur memoria in se ipsam reflectente, dum rationis rerum impressarum imagines ordine movet, ut supradictum est. Deinde fatetur Avicenna læsionem sensus communis comitari læsionē phantasie, & memoriæ, ac proinde in explicandis symptomatum differentiis sufficere Medico tres potentias illas Galeni adsignare. Nihilominus differt sensus propriè a phantasia, quia sensus componit sensibilibus species in præsentia objectorum: phantasia hæc easdem in absentia, quas duas actiones ejusdem potentiæ esse statuit Valesius. Nam ut reminiscencia ulterior quidem motus est, quàm memoria, & tamen non videretur diversa actio: ita imaginatio ulterior motus videtur, quàm sensus, & tamen non diversa actio, sed motus ejusdem potentiæ cujus sensus est actus. Unde sensitivæ potentiæ actio quando ex rebus præsentibus operatur, & veram componit, sensus dicitur: quando falsa effingit, & species rerum absentium repræsentat, phantasia. Verùm cum in somno semper quiescat sensus communis, non autem phantasia, cæteræque interiores facultates non erit utriusque una actio, nec ita imaginatio ad sensum se habebit, ut reminiscencia ad memoriam. Quare sub imaginatione nequit comprehendere sensus communis, sed quatuor erunt interiores potentiæ. Attamen videtur Galen. 7. de *Placit. c. 8. & lib. 1. de Sympt. causis. c. ultimo*, sensum communem à sensibus exterioribus non separare, & sub una facultate comprehendere; ac proinde sensum communem à principe facultate discernere, licet ipsius functiones & potissimum dignotionem eorum, quæ sensibus obijciuntur, phantasie interdum tribuat.

De vigiliis & somno.

Ad sensum communem Galenus cum Aristoteli lib. 1. de *Sympt. causis c. ultimo* reducit vigilias & somnum, Sub vigiliis autem comprehenditur utraque fun-

functio sensus communis: scilicet, distributio facultatis animalis à cerebro ad sensuum exteriorum organa, ut species recipere queant: Deinde ipsa perceptio sive dijudicatio specierum illarum recepta. Somnus verò naturalis non est functio aliqua sensus, sed adfectus, qui secundum naturam functiones sensuum sive vigilias consequi & interpellare debet, quo vires defatigatæ vigiliis restaurentur. Nam per vigilias spiritus dissipantur, viresque corporis defatigantur, & dum defatigantur magna tenuis vaporis copia in cerebro colligitur cerebrum adefaciens, & functiones ejus impediens: unde retracto calore nativo ad interiora, somnus citatur. In somno verò retracto calore concoctiones malius procedunt, & spiritus, humores, solidæque partes laboribus exhaustæ, melius reficiuntur, & dum restaurantur, humor ille cerebrum maderaciens, per concoctiones dissipatur, vigiliasque reuocant. Quare post somnum naturalem homines ad omnes actiones aptiores sunt. Igitur vigilias erunt functiones sensus primi secundum naturam agentis cum debita intermissione. Somnus verò est illa intermissio, quies aut vinculum sensus communis, & naturalis impotentia, functiones ejus impediens, & potentissimum influxum spiritus animalis in organa exteriorum sensuum, qui functionibus eorum inservire debet. Verum in somno non omnis influxus spiritus per nervos impeditur, ut ex respiratione constat, & ex functionibus motus, quæ dormientes obeunt: sed tantus talisque fluxus in organa sensuum non est, quantus & qualis requiritur ad functiones eorum obeundas: nam in somno profundo minus influit: in minus profundo, quando sensus exiliter agunt, plus. Quare non omnis quies aut privatio sensus somnus erit: nec omnis impotentia, sed naturalis, quæ primò sensui primo com-

petit, quo ligato exteriores à suo munere necessarè cessant. Ex quibus colligitur, quod somnus sit quies aut vinculum sensus primi, functiones ejus impediens, ab utili humore cerebrum madefaciente cum retractione caloris nativi, eò usque dum vapor illi per concoctionem dissipetur.

De insomni

ni

Ut somnus $\pi\alpha\theta\eta$ est sensus communis, ita insomnium quod dormientibus obvenit principii facultatis, præcipuè phantasie. Nam in somno quiescit sensus communis, & proinde exterioria, sed non semper phantasia, cogitatio & memoria, nisi in somno admodum profundo, à copiosiore vapore in cerebrum elato. Nam in mediocri aut minus profundo somno, phantasia, ut supra diximus, aliquo modo libera est & actio discretivæ confusa. Quare ex speciebus relictis in sensibus, sive ex iis quæ vigilans senserit aut egerit, phantasia complura phantasmata componit, quæ ceu vera sint dormiens spectat: & quia ratiocinatrix confusè agit, iis fidem adhibet nesciens se dormire. At si (ut in leviori somno evenire solet) discretivæ libera sit, & imaginibus illis fidem non adhibeat, quia cognoscit se dormire: tum phantasmata illa, quæ imaginationi obijciuntur, minus propriè insomnia erunt. Quare erunt in somnia phantasmata ex sensuum motu & reliquiis orta, quæ dormientibus ceu vera obveniunt. Esse autem somnia nonnulla dispositionum quarundam signa in corpore dubium non est. An verò cætera somnia sint futurorum indicia, & an ex iis aliqua prædictio esse possit, non sine causa dubitamus?

Sedes prin-
cipum facul-
tatum.

Hactenus de functionibus facultatis principis, cujus instrumentum teste Gal. 8. *cap. 9. de Vsa part.* est cerebrum secundum substantiam. Habet enim cerebri substantia contentum spiritum innatū, complantatum, una cum spiritu animali permixtum, tan-

anquam organum conservativum omnium facultatum principum: ut alibi dictum est. Atque hunc calorem congenitum juvant spiritus animalis & vitalis, quibus refertum est cerebrum: quorum ratio-
ne cerebrum calidius esse dicitur à Galeno 7. *de Vsa*
art. quocunque aëre. An verò tres illæ facultates principes in cerebro sedibus distinguantur, & cum Aërio & Avicenna, imaginatio in anteriore parte cerebri sedem habeat; ratio in medio ventriculo; memoria in postremo, merito dubitari potest. Nam cum cerebrum totum secundum substantiam, & non ventriculos; sedes sit principum facultatum; cui subseruiunt ventriculi cæteræq; partes, Probabile non videtur, facultates sedibus distinctas esse secundum ventriculos, aut absolutè secundum partes cerebri, ita ut in una parte tantum una facultas subsistat, sed potius unam in una parte magis vigere; ut phantasiam in anteriore parte, quæ mollior & ad species recipiendas aptior est; memoriam in posteriore, quæ durior & ad conservandas species magis idonea: De hac quæstione latius agemus capite de causis symptomatum principis facultatis.

CAPUT XIV.

De facultate Intellectiva.

CUM autem humana perfectio ad vitam divi. *De Faculta*
nam quàm proximè accedat, plures facultates *intellecti*.
quàm cætera animantia requirit. Nam, ut *va*,
cuncta in hoc universo modo sibi consentaneo cognoscat, Deoque similis fiat, singulis facultatum gradibus instructus erit: quæ perfectio ex principio, medio & fine consurgit. Principium nostræ cognitionis constituent, sensus exteriores, medium interiores, de quibus dictum est: finem denique mens i.

L +

pfa

*Definitio
mentis.**Obiectum
intellectus*

imponit, quæ nos cum fine omnium postremo De
scilicet unit. Quare consequens est, ut demente a
gamus. Mens quemadmodum cæteræ facultates a
nimæ per se corporis organo non utitur, nec à cor
poris informatione proximè dependet, sed vel in se
conversa: vel inferioribus animæ facultatibus se
accommodans muneris sui functionem præstat.
Quare erit mens sive facultas intellectiva ea vis ani
mæ humanæ, quæ sine interventu organi corporei
adminiculo phantasie, & sensuum essentiam cu
jusque scibilis intelligit. Functio autem propriè
mentis est intellectio: intelligere autem aliquo mo
do se habet ut sentire. Nam ut sensus nullam earum
qualitatum actu habet, quam sentit: ita mens actu
expers eorum est, quæ intelligit, sed potentia omniū
particeps. Unde τὸ πρῶτον εἰδῶν à Platone dicitur.
Quod si actu intelligit, εἰδῶν εἰδῶν existit. Deinde
ut sensus ab eo quod sentit, afficitur, nimirum à sen
sili, ita mens ab eo quod intelligitur, sed non pari
ratione. Nam sensus objecta λόγῳ sibi correspon
dentia tantum percipit, & ab excellentibus lædi
tur, quod facultas sentiendi instrumento tempera
to utatur. At intellectus excellentissimo objecto
magis acuitur, ut minus excellentiæ facilius per
cipiat: & corpori, quatenus operatur, permixtus
non est: sed propriè simplex & immutabilis. Nam
licet secundum essentiam anima intellectiva cor
pus humanum informet: tamen ratione operatio
num in nulla peculiari parte corporis vires suas ex
erit, nec in recipiendis speciebus intelligibilibus,
organo corporeo indiget: sed sine interventu orga
ni corporei species illas intelligit; quo potissimum
à sensitiva facultate distinguitur, quæ receptam ab
organo speciem judicat.

Obiectum intellectus est omne, quod intelli
gitur,

tur, aut intelligi potest, νοητὸν, id est, scibile. Quæ
tem intelliguntur, duplicia sunt. Alia omni ma-
ria carent, ut ἀπλῶς ὄντα, quorum ipsa, ac ipso-
m esse non differunt. Alia cum materia concre-
sunt, in quibus semper aliud est res ipsa, aliud es-
rei. Nam ipsæ res concretæ, sunt dividuæ, es-
, quod mente percipitur, simplex & individuum
umeri instar. Itaque res ipsæ, ut confusæ sunt, in-
elligibiles non sunt, sed illæ rerum species, quibus
individuum cuiusquæ esse exprimitur, in quibus
ntelligendis, mens in corpore, Διανοία quasi se-
unda mente à prima propagata utitur, quæ se ap-
licans sensuum functionibus & phantasiæ, com-
onendo & dividendo λόγον cuiusquæ scibilis col-
igit. Simplicissima mentis apprehensio primi phi-
osophi est, quæ ἀπλῶς ὄντα considerat: reliqua
cibilium genera, nimirum ἐν περιόριστῳ ὄντα, &
ad physicam, & ἐξ ἀφαιρέσεως ὄντα, quæ a
hematicam pertinet, Διανοία apprehenduntur.
Quemadmodum autem νοητὰ, actu νοητὰ non sunt,
priusquam à materia abstracta mente percipiantur:
ita mens ipsa potentia & non actu intelligit, prius-
quam abstractas species recipiat, sed in ortu homi-
nis instar rasæ tabulæ est. Speciebus verò receptis,
& alia & conversa ad suas species semetipsam intel-
ligit, quod aliis intelligibilibus denegatum est, cum
esse mentis ab ipsa non differat, & materiata pro-
priè non sit. Nihilominus ex similitudine aliarum
rerum, ut species illas mens recipit, materialis &
quodammodo composita dicitur, & in mentem a-
gentem & patientem dividitur. Est autem mens gentem &
paciens, quæ phantasiæ adjuncta νοητὰ in se reci- patientem
pit: mens verò agens, quæ facit ut species in phan. dividitur
tasia potentia intelligibiles actu intelligantur: &

CAP.
XIV.

patibili menti imprimantur. Hæc, ut lumen ad colores se habet. Ut enim colores in subjecto aliquo sunt, sed per lumen sine subjecto ærem adficiuntur: ita mens agens efficit, ut species in phantasia tradantur sine materia in mentem patientem: & ut lumen à pellucido separatur: ita mens agens à phantasia & corpore, cum per se immortalis sit. Verùm mens patientis cum sine phantasia & memoria non subsistat, immortalis judicatur.

*Operatio-
nes mentis
ratione obiecti
sunt tres.*

Operationes mentis humanæ ratione obiectorum tres sunt, quarum prima est *νόσις*, simplicium apprehensio, nuda mente sine ulla compositione & divisione, quæ aut omninò intelliguntur, aut prorsus nesciuntur. Secunda est compositio, sive affirmatio: & divisio *νοημάτων*, sive negatio, in quibus primò veritas aut falsitas spectatur, non solum causa rerum, ut in necessariis, sed etiam causa temporis nimirum in naturalibus & practicis. Tertia *λογισμός* est discursus & ratiocinatio, ex veris notis ignota colligens: qua operatione scientiæ constituuntur.

*Ratione finis
aut theoretica
aut practica.*

Ratione autem finis mens ipsa, aut est *θεωρητική* aut *πρακτική*. Illa circa necessaria versatur, & in nuda veritatis consideratione consistens, intra se vertitur. hæc circa contingentia, in quibus actio, & quæ in nostra potestate posita sunt, occupata est, ac veri consideratione contenta non est: sed boni aliqujus gratia intelligit: nimirum in rebus agendis vim suam exerit consultando & deliberando, quid fugiendum quidque expetendum sit, demonstrans. Utraque sine visis vel phantasmatibus in homine non est: sed contemplativa phantasmata ex sensibus, non tanquam sensibilia, sed *νοητά* considerat, & affirmationem vel negationem visis adjungit, & an vera, an falsa sint, inquit. Practica verò sensibilia ut sensibilia

ilia considerat. Nam deliberatio rerum singulari-
m est: sed his sensibilibus bonum, sive expeten-
um; & malum sive fugiendum adjungit: & com-
parando ex præteritis & præsentibus de futuris de-
berat. In qua deliberatione prudens verè bona vi-
sis illis adjungit: Imprudens boni specie & cupidi-
tate aliqua illectus apparentia bona pro veris habet,
& cum visis illis comparat. Bruta verò sine delibera-
tione sensus communis judicium visis illis adjun-
gunt, & præsentibus sese accomodant, quæ si jucun-
da fuerint, persequuntur; sin tristia, fugiunt.

CAPUT XV.

De facultate voluntarii Motus.

PRæter has jam dictas animæ facultates una ad-
huc restat, qua de loco in locum animalia mo-
ventur. Cujus functio à Galeno nunc motus ani-
malis, nunc voluntarius, & spontaneus dicitur, quia
eum pro arbitrio animal sedare potest, & rursus
quiescentem excitare & velociorem ac tardio-
rem reddere. Hæc facultas nutriendi aut sentiendi non est,
siquidem multis convenit, quæ loco adfixa sunt: nec
intellectus theoreticus, imò ne practicus quidem.
Nam sæpè mens jubet aliquid persequi, quod ob
intemperantiam homines non persequuntur. Præte-
rea nec per se appetitus existit, cum temperantes suis
cupiditatibus non obsequantur. Verùm motus lo-
calis duo sunt prima principia: unum dirigens; al-
terum motum exsequens; ac ut exequi queat addi-
tur tertium principium, quod ei famulatur, & in-
feruit. Id autem quod motum dirigit, expers cogniti-
onis esse non debet, sed aptum ut de absentibus &
præsentibus judicare queat; quale est phantasia & tri-
mens

*De facultate
locomoti-
va.*

*Principia
motus vo-
luntarii.*

CAP.
XV.*Præcipua
causa motus
localis ap-
petitus.**Quid affe-
ctus & ap-
petitus?*

mens. Et quia directio fit per cognitionem, id est
quod exequitur mandata dirigentis, aptum erit, ut
cognitionem sequatur, cujus generis est appetitus.
Nam cognitio sub specie boni vel mali appetitum
moveret; & objectum appetitus est, excitans, ut id
quod bonum est, prosequatur, quod malum, fugiat.
ar. Excitato appetitum spiritus animales à cerebro
per nervos una incitantur, & musculos proximæ
instrumenta voluntarii motus movent: atque mus-
culi articulos, totumque corpus. Quare facultas
locomotiva composita erit ex intellectu vel ratione
cum appetitu: Verum non omnis intellectus mo-
vet: sed practicus alicujus finis gratia: & movet ra-
tio in homine, atque imaginatio in brutis, non per
se, sed quia ad illam appetitus accedit. Itaque pri-
maria & præcipua causa motus est appetitus, facul-
tas animæ à sentiente minimè secreta, quæ si rationi
se adjunxerit, in mente voluntatem constituit, quæ
intellectus promotus dicitur, adfectibus insidens:
hæc illi soli moventur, qui ratione ducuntur, si in
imaginationi copulatus fuerit appetitus, *ad* sive
adfectus una oriatur: quo non bruta solum, sed
etiam pueri & incontinentes aguntur. Sed appeti-
tu adfectus continetur, & adfectus appetitiones
quædam sunt: sed differre aliquo modo videntur.
Nam adfectus propriè est motus animi, ortus ex i-
maginatione jucundi vel tristici, nondum exiens in
actum externum. Appetitus verò propriè motus
est animæ exiens in actum externum, concitatus
ex cognitione objecti, sub ratione boni vel mali.
Nam intendit appetitus finem illum solum, qui ali-
qua cognitione, id est, intellectu vel imaginatione
comprehensus sub specie boni sive veri, sive appa-
rentis est: proinde objectum appetitus, id est, appe-
tibile, quod appetitum ad agendum movet, est bo-
num, vel revera, vel apparans, finis ipsius appetitus.
Verè

Verè autem bonum est, quod intellectus practicus præscribit: apparens verò bonum imaginatio sub ratione jucundi vel ingrati dictat. Nam ratio, quæ in universalibus est semper recta: at imaginatio in particularibus interdum recta non est: id bonum ex adfectu aliquo (ut ex dolore, voluptate &c.) judicans, quod revera tale non est. Unde mirum minimè est, appetitus non tantum oatione contrarios esse, sed etiam inter se: nam cupiditas aliud sequitur, aliud ratio dictat: quia cupiditas præsentibus semper movetur: ratio verò futura considerat: & quæ nunc jucunda sunt mala esse indicat.

Sedes ap-

Residet autem appetitus causa motus in cerebro propriè, ubi facultas sentiens sedem habet, ac unde spiritus animalis provenit. Verùm adfectuum seminaria ab aliis partibus potius scaturiunt: Veluti libidinis seminaria à pudendis, cupiditæ & ciborum ab officio ventriculi, iracundiæ à corde, quod propriè sedes est irascibilis facultatis, ut alibi dictum est. Hi adfectus animi sunt, nondum exeuntis in actum externum. Exeunt autem, si accedat appetitus & incitatio interni motus ad externam actionem. Nam inter adfectum ut iram, quæ est desiderium ultionis sive oppressionis, & ipsam actionem, scilicet oppressionem aut ultionem est appetitus, incitatio scilicet motus illius interni ad externam actionem: ita ex ira educitur actio ad opprimendum offensionis autorem, si iratus oppressionem illam prius appetiverit. Quæcunque autem specie boni aut mali nobis objiciuntur si cum ratione ea sequimur aut fugimus, tum appetitus rationis particeps erit: si præter rationem incitamur, & voluptatis aut molestiæ vis major fuerit, quam rationis, tum appetitus expers rationis erit, & propriè adfectus: at si turbido & violento motu ita insurgat, ut

vires

CAP.
XV.*Differentia
adfectuum*

vires rationem statim conturbent, *παθος* proprie dicitur. Consistunt autem adfectus in persecutione aut fuga ex opinione alicujus sub specie boni aut mali: idque aut presentis aut instantis & futuri. Ac primum, ex imaginatione boni presentis recenter objecti, oritur voluptas aut delectatio: quæ velet de rebus nostris secundis, vel alienis adversis. De rebus nostris aut nostrorum secundis, si moderata & constans fuerit, gaudium; si profusa, læticia: si inanis sese efferens, jactantia vocatur. Si de rebus alienis adversis præcipuè bonorum, malevolentia & malitia dicitur. Contra ex opinione mali presentis aversatio & animi ægritudo oritur, quæ varia est. Nam ægritudo animum premens, angor: crucians, dolor; quæ cum labore accidit, ærumna; cum vexatione corporis, afflictio: quæ cum molestia & cogitatione premit, sollicitudo; quæ sine meliorum expectatione accidit, desperatio: quæ cum fletu, lamentatio; cum ejulatu, mœror: quæ ex interitu alicujus, luctus dicitur; quæ ex aliena miseria oritur, cui subvenire cupimus, misericordia; quæ ex aliena prosperitate, si bonorum, livor invidia dicitur, si malorum, sub *νεμεσις* continetur, quæ mixtus adfectus est potissimum ex ira & dolore. Tertio ex opinione boni futuri, spes boni illius expectatio & confidentia, ac desiderium sive cupiditas oritur, quæ varia est: alia enim consistit in cibi potusque desiderio, cupiditas: alia in rei Veneræ, libido: aliqua in honoris & gloriæ, ambitio: nonnulla in divitiarum, avaritia, quædam in ultionis sive vindictæ, ira; quæ si subito desinat, exadescencia, si inverterata, odium, si tempus ultionis expectet, inimicitia dicitur, &c. Contra ex mali futuri opinione animum prementis excitatur metus (spei & confidentiæ contrarius) mali futuri expectatio, quæ quâdo malû instans est, timor dicitur, si permaneat, for-

formido, si corpus vehementer concutiat, terror, si mentem percellat, pavor: si ulterius procedat, consternatio & exanimatio: si ex laboris metu oriatur, pigritia vocatur &c. Mixtus autem adfectus ex spe & metu est verecundia. Atque hi sunt adfectus, qui motus quidem animi sunt, sed corpus una afficiunt; quò vehementiores fuerint, eò spiritum cum sanguine magis impellunt, quasi suppetias laturos ipsis instrumentis. Moventur autem spiritus vel ad exteriora, ut in ira, gaudio & similibus, desiderio aut appetitu boni præsentis, vel futuri. Vel ad interiora fuga & averfatione mali, ut in tristitia, metu &c. Ex his quæ dicta sunt, apparet, tria requisita esse in motu animalium; quod movet, quod movetur, & quo movetur. Quod movetur, propriè est animal, quo movetur, sunt instrumenta motus, qualia proximè sunt muscoli. Quod movet, duplex est, unum movens immobile objectum, ratione aut imaginatione comprehensum, sub specie boni aut mali: aliud movens mobile appetitus. Nam bonum sive verum, sive apparens, appetitum movet, & appetitus ipsos spiritus animales à cerebro per nervos, qui sua natura appetitui obtemperant, & spiritus à cerebro incitati musculos movent, ac muscoli articulos &c.

Quare quatuor erunt in motu animalium: *Quatuor*
 primo finis motum excitans, objectum: secundo *concurrunt*
 principium dirigens cognitio: tertio medium ex *in motu a*
 quens appetitus, quarto instrumentum absolvens, *nimalium.*
 muscoli, nervi & cerebrum. Verùm quia in cerebro residet vis motus & sensus: igitur cerebrum ea facultate motum imperat: deinde, ut eques habet equum dirigat, ita vis à cerebro nervis (perfusis spiritu animali) quasi habenis musculos movet, qui proxima sunt motus voluntarii instrumenta. Omnes musculi ejus, cui inferuntur, partis voluntario

CAP.
XV.

rio motuierviunt. Nam unicuique motui partiē
peculiares destinati sunt musculi, & contrariis mo-
tibus oppositi musculi; ut musculis articulum fle-
dentibus opponuntur extendentes; & musculis
partem in dextram moventibus, opponuntur mu-
sculi in sinistram moventes; eademquē in cæteris
ratio est. Verūm motus, qui nullum sui contrari-
um habet, oppositos non adipiscitur musculos. A-
git musculus dum in se contrahitur contractio fi-
bris, quæ dum musculus os mover, in tendinem
semper concresecunt. Quare quando partem flecti-
mus, contrahuntur musculi flectentes, & relaxan-
tur oppositi partem extendentes, contrarium eve-
nit, ubi partem extendimus, eademquē est in cæte-
ris oppositis motibus ratio. Verūm ubi omnes op-
positi musculi simul agunt, sive contrahuntur, ori-
tur motus musculorum tonicus, qui partem in eo-
dem situ detinet, ut quando brachium extensum
in eodem situ retinemus, cuius generis quoque
sunt, stare, sedere, erecto corpore jacere, & non
ad pedes delabi &c. Horum respectu cæteri motus
locales dici poterunt, quia vel situm partis in toto
mutant in anteriora vel posteriora, dextrum vel si-
nistrum; sursum, deorsum &c. vel totum animal de
loco in locum transferunt, ut ambulatio sive in-
cessus, qui ex contrariis motibus componitur, ni-
mirum crurum extensione & reflexione. Cum au-
tem nihil moveri queat, nisi aliquo immobili fir-
metur, peculiariter in motu animalium de loco in
locum, sive in deambulatione, duo immobilia e-
runt, unum internum, requisitum in omni motu
cujuscunque partis; aliud externum necessarium
in motu rotius à loco in locum. Nam primum,
si unum absolute animal esset, non moveretur. Par-
tes igitur diversas habet: ac ut membrum aliquod
moveatur, necesse est aliquid quiescere, à quo prin-
cipium

incipium illius motus & cui adfixi sunt muscoli, cujus rei gratia animalibus articuli insunt, ut tanquam in centro flexibus utantur. Immobile verò externum est, quod extrinsecus, obnixui illius, quod movetur, resistit. Nam in ambulatione nisi aliquod sit extrinsecum, quod illi contentioni membrorum renitatur, omnis movendi conatus inanis erit. Præterea functiones, quæ ope musculorum perficiuntur aliæ animales tantum sunt, ut ambulatio, apprehensio, loquutio, &c. aliæ partim naturales, partim animales, ut respiratio, tussis, urinæ, alviq; dejectiones, motus uteri in partu, ac in summa, quæcunque fiunt a facultate expultrice naturali adjuncta motu musculo-

tum.

F I N I S L I B R I S E -
C U N D I



M

DE

LIBER TERTIUS
DE PATHOLOGIA*Sive*DE REBUS PRAETER-
naturalibus

LIBER TERTIUS.

DE MORBIS ET MOR-
borum differentiis.

CAPITULUM I.

DE rebus illis, quæ secundum naturam corpori humano insunt, & quarum considerato ad Physiologiam propriè pertinet, hæcenus dictum est: consequens est ut Pathologiam explicemus, & de rebus quæ contra naturam insunt, agamus. Utriusque enim eadem est ratio: cum in eodem virtus & vitium versetur, ac eadè affectio alio atque alio modo secundum aut contra naturam dicatur.

*Tria in
humano
corpore se-
cundum &
præterna-
turam.*

*I. Consti-
tutio sive
affectus
partium.*

Considerantur autem in humano corpore tria: Primò, ipsa constitutio corporis: secundò, causæ quæ constitutionem efficiunt: tertio, affectus & accidentia quæ ex constitutione dependent. Circa hæc tria omnis Medici consideratio, & operatio. Nam si secundum naturam fuerint, conservari, sin contra, submoveri à corpore debent.

Ac primùm constitutio ea tantum est, quæ partib. viventib. debetur, ac similaribus & dissimilaribus inesse judicatur, aut pro naturæ modo, aut contra: Pro naturæ modo, si constitutio sit expeditis animæ functionibus accommodata & idonea, contra verò, si inidonea & inepta. Nam, pro sua constitutione, pars ad agendum bene maleve disposita & affe-

& affecta est: unde constitutio à Medicis alio nomine plerunque dispositio & affectus dicitur; licet constitutio propriè dicatur de toto, ratione partium componentium, & constituentium, Dispositio vero, quatenus ad actionem producendam pars apta vel inepta est. Ratione constitutionis & dispositionis, sive ea moderata fuerit & naturalis, sive immoderata & præter naturam, pars vivens functiones suas edit: licet à facultatibus animæ functio omnis cedat, Nam facultas, quæ per se impassibilis est, pro constitutione organi sui actiones variat: indiget enim ministerio organi: Quare si fuerit organon naturaliter dispositum, expeditè agit: sin præter naturam, vitiosè & impeditè. Igitur constitutio sive dispositio membri erit immediata causa functionis, tam expeditæ, quàm impeditæ.

Secundò, causa est omne illud, quod suâ naturâ in constitutione illâ partem generationis confert: confert autem per mutationem & motum. Atque ipsa constitutio sive dispositio propriè nihil aliud est, quàm terminus illus motus. Aliud enim est, pati, & affici: aliud, affectum & dispositum esse: deinde, aliud *πῶς* & *πῶς*, passio scilicet & affectio: aliud *ἡ δὲ*, dispositio scilicet & affectus. Nam ipsa dispositio & affectus nihil aliud est, quàm mutationis illius vestigium, patienti corpori impressum: aut forma sive qualitas quædam motum consequens. Proinde sublatâ causâ tollitur quidem passio & patientis corporis affectio: sed non necessariò unâ affectus, sive dispositio.

Tertiò, omnem corporis constitutionem & dispositionem necessaria quædam effecta, sive accidentia consequuntur: præcipuè verò, functiones sive actiones, pro modo dispositionis.

Sub uno horum trium sanitas & morbus erit:

M 2

& pro-

II. Cause
constitu-
tionis.

III. Acci-
dentia con-
sequentia.

CAP.

I.

& propriè aut dispositio viventis corporis, aut illius dispositionis causa, aut, quæ ex dispositione sequitur, actio. Verùm cum contrariorum idem subiectum eademque ratio sit, in eodem subiecto sanitas & morbus erit, & sub eodem genere: & uno cognito alterum statim cognosci poterit. Sani omnium consensu tum sumus, quando, partium corporis adminiculo, munus ad vitam necessariis fungi valeamus: sive quando actiones pro naturæ modo edere possumus: ægi igitur, quando in unâ aut pluribus partibus earumque functionibus impedimentum sentimus. Quilibet enim se sanum iudicat, non solum quando functiones suas naturaliter exercet: sed etiam quando eas exercere potest: sive, quando sentit nullam corporis partem in munere suo impeditam. Quare sanitas ipsa naturalis functio non erit, proinde nec morbus functionis læsio: aut functio impedita, alioqui omnes vincti & dormientes morbo laborarent ob functiones animales impeditas. Verùm omnium iudicio vincti & dormientes sani existimantur, si constitutionem corporis secundum naturam habuerint quæ functiones naturales exercere potest: ægi contra, si contra naturam habuerint, quæ impeditas actiones producit. Quare sanitas erit ipsa constitutio viventis corporis secundum naturam: morbus ejusdem constitutio præter naturam. Actio verò læsa, & quæ actionem sequuntur, accidentia tantum morbi sunt, quæ à Medicis peculiari nomine Symptomata vocantur. Causa illius constitutionis contra naturam morbus censi non debet: sed quod immediatè per se actionem lædit, quod non facit causa: quia sæpè læditur actio causa non existente. Quare causa dispositionis secundum aut præter naturam sanitas aut morbus non erit: sed causa morbum antecedit, & morbum immediatè sequitur actio læsa, cæteraque symptomata.

Quando

*Sanitas &
morbus non
continentur
sub
functione,
sed consti-
tutione.*

Quando constitutionem & dispositionem dico, qualitatem primæ speciei intelligo: licet illud quod subiectum disponit, per se consideratum, alterius speciei aut generis sit: veluti calor & frigus per se sunt Patibiles qualitates: deinde magnitudo & numerus: per se Quantitates: figura & forma sub quarto genere Qualitatis: Quatenus verò subiectum suum bene maleve afficiunt, & ad aliquid certo modo agendum aut patiendum disponunt, dispositiones & affectus subiecti illius dicuntur: quod si secundum naturam & moderatè afficiant, sub sanitate continentur: sin contra, morborum differentias constituunt, ut infra apparebit.

Ex quibus colligitur, quòd morbus sit constitutio viventis corporis præter naturam, quæ per se primò actiones sensibilibiter lædit. Dico præter naturam cum Galeno *lib. de Sympt. diff. c. 1.* in lata significatione, ad differentiam sanitatis, respectu ad formam cuiusque propriam, unde actionis principium, quæ magis natura est, quàm materia. Nam à Galeno id præter naturam dicitur, quòd ex naturæ præscripto non est, sive per se naturæ vim inferat, ut morbus, & morbi causa; sive non inferat, ut symptomata: quâ significatione hæc omnia tria, res præter naturales à medicis appellantur, ac à naturalibus, & non naturalibus distinguuntur. Verùm propriè id præter naturam dicitur, quòd quidem ex præscripto naturæ non est, sed per se ei nullam vim infert, ut symptomata; contra naturam, quòd cum natura pugnat per se, eiq; vim infert, actionesque ejus lædit, vel primò ut morbus, vel alterius interventu, ut causa morbi, unde eodem sensu, quo prius, morbus definiri poterit constitutio viventis corporis contra naturam primò actiones sensibilibiter lædens. Additur *Viventis Corporis*, proprium scilicet morbi & sanitatis subiectum. Cum enim

Morbi definitio.

morbus.

M 3

morbus

CAP.
I.

morbus læsæ actionis causa sit, in alio non erit, quàm
 in ipsis actionum instrumentis: instrumenta autem
 actionem non sunt humores, sed partes solidæ &
 continentes, à quibus spiritus non excluduntur,
 quatenus in membris determinantur, ut agentium
 membrorum partes & instrumenta communia, Qua-
 re morbus in humoribus non erit, sed in partibus
 continentibus, à quarum essentia spiritus non pla-
 nè separantur, quatenus ut instrumenta consideran-
 tur conservantia facultatem in membris: Humo-
 res enim ideo excludimus, quia non vivunt: deinde
 quia materia spirituum & membrorum sunt: neca-
 liter functionibus incommodant, quàm si membra
 quantitate & qualitate suâ offendant: Quare in con-
 tentis potius erunt morborum causæ. Neque ta-
 men hæc tria ita absolute distinguuntur, ut scilicet
 causa sit in contentis solum, symptomata in solis
 spiritibus, & morbi in partibus continentibus. Nam
 symptomata etiam in contentis apparent: & mor-
 bi in spiritibus sunt, quatenus à membris determi-
 nantur, membrorumque partes esse intelliguntur.
 Præterea causæ aliquando in continentibus consi-
 derantur, ut alibi demonstratur. Tertiò, dico,
Actioes sensibilibus lædens, ut separentur leves dis-
 positiones. Nam si quævis immoderata constitu-
 tio, quantumvis parva, morbus esset, omnes homi-
 nes perpetuò morbis afficerentur, & à cunctis in-
 troduceretur. Nam sanitatis magna latitudo est:
 alia optima in medio omnis excessus, alia in habitu
 inculcata, quædam in habitudine vicinâ morbo, &
 quodammodo ambigua. Si igitur tota hæc latitu-
 do sanitas dicatur, nullum medium inter sanitatem
 & morbum erit: sin ea, quæ in habitudine vicinâ
 morbo, à sanitate separetur, media quædam dispo-
 sitio inter sanitatem & morborum erit, quæ actiones
 neque satis firmas neque sensibilibus læsas produ-
 cit:

cit: unde neutra vocatur. Hæc suâ latitudine non destituitur: &, non aliter quàm sanitas & morbus, suas causas & accidentia habet. Illæ verò dispositiones leves, quæ actionibus manifestè non officiunt, licet morbi propriè non dicantur, à morbis tamen magis magnitudine, quàm specie differunt: & ad aliud genus levis inchoata intemperies, & absoluta referri nequeunt. Præterea sub actione hic usum comprehendimus: cum non omnes partes actionem habeant, sed quædam usum tantum. Tandem subjungitur, *Primò actiones lædens*, non solum ut morbi à causis morborum distinguantur, quæ constitutiones interdum sunt præter naturam & actiones lædunt, non primò, sed mediante alio scilicet morbo; verum etiam ad differentiam læsionis, quæ fit ex proprio partis affectu ab re, quæ per consensum tantum.

Læditur enim partis actio dupliciter: per se, *Læditur proprio partis affectu*, unde procedit actio læsa, scilicet per *ἰδιον πάθειαν*, vel per consensum i. e. *συμ- actio per se* *πάθειαν*: quod tribus modis accidit; Primò, dum *vel per consensum* morbi causa aliunde communicatur; ut quando ex *sensum* ventriculo affecto corrupti vapores in cerebrum ascendentes ejus actiones lædunt, deinde ubi facultas influere prohibetur: veluti quando spina aut *Per consensum tribus modis* nervo affecto manus resolutio oritur. Terriò, quando ad partem materia actioni necessaria non pervenit: ut si vulneratâ *τραχέια* vox impediatur. Ubi verò actio proprio partis affectu læditur, morbus propriè & absolute dicitur: non autem quando per consensum tantum: nisi, diuturnâ illâ affectione per consensum, pars illa proprium affectum contraxerit: quod in primâ tantum specie evenit: actum posteriorem affectum, *ἰδιον πάθειαν* vocamus: priorem verò, ex cuius consensu nascitur, *πρωτον πάθειαν*. *Per se duobus modis*

I.

Fit autem morbus causa morbi bifariam: vel suâ naturâ, veluti pleuritis naturâ suâ febriem excitat: vel conditione partium, sub quâ continentur: primo, connexus & societas, qualis est inter ventriculû & cerebrum, per nervos: Secundo, positus partium: tertio, robur & calor, unde pars validior nobiliorq; excrementa sua ad debiliorem ignobilioremque deponit.

*De differē-
tiis morbo-
rum.*

*Differentia
essentiales
quibus con-
stituuntur
genera mor-
borum.*

His definitis consequens est, ut morborum differentias in specie cognoscamus. Differentiæ variæ sunt, quarum præcipuæ sumuntur vel à morbo, vel à subiecto, vel à causa morbifica. In morbo autem quatuor considerantur teste *Gal. 1. de Cris.* Morbi essentia, magnitudo, motus, & mos sive modus morbi; quibus addi poterit exitus sive eventus. Ab Essentia morbi sumuntur differentiæ specificæ, quibus genera & species morborum constituuntur: A cæteris omnibus differentiæ tantum accidentales. Ac primum, cum morbus sit constitutio partis viventis præter naturam, tot erunt prima morborum genera, quot sunt constitutiones. Triplex autem constitutio aut compositio, tam non naturalis quam naturalis, in humano corpore consideratur: Prima, partium similiarum, ex elementis: secunda, dissimiliarum & organicarum, ex similiaribus: tertia, totius corporis, utrisque, tam dissimilaribus quam similiaribus communis, nimirum unitas. Consistit enim naturalis constitutio sive sanitas partium similiarum, in debitâ proportionem quatuor elementorum, sive in justâ temperie quatuor primarum qualitatuum, calidi, frigidi, humidi, & sicci: dissimiliarium verò, ex similiaribus, in debito numero ac justâ magnitudine in decentem formam coeuntibus, cum idoneo consensu & situ; At toti corpori omnibusque partibus communis est unitas. Quare universi corporis sanitas si explicari debeat ita defini-

niri

piri debet, quod sit bona similarium temperies, & organorum integra fabrica, cum utrarumque partium naturali unitate: Hæ naturales constitutiones partium si immutentur, totidem morborum genera necessariò oriuntur. Quare tria erunt prima & *Tria summa morborum genera: unum, partium similarium discrasia sive intemperies: alterum, partium dissimilarium mala compositio: tertium, utrisque communis, unitatis sive continuitatis solutio.*

Tribuitur temperies & intemperies propriè *1. Intemperies propriè* similaribus & non dissimilaribus: sicut mala compositio tantum organicis: quia totius similaris (ut *similaribus* carnis totius & omnium particularum) una natura *debetur.* est: & eadem temperies in toto & singulis partibus inesse solet, quod in dissimilaribus evenire nequit: Deinde similaria quatenus similaria non requirunt certam figuram aut determinatam quantitatem: sed sub quavis figura & magnitudine suam naturam servant: at pars organica certâ figurâ, quantitate & partium positu indiget, sine quibus nec nomen nec naturam instrumenti acquirit. Incipiunt quidem actiones omnes similaribus, sed à dissimilaribus perficiuntur. Deinde similarium intemperies per se consideratæ dispositiones ociosæ non sunt, quæ actiones tantum impediunt: sed quæ sensibilibus, pro naturâ superantium qualitatibus, corpus alterant, & movent: quod non faciunt morbi compositionis, qui impedimenta potius sunt actionum, ut in obstructionibus apparet: transferuntur enim humores de uno loco in alium, quia cava sunt. Si igitur cavitas est causa expediti transitus humorum, cavitatis illius oclusio sive obstructio erit causa impediti transitus. Eadem est ratio in cæteris morbis compositionis.

Oritur autem intemperies ubi Elementorum *Species in* debita proportio non est, nec ea qualitatibus contra- *temperies*

M s riarum

I.

riarum temperies, quæ functionibus naturalibus competit: sed vel una sola tres cæteras vincit & exuperat, vel duæ reliquas duas. Ergo octo erunt intemperies: quatuor simplices, ubi una tantum qualitas exuperat, nimirum, calida, frigida, humida, vel sicca: quatuor compositæ sive conjugatæ, quæ compositis morbis annumerantur: nimirum, calida humida, calida sicca, frigida humida, frigida sicca. Hæ intemperies vicissim multis modis distinguuntur; Primò, ratione antecedentis causæ. Sic alia intemperies cum materia dicitur, sive cum causâ antecedente ex humorum affluxu & vitio, alia sine materiâ: Deinde ratione subiecti, alia intemperies est in habitu & confirmata, quæ difficulter solvitur: alia in habitudine inchoata, quæ minus stabilis est: Præterea alia est æqualis in omnibus membri partibus similis, alia inæqualis, dissimilis & in unâ intensior in aliâ remissior: aut quæ partes ipsas inæqualiter afficit. Verùm in priori differentia morbus cum morbi causâ confunditur: cæteræ differentię accidentales sunt: ac etiam pluribus specie differentibus inesse poterunt. Sub intemperie cū materia comprehenduntur à Galeno tumores, qui fiunt ex humore collecto in parte, de quorum differentiis infra, & capite de causis morbotum dicemus.

*Non datur
morbus si-
milaris à
materia
aut forma*

Plures non sunt similarium morborum species, quàm ex inæqualis primarum qualitarum cōmixtione. Qui verò à Fernelio morbus materiæ dicitur (ut immoderata raritas, densitas, laxitas, astrictio actionem lædens) per se propriè similis non est, sed parti organicæ debetur ut infra apparebit. Præterea similis morbus à tōta substantiâ aut formâ nullus propriè est: Forma enim substantialis indivisibilis est, nulli contraria, quæ intensionem & remissionem non suscipit: Sanitas verò & morbus magis & minus sustinent, & in indivisibili consistere nequeunt.

unt. Quare ratione formæ substantialis morbus nullus erit, sed tantum constitutionis, quæ consequitur formam: nimirum temperamenti, structuræ, & unitatis, quæ variè mutantur manente eadem membrorum substantiâ: nisi fortè in his tantus fiat recessus, ut omnis dispositio & apparatus materiæ pro formâ conservandâ planè pereat. Nam corrupto prorsus naturali temperamento forma substantialis permanere nequit.

Secundum genus morborum est mala compositio, ubi appropriata organi alicujus constitutio sive compositio per se labefactatur. Labefactatur autem quatuor modis: quia naturalis organi constitutio quatuor requirit, ut in *Physiolog. capite 4. demonstratum est*. Ergo quatuor erunt genera morborum organicorum: unum conformationis, alterum numeri, tertium magnitudinis, quantum consensus & situs.

Conformatio, primum, ratione partium externarum, sub se comprehendit figuram & superficiem: ratione internarum, meatus per quos feruntur succi: & cavitates: quorum unum si à naturali statu recedat morbus conformationis oritur.

Quare prima species morbi conformationis est vitiata figura, scilicet si membri alicujus naturalis figura ita immutetur, ut actiones illius impediat: id fit ubi ea quæ recta sunt curvantur: aut quæ curva recta evadunt: quod nonnullis in utero accidit, aliis à partu: ut apparet in varis, vaciis, claudis, fimis, ac in iis, qui ex fractis ossibus malè curati sunt, & in arthriticis nonnullis.

Secunda species est vitiata superficies. Vitiatur autem superficies, si quæ lævis esse debet exasperetur, aut quæ aspera, lævigetur. Quare duæ erunt vitiatæ superficiæ species: una lævitas non naturalis: ut in lientesiâ: altera asperitas, qualis faucibus interdum accidit, quæ tussim excitat.

Secundum genus morborum, mala compositio. Morbus in compositioe quadruplex.

Primum genus vitiata conformationis tres species

I. Morbus in figura.

2. Morbus in superficie.

Ter-

I.

3.
*Morbi in
meatibus
& cavitati-
bus dupli-
ces.*

1.

Dilatatio.

2.

*Angustia,
qua quinque
species ha-
bet.*

*Secundū ge-
nus morbi
composit. in
magnitudi-
ne, Cuius
duae species
sunt.*

Tertia species malæ formationis est in meatibus & cavitatibus, quarum variae sunt differentiae, quæ tamen omnes ad duo cõmunissima genera reducuntur, nimirum ad meatuum dilatationem & angustiam. Dilatatio est quando meatus nimis patent, vel ob partium raritatem, vel immodicam apertionem. Sub hac igitur comprehendimus ἀναστομωσιν, quando orificia vasorum nimis patent & aperiuntur, & ἀσπῆρσιν quando tunica vasorum nimis relaxantur & rarefiunt, ut humores effluant.

Angustia verò multiplex est, ut à multiplici causa oritur: unde etiam denominatur. Hæ causæ vel in vasis consistunt, vel extra vasa: Si in vasis, oritur subsidencia vel contractio, quando in se meatus arctius coeunt: vel coalescentia, quando particulae & tunicae uniuntur: vel constipatio, quando à carnis excrescentia, meatus imminuitur, qualis accidit orificio vesicae ex ulcere: vel denique obstructio, ubi à materiâ non naturali occluditur. Si verò causa extra fuerit, meatum comprimens, oritur cavitatis constrictio sive oppressio aut compressio. Præterea figura vitata meatum aliquem interdum lædit: & tum morbus fit causa morbi.

Secundum genus morbi organici nascitur vitio magnitudinis, quando pars supra naturæ modum excrescit vel infra subsistit. Quare duæ hujus species erunt, una morbus auctæ magnitudinis, quando magnitudo partis ita præter naturam augetur, ut actionem eius impediat. Cujus generis est ἐγκάνθις excrescentia carunculae lacrymalis: sub hoc genere quoque continentur omnes tumores præter naturam, sive ortum habeant ab humore collecto in parte, ut phlegmone, œdema, Scirrus, &c. sive à parte decumbente, ut ἐντεροκήλη, ἐν πτωλοκήλη, qui morbi sunt in magnitudine aucta cum vitato si-

tu & consensu, sive à carnis excreſcentia, ut *ὑπερ-
σάρκωσις*, *σπερμηγήλη*, &c. Altera species est mor-
bus diminutæ magnitudinis, quando pars præter
naturam imminuitur: ut in Atrophîâ, Phthîsi, Rhœ-
ade, & similibus apparet.

Tertium genus morbi organici numeri vitio
evenit: & vel in exuperantiâ vel defectu alicuius
præter naturam consistit. Exuperantia autem illa
est tantum rerum non necessariarum, aut accrescen-
tium iis, quæ naturalia habitu sunt, sub specie partis
ut sextus digitus in manu; *πτερύγιον* in oculo; poly-
pus in naribus: aut toto genere præter naturam; ut
lumbri in intestinis: calculi in renibus, & vesicâ:
fuffusio in oculo, contenta in abscessibus; item ver-
tuxæ & calculi. Morbi hæc dicuntur non per se,
sed in numero respectu membri, cui insident & ad-
hærent, tanquam partes præter naturam superad-
ditæ, organi illius structuram vitiantes, & sua præ-
sentia ejus functiones impediennes, alioqui calculus
in renibus & vesica, quando meatus & vias claudit,
angustia respectu; morbi causa tantum est. Defec-
tus verò est substantiæ naturalis, non qualis in di-
minuta magnitudine, ubi ad numerum pars integra
manet, sed ubi vel ex toto membrum aliquod ra-
dicitus perit, ut manus, lingua, &c. vel de integrita-
te membri particula aliqua decedit, ut digiti portio
&c. quod in mutilatis sæpe videmus.

Quartum genus morbi malæ compositionis
consistit in depravato situ, & connexione sive con-
sensu: In situ, quando partes naturalem situm non
habent, aut à loco naturali abeunt: cujus generis
sunt, luxatio, *ἐντεροκήλη*, *ἐπιπλοκήλη*, prociden-
tia uteri, &c. In connexionem autem sive consensu,
quando mutua partium societas violatur, & ea uni-
untur quæ uniri non debent: ut in coalescentia la-
bio.

C A P.
I.

*Tertium
genus mor-
bi compo-
siti, in nu-
mero.*

*Quartum
genus mor-
bi compo-
siti, prava
connexio
& situs.*

CAP.
I.

*Tertium
genus mor-
borum.
Solut. con-
tinui.*

labiorum, & palpebrarum, in strabismo & simili-
bus.

Utimum & tertium genus morborum utris-
que, tam similaribus quàm dissimilaribus commu-
ne est: ut solutio unitatis. Nam tam similaribus
quàm dissimilaribus unitas & partim cohærentia
debetur: sed alio atque alio: modo fit unde solu-
tio unitatis nunc per se parti similari tribuatur, ex
accidenti organo, scilicet cum particulæ unitas tan-
tum solvitur, ut in ulcere & carie; eaque divisio si-
milaris à nonnullis continui solutio propriè dicitur:
nunc per se toti organo convenit: sed ex accidenti,
particulæ: ut cum una aut altera particula à toto
organo separatur & avellitur; nimirum quando
ἡτοιμασμένη sunt: eaque divisio dissimilaris, à
nonnullis solutio cōtigni propriè vocatur: aliquan-
do & toti organo & particulæ similari per se: ut, si
ligamenti alicujus unitas in se solvatur, & simul
membro non cohæreat.

*Differētia
solut. con-
tin. ratio-
ne subie-
cti.*

*Ratione
cause.*

Continet solutio unitatis sub se variis differen-
tias pro partis subjectæ & causarū diversitate. Nam
ratione subjecti, partibus carnosiss propriè vulnus
& ulcus tribuitur: item carnosiss & mollibus, ruptio
& contusio: ossibus fissura, fractura, caries: nervis
propriè convulsio, & fibrarum divulsio: organicis
partibus, *ἡτοιμασμένη* Ratione verò causæ qua-
druplex est: Primò, ab acri erodente materiâ in car-
noso genere est ulcus, in osse caries: secundò, à causâ
incidente, secante, pungente vulnus: tertio, à valido
& duro corpore irruente, contusio & illisio in parti-
bus mollibus; fractura in ossibus: quartò, à replen-
tibus, contrahentibus, distrahentibus, distentio, &
disruptio.

*De morbis
compositis.*

Hæc sunt prima & simplicissima morborum
genera, eorumque species, quibus corpus humanum
contra naturam afficitur. Afficitur autem corpus
huma-

humanum vel in unâ parte, vel pluribus; idque aut simplici aliquo morbo, aut composito: Componuntur autem morbi illi simplices multis modis: aut generis ejusdem, ut intemperies cum intemperie: vel generis diversi ut intemperies cum mala compositione aut unitatis solutione: Deinde componuntur, vel in una particula exquisitè, ut in tumoribus ex coacervatione humoris in parte, qui intemperies sunt cum aucta magnitudine, & solutione unitatis, vel in versis particulis unius organi: veluti, si oculus simul suffusione, corneæ ulcere, & ophthalmia laboret. Compositæ autem intemperies, de quibus supra dictum est, aut puræ sunt sine antecedente causa & affluxu humorum, aut cum affluxu: is humor est sanguis, pituita, bilis flava & nigra, aut ex his commixta: qui humores in parte coacervati si distentionem fecerint, oriuntur tumorum præter naturam varia genera. Nam calida humida intemperies cum sanguine *φλεγμώνη* dicitur: calida sicca cum bile, *ερυσίπελος*: frigida humida cum pituita *οἰδημα*: frigida sicca cum melancholia tumorem durum faciens *σκιρρῶς* vocatur. At si misti fuerint humores, à vincente humore tumores illi nomen præcipuè sumunt: veluti si vincat sanguis, & adsit bilis, pituita, aut melancholia, *φλεγμώνη ἐρυσίπελατώδης*, *οἰδηματώδης*, aut *σκιρρῶδης* dicitur eadem in cæteris ratio. De quibus in causis morborum. Tandem ubi corpus in diversis partibus afficitur morbi oriuntur, vel planè disjuncti, qui nullâ communionem habent: id est, nec easdem actiones lædunt, nec una alteri causa est: vel impliciti sunt, qui uni eidemque actioni officiant; vel connexi & consequentes, quando prior posterioris causa est. Quomodo autem id fiat supra demonstratū est. Hæc sunt genera & differentiae morborum, desumptæ à morbi

I.

morbi essentia: Cæteræ differentiæ vel accidentales solum sunt: vel à certis distinctisque partibus corporis oriuntur: quæ tamen sub his continentur: licet ex appositione subjecti intelligantur & definiantur: Ac quoque vocabulis *συνδεδασμένοις* ferè semper exprimantur: veluti, pleuritis & angina inflammationes quidem sunt non simpliciter: Verùm hæc faucium; illa membranæ succingentis costas.

Differentia morborum accidentales.

Hactenus de essentialibus morborum differentiis, quibus genera & species morborum propriè constituuntur: Verùm præter has differentias, aliæ quamplures apud medicos reperiuntur, quæ accidentariæ tantum dici debent, quia genus aut speciem morbi non propriè constituunt, sed tantum ad conditiones & proprietates nonnullas explicandas inserviunt, desumptæ non ab essentia morbi, sed vel ab accidentibus essentiam morbi consequentibus, qualia sunt morbi magnitudo, motus, mos & eventus, vel à subjecto, vel à causis, de quibus omnibus in specie dicemus.

Differentia à magnitudine morbi.

Primum autem morbus omnis ratione magnitudinis, quæ nil aliud est, quam quantitas recessus à naturali statu, vel est magnus vel parvus, quibus addi poterit horum & similium respectu intermedius. Judicatur autem morbi magnitudo ex magnitudine priorum symptomatum: Proinde morbus in sua specie magnus est, qui magna adfert symptomata, parvus, qui parva: Attamen non uno modo à medicis morbus magnus dicitur, nam communiter magnus vocatur, qui magnum periculum vitæ minatur, aut ad mortem ducit, vel per se simpliciter, vel ratione functionis læsæ vel virium ægri, unde nonnulli morbi sua natura magni dicuntur; ut vulnus cordis, gangræna: Aliqui respectu aliorum, idque vel in toto genere morborum, ut Pestis, Apople-

Morbus quot modis magnus aut parvus dicatur.

xia,

ia, &c. Vel in sua specie, ut fortis Apoplexia: Nonnulli ratione partis affectæ, aut functionis læsæ ad vitam necessariæ; ut inflammatio jecoris, &c. Alii ob vires ægri debiles, licet morbus in sua specie magnus non sit, unde evenit ratione functionis læsæ, aut virum ægri, ut morbus aliquis dicatur magnus, qui natura parvus est; ut levis Apoplexia in senilibus. Peculiariter verò morbus magnus appellatur, qui à magna causa fovetur, morbum fovente viresque ægri opprimente, ut febris acuta à plenitudine, quæ magnum remedium venæ nimirum sectionum propriè indicat.

2.

Secundò motus totæque duratio morbi, quæ definitur motione causarum morbificarum, dividitur communiter in quatuor tempora, principium, augmentum, statum & declinationem, quæ tempora vel universalia sunt totius decursus morbi, omniumque causarum, vel particularia partis alicujus morbi. Principium autem morbi est, quando causæ illæ agere incipiunt, & natura nondum manifestè resistit, ac parva actionis læsio est. Augmentum verò quando causæ illæ vehementius agunt, & natura manifestè resistere incipit, aut morbificam causam aliquatenus immutat. Status morbi vocatur, quando vehementissima est lucta, naturæ & morbi, quo tempore concoctio & symptomata adhuc omnia vigent. Tandem declinatio est, quando natura superat morbum, & actio læsa imminuitur. Quod si verò in illa lucta morbus naturam planè superat, aut saltem ea morbo resistere nequeat, mors necessario sequitur: quod non solum in statu fit, sed etiam in augmento & principio fieri potest, nunquam propriè in declinatione. Quare morbus lethalis hæc omnia quatuor non habet. Sola tempora universalia considerantur in illis morbis, qui non habent periodes, sed cōtinenter à principio ad finem

Motus & duratio morbi.

Tempora morborum.

N

move-

I.

moventur, sine ulla remissione. At in iis, qui remissiones aut intermissiones habent, præter quatuor universalia in singulis paroxysmis quatuor etiam tempora particularia considerantur. A motu sive duratione morbi duplices sumuntur differentiae:

*Differentia
à quanti-
tate dura-
tionis mor-
bi.*

*Morbus
brevis.*

Longus.

*Acutus
morbus e-
iusq; dif-
ferentia.*

Quædam à quantitate durationis: Aliæ à modo durationis. A quantitate autem omnis morbus, vel brevis vel diuturnus & longus dicitur. Brevis autem morbus est, qui velociter movetur & ad terminum sive declinationem citò pervenit ut Ephe-mera. Diuturnus contra ut hydrops; Nam quicquid velociter aut tardè movetur, citò aut tardè ad terminum pervenit. Quod si morbus brevis simul & magnus fuerit acutus propriè vocatur. Ut enim in voce acutum est, quòd auditum celeriter & cum vehementia movet, ita acutus morbus propriè est, qui celeriter & cum vehementia movetur, aut subito ad statum pervenit, sive quatuor tempora universalia morborum celeriter percurrit, ac proinde eum periculo agit. Acutorum autem morborum magna est latitudo & multiplex varietas, prout mutatio magis vel minus vehemens & velox est: Quòd enim mutatio major & violentior, eò morbus acutior. Proinde morbus acutus à medicis dividitur, in peracutum, acutum simpliciter, & acutem eò *περὶ τοῦ περὶ τοῦ*: Deinde peracutus in exquisitè peracutum, & non exquisitè. Exquisitissimè peracutus est, qui vehementissimè & velocissimè ad salutem vel mortem movetur, sive ad statum & crisin citissimè tendit: Id fit tertio aut ad summum quarto die, qualis est Apoplexia & interdum Pestis. Non exquisitè peracutus tardior paulò est, & ad septimum usque diem producit. Acutus verò simpliciter dictus, si exactè talis est, ad decimum quartum diem protrahitur: sin non exactè, ad viges. tantum. At acutus *ἐκ μεταβολῆς*, i. ex degeneratione, ad quadrage-

simum

simum diem pervenit. Post quadragesimum diem qui finiuntur morbi, dicuntur longi & diuturni.

Deinde modus motus aut durationis morbi dependet à motione causarum morbificarum, aut consideratione partium morbi, cujus ratione alii morbi continui dicuntur, qui continuo affligunt, & in tota sua duratione ad intermissionem aliquam non deveniunt. Hi si uno eodemque motu continenter moveantur sive omni remissione, non solum continui, sed etiam continentes vocantur, ut Febris illa, quæ Synochus dicitur: Sin intentiones & remissiones habeat, certisque periodos, continui simpliciter erunt ut tertiana continua, &c. Alii morbi intermittentes dicuntur, qui ad integritatem sive perfectam intermissionem deveniunt, quod morbifica causa in continuo motu non sit, sed certis quibusdam periodis quiescat, deinde moveatur. Proinde quot sunt periodi, tot erunt morbi particularia tempora. Dividitur tamen tota periodus intermittentium in paroxysmum, ubi causæ morbificæ moveatur, & intermissionem quando quiescunt, & morbus non affligit. Paroxysmus verò omnis quatuor illa tempora particularia comprehendit. Itaque in intermittentibus quinque sunt tempora particularia.

Morbi qui continenter non moventur, sed cum intermissione & remissione, typos & periodos habent. Est autem propriè typus ordo intentionum & remissionum in morbis: Periodus verò tempus illius intentionis & remissionis. Differunt typi & periodi pro differentia morborum, nam quælibet species morbi, quæ intentionem & remissionem suscipit, suum typum & periodum habet. Verùm à Galeno typi alii dicuntur primi, qui parvam accessionem, longam intermissionem habent: Alii contra secundi: ita nonnulli permanentes, quando paroxysmi iisdem horis redeunt: Alii mobiles quando

Differentia à modo motus morbi.
Morbus continuus, continens.

Simpliciter continens.
Intermittens.
Tempora intermittentium.

Quid typus & periodus morbi.

CAP.

1.

tardius, &c. de quibus latius agemus in prognosticis & disputationibus de Febris.

3.

*Different.**à more**morbi, be-**nignus, ma-**lignus.*

Tertio ex more & modo morbi, qui colligitur ex supervenientibus symptomatibus, morbi aliqui mites sive benigni vocantur: Alii sævi & maligni; nonnulli mediam rationem habent. Maligni autem sunt, qui sæviora & majora inferunt symptomata, quàm quæ pro ratione essentiae propriæ illis conveniunt, benigni verò contra: Sic Febris parva aut vulnus si sæva & vehementia inducat symptomata, malignus affectus vocatur, &c.

4.

*Differ. ab**eventu**morbi, sa-**lutaris,**lethalis.*

Tandem terminatur morbus omnis, vel ad salutem vel ad mortem, id quæ vel per se simpliciter, vel mediante alio: unde omnis morbus vel salutaris sive curabilis, vel lethalis, incurabilis, & uterque vel simpliciter talis, vel secundum quid. Simpliciter autem salutaris, qui cum certa laborantis salute & perfecta solutione definit: ut tertiaris pura intermittens: Item Febris ardens, ubi ad perfectam crisin pervenerit: & contra simpliciter lethalis, qui vires valde prostermit, & in naturam ad mortem ducit. Secundum quid salutaris vel lethalis morbus est, qui immediate ad sanitatem vel mortem non tendit, sed in alium affectum permutatur, & morbum curabilem vel incurabilem post se relinquit: Veluti pleuritis mutatur interdum in *peripneumonia* aliquando in *empyema*.

*Differen-**tia morbi**à subiecto.*

1.

*à natura**et tempera-**mento**agri.*

Haftenus de differentibus morbum consequentibus. Cum autem morbus accidens sit & esse habeat à subiecto, pro varietate subiecti & modo, quo in subiecto acquiritur, & subsistit complures erunt differentiae. Vocabulo subiecti comprehenduntur natura, temperamentum, sexus, ætas, partes effectæ, &c. Unde ratione naturæ, aut temperamenti ab Hippoc 34. Aphor. sect. 2. morbi alii dicuntur naturæ familiares & cognati, qui similes sunt:

Alii

Alii minus cognati. Ita juvenibus Febres biliosæ & acutæ familiares sunt, senibus non. Deinde ratione sexus alii morbi virorum sunt ut Priapismus: Alii foeminarum, ut affectus uteri. Tertio ratione ætatis ab Hippoc. 3. Aphor. morbi nonnulli vocantur puerorum, ut Epilepsiæ, &c Aliqui juvenum ut Febres ærentes, Phthisis: Quidam senum ut Apoplexia. &c.

Quartò ratione partium affectarum alii morbi universales dicuntur ut Febriis, Marasmus, qui totum corpus afficiunt: Alii particulares, qui partem aliquam peculiarem, ut Ophthalmia, Angina Præterea morbus omnis, quatenus acquiritur in subiecto aut dicitur in fieri tantum esse, aut in facto tantum, aut partim in fieri partim in facto. Item vel consistit in habitu vel in habitudine, & functionem lædit, vel per se, vel per consensum, de quibus differentiis supra dictum est.

Tandem ex causis non paucæ oriuntur differentia medico necessaria; Causæ autem illæ, aut sunt internæ; aut sunt externæ, ut sequent Cap. dicemus. A causis potissimum sumuntur illæ differentia quibus dicuntur morbi nonnulli exquisiti & legitimi, qui genuinam suam naturam in corpore obtinent à genuinis propriisq; causis. Alii contra spurii & illegitimi. Deinde alii hæreditarii vitio seminis & materni sanguinis: Alii à nativitate vitio conformationis in utero. Pleriq; ascititii ab aliis causis post partum. Præterea ab humoribus alii morbi sanguinei vocantur ut Synochus, Phlegmone; Alii Biliosi ut Tertianæ exquisita, Erysipelas: Quidam Pituitosi, ut Quotidiana, Oedema nonnulli Melancholici, ut Quartana, Schirrhus. Hi omnes vel exquisitè tales sunt ab unica propria causa ut febres & tumores legitimi: Vel nothi ex commistione humorum, veluti ex redundantia bilis, cum

1.

2.

A sexu.

3.

Ab ætate.

4.

A partibus affectis.

5.

A modo quo in subiecto subsistit.

Differentia à causis morborum

1. Morbi legitimi & nothi.

2. Hæreditarii à nativitate.

3. Ab humoribus sanguinei. Biliosi, &c.

CAP.

I.

pituita, Tertianæ notha, Erysipelas œdematodes, &c.

4.

A loco & regione Sporadici. Pandemii. Endemii.

Epidemii.

Pestilentes morbi.

Tandem respectu locorum & regionum in quibus complures laborant à *Gal. comment. in 1. Epid.* quidam morbi sporadici videntur, morbi specie diversi, qui eodem tempore grassantur: Alii *πανδημιοι* morbi speciei ejusdem, qui plures eodem tempore infestant. Pandemii autem vel *ἐνδημιοι* sunt, qui unam aliquam regionem vel locum semper tenent, & illius loci vitio potissimum eveniunt; Unde vernaculi & patrii morbi dicuntur. Talis est scorbutus ad mare Balthicum, &c. Vel *ἐπιδημιοι*, qui certo quodam tempore in una vel pluribus regionibus grassantur, multosque simul infestant: Hi aliquando benigni sunt, plerumque maligni & perniciosi, qui pestes & pestilentes morbi proprie vocantur. Hactenus de præcipuis morborum differentiis, cætera per se facile intelliguntur.

CAP. II.

De Morborum causis in genere:

Quanta sit necessitas cognitionis causarum in medicina.

CUM nihil sine causa fiat, & teste Philosopho, tum demum cujusque rei effectusque essentiam perfectam, cognitamque habeamus, ubi causas ejus proprias perfecte cognoverimus, Medico imprimis causarum illarum cognitio necessaria erit, quibus sanitas humani corporis conservatur & immutatur. Nam sine ea, (ut admonet *Galenus 1. & 2. Methodi*) impossibile Medico erit, morbos dextrè curare aut præcavere; ac sanitatem certa methodo conservare. Requirit enim Medicina, ut effectus in suas causas proximæ & ad

ad æquatas resolvamus, & demonstratione cognoscamus, quemadmodum alibi demonstratum est. Quare de causis illis in genere, nunc potissimum agemus.

*Quid causa
& quotu-
plex?*

Causa omnis in relatione ad effectum dicitur, omneq; illud causa vocatur, quod ad effectum producendum concurrir: sive ei quod fit, partem generationis confert. Confert autem dupliciter, vel *per se*, suaq; propria inrita vi, quatenus effectum sibi similem gignit, vel *per accidens*, alterius interventu, quatenus videlicet actione sua dissimilem vel contrarium sibi effectum producit, ut, si vomitus vomitu curretur, aut si tetanus in juvene robusto, ætate media, tollatur subita affusione aquæ frigida: *Per se* autem causa Galeno est, quæ ex sua natura, ei quod fit, partem generationis confert. *Per accidens* causa contra, quæ non sua vi, sed alterius interventu.

*Quid sit
causa per se
& per acci-
dens?*

*Quatuor
sunt genera
causa per se
& per acci-
dens.*

Deinde in effectus cujusque productione quatuor causæ per se necessario concurrunt: ac ut Aristoteles demonstrat, quatuor tantum sunt per se causarum genera, ad quæ etiam causæ per accidens reducuntur: quarum duæ *Interna* dicuntur, quia intrant constitutionem effectus, *materia*: subjectum scilicet mutationis in quo & ex quo fit aliquid: deinde *forma*, quæ mutatione aliqua introducitur in materiam: Duæ *Externa*, *Efficiens*, principium mutationis in alio, quatenus aliud, & *Finis*, causa illa, cujus gratia res aut effectus ab efficiente producitur. Verum finis duplex est, unus, qui finit motum in subiecto, finis internus; qui in rebus naturalibus à forma revera non differt, & à Galeno *Scopus* vocatur; alius, qui formam sequitur, finis scilicet *externus*, usus rei, unde à Galeno *utilitas* vocatur. Hæ causæ Medico cognoscendæ sunt: Nam *scopus* artis medicæ autore Galeno, est ipsa sanitas, forma motu acquisita: finis & utilitas, est sanitatis possessio; scilicet, ut muniis ad vitam necessariis fungi valeamus; & ut mole-

stis careamus meliusque vivamus. Subiectum, est corpus humanum, partesque viventes. Causa efficiens, omne illud quod sanitatem in corpore conservat & morbum depellit.

*Morbi &
sanitatis
causa.*

Quare morbus sanitati contrarius idem subiectum habebit, sive materiam in qua, non ex qua cum accidens sit. Nam humor, materia morbi non est, sed propriè efficiens: Deinde usum & finem naturalem morbus propriè non habet, sed terminum, usum sanitatis contrarium, nimirum, *functionis lesionem*; & si augeatur, *mortem*. Gignitur autem morbus, quando pars à naturali termino & statu, ad non naturalem movetur: Restituitur sanitas & curatio perficitur, quando à non naturali ad naturalem reducitur. Quia verò contrariorum contrariæ efficientes causæ sunt; causæ morborum, contrariæ erunt causis sanitatis, ac vice versa: atque ita ex se mutuo intelliguntur.

*Quomodo à
Medicis
vox causa
sumatur?*

De his solis efficientibus morborum causis, nunc præcipuè dicemus: nam Medici cum Platone pro eodem vocabulo *causa & efficientis* plerumque utuntur, adeò, ut ubicunq; Galenus causæ mentionem simpliciter facit, effectricem solam intelligat. Per hanc, non solum morbus ex potentia materiæ educitur, sive in subiecto gignitur, sed etiam, si immediata fuerit, morbum illum de suo subiecto primo demonstrat, ac eodem planè modo à morbis symptomata oriuntur, & per morbos ut causas efficientes cognoscuntur.

*Definitio-
nes perfectæ
morborum.*

Quare ea perfectæ morbi alicuius definitio erit, quæ per causam propriam, affectum ad certum subiectum restringit, & quæ immediate sequuntur accidentia propria explicat. Veluti, Apoplexia, si pro morbo sumatur, perfectè definitur, obstructio ventriculorum cerebri; & carotidum, animales functiones repentè tollens, ab humore crasso, affatim

irru-

irruente & occludente. Sin ut symptomata consideretur, definitur, privatio repentina functionis animalis, obstructione ventriculorum cerebri, ex humore crasso affatim irruente: ita, vel una definitione natura morbi, & proprii symptomatis cognoscitur, & simul per propriam causam, affectus ad certum subiectum restringitur.

Efficiens autem causa quatenus effectus ad huc producit, *1. de locis Affectu*; definitur id, quod nos tangente, passio generatur, & quo discedente, quiescit. *Definitio efficiens causa.* Ex passione verò oritur affectus, ut alibi dictum est; ac proinde mediante passione aut mutatione aliqua subiecti, affectus omnis à causa efficiente producit.

Verum effectrix causa per se, simpliciter, nec passionem, nec affectum ullum producit, *ut Gale. 2. de Causis morbus declarat*, nisi hæc tria concurrant; *Tria sunt requisita ut efficiens certum effectum producat.*

- I. Vis efficientis satis valida & magna.
2. Spacium temporis passioni debitum.
3. Aptitudo materiæ, quibus addi poterunt, situs conveniens efficientis & materiæ, ut scilicet materiam ritè contingat, sive ex contactu agat. Sub efficientis vi satis magna comprehendimus. I. genus & gradum qualitatis; à qua actio: alia enim qualitas magis, alia minus efficax in suo genere est, & quælibet qualitas quatuor gradus habet: Deinde comprehendimus justam magnitudinem causæ efficientis; & debitum numerum: ac tandem, motum effectui congruentem. Quia verò partes temporis, partibus motus semper correspondere debent, in omni mutatione legitimum tempus necessariò requiritur: Verum nulla fit mutatio, sine aptitudine materiæ: apta autem est materia, quæ efficienti causæ facilè cedit, minimamque resistit: quæ verò difficilè cedit, plurimum que resistit, *disposita* Indisposita dicitur.

N 5

Omniſ

II

*Divisio
causa effici-
entis.*

*Evidens si-
ve proca-
tarctica
causa.*

*Causa Oc-
cult.*

*Evidentiū
causarum
divisio in
necessarias
& non ne-
cessarias.*

*Res non na-
turales sex
sunt.*

Omnis autem efficiens causa morborum, vel *Evidens & manifesta* est; vel *Occulta & latens*. Evidentes causæ, omnibus sensu notæ sunt, ad quarum cognitionem nulla conjectura opus est; Hæ à Galeno *Procatartica*, id est, *præincidentes*, item *recentes causa* dicuntur; A veteribus, *occasiones morborum*; à plerisque *externa causa*; licet omnes extrinsecus tantum non adveniant, nam nonnullæ intrinsecus proveniunt, sive à nobis excitantur, ut affectus animi, & exercitia: Sed externæ dicuntur, quia omnibus extrinsecus patent, & inter ea non numerantur, quæ corpus nostrum constituunt. *Occulta* verò causæ sunt, quæ interius latent, & non sensibus, sed artificiosa conjectura cognoscuntur, unde internæ causæ communiter dicuntur.

Evidentes autem causæ duplices sunt, aliæ, quæ necessariò nobis occurrunt, & sine quibus vivere non licet: Aliæ contra, quæ nulla necessitate obveniunt, & quas declinare possumus. Hæ omnes causæ, sua natura noxiæ non sunt, & secundam propriam rationem actiones nec lædunt nec juvant, præcipuè verò, illæ, quæ necessariò nobis occurrunt, undè à rebus secundum naturam, & contra naturam, distinguuntur, & à Medicis peculiari nomine, *Res non naturales*, dicuntur: quia eorum usu moderato sanitas conservatur: immoderato usu, morbi gignuntur: quare Causæ salubres, nunc insalubres, vocantur, in quibus moderandis pars artis medicæ, de Tuenda sanitate, consistit.

Eiusmodi res non naturales sunt tantum sex; nimirum, 1. Aer, 2. Cibus, potus, 3. Retentia, excreta, 4. Somnus, vigilia, 5. Motus, quies, 6. Animipathemata. Cæteræ causæ procatarticae ad vitam necessariæ non sunt, sed fortuito nobis obveniunt, ut casus, ictus lapidis, gladii & similia infinita, quæ arte medica prævideri semper nequeunt. Ex illis autem

sex

vum viscerum extinguat aut debilitet, per antipe-
ristasin spiritum cum sanguine ad interiora revocat;
undè melior appetentia, &c. Sicca aeris intemperie-
es, qualis esse solet initio autumnii, aut in sicca cœli
constitutione, flante euro, in locis arenosis; corpora
densa, dura solidaque efficit & extenuat, putredines
quidem coerces, & superfluos humores absomit,
sed simul eos, qui reliquuntur in corpore exiccat &
incrassat, à quibus obstructions fiunt, si caliditati
conjuncta sit, humores adurit, atram bilem gignit,
&c. Contrà humida aeris dispositio qualis contin-
git in pluviosa aeris constitutione, manè in locis
humidis, circa initium veris, corpora mollia, laxa
& debilia reddit, spiritus obfuscant, Humores super-
fluos accumulat; caloremque nativum obtundit; à
quibus erudites, destillationes, obstructions, &c.
oriuntur, potissimum si intemperies frigida sit con-
juncta, si cum calida putredines gignit, & putri-
dos, pestilentesque morbos excitat. Similis ratio est
crassi & caliginosi, quæ est humidi, sed spiritus ma-
gis obfuscant, & calorem nativum viresque corporis
& animi degravat. Præterea inæqualis aut instabi-
lis aeris constitutio, ut quando eodem die modò
frigus, modò calor sit, teste Hipp. 4. Aph. 3. autum-
nales, id est inæqualis: constantes malique iudicii
morbos expectare oportet. Tandem aer corruptus
aut prava & pestilenti qualitate affectus à cœli im-
pressionem, vel quia non perflatur, vel quia prava
halitus ex terra aut aquis suscipit, corpora nostra
sua qualitate inquinat, & morbos epidemicos pe-
stilentiaque gignit. Post aerem sequitur cibus & po-
tus, quorum legitima administratione & usu sani-
tas conservatur; illegitima omnis generis morbi
generantur. Consistit legitimus usus, in debi-
ta alimentorum forma, & quantitate, qualitate, tem-
pore & modo, ut in Therapeuticis capi. de Diætâ
demo n.

2.
Cibi & po-
tus quomo-
do nos le-
dant.

demonstratur. Quare lædi tur sanitas, primùm ubi non servatur idonea diætæ forma & quantitas, nimirùm si aut plenior victus forma sit, majorque alimenti copia exhibeatur, aut tenuior victus minorque alimenti copia, quàm necessitas exigit, viresque requirunt. Nam à multis fomentis sive alimentis, calor natus debilis, qualis in senibus obruitur & extinguitur, perindè ut parvus ignis à multis lignis injectis; contra defectu sive paucitate ciborum corpus consumitur, ipseque calor natus elanguescit ut docet Hipp. 14. aph. 1. Eadem ratio est in modo cibandi, quæ est in quantitate, si sæpè plus cibi offeratur, quàm natura postulat, vel rarò minusque. Peculiariter ubi plus alimentorum ingeritur, quàm modo naturæ conveniat, oritur teste Galeno. Cam. 17. aph. 2. πλησμονή, quæ interdum pro omni repletionem tam ciborum, quàm humorum sumitur, ut 22. Aph. 2. Propriè pro repletionem ciborum, quæ à Latinis satietas vocatur. Ex repletionem cibi oritur in venis repletio humorum, plethora aut cacochymia multorum morborum causæ. Nam quando natura illam ciborum copiam in bonum sanguinem convertit, sic plethora; si nequeat, gignuntur cruditates, variæque cacochymie species. Contrà, inedia aut ubi minus cibi assumitur, quàm natura exigit, non solum humores in vasis, sed etiam substantia partium, spirituum, & caloris nativi consumitur, vires debilitantur, Deindè humores crudi concoquuntur, & evacuantur, sed corrupti & biliosi concitantur, & in furorem aguntur. Cibi potusque ut quantitate, ita quoque qualitate aliqua alterando nos lædant. Proprium autem medicamenti est corpus nostrum alterare; alimenti verò quatenus alimentum à corpore nostro alterari, & in substantiâ ejus converti; attamen multi cibi potusque utraq; vim habent, nimirùm alendi ob similitudinem substantiæ,

CAP.
II.3.
*Retenta
& excreta
quarati-
one ledunt.*

tia; & alterandi ob qualitatem exuperantem, quæ in corpore sano similem intemperiem efficit, in ægro contrariam temperat, Cujus ratione dum cibi à natura concoquuntur, in similes qualitatis humores facile convertuntur, undè calidi cibi calidam intemperiem, calidosque humores gignunt; frigidi frigidos, &c. Lædit quoque cibus, si idoneo tempore non assumatur, nimirum hora non consueta, priore cibo non concocto, nec ventriculo exonerato. Nam tempus hoc antevertere cruditatis, obstructionum, aliorumque morborum causa est. Protrahere verò diuque famem tolerare, ventriculum pravīs humoribus replet, &c. Tandem varii cibi non debito ordine assumpti morbos quoque efficiunt, ut si primò assumantur, qui longum tempus ad concoctionem in ventriculo requirunt, deindè qui citò conficiuntur, & in ventriculo diutius retenti in pravos succos corrumpuntur, &c. de quibus omnibus latius in capite De Dieta dicitur. Tertiò ad vitam conservandā *retenta & excreta* pertinent, Ubi enim, quæ accōmodata sunt ad alendum secundū naturæ modū retinentur, in corpore, deindè evacuationes naturales aut consuetae, utilesque procedūt ac evacuantur, quale, quantum, quando, aut quomodo oporteat, sanitas corporis conservatur; si aliter procedant, morbi generantur. Naturales evacuationes hīc voco per alvum, urinas, & habitum corporis, bilis ex vesicula felle ad intestina, &c. Consuetas utilesque seminis in viris & foeminis justæ ætatis, & peculiariter menstrui sanguinis in foeminis, in nonnullis sanguinis per hæmorrhoides, per nates, item muci è naribus, &c. Nam ubi retenta à naturæ modo recedunt, veluti si sanguinis copia in venis redundaverit, oritur plethora: si qualitate peccaverint aut naturales vel consuetae evacuationes supprimantur parciusve quam pro naturæ modo fluant, sequetur excrementum;

mentorum inutilium corruptorumque humorum
 proventus, cacochymia, cachexia, oppressio virium
 calorisque nativi, &c. Verum ubi expelluntur uti-
 lia, quæ retineri debent, ut sanguis, aut utilia cum
 inutilibus, aut inutilia intèpestivè, immodica quan-
 titate, non debito modo, aut per non naturales vias;
 calor nativus viresque omnes exhauriuntur & dissol-
 vuntur, corpus consumitur, & ab his varii morbi
 generantur. Nam plurimum replere, aut evacuare
 naturæ inimicum est. Quarto loco inter res ad
 vitam necessarias collocantur *somnus & vigilia*.
 Nam vigiliæ per se sunt functiones primi sensus;
 somnus verò functio non est, sed functionis quies
 à natura instituta, ut vires defatigatæ vigiliis refi-
 ciantur. Deinde vigiliæ ad distributionem ali-
 mentorum per corpus & excrementorum expulsi-
 onem, somnus magis ad concoctionem confert:
 utriusque igitur moderatus usus sanitatem tuetur
 & conservat: immoderatus labefactat & corrup-
 pit. Nam somnus immodicus: spiritus calorem-
 que nativum obruit, & suffocat, vires enervat, cru-
 dorum humorum & excrementorum copiam in
 corpore accumulat, &c. At vigiliæ diurnæ su-
 pra naturæ modum, substantiam spirituum & calo-
 ris nativi dissolvunt vires corporis exhauriunt,
 concoctiones impediunt, bilem accendunt, sensus
 mentemque derurbant, corpora exiccant & exte-
 nuant, &c. Quintò similis fere ratio est in *motu*
 & *quiete*, sicut in somno & vigiliis. Motus autem
 siue exercitationes corporis moderatæ, ante cibos
 peracta concoctione, calorem nativum excitant,
 spiritus agiliores reddunt, corpus roborant, undè
 melior concoctio & excrementorum omnium eva-
 cuatio. Contrà ocium & intèpestivæ exercitationes
 efficiunt. Nam ocium & consuetæ exercitationis re-
 missio, calorem nativum obruit, & obtundit, vires
 omnes

4.
Somnus & vigilia
quomodo
sanitatem
labant.

5.
Motus & quies
quaratione
nos affectant.

II.

*Perturba-
tiones a-
nimique
modo la-
dant.*

omnes enervat, evacuationes impedit, ac excrementorum vitiosorumque humorum copiam auget, &c. At immodici labores & exercitationes calorem nativum & spiritus exhaustiunt, vires corporis dissolvunt, humores dissipant, aut commovent, concoctiones impediunt, vasa interdum dirumpunt, corpus gracile & biliosum reddunt, &c. Tandem vehementes animi perturbationes non minus, quam immodicæ corporis exercitationes nos lædunt, quatenus cum impetu spiritum & sanguinem vel ad cor revocant; vel ad exteriora effundunt. Nam primum timor & tristitia, quia calorem ad interiora revocant, partes externas refrigerant, calorem nativum obstruunt, cor premunt, vires omnes debilitant; unde pulsus parvi, rari, debiles, aliquando syncope, præcipue à timore, qui non sensim ut tristitia sed confertim spiritum ad cor revocat, & ubi natura debilis est, tanto cum impetu nonnunquam, ut vires omnes resolvantur & suffocato calore nativo in corde mors subsequatur. Deinde tristitia non minus quam timor totum corpus refrigerat & siccat, vigiliis inducit, concoctiones vitiat, sanguinem melancholicum morbosque; melancholicos efficit. Gaudium autem profusum ita vehementer spiritum à corde interdum effundit, ut dissipetur, & cor deferat, quare in iis: qui natura debiles sunt, synopen, & repentinam mortem aliquando inducere solet. Ira vetò repente spiritum effundit cum copia caloris effervescentis adhuc circa cor: cujus ratione spiritus primum, deinde humores accenduntur & concitantur, totumque corpus incalescit & pro dispositione corporis omnis generis febres calidæque intemperies generantur. Verecundia & Agonia mixti motus sunt, & inæquales; sed Agonia cum sit vehementior compositus ex ira & metu amborum pericula inducit. Cætera de legitimo & ille.

Illegitimo usu sex rerum non naturalium explicabuntur in *Therapeut. capite de Diata*. Hæ causæ procatacæ ad vitam necessariæ sunt, cæteræ non necessariæ, sub quibus comprehenduntur contagium & venena.

Est autem *Contagium*, quod ab uno in alium *Quid contagium?* transfertur, velim mediatè, per mutuum contactum, ut in scabiosis, vel mediatè, per quædam *pusioles* sive seminaria, sub halitus & vaporis specie aeri communicata; aut corpori quod fomitis rationem habere potest; ita pestis grassatur, & phthisici aliorum pulmones, lippi aliorum oculos halitu inficere solent.

Venena verò sunt corpora cordi inimica, & humanæ naturæ corruptiva: *Inimica* dico; quia temperamentum cordis & calorem nativum principaliter dissolvunt, licet alias partes etiam lædant: talia vel à venenatis bestiis ejaculantur, vel assumuntur, aliquando etiam adhibentur; & lædunt, nunc qualitate prima, nunc secunda, aliquando proprietate substantiæ. *Quid venena?*

Omnes hæ causæ procatacæ tam necessariæ, quam non necessariæ, ad quatuor illa capita, *causa procatacæ* quæ. 1. *de Tuen. Sanit. at. à Galeno enumerantur*, reduci poterunt, scilicet, *ad assumenda, evacuanda, adhibenda, agenda*. 1. Ad assumenda pertinet cibus & potus, *ad 4. capitula à Galeno* item medicamenta, venena, & similia. 2. Ad evacuanda, ea quæ naturaliter excernuntur, & præter naturam retinentur; 3. Ad adhibenda, aer, & quæcunque extrinsecus corpus alterant, contundunt, secant, divellunt, &c. 4. Ad agenda, exercitia, motus, vigilæ, quibus opponuntur quies, præterea animi affectus. *Omnes causa procatacæ*

Occulta sive Interna causa originis suæ respectu, vel *Congenita* & *Nativa* est, vel *Ascititia*: *Internarum causarum* Congenita, in utero ab ipso ortu contrahitur: *Ascititia divisio*.

O

verò;

II.
*Congenita
causa Asciti-
cia.*

*Origo mor-
borum hære-
ditariarum*

*Alia divi-
sio internā-
rum causa-
rum.*

*Quid causa
antecedens?*

*Quid causa
Continens?*

verò; post ortum. Contrahitur autem in ortu, vel ex ipsis generationis principiis, & vitio uteri, vel externo alioquo errore, in formatione partium. Ac primum, naturali actione caloris nativi in humidū, corporis cōstitutio, sensum, decursu ætatis, ad mortem usque immutatur: præter naturam, à prava partium gignentium dispositione vitia quædam semini & materno sanguini communicantur, quæ iisdem foetus partibus innascuntur, unde morbi hæreditarii, ut phthisis, calculus, lepra, & similia atque hæ causæ occlutæ, ipsi substantiæ partium insunt, ut seminarium morborum; vel aptitudo ægrotandi, propter quàm à levi quacunque causa immutatur: aliquādo foetus in utero ipsam morbū cōtrahit.

Verum causæ omnes internæ, prout ad morbum producendum concurrunt, dividuntur in *αὐτογενέας*, id est, *Antecedentes*, & *ἐκλυέουσας*, id est, *Continentes*. *Antecedens* propriè causa est, quæ effectum antecedit & per se propriè tantisper durat, actuque movet, donec effectus constituatur, sive continens morbi causa in actum deducatur: Constituto enim effectum definit motus; & propriè causa antecedens actu adesse non dicitur. Nihilominus continens sub antecedente interdum contineri dicitur, ut plenitudo, & antecedens & continens causa à *Gal. lib. contra Iulianum*, vocatur; verum illa tantum antecedens sit continens, quæ cū morbo permanet, & immediata morbi causa est. Nam *Continens* causa, est propriè immediata & adæquata ipsius morbi causa, quæ autore Galeno, in ipsa effectus generatione essentiam habent, sive, cum effectum esse incipit, effectumque perpetuò fovet, ut pars essentialis morbi, ac qua posita ponitur, sublata tollitur effectus. Quare continens est per se causa, quatenus morbi actu sunt, à quorum essentia separari nequit; similiter, morbi sunt continentes causæ

finis.

uorum propriorum symptomatum, veluti humor crassus, infarctus ventriculis cerebri, continens causa est apoplexiæ, sive obstructionis ventriculorum; & tãdiu durat, quãdĩui ipsa obstructio: Similiter, obstructio illa, est continens causa repentinæ privationis functionis animalis. At antecedens & procatactica, tantũ sunt causæ rerum in potentia, vel adhuc motu nascentium, sive morborum in fieri: quare sublato motu & passione subjecti, permanet plerumque morbus, sed propriè nec antecedens, nec procatactica causa. Ita ignis calidæ intemperiei causa esse potest, quatenus alteratione sua intemperiem gignit, non quidem intemperiem actu fovet; & crassus humor, causa antecedens obstructionis dicitur, quatenus obstructionem gignere potest, & motu suo meatum occludit, aut obstructionem adhuc gignit, & non quia ingenua permanet & actu obstructionem continet, ita enim continens causa est. Nam propriè antecedens causa continentem in actum deducit, & antecedentem procatactica.

Quare in universum tria erunt causarum genera: verũ, ad cuiusque morbi productionem omnes necessariae non sunt, siquidem procatactica causa aut extrinsecus corpori, aut contentis vim infert, idẽ morbos excitat nunc per se sola, nunc per antecedentes causas, Deindẽ, causa antecedens cum se actu movet, (potest enim latere) aut per se morbum facit, aut mediante continente; & tum tres causæ concurrere possunt: sed Continens causa cum morbo incipit, & ut pars essentiae morbum continud fovet: quare à Contentiva sumitur indicatio semper curativa, à cæteris tantum præservativa.

Sunt nonnulli, qui in morbis Continentem causam esse dicunt nõ debitam proportionem constituentium, sive excessum & defectum componentium, ut in intemperie calida, calor auctus in parte,

O 2

pro

CAP.
II.

proportionem quam cum aliis qualitatibus habet, vitiat: Vitiata proportio qualitatum, excessu caloris partis constitutionem lædit, sive intemperiem calidam introducit: Quare illam vitiatam proportionem, sive excessum caloris, continentem causam intemperiei calidæ vocant: Nam non tollitur illa intemperies, nisi proportio corrupta à contrario, ad mediocritatem reducat. Verum ejusmodi proportio vitiata qualitatum excessu caloris in parte, ab ipsa constitutione sive intemperie calida propriè non differt, & formalis causa potius est.

*Quibus
morbis
propriè tri-
buatur
causa con-
tinens.*

Propriè autem illis morbis tribuitur continens causa, qui causam habent in parte permanentem & foventem, quæ sibi similem in parte non generat, nec se multiplicat, quod pletisquæ morbis Organicis convenit, & nonnullis in solutione continui, qui à materia distendente fiunt. Omnes autem morborum internæ causæ, vel in Continentibus sunt, id est, in ipsis partibus solidis, vel in Contentis; quibus addi poterunt spiritus. Ac primum, abortu vitio seminis & materni sanguinis ipsis partibus solidis causæ morborum hæreditariorum innascuntur: unde alii aliis morbis magis à natura obnoxii & opportuni sunt: ita, qui longo collo, & angusto pectore sunt Phthisi; qui angustas venas habent, obstructionibus; qui sicco & tenui corpore sunt hectici; qui calido & humido corpore, putridis morbis.

*Quarati-
one morbus
fiat morbi
causa.*

Præterea figura partis vitiata; aut tumor comprimens, meatum aliquem simul offendere solet, atque ita in parte morbus fit morbi causa. Verum, contentorum vitia morbi esse nequeunt, sed vel causæ morborum, ut partis alicujus constitutionem lædunt, vel symptomata, quatenus vitiatam constitutionem consequuntur.

*Contenta
duplicita,
sunt,*

Contenta autem duplicia sunt, alia naturalia quæ naturaliter ex alimentis gignuntur, omnibusque

que insunt, qualia sunt, humores alimentarii, & excrementitii, veluti, chylus, sanguis, pituita, bilis utraque, item feces, urina, semen, lac; His addi poterunt vapores utiles: ac etiam spiritus: Alia non naturalia sunt, quæ præter ordinem naturæ insunt, ut, pus, calculus, grando, vermis, flatus, fumosi vapores, & similia. Hæc sua natura noxia sunt, & inter causas insalubres semper numerantur: illa verò natura sua noxia non sunt; sed ubi naturæ legibus tenentur causæ salubres, ubi à naturæ modo discedunt, insalubres & morborum effectrices vocantur: Discedunt autem à naturæ modo vel quantitate sola, vel qualitate sola, vel utraque.

Ac primum qualitatis vitia, sunt vel in primis qualitatibus; excessus scilicet caloris vel frigoris, ac similia, &c. vel in secundis, ut lentor, crassities, acrimonia, malignitas, &c. veluti, si flava bilis in vitellinam aut atram convertatur, sanguis aduratur, & ex pituita naturali, salsa efficiatur. His addi poterunt putredo, inquinatio, & corruptio humorum. Præterea sub qualitate vitiosa comprehenduntur substantiæ alienæ & non naturales in corpore, ut calculi, lumbrici, pus, &c.

Deinde, quantitatis vitia in contentis propriè duo sunt, *Exuperantia*, ubi supra naturæ modum augmentur, & *Penuria*, quando infra naturæ modum deficiunt. Spiritibus verò unicum vitium quantitatis ratione accidit, nimirum, penuria. Verùm excrementorum immodica excretio, ac consuetarum vel temporariarum evacuationum, ut urinæ, fecum, hæmorrhoidum, mensium, & similium suppressiones, quia sensibus manifestæ sunt, evidentibus causis annumerantur; propriè verò, ut excrementa illa in corpore continentur & latent, morbosque redundantia sua excitant, antecedentes causæ vocantur.

1. Naturalia.

2. Non naturalia.

Contenta trifariam à natura modo discedunt.

Vitia contentorum in qualitate.

In quantitate.

II.

*De Plethora
eiusque dif-
ferentijs.*

Propriè autem & simpliciter solius sanguinis redundantia, deinde, omnium quatuor succorum æqualiter se habentium, *Plethora* dicitur: Impro-
priè verò, redundantia bilis flavæ atræ, aut pituitæ, *plethora* aliquando vocatur, sed cum adjectione tantum, nimirum, *plethora biliosa*, *plethora melan-
cholica*, *plethora pituitosa*. Nam ubi humoralis à sanguine solus redundat, *Cacochymia* propriè dicitur. Omnis *plethora* duplex est, aut quo ad vasa, vasorumq; capacitatem, aut quo ad vires. *Plethora* autem quo ad vasa est, quando humores tanta copia redundant, ut vasa in tumorem attollant, & distendant. Atque hæc *plethora*, si boni sanguinis sit, cum totius corporis rubore & tumore & pulsus magnitudine conjuncta erit, ac corporibus sanis, præcipuè verò juvenibus bono & liberali victu utentibus, accidit. *Plethora* verò quo ad vires, sive quæ viribus confertur, est, ubi ea tantum copia humorum fuerit, quæ vires corporis gravat & premit, & non propriè, quæ vasa distendit: quod evenit, ubi virtus aliqua occasione debilis, nequit copiam illam gubernare, unde à natura relicta, putrescit, & gravem *Cacochymiam* inducit. Fit non rarò, ut vasa nimia copia distendantur, & simul vires premantur, & tum conjungitur *plethora*, quæ ad vasa, cum ea, quæ viribus confertur, unde oritur composita *plethoræ* species. *Cacochymia* propriè est omnis vitiosi humoris in corpore redundantia sive vitio viscerum sive alimenti, quæ duplex primùm est: unà cum humoralis à sanguine quantitate modum exuperat, scil. bilis flava, melancholia, aut pituita, unde *cacochymia biliosa*, vel melancholica, vel pituitosa est, vel ex his composita. Altera quando qualitas humoris vitatur quantitate conveniente servata, veluti si sanguis, aut humoralis ita corrumpatur vel putrescat, ut à natura non regatur, hæc *cacochy-*

*Cacochy-
mia quid
est quatuor-
plex.*

Cochymia cum sensu gravitatis conjuncta est, & pul-
 su inæquali, proinde non minus, quam plethora
 quoad vires virtutem premit. Causæ autē omnis re- *Causæ o-*
 dundantiæ humoris in corpore vel externæ vel in- *mæ redun-*
 ternæ sunt; quæ vicissim ad tria genera reduci pore- *dantiæ hu-*
 runt; aliæ enim propriè efficientes; quædam ma- *morbū tripli-*
 teriam suppeditant; cæteræ humorem genitum præ- *ces sunt.*
 ter naturæ modum in corpore detinent. Efficiens au-
 tem causa sanguinis est calor immoderatus, modiceq;
 humidus; bilis calor immoderatus siccus, magis ad-
 huc moderatus, ubi gignitur bilis atra; causa pituitæ
 est calor debilis humidusque, melancholiæ siccus.

Quare ut à plethora incipiamus, Causæ re- *Causæ red-*
 dundantiæ sanguinis in corpore efficientes ex in- *dantis san-*
 ternis sunt calida humida corporis constitutio, *guinis sive*
 præcipuè jecoris & cordis, adolescentia, dein- *plethora.*
 dè ætas juvenilis; ex procata ætate vernalis tem-
 pus, regio aeris vè constitutio temperata, vita incun-
 da sine curis; materiam suppeditat, victus plenior, &
 liberalior ex alimentis boni succi multi nutrimenti,
 qualitatis moderatæ, substantiæ mediæ, cujus gene-
 ris sunt, carnes pullorum gallinaceorum, perdicum,
 turturum, vituli, hœdi, Juniorum animalium castrato-
 rum, ova recentia, panis similagineus, fermentatus,
 benè coctus, pisces saxatiles, vinum dulce, rubrum,
 &c. Detinent aut colligunt sanguinem in corpore,
 ocium, & solita exercitatio intermissa, suppressio
 consuetæ alicujus evacuationis sanguinis per ute-
 rum, hæmorrhoides, nares, phlebotomia consuetæ
 omissa, &c. Cacochymia biliosa causæ efficientes *Causa caco-*
 primū sunt viscerum intemperies calida sicca, quæ *chymia bi-*
 si augeatur, bilem flavam in vitellinam, hinc in atram *liosa.*
 convertit, deindè ætas Juvenilis, tempus æstivum,
 aerisq; constitutio calida sicca, vigilæ, ira, exercita-
 tiones & labores immodici: materiam suppedi-
 tant diata ex alimentis calidæ siccæ qualitatis,
 tenuis

II.

*Causa redun-
dantia me-
lancholia.*

tenuis substantiæ, quæ plerumque vel aëria sunt, vel
dulcia & pingua; detinent in corpore suppressi
evacuationis bilis à jecore & vesicula felle ad in-
testina, consueta purgatio bilis omissa, &c. Simili-
ter cacochymia melancholica causæ sunt, sicca to-
tius corporis, aut præcipuorum viscerum constitutio,
tatio, ætas ingravescens, tempus autumnale, aeris
que status inæqualis, interdum calidus siccus, in-
terdum frigidus siccus, vigiliæ, curæ, sollicitudines,
timor & tristitia, labores immodici; Materiam po-
tissimum suppeditant alimenta crassi succi, terrena
substantiæ, siccæ qualitatibus, ut caro animalium se-
niorum non castratorum, caro cervina, caprina, bu-
bula, leporina, carnes & pisces fumo indurati, au-
sale conditi, legumina, brassicæ, caseus verus, pani-
furfuraceus, potus vini nigri crassi, &c. Colliguntur
& detinent in corpore suppressio consueta eva-
cuationis melancholici per uterum aut hæmorrhoides
aut lienis venarumque obstructione, solita purgatio
melancholici prætermissa &c. Quarto redundan-

*Causa redun-
dantia pi-
tuitosi hu-
moris.*

tiæ humoris pituitosi causæ sunt præcipuorum vi-
scerum frigida humida intemperies, caloris nativi-
tanta debilitas, ut alimenta perfectè non concoquantur
sed cruda relinquantur, ætas decrepita, tempus hyber-
num, otium, animi tranquillitas, locus palustris,
somnia, frequens balneatio à cibo; materiam
suppeditant ebrietas, ingluviæ, alimenta refrigeran-
tia, humectantia, ut caro agnina, & animalium oc-
iosè viventium, pisces & volucres degentes in aquis
palustribus, fructus, fungi, potus vini, aut cerevisiæ
recentis, &c. Detinentur & coacervantur pituitosi
humores in corpore, suppressione consueta eva-
cuationis pituitæ per vomitum aut alvi dejectio-
nem, per nares, urinas sive spontè, sive auxilio artis,
exercitationes solitæ omissæ, &c. Tot modis pec-
cant nimia copia quatuor humores in corpore, à

sua

Causa corruptionis humorum

sua natura degenerant, & pravam qualitatem sive corruptelam contrahunt; primum ob pravam viscerum intemperiem, ut in leprosis, &c. Vel quia aduruntur, veluti quando bilis flava aut melancholica in atram bilem transmutatur, &c. Deindè quia in corpore putrescunt; putrescunt autem sive calor eorum natus à peregrino corrumpitur, Ubi vasorum natura per perspirationem, & ventilationem naturale temperamentum conservare, & juxta morem humoribus dominari nequit; propter obstructionem ipsorum vasorum, constipationem pororum cutis, & plenitudinem virescens. Tertio pravitatem contrahunt humores, ubi ex alimentis corruptis, praviq; succi & qualitatis generantur: tandem quia contagione quadam ab aere vitiato, aliisque externis causis & inquinamentis corrumpuntur. His speciebus cacochymia adduntur à nonnullis redundantia serosi sive aquosi humoris & flatus. Serum autem peculiaris humoris species non est, ut pituita: Nam quot species succorum in venis continentur, tot species quoque serosi humoris sunt; & quilibet humor suum serum habet, copiosissime tamen provenit in iis, quorum viscera frigida sunt, jecur aut lien obstructum, ex multo potu aquæ aut cerevisiæ tenuioris, ac ex cibis aquosæ substantiæ, ut sunt fructus horarii, &c. Detinent in corpore vis retentrix robusta, expultrix infirma, suppressio urinæ & consuetæ evacuationis per sudores, &c. Flatus verò crudiratis soboles est. Nam generatur ab imbecillitate concoctricis ventriculi, materiam non perfecte transmutantis. Causa flatus est, debilitas caloris nativi in ventriculo contracta, ex intemperie frigida, sine aut cum materia, vel per consensum ex obstructione lienis & venarum meseraicarum, &c. Materia ex qua fiunt flatus, est crassa frigida genita vel intra corpus, ut humores

Causa redundantie serosi humoris

Causa flatus

res crudi, pituitosi & melancholici; vel extra, ut alimentum crassa cruda, aut sua natura flatulenta, quali sunt fabæ, castanea, bulbi, rapæ, &c. De generatione flatuum latius capite de vitiis concoctionis dicitur.

Redundantia humorum secundum regiones corporis.

His modis humorum quantitas & qualitas vitatur. Verum redundantia illa, aliquando in toto corpore omnibusque vasis continetur, interdum in una regione vel parte corporis. Regiones autem tres sunt. *Prima* complectitur ventriculum, intestina, venas mesaraicas, lienem, & sinistram partem jecoris. *Secunda*: Vasa corporis majora à sinistram jecoris, scilicet, venam cavam, & arteriam magnam. *Tertia*: Venas & arterias minores, in ambitu totius corporis, & meatus partium. In singulis regionibus certa alimenti concoctio perficitur, & prior posteriori semper alimentum præparat, ut alibi dictum est. Sed posterior vicissim prioris vitia corrigere nequit, quare in singulis regionibus ac etiam regionis partibus, pro varia partium constitutione, varia etiam excrementa oriuntur; omnium interiorum morborum causæ. Nam in prima concoctione, vitio ventriculi aut alimentorum, gignitur cruditas; & corruptio. Deinde in secunda concoctione, ex prava dispositione hepatis, & ministrantium, scilicet, lienis & vesiculæ fellis, aut vitio chyli, sanguis vitatur: Unde Cacoehymia biliosa, pituitosa, vel melancholica in vasis majoribus relinquitur.

Dupliciter coacervatur in parte materia vitiosa.

Præterea in tertia regione, & usque singulis partibus, varia excrementa coacervantur, partium plerumque vitio, quæ alimentum suum non perfecte concoquunt & assimilant, nec excrementa sua discutiunt & aliena expellunt, Nam coacervatur in parte materia vitiosa, vel per *Congestionem*, vel per *Fluxionem*. Per congestionem, quando in parte gignitur proprio illius partis vitio; scilicet, ob debilitatem

atē virtutis concoctricis & expultricis. Per fluxionem verò; quia aliunde humorem suscipit, sive ab 1. Per con-
 gestionem.
 2. Per fluxionem.
 alicuius parte demandatur, & mittitur, vel partis mittentis ratione, vel recipientis, vel utriusque. Verum de his omnibus alibi latius agemus. Tandem ex
 tertia concoctione in partibus redundant interdum nonnulla, quæ vel naturalia sunt, ut semen & lac, vel præternaturalia, ut pus & sanies, quæ diu detenta in corpore, morbum efficiunt. Nam semen præter naturam detentum corrumpitur, & interdum calorem nativum strangulat, pessimaque symptomata inducit, ut docet Gal. 6. de Locis. Affect. cap. 5. Lac redundans in mammis non multò leviora mala inducit. Pus & sanies in parte diu retenta exulcerat, & depascit, febremque excitat, &c. Redundantiæ utilis succi, aut humorum opponitur Inanitio.

Communiter Inanitio est absentia vel defectus Inanitionis
 cuiusque corporis necessario requisiti ad salutem cause.
 nitatem conservandam: requiritur autem ad sanitatem debita quantitas substantiæ, partium solidarum, humorum & spirituum. Nam horum defectu sanitas labefactatur. Verum qui partes & spiritus rescipiuntur & nutriuntur ex humoribus; Ideo per Inanitionem intelligimus hîc potissimum defectum utilium humorum, unde non modò corpus extenuatur, sed etiam substantia coloris nativi & spirituum dissolvitur. Causa inanitionis est calida sicca corporis constitutio, rara textura, acerbis tenuibusque succis referta, vis retentrix debilis, expultrix valida, copiosæ evacuationes tam sensiles, quàm insensiles, aer calidus siccus, inedia aut victus tenuis, vigiliæ, exercitationes, aut labores immodici, curæ, sollicitudines, ac in summa, quæcunque substantiam corporis humorum aut spirituum dissipant aut consumunt.

Est

III.

*Causarum
efficientiū,
alia est Pri-
maria, alia
adiuvans,
alia sine
qua non.*

Est præterea causarum efficientium, ut ad effectum concurrunt, alia differentia, nimirum, quod alia sit *Primaria & principalis*, quæ propria ratione & per se sola vim agendi habet; Alia *Adiuvans*, quæ propria quidem ratione, sed non per se sola agere potest, nisi cum primaria jungatur. Quædam causa est *sine qua non*, quæ nec propria ratione, nec per se sola agit, sed ab iis quæ agunt, seungi nequit. De causis morborum in specie sequenti capite dicemus.

CAPUT III.

De morborum causis in specie.

*Causa mor-
borum par-
tium simili-
larium.*

DE communissimis omnium morborum causis earumq; differentiis supra egimus, consequens est, ut in specie singulorum morborum causas seorsim proponamus, initio facto à morbis *similari-um partium*, quarum constitutio læditur, vitiato temperamento sive proportionem qualitatum, excessu unius aut duarum; unde octo intemperies, quatuor simplices, quatuor compositæ, cum vel sine materiâ, ut jam dictum est. Hic excessus à causis externis potissimum oritur, aut per se, aut quatenus contentis vim inferunt, causamq; antecedentem in actum deducunt, quæ ad quatuor communissima genera sc. adhibenda, assumenda, agenda, & excreta retentaq; reduci poterunt.

*Causa in-
temperiei ca-
lida quinq;*

Ac primum *descripta calida* in parte aliquâ corporis vel in toto *quinque causa* præcipuæ à Galeno numerantur, nimirum vicina & contactus rei calidæ. 2. Motus improbus. 3. Putredo. 4. Constipatio. 5. Assumpta, id est alimenta & medicamen-
ta

ca calefacientia: Verùm hæ omnes pari modo non calefaciunt, sed aliquæ tantum per se immediatè; alteræ, ut ad aliud reducuntur, quod actu suo vim calefaciendi obtinent.

CAP.

III.

1. *Contactus*

Per se autem *vicinia* & *contactus rei calidioris* & *vicinia rei calide*.
per continuam alterationem, qualitatem sibi similem corpori paulatim imprimit, sive calidam intemperiem immediatè gignit, veluti aer ambiens ferventior vi ignis & radiorum solarium: mora in balneis diuturnior: item phlegmone, bubo, & similia, à quibus continenter vicinis partibus calor distribuitur, & cordi interdum communicatur, unde febres.

2. *Motus improbus*

Deindè sub *motu* omnia ea continentur, quæ nobis geruntur & proveniunt, ut sunt exercitia, labores, curæ, sollicitudines, vigiliæ, & ex animi affectibus imprimis ira. Excitat autem motus intemperiem calidam non per se immediatè, sed ut calorem nativum quasi sopitum, nimia agitatione suscitatur & diffundit, ac primum spiritus & humores, deinde partes solidiores accendit. Unde febres generantur, verùm ille motus, qui calorem nativum cum spiritibus non tam suscitatur & diffundit, quàm dissipat & dissolvit frigidam aliquando siccam intemperiem introducit.

3. *Putredo*

Tertiò *putredo* vel est humorum in vasis, unde febres putridæ, vel in habitu partium, ut quando tumor ad suppurationem deducitur, aut pars à septicis medicamentis corrumpitur. Putrescunt autem humores in vasis, ob plenitudinem, aut obstructionem à crassis humoribus impactis. Quæcunque verò putrescunt teste *Arist. 4. Meteor.* à sua natura discedunt, & corrupto calore nativo præter naturalem acquirunt. Deindè in rebus externis, ut in stercore columbino videmus putredinem tantam vim caloris gignere, ut flammam interdum excitet & comburat.

Quar-

CAP.

III.

4. *Consti-
patio mea-
trum.*

Quartò *constipatio* est pororum cutis & meatuum obturatio a frigore condensante, à balneis aluminosis frigidis & similibus. Hæc eatenus calorem non naturalem excitat, & febres gignit, quatenus transpirationem impedit, sive fuliginosos vapores diffusi non sinit. Ut enim hypocaustum calidū redditur, ubi accensi ignes, fores & fenestræ occluduntur, ita corpus nostrum incalescit obstructis poris & viis per quas calidi vapores exspirare debēt. Nam vestes & stragula non aliter nos calefaciunt, quam quod expirationes calidas impediant, quæ aliòquin exhalarent.

5. *Assum-
pta.*

Tandem *assumpta* ut sunt cibus, potus & medicamenta nō uno modo calidos morbos procreant. Quædam enim per se qualitate acri calidaque, ut esus allii, potus vini adusti; alia, ratione quantitatatis aut erroris alicujus. Quantitas autem nimia alimentorū, quia pabulū calori suppeditat, aut quia obstructiones & constipationes facit, calidos morbos procreat: Eodē modo, quantitas exigua, & inedia; quod pabuli defectu, calor in solidas partes vehementius agat, aut quia in cholericis bilem accendit unde febres biliosæ. Aliquando errore victus, calidi adfectus excitantur, veluti, si quæ facile concoquuntur, post alios cibos ingerantur, longiori morâ corrumpi & putrescere solent. Cum autem contrariorum effectuum contrariæ per se causæ sint teste *Arist. lib. de Ortu & Interitu*, cognitis causis per se discrasia calidæ, facilè erit per se causas frigidæ colligere. Frigidam autem intemperiem per se inducit quod frigidum est, immediatè sive contactu suo refrigerat. Verū quia multa refrigerant, quæ per se frigida non sunt, omnia refrigerantia *Galenus ad quinque capita præcipua reduxit*: ut sunt vicinia & contactus rei frigidæ 2. Assumptorum quantitas & qualitas. 3. Corporis raritas. 4. Constipatio. 5. Motus immo-
dicus, & ocium.

Frigida in-
temperiei
causa
quinque.

Vici-

Vicinia & contactus refrigerida, item assumptum & humorum frigiditas, immediatè intemperim frigidam inducunt; cætera mediante alio aut quatenus, calorem nativum *κρυαρόν* dissolvunt *refrigerida*.
minuunt, aut *κρυαρόν* suffocant & opprimunt.

Deinde ut ignis marcescit subtracto fomite; *a calor nativus minuitur subtracto caloris pabulo, id est, minima alimentorum copia, inedia & evacuationibus* *propterea nimia parva aut magna quantitas*.
propterea: & ut ignis pluribus admotis lignis opprimatur & extinguitur; ita calor nat. nimia alimentorum *aut magna quantitas*.
iam optimorum copia suffocatur, sive ut Hipp 1. Aphor. multis fomentis extinguitur: Idem faciunt cruditas, ingluvies, alimenta si non acta saltem potestate frigida.

Tertiò, ut flamma marcescit aere ambiente nimis calefacto à calore externo vehementiori & validiori: ita calor naturalis minuitur nimia raritate corporis, aut apertione pororum ab aere vel medicamentis *3. Corporis raritas.*
validis. Nam raritas illa calorem nativum nimis exalare & evolare finit.

Præterea ut eadem flamma extinguitur obstructis fornacum foraminibus, aere circumfuso nimis *4. Constipatio.*
constipato; Ita opprimitur calor nat. *constipatione & condensatione corporis.* Nam fuliginosi vapores, qui per poros jamdiu conclusos exspirare non potuerunt, calorem nativum interdum obruunt aliquando calor ipse intro coactus & conclusus primùm effervesceat, deinde absumpto pabulo elanguescit. Constipatio corporis duplex est, una pororum, & meatuum cutis, ab externis causis potissimum, ut aere frigido, balneis astringentibus, &c. Altera venarum & arteriarum à causis internis præcipuè, ut à plenitudine, valorum obstructione & interceptione, quibus adduntur vincula partibus injecta distributionem caloris à corde impediunt. Hæ causæ si nullam transpirandi viam relinquant, calorem nat. penitus

CAP.
III.s. Immo-
dicus mo-
tus &
quies.Sicca dis-
crasia cau-
sa quatuor.

penitus obruunt, mortemque inducunt, constipatio tanta non fit, expirationem vaporum tam fuliginosorum & acrim ab acribus humoribus, quam halituosorum & benignorum à bono sanguine impedit. Sed ubi benignorum vaporum à bono sanguine impedita transpiratio est, nisi accedat exercitatio, plethora oritur; ubi verò fuliginosorum magna copia est, calor nat. plerumque opprimitur: si parva sit, febris tantum excitatur. Tandem ut flamma ad sui incrementum eventilatione & motu indiget ad ventitio, sed non immodico. Mater sine omni motu languescit, & exigua flamma, si flabello leniter ventiletur, crescit; si immodicè, dissipatur & dissolvitur: Ita moderata exercitia nativum calorem conservant; immoderata dissipant & dissolvunt, & substantiam spirituum & virum exhaustiunt, atque curatione refrigerant. Otium verò & somnus calorem spiritus torpescere sinunt.

Tertiò Cause sicca d. siccitas alia per se exsiccant, alia tantum quia humores & humiditates dissolvunt & minuant. Ac primum ex iis, quæ admoventur, exsiccant, aeris sicca constitutio, balnea sulphurea, salsa, aluminosa. Deinde ex assumptis medicamentis & alimentis siccantia, ut sunt salsa, acerba, item calefacientia, quæ humores dissolvunt, nimirum acria, præterea sitis, & alimenti paucitas. Tertiò nimis verò Venus immodica, ac siccorum quoque humorum scilicet bilis retentio, siccos morbos producit, item obstructions & quæcunque distributionem sanguinis impediunt, unde partes defectu alimenti marcescunt. Tandem ex agendis, longæ & vehementes exercitationes, curæ, sollicitudines, dolores, vigiliæ, &c. exsiccant, quatenus spiritus exhaustiunt ac fomitem caloris nat. dissolvunt & dissipant, ac in summa corpus suâ natura siccum in

in siccam intemperiem facile incidit, non solum nimirum usu rerum exiccantium, sed etiam si plus è corpore transpiret quàm nutriatur, & præsertim si accesserint curæ, labores, vigiliæ immodicæ, &c.

Humida dyscrasia causa primum in iis, quæ admoventur sunt, aer humidus ex pluvia, & vento austrino, balnea aquæ dulcis præcipuè à cibo, frictiones molles. *Secundò* ex assumptis, alimenta & medicamenta humectantia, potus longior imprimis aquæ, ciborum copia, &c. *Tertiò* excretio humorum siccorum, & retentio humorum nimirum pituitæ. *Tandem* ex agendis, ocium, somnus, lætitia, animi tranquillitas, mollis educatio, motus mediocris post cibos.

His modis dyscrasiæ simplices oriuntur; compositæ verò *intemperies compositas habent causas*, & quot modis complicantur causæ, tot modis simplices dyscrasiæ. Quare si calida causa & sicca simul in eodem coeant, calidus siccusque morbus concitatur. Eadem in cæteris causis non contrariis ratio est, unde intemperies composita calida humida, frigida sicca, frigida humida. Verum non rarò contingit, ut contrariis ex causis corpus ex æquo lædatur & simul à calido & frigido, vel à sicco & humido afficiatur, unde inæqualis intemperies oritur. Dyscrasiæ compositæ aut sine materiâ & antecedente causâ sunt; aut cum materiâ: quæ sine materiâ, causas habent compositas de his, quas retulimus: quæ verò cum materiâ, unam habent causam immediatam, humorem aliquem, qui pro natura sua corpus alterat: & interdum cum tumore præter naturam complicantur, aliquando sine tumore sunt. Nam ubi humor præter naturam in parte coactatus & impactus est cum distensione, oritur tumor præter naturam; ubi sine distensione in cavitate aut substantia partis tantum collectus est, pro sua

*Humida
dyscrasia
causa quatuor.*

Compositarum intemperierum cause.

CAP.
III.Causa tu-
morū pra-
ter natu-
ram.

Congestio.

In fluxio-
ne quatuor
or consi-
derantur.

1. Materia

2. Pars
mandans

natura intemperiem cum materia producit: Veluti sanguis, calidam humidam, pituita, frigidam humidam; bilis calidam siccam melancholia frigidam siccam; mixti humores mixtam & inæqualem intemperiem.

Tumores autem qui cum discrasiiis compositis & inæqualibus sæpè complicantur, ab humoribus in parte coacervatis distensionemque facientibus gignuntur. Coacervatur humor copiosus in parte duobus modis: primò *congestione*, quando in ipsa parte gignitur & colligitur: deinde *fluxione*, quando aliunde in partem affectam confluit. Congeritur in parte humor, aut quia alimentum non ritè concoquitur, nec in substantiam partis convertitur; aut quia excrementa in concoctione in redundantia nō excernuntur & discutuntur. Quod autem in substantiam partis non convertatur, fit aut ex imbecillitate facultatis concoctricis, aut vitio alimenti attracti: quòd verò pars non ritè excrementa sua expellat, ob imbecillitatem excrettricis facultatis evenit; aliquando ob obstructionem, aut constipationem meatuum per quos excrementa exacuari solent.

Influxione autem, quæ nihil aliud est, quam motus materiæ ab uno membro in aliud, *quatuor considerantur*. Primò membrum mittens sive mandans terminus à quo: *Secundò* membrum recipiens, terminus ad quem: *Tertiò* materia ipsa quæ movetur: *Quartò* spatium & via per quam.

Materia per se non movetur nisi tenuior sit, ac viæ patentes ac pròclives, sed ab alio potissimum concitata, & vel à membro mandante per *āsciv* pulsionem, vel per *īciv*. A mandante verò pellitur vi facultatis expultricis irritatæ nimia copia aut qualitate materiæ. Naturaliter vero partes nobiliores & robustiores ad ignobiliores & imbecilliores materiam inutilem semper deponunt, nisi impedian-

GUR

tur: proinde quod ab omnibus robustioribus partibus expellitur, & nullibi consistere queat, ad omnium imbecillissimam & debilissimam partem cutem scilicet tandem pervenit.

CAP.
III.

3. Pars recipientis.

A membró recipiente attrahitur humor, præcipuè ob calorem non naturalem, minùs propriè ob dolorum quatenus dolor fluxiones concitat, vicinasque partes commover, ut spiritum & sanguinem tanquam auxiliares copias ad partem dolentem transmittat. Suscipit vero in se pars humorem influentem ratione imbecillitatis sive illa nativa, sive adsciticia sit: deinde ratione laxitatis meatuum tertio situs declivioris & consensus cum parte mittente. Redundat quidem materia copiosa in membró mittente per congestionem, vel per attractionem aut transmissionem, sed in eo non retinetur; verùm ubi molesta esse ceperit, vi & robore expultricis facultatis in partes imbecilliores extruditur, ac ut extrudi queat, conferunt materiæ tenuitas, viarum proclivitas & rectitudo, meatuum amplitudo. Quando autem in parte aliqua humor per congestionem vel affluxionem collectus fuerit, ei que impactus, à sua naturâ necessario discedit, & aliquo modo corrumpitur aut putrescit: interdum malignitatem aliquam acquirit, ac simul proprium partis nutrimentum, aliquando etiam partem ipsam in suam naturam convertit. Atque hinc intelligitur, quare morbi nonnulli ex intemperie cum materia intermissione habeant, statisque periodis & temporibus recurrant, nimirum quia pars æquali tempore æqualia excrementa congerit aut aliunde suscipit.

Quatuor
vie.

Causa tu-

morum in

specie.

Differentia

tumorum.

Hoc modo per fluxionem vel congestionem tumores gignuntur. Tumores præter naturam, hæc tantum intelligo, qui sunt ab humore parti impacto: Nam tumores dupliciter oriuntur, uno modo ex humore im-

P 2

impact

CAP.
III.

pacto, alio ex decubitu partis, ut *ἐν προσηλή*, &c. Illi propriè sunt intemperies compositaë cum aucta magnitudine, & solutione continui. Differentia & species horum tumorum oriuntur ex differentiis humorum. Humores autem quatuor sunt: sanguis, cholera, melancholia & pituita, quorum quilibet in parte vel sincerus est, vel alteri permixtus, vel naturalis vel non naturalis.

*Τυμῶνές
ἐκ τοῦ σίτι.
φλεγμονή.*

ἰδιόησες,

*ἰερυσίπε-
λας.*

σκίρρ' ρ'

Primum igitur omnes tumores, quibus ad est dolor & fervor, Græci *φλεγμονὰς* communiter appellant. Propriè tumor ex sanguine sincero calidus rubens, renitens cum dolore pulsatio *ῥίο φλεγμονή* vocatur. Deinde ex pituita sincera in toto corpore fit Anasarca in parte aliqua œdema tumor frigidus, latus, mollis, indolens, albi coloris. Tertiò ex bile flava generatur erysipelas, ardor cum dolore pungente in summam cutem effusus; Ex humore melancholico naturali sincero generatur scirrhus exquisitus tumor, durus, concolor, doloris expers, ac etiam in cute macula nigra, quæ Melasmatæ dicuntur & vitiligo nigra.

*Tumores
illegitimi*

Ex humoribus naturalibus non sinceris sed permixtis oriuntur illegitimæ species tumorum, veluti si sanguini redundantem misceatur bilis, aut pituita phlegmone erysipelatodes, aut œdematodes: si bili redundantem permisceatur sanguis, aut melancholia erysipelas phlegmonodes, aut scirrholes, eadem in cæteris ratio est.

*Furuncu-
lus.*

Ex his humoribus ut à naturæ modo recedunt, excitantur cæteræ species tumorum, veluti à sanguine crasso furunculus, tuberculum durum ovi columbine magnitudinis cum ingenti dolore, deinde ex crasso, adusto, corruptoq; sanguine, qui plerumque venenatam qualitatem assecutus est, carbunculus, tumor ferventissimus cum ulcere crustaceo.

*Carbun-
culum.*

Ex

DE CAUS. MORB. IN SPEC. 229

Ex pituita non naturali variæ species tumorum excitantur: sub pituita non naturali comprehendimus hîc aquosos & serosos humores, deinde flatus & flatulentos humores, tertio pituitam salisam, quarto crassam & mucilaginosam, tandem gypseam. A serosis humoribus fiunt tumores serosi, sub quibus continetur ascites, ex flatibus ἐμφυσήματα. Ex pituita salsa nitrosa scabies in corpore Achores tumores cum parvis ulceribus ex crassa mucilaginosa corrupta, abscessus illi, in quibus aliquid melli, pulticulæ, aut sevo simile apparet, unde melicerides Atheromata & steatomata vocantur, ex crassa salsa pituita ulcera fistulosa; ex pituita gypsea genus Scirrhi minus exquisitum, sub quo contipetur struma ex materia crassa collecta inter cutem & asperam arteriam; Deinde ganglion tumor durus circa articulos; & glandula circa adenes; item verrucæ & clavi.

Præterea bilis non naturalis crassa mordax cutem exedens, herpetem exedentem; tenuis minus acris herpetem miliarem à pustulis exiguis frequentibus, quæ milio similes sunt; quibus cognatæ sunt φλυκταίναι pustulæ ex ferventissima bile, flava bilis adusta: ulcera cancrofa & φαρμάδαινα excitat. Sed hi affectus ad atram bilem potius referuntur.

Melancholia autem non naturalis, sive atra bilis gignitur ex adustione vel melancholiæ naturalis, vel bilis flavæ, vel sanguinis, peculiariter sanguis dum aduritur pars tenuior in bilem flavam, pars crassior in atram transit, ex hac carbunculi fiunt, ut jam dictum est. Ex atra bile crassa corrupta in habitum totius corporis effusa Elephantiasis; in parte cancer generatur; ex atra minus crassa & corrupta impetigo & psora Græcorum, atra ex adustione bilis flavæ, ulcera cancrofa & depascentia efficit.

P 3 Hæc

C A P.
I I I.

Tumores
ex pituita
nō naturali.

Ascites.

ἐμφυσήματα.

Achores.

Mel. ceri-
des.

Atheroma-
ta.

Steatoma-
ta.

Scirrhus nō
exquisitus

Struma.

Ganglion.

Glandula

Tumores ex
bile non na-
turali.

Herpes.

φλυκταίναι.

Ulcera can-
crofa.

Tumores

ex melan-

cholia non

naturali.

Cancer.

Impetigo.

III.

*Tumores
partium.*

Hæc sunt præcipua tumorum præter naturam genera, quæ pro partis ratione interdum denominantur. Nam phlegmone oculi, ophthalmia; faucium, Angina; pulmonum, peripneumonia; pleuræ, pleuritis; glandularum post aures, parotis dicitur, &c. Item inflammatio adenum & propriè in inguine bubo; quæ si ex puro sanguine fit, & ad suppurationem tendat Phyma; si aliquid bilis permixtum habeat phlegethlon appellatur: similiter serofus tumor scroti, hydrocele; flatulentus tumor abdominis, tympanites nominatur, &c.

*Bubo. Phyma
Phlegethlon.*

Morborum

*partium organorum
partium
causæ.*

*Figura vitii
ata causæ.*

Consequens est ut ad causas morborum organorum partium perveniamus, initio facto à morbis conformationis, qui vel sunt in figura, vel superficie, vel cavitatibus & meatibus. Oritur figura vitii multis modis. Primum, in ipso utero & in primâ conformatione partium, ob imbecillitatem facultatis formatricis sive motum naturalem spermatis impeditum, vel vitio materiæ in quantitate & qualitate, aliquando errore aliquo, à causa externa comprimente. Deinde in ipso partu vitiiatur figura, quando suscipitur, & ob infantis magnitudinem, & viarum angustiam, ubi cum difficultate extrahitur. Præterea à partu figura vitiiatur, vel in tenebris adhuc, vel in iis qui firmâ ætate sunt: tenebris, quia membra adhuc mollia & flexilia sunt, distorquentur faciliè, si alia à nutrice arctius deligentur aut inæqualiter tendantur; alia leviora relinquantur, item si nimis citò ingredi permittantur, vel si crura intrò distorqueantur, pedes extra, ut in variis & varis, aut contra, ut in valgibus. Distorquentur membra, & figura naturalis partium tam in infantibus quàm ætate proVectis mutatur, primum, a vi aliquâ externa frangente, comprimente, collident: secundo erroribus ipsius laborantis, aut alterius, ut Medici, qui collisa, contracta & luxata vitio-

nitiosè reponit: tertio ob nimiam copiam & inopia-
 m alimenti, sicut iis evenit, qui aut nimium
 crassi facti sunt, aut jam contabuerunt, sive in unâ
 corporis parte sive in toto, ut in phthisicis; item
 ob materiæ crassitiem & siccitatem, ut in Elephan-
 tiacis. Tandem ex accidenti propter alios morbos
 veluti ob distensionem, resolutionem, aut sectio-
 nem per transversum, nervorum, tendinum, & mu-
 sculorum figura vitatur. Resoluto enim & secto
 per transversum nervo aut tendine, pars à contrari-
 s musculis illæsis attrahitur: distensio verò sive sit
 ex convulsione sive ex inflammatione sive cicatrice
 durâ, partem proximam tendit attrahitque, atque
 ita figuram membri pervertit. Huc referuntur luxati-
 ones articulorum aliaq; structuræ vitia.

Secundus morbus conformationis, est superfici-
 ei asperitas vel lævitas non naturalis actionem læ-
 dens. Exasperatur autem pars præter naturam à
 materiâ acri abstergente & abradente, superficiem
 inæqualem reddente. Ea materia interdum est cibus: *Causa mor-*
 potus, aut medicamentum, plerumque humor ali- *borum con-*
 quis, nimirum pituita salsa, flava bilis, vel atra, cor- *formatio-*
 rupta, à quibus intestina non rarò exasperantur & *nis.*
 exulcerantur: quæ enim exasperant, si invaluerint
 exulcerare & corradere solent. Huc addi poterunt
 vapores acres, item pulveres & fumi, à quibus o-
 culi & fauces non rarò exasperantur. Lævitas fit
 quando omnes superficiæ particulæ æquantur, quod
 duobus modis contingit, vel cum aliquid iis dicitur,
 quæ inter se diffident, vel quando detrahuntur par-
 ticular, quæ præ cæteris eminent. Hoc autem deter-
 gentibus fit, licet detergentia exasperandi vim habe-
 ant, illud ab humoribus pinguibus, lentis & hume-
 ctantibus.

III.

*Causa aper-
tionis mea-
tuum & ca-
vitalum.*

Præterea *vitæ in meatibus sunt dilatatio & angustia*, sub meatibus comprehendimus hic non solum venas & arterias, in quibus continetur sanguis, sed etiam omnes cavitates sinus & canales, ac etiam parva foramina & poros. Apertionis autem & dilatationis meatuum causæ sunt plures. Nam laxantia emolliendo, & rarefacientia externuando dilatant: amara & acia incidendo expurgandoque orificia vasorum aperiunt: ac non raro expultrina vehementius concitata copia & qualitate contentorum, vasa nimium dilatat & orificia recludit: interdum retentrix imbecillis, orificia non bene claudit: aliquando non accedit, quod secundum naturam vias claudere debet, ut si in cerebrum non ascendant vapores à quibus somnus. Ex vase aperte humor contentus effluit; effluit autem sanguis ex vasis tribus modis, uno per ἀνασόμεωσιν, id est orificiorum vasorum apertionem à causis jam enumeratis, deinde per διασπόμεωσιν, dum per tunicas vasorum transcolatur ob humoris contenti tenuitatem, & vasorum raritatem & laxitatem, tertio per διαίρεσιν, qualis est ruptio, sectio, erosio vasorum, quæ species morbus conformationis non est, sed solutæ unitatis.

*Causa angu-
stia mea-
tuum.*

Angustia & occlusionis meatuum plures sunt differentiæ pro varietate causarum, ut alibi dictum est. Nam subsidentia oritur, quando latera meatuum contrahuntur vel coincidunt: contrahuntur ab adstringentibus, refrigerantibus, vel siccantibus; coincidunt ob evacuationem eorum contentorum, quæ in meatu contineri debent. Secundò, coalescentia fit ulcere, vel vulnere, quando interiores superficie partes adhærescunt & conglutinantur. Tertio, constipatio à quocunque tumore vel tuberculo in substantiâ partis, meatum interiorem occupante.

capante. Quartò obstructio ab humoribus viscosis & lentis, meatui impactis: item à lapide, grumo, & similibus. Postremò, compressio fit à quocunque extrinsecus constringente & comprimente, ut sunt vincula, tumores comprimentes. His additur in vesica & similibus organis nimia distentio, ut inde meatus seu orificium ejus occludatur, & corpus sese contrahere, aut à se expellere nequeat. Distentio ista oritur vel à tumore tendente & contrahente substantiam vasis, & potiss. cervicem ejusdem, vel à copia humoris cavitatem replentis, quod illis accidit, qui urinam diutiùs, quàm par est, retinent. Oritur autem coarctatio vel meatus angustia aut occlusio aliquando in utero, errore formativis; plerumque post.

Secundum genus morborum organicorum *Causa mor-
est magnitudo præter naturam aucta vel diminuta. borum in*
Aucta magnitudo partis ex rebus ipsis naturalibus *magnitudi-
servatâ debitâ figurâ, à copiâ utilis materiæ & vi-
ne.*
rum robore oritur; at aucta magnitudo ex rebus
non naturalibus, ut tumores præter naturam ex aliis
causis provenit. Nam partes tumidæ redduntur
sive præter naturam tumorem contrahunt, vel
ob coacervationem inutilis humoris in substantia
partis, ut in inflammatione, cedemate, &c. vel per decubitus
partis unius in alterius cavitatem, ut tumor
scroti in Enterocoele; inguinum in bubonocoele, &c.
Illud genus tumoris est aucta magnitudo cum
intemperie, de cujus differentiis & causis supra dictum
est. Decumbit verò pars in cavitatem alterius eam mole
sua distendens, quia à loco suo excidit ruptis aut
laxatis ligamentis aut membranis. Quare respectu
partis, quæ intumescit ejusmodi morbi erunt in
magnitudine aucta; respectu verò partis, quæ
illabitur, morbi in situ. Minuunt verò magnitudinem
virium imbecillitas, & penuria

*Causa o-
mnium tu-
morum.*

*Causa tu-
morum ex
decubitu
partis.*

P s mate-

C A P.
I I I.

materiae utilis, scilicet ubi plus digeritur, quam apponitur, idem sectio, ustio, putrefactio, frigus, &c.

Causa morborum numeri. Tertiò *morbos numeri* in exuperantiâ & defectu rei alicujus præter naturam consistit ab ortu, vel post. Exuperantia autem morbifica non est rei naturalis, quæ actionem non lædit, sed non necessariarum rerum, vel adhaerentium illis, quæ in naturali habitu sunt sub naturali specie, ut polypus, pterygium, &c. vel toto genere præter naturam, ut calculi & simil. Omnis autem exsuperantia oritur a validâ virtute expultrice, & superfluitate materiae. Verum quæ sub naturali specie partibus adhærent, ex redundantia materiae utilis oriuntur, quæ toto genere præter naturam sunt, ex inutili materiâ. Defectus autem rei naturalis ex toto vel parte causæ sunt, putredo, sectio, ustio, nimia refrigeratio, &c.

Causa morborum in consensu & situ.

Tandem *vitiata structura in connexionione* sive consensu est, quando ea uniuntur vel disjunguntur, quæ uniri aut disjungi non debent: & in situ, quando è naturali loco pars abit. Abit autem pars a loco naturali, ruptis & laxatis vinculis quibus continentur: aut abrupto meatu, ut in *ἐπεροκλήη* procidentia uteri, & simil. Item intentis & contractis ligamentis, ut in uteri ascensu & declinatione. Contrahuntur autem ligamenta, si nimio humore repleantur aut exsiccantur; laxantur autem ab emollientibus: rumpuntur ab iis, quæ unitatem solvunt. Denique à vehementi motu, à casu & compressione partes à suis sedibus removentur, & visceris alicujus fibra complicatur. Articulis verò luxatio accidit, nonnunquam à motu violento & contorsione, aliquando ab articulorum immodicâ humectatione, totam articulationem lubricam reddente & lignamenta laxante. Interdum articuli ipsi suis sedibus excidunt, ubi suscipientis cavitas debito angustior est, ob tumorem vel castum circa articulum; aut laxior

maxior debito, ob id quia sinuum supercilia circumfranguntur, ac corylæ ab ortu minus capaces aut penitus in superficie factæ fuere. Connexio partium irritatur, si, quibus continentur, ligamenta relaxentur, contrahantur, aut abrumpantur, &c. Coalescunt verò, quæ coalescere non debent, ulcere, vulnere, & similibus.

Ultimum genus morborum tam similaribus, *Causa soluta* quam dissimilaribus commune est *unitatis solutio, tione cōtinui.* cujus variæ sunt differentiæ pro causarum diversitate. Causæ autem vel externæ, vel internæ sunt, quæ omnes ad quatuor genera reducuntur, scilicet 1. ad incidentia. 2. erodentia. 3. frangentia & contundentia. 4. distendentia & disrumpentia. Sub incidentibus continentur quæcunque vulnerant & pungunt, sive cæsum vel punctum partem dividunt, qualia sunt acuta corpora & tenuia, ut gladius, sica, &c. Item morsus ferarum, & similes causæ externæ. Erodunt & exulcerant propriè acria & mordacia, ut sunt medicamenta caustica septica & acria, ignis, &c. ex causis internis, humores corrupti acres & putridi, ut bilis flava atra, pituita salsa, &c. Contundunt & frangunt causæ tantum externæ, item corpora gravia, obtusa & dura, diversâ tamen ratione. Nam dura, obtusa, propriè ea frangunt, quæ tactui non cedunt, qualia sunt ossa. Contundunt verò & collidunt, quæ tactui & impressioni cedere possunt, ut sunt mollia. Huc referuntur calus ab alto, percussiones, saltus, lucta, &c. Tandem distendunt, disrumpunt, & convellunt quæcunque partem nimium replent, ut flatus aut humores impacti unde tumores: deinde quæ nimium evacuant & contrahunt. Fit autem convulsio propriè dicta teste Hippocrate, à repletionem, vel inanitionem. Præterea quædam quoque distrahendo & lacerando continuum dissolvunt & disrumpunt, ut violenta tractio partis fune aut loquco, &c.

Hæ

III.

Causa dif- Hæ sunt simplicium morborum causæ primariæ
ferent. ac Compositorum verò morborum causæ ex his sim-
eidem aliis. plicibus componuntur & intelliguntur. Restant
causa differentiarum accidentalium, quæ morbum
 morbi causas, & subjecta consequuntur.

Ac primam, cum *Omnis morbus magnus aut*
Causa mor- parvus dicatur ex effectus quantitate, cognita pro-
bi parvi & pria cuiusque affectus causâ facile erit intelligere
magni. causam magnam vel parvam, affectum absolute par-
 vum vel magnum ejus generis facere posse. At rati-
 one loci & functionis læsæ interdum fieri solet, ut
 effectus magnus dicatur, qui suâ naturâ parvus sit,
 causamq; debilem habet, ut alibi dictum est.

Secundò, *morbis brevis* dicitur, qui celeriter
Causa mor- ad terminum sanitatem vel mortem tendit, nimi-
bi brevis & rum qui citò vincit, aut vincitur: contra *longus*
longi. qui tardè. Quòd citò vel tardè à naturâ vincatur,
 aut naturam vincat causæ sunt, primò, ipsius morbi
 forma vel natura: secundò magnitudo morbi: ter-
 tiò vehementia causæ morbificæ: quartò partis af-
 fectæ conditio & totius corporis dispositio: tan-
 dem robur virium & imbecillitas. Verùm in saluta-
 ribus & lethalibus morbis eadem ratio non est.
 nam quò lethalis morbus major est, eò semper bre-
 vior, minor eò longior. In salutaribus contra-
 rium non rarò evenire solet. Deinde in lethalibus,
 quò virtus imbecillior, eò morbus brevior, & quò
 robustior eò longior. In salubribus semper con-
 trarium est. Verùm de his in Prognosticis dicetur.

Ex prædictis intelliguntur *causa morborum a-*
Causa mor- cutorum, qui simul breves & magni sunt, ac quatu-
borum acu- or universalia tempora celeriter & cum vehemen-
torum, on- tiâ percurrunt. Ea universalia tempora, ut alibi di-
etinentium, ctum est, Galeno motiones causarum morbifica-
intermitten- rum dicuntur. nam ex motionibus causarum ori-
tium. untur & dependent. Hæ motiones si continuæ fue-
 rint,

ut morbus erit *continuus*; sin interrupta, *morbis* e-
t *intermittens*. Nam ubi causa morifica unica est,
ex tota materia actu simul, continenter mover;
morbosquē continuos facit sine ullis periodis. Sin
materia tota simul non sit, nec tota simul se com-
moveat, sed certis quibusdam periodis ad partem
affectam confluat, aut per congestionem in parte
colligatur, similem motum efficit nimirum non ab-
solutē unum, sed pluribus periodis distinctum; vel
ine intermedia quiete, ut in tertiana continua, vel
um intermedia quiete ut in febribus intermitten-
tibus, Epilepsia, Cephalica, & simil. Quomodo verò
colligatur parte humor, supra dictum est.

Tertiò, *morbi moris sive maligni* à malignis
benigni à benignis oriuntur. Malignæ autem sunt
causæ, quæ non solum natura sua vehementer a-
gunt; sed etiam quæ latentem lædendi vim habent,
ut venena, bilis atra, & flava adusta; ac in summa
omnes penè humores putredine corrupti. Nam
quò humor à natura sua magis immutatur, eò ma-
lignior est. Fit tamen ut eadem causa ratione partiū
diversarum, nunc benigna, nunc maligna dicatur;
veluti punctio partis carnosæ benigna, partis ner-
vosæ maligna iudicatur.

Quartò, *absolutē salutaris morbi causa* sunt
quæ naturæ aut artis opera planè vincuntur; contra
absolutē lethales. quæ naturam planè prosternunt.
Prosternunt autem aut sua natura & facultate, ut
venena & maligni humores: aut magnitudine, ut
vehementissima refrigeratio: aut partis ratione
quam afficiunt, ut apoplexia: Item levis affectio in
principe parte, & præcipuè corde lethalis est; at
magna, parte ignobili absolutē lethalis non est,
ut podagra, elephantiasis: his adde virium robur &
debilitatem. Morbus verò secundum quid salutaris
vel lethalis causam habet materiam, quæ permuta-
tione

III.

*Causa
morborum
in habitu.
& habitu
dine, &c.*

tione sua affectum alium curabilem vel incurabilem relinquit.

Præterea, morbus factus nullam antecedentem causam sive *æqualitatem* actu conjunctam habet; sed ea præfuit morbumque perfecit. At fientes morbi ejus modi causam necessario requirunt. Deinde *morbus in habitu* a causâ validâ & durabili oriuntur, quæ morbum planè absolvunt; contra *morbus in habitu dine*. Inæqualis morbus, qui inæqualiter partes afficit in quibus consistit, causas habent, quæ non ex æquo omnes, quas lædunt, membri partes afficiunt; vel quæ contrariis motibus infestent, contrariæque sunt, qualis affectus est in comate vigilante. Causæ morborum æqualium omnes partes ex æquo afficiunt, & contrariæ non sunt. De causa morborum per se, & ex consensu, item primariorum & secundariorum in primo capite dictum fuit.

*Causa
morborum
communium.*

Tandem in morbis publicè grassantibus, aut illa Hippocratis regula *libr. de Nat. Hum.* observanda est: Cum unâ ægritudine plures eodem tempore homines sine discrimine corripiantur: nimirum juvenes, senes; scemina, mares; temperantes & intemperantes & dissimili victu utentes, causam ad id rejicere debemus, quod maximè commune est, & quo omnes utuntur. Id autem est aer ambiens, quem accipimus reddimusque, interdum ipsa aqua, præcipuè in Endemiis morbis. Quando vero eodem tempore plures diversi morbi gi-gnuntur, causa sine dubio est propria cujusque victus ratio. Viriata autem aer in Endemiis, vitio ipsius loci a pravis vaporibus perpetuo exhalantibus ex terra vel aquis. At in morbis Epidemiis, qui certo tempore sæviunt, inquinatur aer por-fissimum syderum maligno influxu, & perniciosâ qualitate cœlitus demissâ, ac præpâ temporum

con-

DE SYMPTOMATIBUS.

239

CAP.
IV.

constitutione: interdum exde hominum, sordibus
& similibus inquinamentis ex terra vel aqua. Cæ-
terarum differentiarum causæ ex se facile intelli-
guntur.

CAPUT IV.

De Symptomatibus & Symptomatum differentiis.

Tertium genus rerum præternaturalium est,
quod morbum umbræ ritu consequitur, & à
Medicis *σύνπτωμα* propriè vocatur. Sumitur
autem vocabulum Symptomatis non uno modo:
Nam si vocis significationem spectes, quæ Latinis
est concasus, à *συνπτωω*, i. simul cado, nihil aliud
erit, quàm *συνεσθῆναι*, à *συνεβαίνω*, quod idem signi-
ficat: quare quicquid alicui accidit, aut aliud conse-
quitur, siue secundum, siue præter naturam, ipsius
σύνπτωμα dici poterit. Nihilominus usus invaluit,
ut à Medicis id solû latissima quoque significatione
indicatur Symptoma, quod animato corpori præter
naturâ inest. Nâ à Galeno 1. de Sympt. diff. p. 2. Sym-
ptoma bifariam accipitur: Uno communiter, ut o-
mnia sine discrimine complectatur, quæcunque a-
nimali præter naturam accidunt. Qua significatione
non solum morborum accidentia, sed etiam omnes Sympto-
ma morbi, morborumque causæ symptomata dicun-
tur.

*ma large
sumptum*

Alio propriè & speciatim accipitur, ut à mor-
bis, morborumque causis distinguitur, pro eo tan-
tùm, quod morbos propriè consequitur, aut à mor-
bis provenit: Unde alio nomine *ἐπὶ τῶν νοσούντων*, id est, priè sym-
super. ptoma.

supervenienti & supergenitum vocatur. Nam ut à
libi dictum est, constitutio ipsa, quæ primùm actio-
nem lædit, morbus est; quod morbum producit
ipsius causa: quod morbum consequitur, sympto-
ma propriè dicitur, à nonnullis ἐπιγεννημα.

Definitio
symptomati-
tis.

Quare *σύνπτωμα* propriè erit affectus cor-
poris viventis præter naturam, morbum umbra-
ritu consequens. Affectum dico, non propria si-
gnificatione, ut in morbi definitione, sed commu-
ni, ut tam affectionem, quàm affectum propriè di-
ctum comprehendat, cum nullum magis accom-
modatum genus dari queat. Nam nonnulla sym-
ptomata propriè effectus sunt; & permanentiam
habent, ut qualitas mutata: alia affectiones tari-
tùm, quæ in motu consistunt, ut delirium, tremor
& similia. Deinde subjungitur, morbum immediatè
consequens, ut discernantur symptomata ab iis ac-
tionibus & operibus, quæ solius naturæ sunt, non
irritatæ à morbo, aut causa morifica, ut sunt copio-
sæ excretiones, quæ sunt virtutis robore. Nam ubi
nullus est morbus in facto, aut fieri, ibi propriè
symptoma non est. Nihilominus nonnulla sympto-
mata opera naturæ dicuntur, ut criticæ evacuatio-
nes: alia morbi, ut convulsio, evacuationes
symptomaticæ, &c. nonnulla utriusque, ut tremor.
Verùm illa quæ naturæ opera dicuntur, licet na-
turæ conferant, & robur ejusdem arguant, ea quæ
ratione secundum naturam dici queant: quia tamen
sunt vi naturæ, irritatæ à causâ aliquâ morficâ,
meritò symptomata vocantur. Nam non fie-
rent, nisi naturâ à illâ cogeretur aliquid agere
& movere. Præterea vocabulo morbi intelli-
mus non solum morbos factos, sed etiam fientes
aliquando, & ex consensu: ut si visus obscuratur ob
vapores à ventriculo ascendentes, symptoma qui-
dem

Naturam est, non tam oculorum, quam ventriculi. Verum à symptomatibus propriè dictis, naturales impotentias distinguimus, ut sunt frustrationes facultatum, velut ab errore externo, sive ratione objecti. Veluti cruditas in ventriculo oriatur, sive concoctio abortiva, ob nimiam alimenti ingesti copiam, aut alienam naturam, symptoma aliquando dicitur, licet propriè naturalis impotentia sit, & ratione objecti tantum eveniar. Nam quando assumpta inconcocta in ventriculo permanent, non vitio ventriculi, sed ipsorum assumptorum, læditur quidem actio ventriculi, sed non præter naturam. Nam præter naturam non est vinacea, lapillos, &c. non concoctui in ventriculo, quia secundum naturam illis concoctio non competit. Quare actio hoc modo læsa præter naturam non erit, & proinde nec symptoma propriè. Deinde ratione rei objectæ & eorum quæ ad eam spectant, nulla actio symptoma propriè dici poterit, alioqui tremor ex gravi onere, & coccussio ex aspersione aquæ ferventis, vomitus immissis in digitis, symptomata propriè essent: quare quæcumque actiones fiunt à causa aliqua solum irritante, si nihil morbi adhuc fecit, non sunt symptomata, sed opera naturæ: quod si cum læsione fiant, sunt naturales impotentia. Verum ubi causa aliqua morbum fecit, non sunt amplius actiones naturales, sed præternaturales. Nam sæpè naturæ opera & symptomata ita similia inter se sunt, ut & symptoma videatur opus, & opus symptoma: quod in magnis evacuationibus manifestè apparet. Deinde evenit, eadem actio in uno impotentia quadam secundum naturam sit, in alio præter naturam & symptoma. Veluti tremor membrorum, in decrepito naturalis est, in juvene præternaturalis & symptomaticus. Item profundior somnus & pigrities, in pituitoso naturalis est, in cholericæ præter

Q natu-

CAP.
IV.

naturam, similis est ratio qualitatis corporis mutatae. Quare illae actiones & effecta propriè symptomata sunt, quae præter naturam oriuntur, & morbum consequuntur, Verùm per morbum intelligo non solum proprium affectum partis aut in factio esse, sed etiam per consensum, & in fieri. Consequuntur quidem morbum omnem symptomata quaedam, sed certo tantum ordine & modo: Nam actio læsa proximè, cætera propter actionem læsam: Unde actio læsa in definitione morbi ponitur, ut differentia, quæ à sanitate distinguitur. Oriuntur itaque symptomata omnia à morbis sed alia magis immediatè, nonnullis intervenientibus symptomatibus. Verùm propriè symptomata solius morbi sunt effectus, licet nonnulla aliorum symptomatum dicantur, quatenus cum morbo complicantur, sic atrophiam plura præcedunt symptomata, ut alibi dicemus. Accidit autem interdum, ut idem sit symptoma, & morbi causa, sed diverso respectu, veluti catarrhus est symptoma cerebri sed causa variorum morborum, ut phthisis, Asthmatis, & similium. Deinde ut morbus aliquis ex consensu, symptoma dicatur morbi per se, ut febris symptoma vocatur pleuritidis & peripneumoniæ: nihilominus idem propriè morbus, & symptoma non est.

*Differentia
symptomatum.*

Triagenasymptomatum.

*I. Genus
actio læsa.*

His definitis restat ut ad differentias symptomatum perveniamus. Genera symptomatum tria præcipua sunt: quorum primum facultatem, facultatisque functionem respicit, Actio læsa: Secundum in contentis consistit, excrementorum & humorum vitia: Tertium in solidis partibus, qualitas mutata, sive simplices corporis affectus, qui actionem per se non lædunt.

Præcipuum symptoma morbum immediatè consequens, est actio læsa, quæ nobis morbum pri-

num aperit & demonstrat. Cum omnis actio fiat ab instrumento, mediante constitutione; si functio aliqua fuerit expedita vel impedita partis, unde procedit constitutio secundum, aut præter naturam erit. Quare cognitis actionum differentiis, & partibus actionem producentibus, ex actionibus facile erit colligere, quæ pars morbo laborat.

*Actionem
differentia.*

Actiones omnes humani corporis à Galeno 3. capit. libr. Differ. sympt. in animales & naturales dividuntur: Animales vicissim in principem sive gubernantem, motivam & sensitivam. Princeps in Imaginationem, Cogitationem & Memoriam. Motiva unica quidem genere est, & unicum commune instrumentum habet, videlicet musculos: prout tamen in variis particularibus instrumentis, varia munera producit, diversis nominibus donatur. Nam in manibus apprehensio; in cruribus deambulatio; in thorace respiratio; in lingua locutio, dicitur; eademque in cæteris ratio. Sensitivæ actiones sunt quinque, visus, auditus, olfactus, gustus, tactus, quibus additur sensus communis. Sub naturalibus verò functionibus hoc loco à Galeno continentur, non solum illæ; quæ naturales propriè dicuntur, ut sunt nutritio, auctio, generatio, & quatuor ministrantes functiones, in singulis partibus: Attractio, retentio, alteratio & expulsio: sed etiam quæ à corde promanat, pulsus, animi affectus & generatio spiritus vitalis. Nam propriè tres sunt primæ functiones, totidemque principales partes, cerebrum scilicet, cor & jecur, quibus cæteræ partes, functionesque subserviunt, ut alibi dictum est. Attamen 4. capit. de Sympt. differ. naturales actiones communes septem enumerat, quibus quatuor ministrantes facultates subserviunt. 1. Appetentia cibi & potus: 2. *χύλασις* concoctio in ventriculo. 3. *ἀνὰ δόξιν*

Q 2

distrib.

distributio chyli per venas meseraicas. 4. *αἱματώσις*,
secunda concoctio vi jecoris, cui subserviunt fun-
ctiones lienis, vesiculæ fellis, renum & vesicæ. 5.
Τρῆψις, ultima concoctio in singulis partibus, ex nu-
trimēto perfectè elaborato. 6. *Ἀγχορσις* & *Ἐκκρίσις*
expulsio & secretio excrementorum cujuscunque
concoctionis, & ex quocunque loco. Tandem pul-
sus, motus scilicet cordis & arteriarum, compositus
ex systole & diastole, cum intermedia quiete.

*Differentia
actionis
læsæ du-
plices.*

1. *Ex actio-
nis diffe-
rentia.*

2. *Ex mo-
do læsionis
triplex.*

Ex his omnibus & singulis differentiæ sym-
ptomatum actionis læsæ primum sumuntur: dein-
de ex ipso læsionis modo. Nam primum ex illâ a-
ctionis differentiâ, alia symptomata dicuntur facul-
tatis naturalis, ut *δυσπνῖα* mala sanguificatio a-
lia vitalis, ut deliquium animi: alia animalis. De-
inde animalis alia sensus, ut cæcitas: alia motus, ut
paralysis, convulsio: nonnulla principis facultatis,
ut delirium atque ita in cæteris, ut infra apparebit.

Ex læsionis verò modo tria oriuntur genera
symptomatum in qualibet actione. Læditur enim
omnis actio, vel quia non præstatur, vel quia pravè:
& pravè vicissim, vel quia diminute & debiliter, vix
aut longo tempore: vel quia depravatè, id est, non
debito modo. Quare omnis læsa actio cujuscunque
generis aut speciei sit, aut erit abolita, aut diminu-
ta, aut depravata. Abolita autem actio est: quæ
non fit, aut quantum sensu judicari poterit, prorsus
perit. Diminuta, quæ vix, aut tardè fit, aut ad perfe-
ctionem nunquam pervenit. Depravata verò Gale-
no est, quæ non solum alio modo & ordine fit quàm
fieri debet, aut debitum tempus anticipat, sed et-
jam quæ major vehementiorque est, quàm natura
postulat: quare duplex meritò videri poterit: Una
propriè depravata, quæ in qualitate peccat, sive or-
dinem,

dinem, tempus, aut modum agendi non servat: alia aucta actio, quæ major est: quàm natura requirit.

His intellectis, non difficile erit numerum symptomatum actionis læsæ colligere. Atque ut à principe facultate initium faciamus, Abolita functio omnium actionum animalium est in apoplexia, deinde in catalepsia & epilepsia, diminuta imaginatio est *λυθαργία*, Abolita cogitatio *ἄνοια*, Latinis amentia & extrema fatuitas; diminuta cogitatio sive ratiocinatio *μωρία*, Latinis stultitia. Abolita memoria est extrema oblivio, qualis teste Thucydide in peste Attica nonnullis accidit, ut non alios solum, sed ipsos etiam ignorarent. Diminuta memoria est oblivio non exquisita, sive torpor memoriæ. Depravata functio totius principis facultatis est Delirium, sub quo continetur Phrenitis melancholia, Mania, &c. Nam delirat interdum sola imaginatio, interdum sola cogitatio, nonnunquam utraq; & simul ipsa memoria, quando alio ordine & modo meminit, quàm debet. Depravata quoq; imaginatio est in vertigine & incubo.

Post principem facultatem sequitur sensus primus & communis, cujus functio est vigilia, quam somnus naturalis interpellare debet: Læditur hæc functio tripliciter. Nam primum auferitur, quando gravis & inextinguibilis sopor hominem planè opprimit, ut in lethargo caro & apoplexia. Deinde diminuitur, ubi magna est ad somnum propensio, quæ coma dicitur; tertio depravatur quando somno privantur, quod symptoma *ἀγρυπνία* sive pervigilium vocatur. Symptomatibus sensuum primi additur propriè Vertigo: Nam in vertigine sensuum exteriorum species à cerebro non naturali modo percipiuntur, sed cum motu, tenebris, &c. cujus

*Symptomata
sensus.*

functionis lætio magis ad sensum communem, quam imaginationem depravatam referri debet. Sequuntur symptomata sensuum exteriorum. Primum autem abolita functio visus est cæcitas : diminuta & hebes, ἀμβλυωπία : depravata, hallucinatio: quibus tribus in auditu correspondet surditas, gravis auditus, & tinnitus aurium. Eadem in olfactu & gustu ratio est, licet nominibus propriis plerumque careant: at tactus abolitus est in paralyssi, diminutus in stupore sive torpore; depravatus in pruritu, dolore, lassitudine, ulceroso sensu & similibus. Omnibus autem sensibus dolor communis est, a vehementi sensili proprio vel communi, ut alibi apparebit, sed præcipue & peculiariter symptoma tactus est, ac cæterorum sensuum, aliarumque partium, quatenus tactu participant. Quare aurium est ὠτὸς ἀλγία, capitis κεφαλαία, oris stomachi καρδιαλγία, &c. Quo verò sensorii essentia crassior est, eo dolore & voluprate majori afficitur: at tactus organum crassissimum est, proinde orificio ventriculi, quod exquisitissimo sensus præditum sit, gravissima symptomata accidere solent, tam sui respectu, quam ob consensum, quem habet cum corde & cerebro. Nam ex consensu cum corde, accidit καρδιαγμός, συγχωπή, &c. Ex consensu cum cerebro, ἐπιληψία, delirium, κῶρ, &c. Ex utriusque consensu ἀπνοία: at ipsi ventriculo ratione tactus, accidunt appetitus abolitus, diminutus, depravatus, de quibus infra.

Symptomata motus.

Tandem, motus voluntarius abolitus est paralyssi, vel totius corporis cum resolutione principis facultatis, ut Apoplexia: vel partis alicujus, aut plurium qui paralyssi dicitur. Deinde debilis functio est stupidus aut torpidus motus. Tertio, deprava-

pravatus & pravus motus Galeno de Diff. sympt. cap. 3. quadruplex est: Tremulus, convulsivus, vibrans & palpitans. Sub vibrante motu horror & rigor continentur: sub convulsio motu, Convulsio propriè dicta, ut *τέτανος*: & quasi convulsio, ut *σπασμὸς* singultus. Addunt nonnulli his tussim, oscitationem, pandiculationem, sternutationem; item expultrices motus ventriculi, uteri, vesicæ & similitum. Verùm hi omnes motus nec propriè, nec pari modo motus depravati facultatis motricis sunt, sed propriissimè convulsio. Nam propriè convulsio est inuita retractio musculorum & nervorum, versus suam originem, & proinde depravata actio motivæ facultatis, quæ nervis & musculis perficitur. Ea retractio vel in toto corpore sit, cum principis partis læsione, & *ἐπιλήψια* dicitur, quæ tamen convulsio absolutè non est, sed potius motus convulsivus. Vel in parte unâ, aut pluribus. Ubi verò in omnibus partibus capiti subjectis tam prioribus, quàm posterioribus evenit, *τέτανος*: ubi in prioribus tantum, *ἐμπροσθέν*: ubi in posterioribus, *ὀπίσθεν* vocatur. At depravatus motus in oculis *σπασμὸς*, in dentibus *σιγμός* dicitur. Sub motu voluntario continetur vox, loquela & respiratio, quatenus motu musculorum perficitur. Vocis autem symptomata sunt *ἀφροία*, privatio vocis, deinde *ἰχνοφωνία*; quando vox ita gracilis & parva est, ut vix audiat, aut cum difficultate profertur, tertio *κακὴ φωνία*, vox prava, sub qua continetur vox aspera, rauca, clangosa, flebilis, &c. Deinde loquelæ sive sermonis symptomata sunt, loquela abolita, obmutescētia & loquela debilis ac depravata, ut *μοιλαλία* & *ἀγκυλογλώσσης ψεδότης* quando difficulter loquuntur, aut cum difficultate pronunciant R, L, K, aut in loquendo resistentes sermonem

symptomata
ta vocis.

Symptomata
ta loquela.

Q +

*Symptoma
ta respira-
tionis.*

monem præcipitant, quos Galenus *τραυλῆς*, Latini balbos aut blesos vocant. Respiratio abolita, ubi ad sensum perit *ἀπνοια* appellatur, cui vicina est diminuta respiratio quæ parva, tarda, rara est: depravata verò respiratio propriè *δύσπνοια* vocatur, ubi respiratio est magna, velox, densa, sublimis aut inæqualis. Dyspnœa hæc triplex est, una quando respiratio naturalem mediocritatem in velocitate & frequentia non multum excedit, quæ generis nomine *δύσπνοια* simpliciter dicitur: altera ubi redditur valdè frequens & velox cum sibilo & stertore, quæ Asthma nominatur: tertia ubi ad summum frequentia ascendit, & non nisi erecta cervice perficitur, quæ *ὀρθόπνοια* inde appellatur, symptomatib. respirationis annumeratur tussis.

*Symptoma-
ta faculta-
tis vitalis.*

Consequens est, ut symptomata facultatis vitalis & naturalis enumeremus. Conservatur primò vitalis facultas in corde & cæteris partibus pulsu, cujus symptomata sunt, 1. *ἀσφυξία*, pulsus abolitus, ut in gravi syncope. 2. Pulsus languidus sive debilis, quando imminuitur motus tam systoles quàm diastoles, ut in lypothymia. 3. *κακὸς σφυξία*, depravatus pulsus, quando naturalem motum superat, & rhythmum ac ordinem non servat. Sub his omnes differentiæ pulsum continentur. Deinde ipsa virtus & substantia spiritus in corde aliquando dissolvitur vel sensim, unde lenta mors vel confer-tim, unde gravis syncope & subita mors: aliquando tantum debilitatur, & lypothymia consequitur: depravatus verò motus virtutis vitalis est cordis palpitatio. Præterea qualitas caloris qui à corde per arterias in totum corpus emanat, nonnunquam præter naturam augetur, ut in febribus: aliquando debilitatur & languescit, ut in hydropè aliisque morbis frigidis: at salva extingui non potest.

Ex

Ex naturalibus facultatibus propriè dictis, prima est appetentia. Inest autem omnibus membris naturalis appetitus restorationis illius, quod perpetuo defluxu dissipatur: hic convenientis desiderio excitatur, & cum attractione conjungitur: Verum in ventriculo, præter naturalem appetitum ex partium inanitione, appetentia quædam animalis inest, nimirum desiderium plenitudinis ex suctionis sensu, cum venæ ex ventriculo attrahunt. Hic sensus si fuerit ex desiderio sicci, oritur fames; si humidi, sitis.

Symptomata facultatis naturalis.

Hujus appetitus symptomata sunt, ut, supra dictum est, primò ἀνορεξία, abolitus appetitus, quando nullum prorsus cibum potumque appetit. 2. debilis appetitus, quando languidè 3. depravatus & inordinatus qui duplex est. Unus δυσορεξία propriè dicta, ubi talia appetit, qualia secundum naturam appetere non debet, ut in picâ. Alius immodicus appetitus, quando adest insatiabilis fames, ut in βελικία: aut inexplebilis sitis, ut in febrilibus colliquantibus interdum accidit, plerumque in diabere. Expletur appetitus naturalis convenientis attractione, verum attractio duplex in corpore est: una ab appetitu animali oritur ope musculorum, qualis attractio ventriculi non est, licet illi insit sensus indigentiae, sive appetitus animalis: Alia sine musculis absolvitur, & excitatur non uno modo. Nam quædam oritur à familiaritate substantiæ, quæ ob definitum à substantiâ alicujus partis calorem, certum quiddam pars illa appetit: Alia communis omnibus partibus est, & indeterminata ob indefinitum calorem trahentem spiritus & humores, ut in inflammationibus: Tertia fit metu vacui, & successione ad id, quod evacuatur: quarta efficacia spiritus mediantibus fibris, quæ propriissimè attractio vocatur.

Qs Quem.

*Attractio
cu ventri-
culi symp.*

Quemadmodum enim in musculis fibræ spi-
ritu animali repletæ ad principium suum retrahun-
tur: ita in partibus naturalibus fibras habentibus e-
venit. Nam efficacia spiritus naturalis fibræ rectæ
intentæ attrahunt, ac eodem modo fibræ transver-
sæ si intendantur expellunt, obliquæ retinent: quod
si fibræ planè relaxentur, à munere suo cessant.
Quare attractio ventriculi convenientis desiderio
non excitatur, sed aboletur, si fibræ ventriculi & gu-
læ penitus relaxentur. Diminuitur, si vix longo
tempore & imperfectè agant: depravatur ubi inter-
trahendum ventriculus quasi palpitât, tremit, con-
vullitur, aut concutitur.

*Retentio
symp.*

Attrahit quidem ventriculus alimentum, ut
eo fruatur: sed frui nequit, nisi commodè retineat.
Commodè autem continet, si ita complectatur, ut
inter ventriculum & cibos nullum spatium relin-
quatur. Deinde si justo tempore, & ad perfectam
concoctionem contineat. Alterutrum, aut utrum-
que si non evenit, vitiatur retentio. Nam retentio
abolita est, ubi nullos omninò cibos complectitur,
sed inconcoctos defluere sinit, unde lienteria: de-
bilis si complectatur vel leviter, vel non justo tem-
pore: Si leviter, consequuntur fluctuationes & in-
flationes: si non justo tempore, imperfecta conco-
ctio, & vel celer exitus per alvum, unde cœliaca
passio, excretiones humidæ: vel corruptio ciborum
in ventriculo & intestinis, unde excretiones fœti-
dæ. Depravata retentio oritur, quando ventriculus
cibos comprehendit, sed cum palpitatione, vibrati-
one (ut in febrium rigoribus) singultu, aut cum tre-
more.

*Symptoma-
ta concocti-
onis ventri-
culi.*

Retinet ventriculus cæteræque partes alimenta
sua, ut fruantur & concoquant, ac in suam qualita-
tem alterent; cujus actionis in ventriculo, tria sunt
symptomata, 1. *ἀνέψια*, cruditas & abolita con-
coctio,

coctio, quando cibus planè non mutatur. 1. *Geσ-
δυπείψια*, quando vix, tardè & imperfectè conco-
quitur. 3. *Quαρεψία*, quando alimenta immutan-
tur quidem, verùm non perficiuntur, sed corrup-
puntur, & qualitatem naturæ alienam assumunt.
Pars chyli utilissima à ventriculo & intestinis per
venas meseraicas ad jecur naturaliter deferri & di-
stribui debet, verùm hæc distributio aliquando tol-
litur, nihilque de chylo venas ingreditur, unde flu-
xus chylosus: interdum diminuitur, quando non
sufficienter chylus in venas rapitur. Nonnunquam
depravatur, si citius, aut tardius distributio fiat, aut
non eo modo, quo fieri debet.

Secunda concoctio alimenti ex chylo vi jeco-
ris fit, & sanguificatio dicitur. Cujus symptomata
sunt, 1. Abolita sanguificatio, quando nihil omnino
sanguinis generatur. 2. diminuta, quando longo
tempore parcè, &c. 3. depravata si pravus & vitiosus
sanguis gignatur, quo corpus pro nutrimento satis
commode uti nequit. Ex abolita & diminuta san-
guificatione, ac etiam chylicatione oritur *ἀρε-
ψία*, licèt symptoma omnium naturalium faculta-
tum dici queat. Ex depravata verò sanguificatione
magis *καχεξυρία*, *καχεξία*, *ὑδρωψ* & *καχερροψία*,
sub cacotrophia continetur, Elephantiasis, Leuce,
&c.

Nam actio naturalis singulis partibus necessa-
ria, est nutritio ex sanguine in substantiam partis
converso & assimilato. Cujus symptomata sunt
ἀρεψία & *καχερροψία*, sub qua *καχεξία*, &c. Fit
autem *ἀρεψία*, quando partes nullo fruuntur ali-
mento, vel quia non sufficienter fruuntur, sive nu-
trimento frustrantur: non fruuntur, vel quia ali-
mentum non ritè attrahunt, vel attractum non ritè
retinent, vel non perfectè uniunt & assimilante aut

NON

*Symptoma-
ta concocti-
cia jecoris.*

*Symptoma-
ta concocti-
cia partium
nutritienis.*

I V.

non naturaliter expellunt. Quare atrophiam multorum symptomatum symptoma commune esse solet. *Κακοτροφία* propriè est, quando partes nutriuntur quidem, sed pravè, ex alimento converso in alienam qualitatem, quæ secundum naturam non est. Unde pars paulatim à naturali forma & constitutione recedit. Hæc ut *ἀτροφία*, plurium symptomatum symptoma esse solet, propriè verò facultatis assimilatricis, ac cum *ἀτροφία* interdum complicatur. Vbi enim partes pravo nutrimento non satis sufficienter fruuntur, *κακοτροφία* & *ἀτροφία* conjunguntur.

Symptomata expultricis facultatis.

Qualibet concoctio sive ea toti communis sit, ut chylicatio & sanguificatio: sive singulis partibus propria, ut nutritio, sua excrementa habet, quæ vi excrettricis facultatis secernuntur, & extra corpus naturaliter expelluntur. Præter naturam verò hæc actio tripliciter læditur: aliquando enim plane aboletur, nihilque per debitas vias excernitur, aliquando diminutè fit, id est, tardè & imperfectè: nonnunquam depravatè, nimirum non justo tempore & modo, aut quod utile est expellitur, retento inutili, aut inutile cum utili. Quarè dejectionis alvi symptomata sunt suppressio, astrictio, alviq; profluvium, sub quo continetur lienteria, diarrhæa, dysenteria, tenesmus, &c. Deindè excretionis urinæ, Ischuria, stranguria, dysuria, diabetes, mictus involuntarius, &c. Excretionis flavæ bilis symptoma Icterus flavus: melancholiæ, Icterus niger, &c. Huc referuntur omnes illi motus, qui fiunt vi expultricis facultatis, irritatæ à causâ morbificâ, sive cum sensu aliquo tactus, sive sine sensu: quorum alii pluribus partibus communes sunt, ut tremor, horror, rigor, pandiculatio, palpitatio: alii partibus nonnullis proprii, veluti ventriculo, vomitus, nausea,

fin;

singultus, rectus: Instrumentis respirationis, tussis
capitis sternutatio: maxillæ oscitatio: intestinis colli-
ca & iliaca passio, crepitus ventris, &c. vasis sperma-
ticis gonorrhæa, seminis quæ excretio abolita vel di-
minuta, utero mensium suppressio & profluvium, u-
teri strangulatus, ascensus, prolapsus, &c. De quo-
rum omnium natura & causis suo loco agemus.

Ex his omnibus colligitur numerum sympto-
marum actionis læsæ. Nam pars quævis similis
quatenus nutritur, quatuor prædita est facultatibus
naturalibus: quarum quælibet trifariam læditur.

*Numerus
symptoma-
rum fun-
ctionis læsæ.*

Quare 12. symptomata ei accidere possunt: verum
quæ publico munere naturali funguntur, quia du-
plices naturales functiones obtinent, communes &
propriæ, illa omnia duplicia habebunt. Pars enim
quatenus sentit, tria habet symptomata: quatenus
movetur, totidem. Quare quævis pars sentiens 15.
pars movens 18. recipit. Verum oculis, aliisque
partibus, in quibus præter tactum alius sensus in-
est, duplicia accidunt sensus symptomata, quare o-
culis ratione visus tria, ratione tactus totidem acci-
dunt symptomata, quibus adde tria ratione motus,
& 12. quatenus nutriuntur: Verum ventriculus 27.
symptomata recipit, nimirum 12. ut nutritur, toti-
dem ut commoveatur instrumentum. 3. ratione sensus
sive animalis appetitus.

Secundum genus symptomatum considera-
tur in habitu corporis, nimirum sensibilis qualitas,
sive simplex affectus sub sensum aliquem cadens,
qui actionem per se non lædit. Sensiles autem qua-
litates duplices sunt, aliæ communes, ut magnitu-
do, numerus, figura, motus, quies: aliæ propriæ, ut
color, sonus, odor, sapor & tactiles qualitates. Ac
primum, præter naturam oriuntur colores, ut cate-
ræ qualitates in morbis, ex alterationibus & moti-
onibus naturam lædentibus, vel in toto: ut flavus
color

*secundum
genus sym-
ptomatum
eiusque dif-
ferentia.*

color in icterico, niger in splenitico; vel in parte; u^{bi} lingua nigra in febribus ardentibus, &c. Deinde sonus objectum auditus, permanens qualitas non est: nihilominus ubi naturalis sonus, nimirum vox immutatur, vel novus sonus percipitur, ut stridores dentium, crepitus & similia, sub hoc genere symptomatum interdum numerantur, licet propriè sint symptomata actionis læsæ. Tertio, odores non naturales ex graveolentia sese produnt, i. in respiratione per os, & in transpiratione per poros cutis. Deinde in auribus, naribus, alis, & partibus putrescentibus Item in ructibus fumosis, acidis, nitrosiss. Verum odor qui ab excrementis exhalat, ad tertium genus symptomatum potius referri debet. Quarto, gustu nullius partis saporem naturalem percipimus, nisi linguae, quando imbuitur humore salso vel amaro, ut in febribus. Propriè vero contenta, quæ ad tertium genus symptomatum reducuntur, quatenus in os defluunt, gustu præter naturam, salsa, amara, acida & similia esse judicantur. Præterea sub tactum in ægris, qualitates & primæ & secundæ cadunt, quæ secundum naturam non sunt, & tamen per se actionem non lædunt, unde simplices affectus dicuntur, ut in febribus calor aut frigus extremarum partium, item cutis arida, dura, laxa, rugosa, intesca. Tandem ex communibus sensibilibus, magnitudo, numerus & figura præter naturam, si nullam actionem per se manifestè lædant, simplicibus affectibus annumerari poterunt, ut sunt signa illa lethalia. i. Prognosticorum Nasus acutus, oculi, concavi, collapsa tempora, aures contractæ, crura disjecta, &c.

Tertium

genus sym-

ptomatum:

Tertium genus symptomatum est contentorum vitium, sive eorum quæ à corpore excernuntur, aut præter naturam retinentur, quorum alia secundum

hum naturam insunt, & necessariò gignuntur, ut quatuor humores & naturalia excrementa: alia non necessariò sed præter naturam oriuntur, ut vermis, calculus, flatus, humores non naturales, pus &c. Horum vitia si morbos antecedant causa potius dicuntur: si ratione morbi alicujus contingant, symptomata propriè vocantur. Excreta & retenta immodica præter naturam, tribus potissimum modis dicuntur. 1. tota substantia. 2. qualitate. 3. quantitate. Quibus addi poterit, excretionis modus & tempus. Excretio autem sive profusio sanguinis præter naturam, & excrementorum suppressio, toto excretæ & retentæ substantiæ substantiæ genere præter naturam sunt. Profunditur sanguis præter naturam variis modis, nimirum vase rupto, vulnerato, eroso, aut oretenus recluso: item retentrice debilitata & expultrice immodicè concitata: præterea quando vitio sanguificationis totus sanguis tenuis & serosus redditur. Deinde qualitatis vitia in excretis & retentis sunt calor, frigus, lentor, acrimonia, putredo, &c. Tertio quantitatis vitia sunt excretio & retentio immodica excrementorum, scilicet urinæ, ut in diabete & dysuria; fecum alui, ut in lienteria, diarrhæa, colica, &c sudoris, ubi nimis rara cutis, vel densa est. His additur nimia mensium fluxio & suppressio. Nam una hæc sanguinis evacuatio sola quantitate peccat. Huc referuntur omnium pravorum humorum evacuationes & suppressiones, ut vomitus, alvi dejectiones, sputa, & horum suppressiones. Aliquando in modo excretionis vitium est, ut si non debita via, aut confertim, aut cum dolore, vehementia, strepitu & similibus, excrementa exeant: Item in tempore vitium est, si intempestivè & ante debitum tempus exeant, quales excretiones symptomaticæ dicuntur, ad differentiam criticarum, quæ tempestive sunt.

Qua.

CAP.
V.

Quare in omnibus excretionibus semper natura solius opera ab ipsis symptomatibus distinguere oportet. Nam potest una eademque excretio alia symptoma dici. scilicet si vi morbificæ causæ oriatur: alias naturæ opus: ut supra demonstratum est.

CAPUT V.

De Causis Symptomatum in Genere.

*Causa omnium
sympt.*

CUM symptomata propriè morborum effecta definiantur, & morbos umbræ ritu consequantur, necesse est omnium symptomatum causam morbos esse, & quodvis symptoma à morbo aliquo, vel immediatè vel mediantibus aliis symptomatibus oriri. Nam actio læsa præter naturam à morbo procedit, & actionem læsam excrementorum vitia, & plerique simplices affectus, cæteri morbos immediatè consequuntur. Præsupponit enim lætio præter naturam læsa necessariò partis illius affectum, in qua residet actionis causa, siue facultas: Residet autem facultas in partibus solidis, & pro partis constitutione agit, ut alibi demonstratum est. Quare læsa actio à læsa constitutione, siue à morbo dependet, & non immediatè à morborum causis: deinde ipsæ causæ siue internæ, ut contenta, siue externæ, nisi interveniente partii affectu, actionem præter naturam non lædunt. Igitur actionis præter naturam læsæ causa erit morbus aliquis simplex ut intemperies, mala compositio, unitatis solutio, vel ex his compositus affectus.

*Requisita
ad perfecti-
onem actio-
nem.*

Ad actionem aliquam perfectè edendam tria præcipuè requiruntur, facultas, instrumentum & objectum. Sub facultate & instrumento continentur quæcumque operantur: in quorum numero sunt spiri-

spiritus & calor natus. Sub objecto omne id in quod operantur, item tempus, locus & cætera sine quibus non sit operatio, præterea actionis usus & necessitas. Objectum autem & quæcunque sub eo continentur, ubi proportionem non correspondent facultati; facultas frustratur, & functio satis commodè fieri nequit, sed si alia nulla subsit causa propinquior, nullusvè morbus, symptoma propriè non erit, sed naturalis impotentia aut naturæ opus, quale in tremore ex gravi onere & similibus apparet, ut alibi demonstratum est: nihilominus actiones tales symptomatibus plerumque annumerantur, licet propriè nec præter naturam, nec secundum naturam dicantur. Verùm ubi objectum proportionem correspondet facultati & functio satis commodè non exercetur; in facultate, facultatisque instrumento, vitium necessariò erit, eaque functio præter naturam læsa dicitur, & propriè symptoma: quemadmodum si vitium sit in objecto & facultate. Nam non rarò objecti vitium cum partis affectu præter naturam conjunctum est, ut in vitiato pulsu, & respiratione, propter necessitatem & usum. Necessitas enim in vitiato pulsu ab affectu, aut affectione præter natura oritur, quæ cum cum cordi infesta sit, eam protinus excutere conatur. Facultas partis temperamentum per se primò consequitur, temperamentum similaribus propriè inest, proinde facultas similaribus partibus primò debetur, & actio omnis à similaribus primò procedit, licè sine debita instrumenti structura non perficiatur. Conspirant autem cujusque organi particulæ in unius actionis famulatum, ac in quolibet organo perfectò unica particula principalis est radix & domicilium facultatis à qua primò actio, & qua posita ponitur, læsa læditur facultas, facultatisque functio. Cæteræ partes huic subministrant, & in illius unius actionis

R

sub-

CAP.

V.

*Cause
symptom.
actionis
laesa.*

subsidium veniunt, ut in disputatione de differentiis partium dictum fuit. Quare ad actionem perfectam præter facultatem parti similari insitam, requiritur debita compositio omnium particularum instrumenti perfecti, quod facultati subservit. Ea consistit in apta figura, iusta magnitudine, debito numero idoneo consensu & situ, quorum unum si desideretur, facultas etiam illæsa expedite agere nequit, & morbo organico impeditur. Quare læditur actio omnis, morbo similari, vel dissimilari, aut communi ut supra dictum fuit. Facultates in corpore duplices sunt, aliæ insitæ, quæ omnibus & singulis partibus insunt proprii muneris gratia; hæc perficiuntur & conservantur in singulis partibus vi nativi caloris, quatenus determinatur partis temperamento, quo læso facultas necessario læditur: aliæ influentes dicuntur, quæ in principali parte sedem & domiciliū habent, ac ab ejus proprio temperamento oriuntur, à quo principio ut à fonte per debitas vias emanant; ita vis sentiens & movens mediante spiritu animali per nervos, in motus sensusque instrumenta; ac vis vitalis à corde mediante spiritu vitali per arterias in omnes partes insluit: à jecore verò alimentum per venas cunctis communicatur. Verum vis illa quæ à corde insluit; scilicet conservatio symmetriæ caloris innati, & quod per venas communicatur, insitæ vires tantum cœtur, & conservat, nec alias inducit; at quod à cerebro defluit facultatem movendi & sentiendi instrumentis sensus & motus tribuit. Nam in corpore nullius partis essentia permanens est, sed omnes nutrimento per venas; & conservatione symmetriæ caloris innati, per arterias indigent. Quare instrumenta motus & sensus à naturalibus plurimum differunt: nam naturalia congenitam actionis vim habent, quæ non læditur illæsa parte aut sine proprio

prio affectu; animalibus verò vis sensus & motus à principio scilicet à cerebro quemadmodum radii à sole defluit. Unde non rarò accidit ut ipsis partibus haudquaquam affectis, aut proprio morbo laborantibus, actio eorum nihilominus pereat. Ex his omnibus colligitur, actionem sensus & motus tripliciter lædi, vel læsa, facultate influente, vel primo actionis instrumento, vel aliquo ministrantium: facultas læditur læsa parte principali à qua, & via per quam scilicet cerebro & nervis; spirituum verò vitia vel fonti ascribuntur unde oriuntur, vel membro in quo determinantur. Nam in membris illis ita determinatur spiritus animalis, ut proprius esse dicatur, & agentium membrorum quasi pars aliqua, unde spiritus oculis proprius opticus dicitur. Magnitudo læsionis correspondet magnitudini affectus. Nam parvi morbi parvam actionis noxam inducunt, majores semper actioni ad proportionem nocent. Eadem est ratio in cæteris duobus generibus symptomatum ut suo loco dicemus. Verùm ubi natura symptomatis explicatur, duplex definitio locum habere solet, una imperfecta, Galenò *ἐννοητικὴν*, Aristoteli *ὁνομαστικὴν*, descriptio rei, in qua modus læsionis locum generis, actio ipsa partis, locum differentię obtinet. Ita convulsio definitur depravata sive invita retractio musculi vel nervi versus suam originem; apoplexia privatio repentina animalis functionis. Altera definitio essentialis causalis & scientifica dicitur, quæ illam priorem complet & causam proximam illius læsionis in subiecto explicat, de qua alibi dictum est. Illæ læsionum causæ sunt affectus partium præter naturam, ut supra demonstratum est. Abolent autem actiones magni affectus quatenus generationē & distributionem spirituum impediunt, calorem innatum, & robur partium planè dissolvunt; debilitat verò, hæ-

*Sympto-
matis de-
finitio d
plex.*

R 2

eadem

eādem causā plerumque, si minores fuerint: deprā-
vant, quæcunque facultatem vehementius urgent,
irritant, commovent, &c. His determinatis restat,
ut causas symptomatum in specie consideremus, ini-
tio factō à symptomatibus principis facultates.

CAPUT VI.

*De Causis Symptomatum Cerebri, Nimi-
rum Principis facultatis & sensus
communis.*

ET si Anima cum omnibus suis facultatibus radi-
caliter in corde sit, ut, in centro microcosmi,
tamen quia functiones illæ, quæ à Medicis prin-
cipes vocantur, in corde non perficiuntur, nec mani-
festantur sed in cerebro: omnium ferè Medi-
corum consensu, cerebrum domicilium &
instrumentum principum facultatum est, cui
curatio adhibetur, quoties aliqua functio-
num principum læditur. Est enim cerebrum
sensorium primum, sive sedes sensus communis, à
quo dependent quinque sensus exteriores, & mo-
tus voluntarius. Deinde à cerebro immediatè per-
ficiuntur functiones illæ tres, quæ à Medicis prin-
cipes vocantur, nimirum imaginatio, cogitatio, &
memoria, ut alibi dictum est. Hæ functiones pa-
ræ similes non sunt, quæ à sola temperie incho-
antur & absolvuntur, sed mixtæ: quamvis enim ab
idonea cerebri temperatura primum profiscian-
tur, absque tamen apparatu instrumentali non per-
fectè exercentur. Temperatura autem illa, est, pri-
mum substantiæ cerebri, unde actio; deinde spiri-
tuum animalium, sine quibus non; tertio, partium
mini-

ministrantium, ut membranarum, &c. Apparatus
verò instrumentalis, est omnium partium apta com-
positio, in magnitudine, numero, conformatione,
consensu & situ.

Horum unum si lædatur, pro modo læsionis,
functio cerebri vitatur. quare læduntur functio-
nes cerebri, vitata temperie, vel labefactatis iis,
quæ ad organi integritatem pertinent. Intemperies
autem auctore Galeno 3. de locis, vel simplices
sunt vel compositæ, sine vel cum materia, humore
scilicet aut vapore, sive flatu, quibus adduntur intē-
peries mixtæ, ex contrariis, qualis dispositio oritur,
si bilis pituitæ, vel pituita sanguine in cerebro per-
misceatur, aut sanguis, melancholiæ, vel atræ bili.
Hi humores interdum per arterias & venas defluen-
tes & membranas aut cerebrum quasi alluentes in-
temperiem cum materia gignunt, aliquando vasa e-
gressi in substantiam membranarum, aut cerebri
impacti, & absorpti tumorum præternaturam effi-
ciunt, exquisitum, ut phlegmonem, erysipelas, scir-
rhum, aut œdema, vel minus exquisitum, qualis est
phlegmone erysipelatodeas, &c. Intemperies illæ
cerebri, non modò secundum magis, aut minus
differunt, unde magna symptomatum varietas, sed
etiam quia totum cerebrum, omnesque cerebri par-
tes, pari modo non afficiunt. Nam aliquando his
intemperantiis ventriculi cerebri tantum afficiun-
tur, vel omnes, vel aliqui tantum; interdum univer-
sa vasa, aliquando humor per totum corpus cerebri
dispersus est; nonnunquam totum cerebri corpus
intemperatum redditur. Præterea laborat cerebrum,
vel per se, propria affectione, sive ea sit primogenia,
sive secundaria; vel ex consensu partis alterius, i-
tem ex vaporibus, vel humoribus ad cerebrum
ascendentibus. Tandem cerebrum ut pars instru-
mentaria laborat tumore præternaturam, & angu-

*Causa cō-
munes sym-
ptom. prin-
cipii facult.*

VI.

stia aliqua, ut obstructione, compressione, & subfidentia ventriculorum, & cavitatum ac etiam continui solutione, ut vulnere, ulcere, contusione & concussione, &c. Hi morbi sunt causæ præcipuæ symptomatum facultatis principis, sensusque primi, & sub nominibus symptomatum plerumque describuntur. Nam omnes ferè morbi capitis à symptomatibus denominantur. Quare de natura & causis symptomatum principis facultatis, sensusque communis ordine dicemus initio facto à desipientia.

*De delirio
sive desipientia.*

Desipientia, authore Galeno i. *Prophet. Com. i.* alia nuda & simplex est, qualis accidit in febris vehementis rigore, alia continua, cum febris acuta conjuncta, quæ Phrenitis dicitur, quædam sine febris, quæ à Galeno ibidem insania vocatur, a recentioribus desipientia Melancholica. Nam, ut ibidem Galenus, *μαλυσος* omnes homines dicunt eos, significatione tantum communi, qui desipiunt sine febris, *φρενιζεν*, qui cum febre continua patiuntur: quod verò in febris vehementis vigore accidit, appellant & *πασακόψας* & *παρχθυίας* & *παρχλυσήσας* & *παρχφρονήσας*. hæc desipientia simplex a recentioribus dicitur.

*Desipientia
simplex.*

Accidit autem desipientia simplex, aliquando in febris vehementis vigore, ab expiratione calida, vel humore calido per cerebrum effuso; aliquando sine febris, à causa aliqua procatartica, spiritus animales conturbante, scilicet ab ebrietate, nimia sanguinis evacuatione, immodicis vigiliis, commotione cerebri & similibus.

Phrenitis.

Phrenitis, à læsa mente, quam græci *φρένας* vocant, nomen habet, unde ab Hipp. pro quovis delirio interdum sumitur. Phrenas verò veteres septum transversum appellarunt, ibique mentem sedem

sem habere crediderunt, quod ex inflammatione τῶν
 φρενῶν, id est, septi transversi, delirium oriri viderunt,
 cerebro consentiente septo transverso per nervos. ve-
 rum ejusmodi phrenitis notha est sive παρὰ φρενίτις,
 & ex inæquali respiratione, præcordiorum calore, &
 contractione cognoscitur, ac à vera phrenitide di-
 stinguitur.

Paraphre-
 nitu.

Vera autem phrenitis ex cerebri proprio affe-
 ctu oritur, ac definitur, delirium continuum cum
 febris acuta, orta ex calida cerebri intemperie, con-
 juncta cum inflammatione membranarum, obve-
 lantium cerebrum.

Definitio
 Phrenitidis.

Necesse enim est in phrenitide læsam esse se-
 dem facultatis principis, nimirum cerebrum, vel
 primariò, vel secundariò ex meningibus, affici au-
 tem membranas, ostendit pulsus durus, quare à ra-
 tione alienum non est, incipere inflammationem à
 membranis, præcipuè à tenui meninge, ac proce-
 dente morbo, humorem illum calidum interdum
 diffundi per totam substantiam cerebri, & phreniti-
 dem hæcticam inducere.

Pars affe-
 cta.

Nam morbus causa immediata Phrenitidis
 est intemperies calida substantiæ cerebri conjuncta
 cum inflammatione meningum, ea inflammatio
 vel erysipelas exquisitum est, vel erysipelas phleg-
 monodes, vel phlegmone erysipelatodes, intempe-
 ries autem cerebri, vel inæqualis est, occupans
 partem cerebri, aut in una parte intensior, in alte-
 ra remissior; vel æqualis, totum cerebrum occu-
 pans. Ex hac oritur phrenitis hæctica, tremu-
 la & blanda, omnium pessima, in qua omnes
 functiones depravantur: ex illa, phrenitis tumultu-
 osa, in qua omnes functiones non semper læ-
 duntur. Nam, ut vult Galen. 1. Prophet. Com, 37.
 si humor in aliqua cerebri parte firmetur, conse-
 quitur

Causa.

quitur symptomatis species, quæ peculiaris & affinis est, tum naturæ partis, tum humoris. Materia ex qua intemperies cerebri, & inflammatio oritur, est humor tenuis & calidus, putrescens in meningibus, & circa cerebrum, nimirum aut bilis, aut biliosus sanguis, sed in quo bilis maxime dominantur. Bilis illa erit vel pallida, quæ omnium mitissima est, vel flava, acrior & calidior, vel perassata, dum adurit, unde omnium pessima phrenitis. Verum bilis, quæ jam adusta est, non putrescit, nec propriè phrenitidem gignit, sed Maniam.

*Differentiæ
Phrenit.*

Ex his omnibus differentiæ phrenitidis colliguntur, quæ suis certis signis judicantur. præcipuæ verò differentiæ sumuntur à causis & forma delirii. Nam à sanguine deliria tutiora sunt cum risu; à bile flava cum iracundia & jurgiis, ab atra cum sævitia & rabie. Dignoscitur quoque humor peccans ex habitu, temperamento, & colore corporis, excrementis, ætate, anni tempore, diætâ, &c. ut in doctrina signorum. Deinde in delirio, vel depravantur omnes principes functiones, præcipuè imaginatio & ratio, interdum imaginatio sola, aliquando ratio cæteris illæsis. Cur autem una functio lædatur, altera illæsa, dubitant Medici.

An facultates principales sedibus distinguantur.

Actius, Arabes, & ex recentioribus non pauci, has functiones, functionumque læsiones, sedibus distinxerunt, lædique imaginationem, dicunt læsa anteriori cerebri parte: cogitationem, læsa media: memoriam, læsa posteriori parte. Verum cum temperamentum cerebri sit primum instrumentum omnium facultatum principum, sive cerebrum secundum propriam substantiam, omnesque partes, organum sit omnium facultatum principum, nulla necessitas exigere videtur, ut illas functiones læsas, earumque facultates, his sedibus tantum definiamus & circumscribamus; licet alienum à ratione

non

non sit, vim imaginatricem, sensumq; communem in anteriori parte magis vigere, quæ mollior est; & ad recipiendum aptior, memoriam magis in posteriore, quæ durior, & ad conservandas species magis idonea. Probabile quidem videtur imaginationem solam lædi à vaporibus ascendentibus, & à commotione humorum: imaginationem verò, cum ratione & memoria, à morbo valido & confirmato: nam in initio, cum malum leve est, à commotione humorum, & à vaporibus in cerebrum ascendentibus, non aliter cerebrum & imaginatio afficitur, quam si ab externis objectis efficeretur. ob transitum enim humorum & vaporum, species externorum sensibilium non clarè figuntur, sed pro iis visa plurima obversantur, juxta humorum & vaporum naturam; at, si causa in motu non sit, nec quasi transitu ulterius offendant, sed temperamentum cerebri lædat, tum rationem vitiat, non necessariò imaginationem, nisi intemperies magna sit, nam ex leviori intemperie tollitur cogitatio, quæ præstantior actio est, quàm imaginatio.

Desipientia melancholica, ab humore melancholico, duplex potissimum est, scilicet melancholia propriè dicta, & Mania, quibus addunt nonnulli Lycanthropiam, Cynanthropiam, &c. Melancholia autem inter illos affectus à Galeno numeratur, qui à causis nomen habet, nam nomen tum effectui, tum efficienti causæ convenit. præterea interdum pro ipso affectu cerebri, genito à succo sæculento & nigro, sumitur: interdum pro ipso delirio, sive symptomate, quod illum affectum consequitur. Hoc modo definitur Melancholia, delirium sine febre cum metu & mœstitia, absq; manifesta causa ab intemperie frigida, sicca, ex humore, vel vapore melancholico, cerebrum occupante, & spirituum in cerebro substantiam alterante.

R 5 Affect.

VI.

Causa melancholia.

Affectus ad quem consequitur Melancholia, est cerebri quatenus pars similis & non dissimilis, quia sensum fit, Deinde quia teste Hipp. 6. Epid. sect. 7. Melancholici magna ex parte Epileptici fiunt, & epileptici melancholici, prout in hanc, vel illam partem infirmitas, & humor Melancholicus repit. nam ubi in corpus, epilepsiam, ubi in mentem, melancholiam procreat; in corpus autem repit, auctore Galeno 3. de locis cap. 7. si in cerebro obstructions excitavit. in mentem verò, si cerebri & spirituum substantiam in suam naturam transmutaverit, sive ea intemperie affecerit, quæ tenebris correspondet: qualis intemperies est frigida sicca, cum humore & vapore melancholico, quæ ex consensu quoque cordi tandem communicatur. Communia omnibus melancholicis signa, sunt delirium cum timore sine evidenti causa, diffidentia, odium hominum, cogitationes profundæ, & præ dispositione corporum & humorum, vitæque studio variæ ferè ut, in ebrietate; alij enim irascuntur quidam flent, nonnulli rident, aliqui mortem experunt, hi reges, divinos vates, divites se esse imaginantur, illi miseros, pauperes, defunctos, bruta animalia, &c.

Species melancholia tres.

Ratione materiæ hujus, melancholia in tres species dividitur, quarum una primaria, sive per essentiam vocatur, altera ex consensu totius: tertia, hypochondriaca & flatulenta. Primaria autem quæ continua est, cum cogitationibus intentis, fit ab humore melancholico, cerebrum duntaxat obsidente: melancholia ex consensu totius, fit ab humore & vapore melancholico, redundante in toto corpore, & ambitu omnium venarum, & propterea cerebrum ipsum afficiente: cujus notæ sunt, gracilis, niger, hirsutus corporis habitus ex toto melancholicus vel à natura, vel contractus ex curis, vigiliis, victu crasso, &c. Melancholia verò hypochondriaca,

Melancholia, fit propriè à vapore melancholico ex hypo-
 chondriis, sive quibuscunque partibus imi ventris
 in cerebrum sublato. Hi vapores in cerebrum a-
 scendentes variis modis oriuntur, primò, ab effe-
 vescentia quadam sanguinis, ex venis illis, quæ ali-
 mentum ad jecur deferunt, ut Diocles voluit. Se-
 cundò, magno pylori, & ineumbentium partium
 ardore, chylum & sanguinem in primis venis adu-
 rente, non autem à vera inflammatione, ut ipsi Ga-
 leno videtur 3. *de Locis cap. 7.* Tertiò, vitio lienis, à
 seroso humore, è liene in ventriculum irruente, ut
 testatur Gal. 5. *de Locis cap. 6.* vel à melancholico
 humore, circa viscera detento, qui à liene non ex-
 purgatur, tandem à putredine in vasibus uteri & se-
 minalibus, ex suppressis mensibus, & semine reten-
 to; quod viduis, & grandioribus virginibus accidit,
 ut vult Galen. 6. *de Locis cap. 5.* Hipp. lib. de Morbis
 virginalibus. In his omnibus penè, malum prius
 ventriculo, quàm cerebro communicatur, & con-
 coctio vitatur, undè æstus in præcordiis, fluctua-
 tio, dolorque ventriculi ad dorsum se extendens,
 & scapulas, compressio interdum diaphragmatis
 ut suffocari videantur, anxietas, nausea, ructus acidi
 aliaq; circa ventriculum accidentia: nonnunquam,
 ubi effervescencia in arteriis est, malum cordi quo-
 que communicatur, quæ omnia ructu, vomitu, al-
 vi dejectione mitigantur, refrigeratoque cibo, dein-
 de per intervalla recurrunt, præcipuè post crudi-
 tates.

Melancholia si intendatur, in maniam abire *Mania*
 solet. Est autem Melancholia adeò mania cognata,
 ut mania pro melancholia, & melanch. pro mania,
 à Gal. & Hipp. non rarò sumatur. Verùm mania
 propriè dicta, à melancholia, non tantum sympto-
 matum magnitudine, ut Tralliano videtur, sed
 etiam

V I.
Causa Ma-
nia.

etiam modo delirii, ac etiam cerebri affectu, & cau-
sis distinguitur. Nam in mania ægri timidi nullo
modo sunt, ut in melancholia, sed audaces, & teme-
rarii, quique iracundia, jurgiis, clamoribus; aliisque
perturbationibus pro qualitate humorum, omnia
agunt, ac interdum, ut feræ, obvios invadunt. De-
inde in Mania, ut in Melancholia, læditur cerebrum,
quatenus pars similis, vel per se, vel per consen-
sum, ex toto, aut præcordiis; sed mania, propriè ab
intemperie vehementur calida, oritur, sive à ferven-
te calore cerebri, spiritus animales in suam natu-
ram alterante, id est, igneos reddente: ea intempe-
ries calida, aliquando sola est, plerumque cum ma-
teria, scilicet cum succis calidis & mordentibus,
sed sine tumore, quales succi sunt sanguis fervens,
unde mitissima mania; vel succus melancholicus
adustus, vel bilis flava perassata, unde immanissimus
furor. Quare erit Mania depravata functio princi-
pum facultatum, sine febris continua cum excan-
descencia, à fervida cerebri intemperie, cum humo-
re calido sine tumore. Dico sine febris & sine tumo-
re, ad differentiam phrenitidis, deinde dico cum ex-
candescencia, & à fervida cerebri intemperie, ad
differentiam Melancholiæ propriè dictæ. Ad hæc
genera omnis desipientiæ formæ reduci poterunt.
Sunt autem variæ delirii formæ, quæ omnes conse-
quuntur dispositionem corporis, & naturam causæ
lædantis, aut humoris peccantis, aliquando vitæ
studium & conditionem, ut sunt Lycanthropia, à
Melancholia adusta; Cynanthropia à bile præassata;
Hydrophobia infania, ex morfu canis rabidi, item
furor ex vesano more.

De verti-
gine.

Est præterea depravata imaginatio, cum læsio-
ne motus voluntarii in Incubo, ac quoque in vertigi-
ne, verum in vertigine per se, est depravata perce-
ptio sensationum primarum, præcipuè specierum
visi:

visibilibus, ex accidente depravata imaginatio, qua
 genus falsa motus species à sensibus ei offertur; nam
 in vertigine iudicium imaginationis non propriè
 convertitur, quam motum à quiete discernit, & il-
 lam motus speciem falsam esse intelligit: Cujus con-
 trarium in delirio apparet, nam melancholici se falsa
 imaginari non putant; at vertiginosi, visionem il-
 lam, in qua omnia circumaguntur, falsam esse non
 dubitant: nihilominus quia in vertigine, cum falsa
 motus specie, imaginatio sensationes apprehendit,
 depravata functio imaginationis dici poterit.

Causa hujus depravatæ functionis, est inordi- *Causa*
 natus motus spiritus animalis, insigniti visibilibus *vertiginis*
 speciebus. nam spiritus animales in cerebro, mini-
 stri imaginationis, non solum vim sentiendi exter-
 nis sensibus tribuunt, sed etiam eorum objecta de-
 ferunt ad interiorem sensum: proinde species visi-
 biles ab imaginatione, cum motu percipiuntur,
 quo moventur spiritus animales.

Quare erit vertigo falsa conversionis imagi- *Definitio.*
 natio, affecta cernendi facultate, aliquando oculis
 caligine offusis, unâ cum læsione motus volunta-
 riis, ex inordinato motu spiritus animalis, insigniti
 speciebus visibilibus, à flatulento vapore permixto
 spiritibus, coarctante ventriculos cerebri. Con-
 currunt enim in vertigine cum falsa imaginatione
 conversionis, inordinato motu spirituum, de-
 pravata visio, & in gravi vertigine, quæ *oxlopia* di-
 citur, oculorum obtenebratio, ac præterea, quia non
 habent, ubi gressum figant, cum omnia circumagi
 videantur, voluntarii motus læsio sive lapsus peri-
 culum.

Circumaguntur autem spiritus animales in *Morbus.*
 cerebro, ob angustiam aliquam anteriorum ventri-
 culorum cum debilitate retentricis specierum in
 cerebro; ea angustia interdum est obstructio ab hu-
 more

CAP.
VI.

more flatulento, aut crasso vapore spiritus animales commovente, & liberum transitum impediēte; aliquando compressio à cranii fractura, aut depressione ex ictu, casu, &c. nonnunquam subsidentia dolore ex acri maligno aut venenato & flatulento humore, crasso vapore expultricem cerebri irritante. Nam plerumque vertigo calidam causam includit, aut inæqualem intemperiem, partim frigidam ratione materiæ, ex qua flatus, partim calidam ratione causæ materiam movētis, cerebrumque irritantis; sæpè enim tenuis calidusque spiritus per arterias in cerebri ventriculos irruens vertiginem excitat, unde teste Gal. 3, de Loc. aff. 8 nonnulli sectione arteriarum pone aures ab hoc malo curati fuerunt.

Differentia
vertiginis

Materia expultricem cerebri irritans spiritus que commovens, aliquando in cerebro coacervatur, nonnunquam à ventriculo transmittitur, uterque aliis que partibus. Quare vertigo alia primæria erit aut ex proprio cerebri affectu, quam demonstrat dolor, gravitasque capitis, tinnitus aurium, obliquis olfactus, aut alicujus sensus: alia per consensum & potissimum ventriculi, quam arguit inappetentia, nausea, oris amaritudo, cardialgia, &c. Deinde alia levis dicitur, quæ omnia tantum circumagitur à leviori spirituum commotione, extenuioribus vaporibus; alia gravis, quæ *σφοδρά*, & *σφοδρόν* dicitur, ubi dum circumaguntur, tenebræ oculis offunduntur. hæc à graviore affectione oritur, spiritibus, qui ad oculos tendunt, ita transversim motis, ut vilum prorsus destruunt, ex vapore crassiore & copiosiore; quare hæc species Epilepsiam, aut Apoplexiam præcedere plerumque solet.

Vertiginis & incubi magna cognatio est, utrumque enim phantasma quoddam est, & à vaporibus

poribus, cerebri ventriculos obstruentibus, ac etiam præludium Epilepsiæ, aut Apoplexiæ; sed veritigo vigilantibus obvenit; Incubus dormientibus, cum sensu gravitatis & suffocationis, à vapore magis aliquo modo obstruente. Quare erit Incubus infolium parvum, sive phantasma rei gravis & suffocantis, id est, vocem & respirationem intercipientis, à vapore crasso sursum ascendente, cerebrique ventriculos implente, & liberam spirituum ad nervos penetrationem impediente.

Causa
ius.Definitio
incubi.

Nam sedes affecta est cerebrum cum phantasia lædatur, incubus sit nil nisi phantasia rei gravantis licet diaphragma quoque afficiatur. Morbus causa læsionis est levis aliqua obstructio ventriculorum cerebri liberum transitum spirituum ad nervos impediens, cujus ratione ad instrumenta respirationis, quæ in somno non quiescunt, quia spiritus libere non descendit, ipsa respiratio impeditur sensusque suffocationis & gravitatis percipitur.

Pars affe-
cta.

Morbus.

• Causa morbi est crassus vapor à præcordiis initio somni potissimum ascendens, cerebrique ventriculos implens, genitus ex crassa pituita, aut melancholia concervata potissimum in ventriculo primisque venis; hic vapor dum ascendit, quia diaphragma comprimere solet, nonnulli recentiorum à sola illa compressione ex crassis vaporibus ascendentibus incubum fieri putant, cum ea sola non sufficiat, nisi cerebrum quoque afficiatur. Comitantur hunc affectum motus difficilis, & in somno sensus torpidus, suffocationis imaginatio, & quasi ab aliquo super incumbente oppressio, ita ut exclamare nequeant, sed confusam vocem edant, &c.

Causa
morbifica.

Hactenus de depravatis functionibus principum facultatum diximus, consequens est, ut de diminutis & abolitis agamus, ut sunt *divox, pægaris, obliuio*

VI.

*Amentia**Definitio
amentia**Causa.**Oblivio.*

oblivio, soporiferæ affectiones. A' vola Latinis A-
mentia & extrema fatuitas est, abolita functio men-
tis sive cogitationis: *μωρία* sive *μώρωσις* stultitia
est debilitas tantum rationis: Nam amentia defini-
ri poterit defectus rationis, quem plerumque co-
mitatur defectus imaginationis & memoria, adveni-
ens sine læsione sensus & motus ex defectu caloris
nativi residentis in substantia cerebri. Dico defectum
rationis sine læsione sensus & motus ad differentiam
apoplexiæ, cari & similibus: ubi cum functionibus
mentis perit sensus & motus. Nam in amentia illa-
so sensu & motu tantus est rationis defectus, ut nil
omnino dijudicare & inter se conferre queant, sed
stupidi ad brutorum modum omnia sine animad-
versione negligant.

Causa proxima amentia est defectus nativi ca-
loris residentis in substantia cerebri, qui vel privati-
vus est, ex defectu spirituum & substantiæ caloris
nativi in cerebro, vel positivus, ubi vis ejus obtru-
ditur à contrario frigore, graviq; intemperie frigi-
da humida plerumque cum materia pituitosa, quæ
actiones omnes torpidas reddit. Deinde defectus il-
le vel est, ab utero & in formatione fœtus ob non
debitam quantitatem & formam cerebri, vel post
ortum à vehementissimis cerebri affectibus calorem
nativum debilitantibus, ut ex apoplexia, peste, gra-
vi epilepsia, &c. Ab iisdem causis sed levioribus ori-
tur *μωρία* diminuta functio rationis, orta à debili-
tate caloris nativi in cerebro ex intemperie frigida
potissimum.

Ad amentiam plerumque consequitur oblivio.
Nam abolitâ ratione læditur unâ imaginatio & me-
moriam: at contrâ læsâ memoria non semper lædi-
tur unâ ratio aut imaginatio: memoria abolita &
debilis communi nomine oblivio dicitur, propriò
verò

verò & absolutè memoria deperdita, ubi nil omnino præteritorum recordantur, oblivio: debilis verò aut diminuta memoria, ubi difficulter aut ex non longa tempore reminiscuntur, stuportantum memoriæ & minus absolutè oblivio. Est igitur oblivio *Eius de-* abolita aut deperdita memoriæ functio orta à debi- *nitio.* litate aliqua caloris nativi in cerebro ex defectu aliquo spirituum & substantiæ ejusdem, vel ex intemperie frigida, conjuncta plerumque cum siccitate aut humiditate, & materia pituitosa vel melancholica.

Sedes affecta est cerebrum secundum substantiam: causa verò est debilitas quædam caloris nativi residentis in substantia cerebri, sed non tanta ut cum memoria imaginatio & ratiocinatio lædatur, Nam à potiori non oblivio, sed amentia aut stultitia tunc diceretur. Debilitas illa nativi caloris provenit ex defectu aliquo spirituum & substantiæ caloris in cerebro ab utero, vel gravi morbo cerebri, ut apoplexia, peste, vehementi ictu, senio, &c. Plerumque à contrario frigore frigidaque intemperie læditur autem memoriæ intemperies frigida, aliquando per se sola, plerumque cum humiditate, aut siccitate conjuncta, vel cum materia pituitosa, aut melancholica in cerebro coacervata: per se autem ipsa intemperies sicca cerebrum ineptum reddere potest ad species suscipiendas: & humida ad conservandas, ut in pueris. Ab iisdem causis, sed levioribus oritur debilis memoria. Qualis sit intemperies, & ex quo humore, deprehendimus ex habitu corporis, excrementis, victus ratione, &c.

Soporiferæ affectiones sunt, ut alibi dictum est, in quibus sensus communis aut primus, (cui debetur somnus & vigilia) propriè læditur vel solus, unde *καμνη*, vel simul cum facultate motiva & principis, ut in apoplexia, caro lethargo, & catalepsia.

S

quibus

*Pars affecta.**Morbus causa oblivionis.*

quibus addi poterit epilepsia. Horum symptomatum communis quædam ratio est, omnium enim sedes affecta est cerebrum, & causa frigida. Differunt tamen & modo læsionis, & varietate affectus lædentis. Nam coma propriè dictum symptoma est sensus communis, cæteræ affectiones, & sensus communis & principis facultatis. Deindè in comate & lethargo magis læditur substantia cerebri; in cæteris magis ventriculi, & in caro magis anteriores, in catalepsia posterior, In apoplexia & epilepsia omnes ventriculi.

Apoplexia.

Apoplexia ὁπὸ τῆς ἀποκλήπτειν nomen habet, quòd ægri hoc malo correpti repenti corruant, non aliter, quàm si gravissimè percussi essent, undè syderatio dicitur, quasi fulmine percussi: & morbus attonitus, quia stupet mens & corpus: item universalis paralyfis, quia resolvuntur omnes functiones animales. Discernitur autem vera apoplexia à cæteris symptomatibus, primùm quod ægri repenti concidant cum privatione omnium functionum animalium excepta respiratione, quæ læsa aliquo modo permanet: deindè quòd excitati partem corporis resoluta ut plurimum habeant. Causa immediata hujus mali non est sola intemperies, quæ repenti non fit, sed morbus instrumentalis, & potissimùm angustia ventriculorum cerebri, licet sine valida intemperie substantiæ cerebri facultatem ipsius debilitante non oriatur, quò in primis à caro & epilepsia distinguitur. Verùm de causa non planè consentiunt Medici. Aliqui à sola obstructione ventriculorum & cavitatione cerebri apoplexiam immediatè fieri arbitrantur: nonnulli non à sola obstructione, sed cum Galeno com. 4. 2. aph. 4. à compressione ventriculorum cerebri, & potissimum ab affectu inflammatorio, ex sanguine copioso irruente in cerebrum, venas & arterias tendente, & ventriculos cerebri comprimente: aliquando ab ipsa inflammatione aucta, cujus ratione

*Diverse
opinionēs
circa causam
Apoplexiam.*

phrenitis & lethargus in apoplexiam interdum terminatur. Aliqui ex Hipp 4. de Vict. in acut. cont. 23. apoplexiam quoque fieri arbitrantur ab interceptione aut obstructione carotidū, aut venarum sive articularum, per quas materia in cerebrum defertur, & spiritus animalis generatur, à copia sanguinis irruente, in quam affectionē plethorici incidere solent. Verū cum legitima apoplexia sit, in qua agri repente sine motu & sensu concidunt, & excitati partem corporis resolutam habent, non erit à sola obstructione aut interceptione jugularium. Nam his ligatis & interceptis hominem non repente motum, sensumque amittere sua experientia demonstravit Gal. 4. de placitis cap. 6. attamen rationi consentaneum est, si ista interceptio diu duraverit, nihilque virtutis à corde in cerebrum influxerit actiones animales sensum debilitari, donec prorsus aboleantur; quare in hoc affectu cerebrum per consensum tantum afficitur non aliter, quā in gravi syncope, unde vera apoplexia dici nequit, sed notha. Deindē quando ob interceptionem vasorum in toto corpore à plenitudine suffocatur calor nativus, præceps est omnium virium, non modo animalium, sed etiam vitalium lapsus, sed non vera apoplexia; nec etiam proprie, ubi sanguis tanta copia in cerebrum irruit, ut ventriculos planē repleat, & spiritus omnes elidat, caloremque nativum subito opprimat, sed tantum ubi vias spirituum intercipit, & substantiam cerebri constringit, vasaque comprimit. Hæc affectio à Gal. com. 42. ap. 2. dispositio inflammatoria dicitur, non vera inflammatio, quando sanguis in parte coacervatus putrescit, verū ista species apoplexiæ rara est, & juvenibus plethoricis accidit. Plerumque causa proxima veræ apoplexiæ est obstructio omnium ventriculorum cerebri effluxum spirituum impediens ex humore crasso repente influente, ac ipsam etiam substantiam replente, ut turgescat. S 2 Quare

CAP.
VI.
*Definitio
Apoplexia.*

Quare vera Apoplexia definiri poterit repentina privatio omnium functionum animalium, respiratione solâ læsâ manente, ab angustia ventriculorum & cavitatum cerebri cum debilitate expultricis ejusdem ex crasso humore confertim irruente. Dico respiratione læsâ manente, quia sublata omni respiratione animal vivere nequit. Manet quidem respiratio, sed læsa, & proindè ex læsione respirationis judicamus periculi aut ipsius apoplexiæ magnitudinem.

Causa Apoplexia.

Causa proxima veræ apoplexiæ est angustia ventriculorum cerebri cum intemperie debilitante facultatem cerebri, ut ad expulsionem causæ morbiicæ statim insurgere nequeat; sicut in epilepsia fit, angustia illa, vel obstructio, vel compressio ventriculorum & cavitatum cerebri est. Obstructio autem fit à crasso frigido humore confertim irruente, qualis est pituitosus, aut melancholicus, genitus ex prava crassaque victus ratione crapula, &c. Quæ dignoscitur ex causis evidentibus progressis propriis quæ effectis. Compressio verò fit ab affectu inflammatorio ex sanguine irruente in cerebrum, quæ plethoricis potissimum accidit. Cujus signa sunt oculi, faciesque rubicunda, pulsus magnus, tensio venarum jugularium & capitis, &c. Irruunt isti humores in cerebrum incitari & commoti à causis plerumque externis, ut immodico calore aut frigore, ab ebrietate, intemperativa Venere, timore, fulmine, &c. Obstructis ventriculis & viis, spiritus animalis non descendit, unde sensus & motus perit.

Epilepsia.

Επιληψία Latinis morbus caducus comitialis & lunaticus, gravis, & portentosa affectus species est, ad cujus nomen teste Plinio despui consuetum fuit. Continetur à Galeno sub genere convulsionis, licet convulsio exquisita non sit οὐκ ἐστὶν, ut

τέτατο

geranus perpetua, sed ex temporum intervallis acci-
dens cum sensuum mentisque oblacione; qualis mo-
tus convulsioni similis est, sive convulsivus cum
contractione membrorum voluntarii motus. Nam
in Epilepsia concurrunt motus convulsivus, sive con-
cussio & conquassatio cum nervorum contractio-
ne: unde membra & contrahuntur versus initium
suum, & concutiuntur. Concutit autem se cerebrum
principium nervorum, ut expellat id quod noxium
est, sive quod facultatem expultricem cerebri irri-
tat, non aliter quam in sternutatione. Contrahunt
autem se omnes nervi & muscoli corporis ad cere-
bri contractionem, & simul mens sensusque lædun-
tur ob angustiam ventriculorum cerebri: Verum
illa contractio perpetua non est, qualis in convul-
sione propriè dicta accidit, sed cum relaxatione in-
terpolata, ut in motu voluntario.

Quare erit Epilepsia motus convulsivus toti. *Definitio e-*
us corporis unâ cum sensus & principis functionis *pilepsia.*
lacione, ortus à pituitoso melancholico, vel mali-
gno humore, aut vapore cerebri ventriculos arctan-
te, & expultricem cerebri irritante, ut sua contra-
ctione extrudat id, quod noxium est. Pars affecta,
ubi resident facultates læsæ, est cerebrum. Deindè *Pars affe-*
quia subitò fit, & desinit, morbus causa immediata *cta.*
hujus læsionis, non erit intemperies, nec quemad- *Morbus*
modum in melancholia cerebrum secundum sub- *causa im-*
stantiam hic afficitur, sed secundum ventriculos *mediata.*
tantum non ob angustiam perfectum cum intem-
perie substantiæ cerebri, qualis est in apoplexia, ubi
ad expellendum id, quod noxium est, facultas ex-
pultrix insurgere nequit. Nam in Epilepsia concur-
rit angustia ventriculorum cerebri cum motu fa-
cultatis expultricis, ut id, quod noxium est, expel-
lat; Ob angustiam ventriculorum mens sensusque læ-
duntur, & eo magis quo major obstructio, dum

verò ad expellendam id, quod noxium est, principium nervorum contrahitur & concutitur, omnes partes motum convulsivum patiuntur.

Angustia illa, est vel obstructio, vel subsidencia ventriculorum. Obstructio autem fit quidem à materia crassa, veluti pituita, aut melancholia, sed non sub propria forma, verum quia tenuior spumosioreque facta; à crasso vapore obstruente raro aut levis epilepsia fit. Subsidencia verò ventriculorum interdum fit ab humore, plerumque à vapore maligno irritante cerebrum & meninges, ut sese violenter concutiat; dum autem principium nervorum sese concutit, spiritus aut suffocantur, aut dissipantur, & extra ventriculos protruduntur, unde ventriculi cerebri concidunt, & ægri sine motu & sensu jacent, donec spiritus in debita quantitate regenerentur. Ab obstructione ventriculorum epilepsiam fieri ostendit translatio materiae morbi- ficæ, interdum à ventriculis ad nervos. Nam Epilepsia in paralyti linguæ, aut alterius lateris non nunquam terminatur, & teste *Galen. Com. lib. 4. de vi- et ratione*, apoplexia per mediam Epilepsiam in paralytin quandoque terminatur.

*Epilepsia
triplex.*

In omni Epilepsia afficitur cerebrum, aut per se primario affectu, aut per consensum alterius partis nimirum vel visceris alicujus potissimum ventriculi vel partis in ambitu corporis, unde à Galeno triplex constituitur Epilepsia: una primaria ex cerebri proprio affectu: alia ex consensu viscerum, imprimis orificii ventriculi, aliquando uteri, lienis, &c. tertia ex consensu partis alicujus in ambitu corporis: ut manus, pedis, &c. ab aura maligna ascendente in cerebrum; vel à venenata qualitate alteratis per continuationem partibus cerebrum non tam obstruente, quam irritante ut sese contrahat, & quod noxium est, excutiat: huc refertur mor-
sus

sus venenatus, ubi nerveam substantiam venenum aggreditur.

Affectus hic ex eorum numero est, qui accessiones intermissionesquæ habet; incipiente paroxismo ægri repente concidunt, sæpe cum clamore convelluntur, totoquæ corpore concutiuntur, &c. spuma ex ore erumpit, functiones omnes animales laeduntur, &c. Epilepsiam ex primario affectu demonstrant sensuum mentisque stupor, oblivio, capitis gravitas, & dolor, turbulenta somnia, & quod paroxismus subito invadat: Ex consensu ventriculi cardialgia & palpitatio, difficilis inedia tolerantia, nausea, vomitus præcipue instante paroxismo & præsentē, &c. A parte in habitu corporis, ut à manu, &c. quando instante paroxismo sensus aoræ frigidioris per continuitatem in cerebrum ascendentis percipiatur, &c.

Ἀδραγία, Latinis iners oblivio & veternus, *Lethargus*. duplexprehenditur: unus illegitimus, somnus nimirum inexplibilis, à pituitoso vapore vel humore putrescente in cerebro: alius legitimus, qui à Galeno 3. *Metb.* passio dicitur, secundum speciem phrenitidi contraria; utriusque enim causa est humor putrescens in cerebro, sed materiâ & loco differunt. Nam materia phrenitidis est bilis putrescens circa meninges potissimum: materia lethargi est pituita, putrescens magis in substantia cerebri, ac proinde in lethargo cum stupore principum facultatum & inexplibili somno adest febris continua, lenta & symptomatrica, quæ simul principem facultatem aliquo modo depravat: quod ex indecentibus ægri motibus apparet.

Quare erit Lethargus inexplibilis somnus cum diminuta functione principum facultatum & fe-
bri continuâ, lentâ, & symptomatricâ; ortâ ex pi-
uita putrescente in cerebro. Putrescit autem pi-
uita

tuita aliquando non impacta, sed diffusa circa cerebrum & meninges, interdum impacta cerebro aut meningibus: undè in lethargo inflammatio pituitosa cum febris lentâ & continuâ, ut in phrenitide inflammatio biliosa cum febris ardente continuâ. Lethargicos comitatur febris lenta, altus sopor ex quo excitati & interpellati vix respondent, obliuiofi & amentes sunt, crebrò oscitant, ac hiant ore aliquando persistunt, tanquam claudere id oblitum, pulsus undosi sunt, respiratio rara, debilis, urina iumentorum similis, facies tumida, aliquando tremunt & desudant, &c.

Carus.

Carus exquisitus propriè dictus cum Lethargo & Apoplexia magnam cognationem habet: fiunt enim omnes ab intemperie frigida, & principes functiones pari ratione lædunt, sed differunt modo læsionis & causâ. Nam in lethargo principes functiones tantum debilitantur, in cæteris abolentur. Peculiariter verò in Apoplexia sensus & motus planè aboletur, & respiratio læditur, & ægri excitati, ut dictum est, partem aliquam resolutam habent. Nam apoplexia, quæ curatur, in paralyfin desinit. Verum in Caro sensus tactus planè abolitus non est: nam puncti tantum, aliquo modo sentiunt, aliâs non; & respiratio non læditur, nisi affectus nimium augetur, nec in paralyfin desinit. Deindè Lethargus fit affecto cerebri corpore: Apoplexia & Carus, sicut & Epilepsia, ventriculis: verum in Apoplexia cum obstructione ventriculorum cerebri ipsum corpus cerebri intemperie quoque afficitur, & facultatis transitus secundum poros omnes cerebri impeditur: In caro tantum impeditur secundum ventriculos cerebri, præcipuè anteriores & medios.

*Definitio
cari.*

Quare Carus erit abolita functio animalis facultatis, respiratione manente, orta ab angustia aliqua ventriculorum cerebri impediēte transitum spiri-

Spirituum animalium. Nam causa cari est angustia ventriculorum, quæ tribus modis fit: 1. compressio-
ne à capitis ictu, tumore premente, ut colligitur ex
42. *Aphor. sect. 2.* Deindè subsidentia ventriculorum
cerebri à qualitate dolorifica, ut vult *Gal. lib. 4. cap. 2.*
de Locis affectis: vel à magna cerebri frigiditate, qua-
lis iis evenit, qui per loca frigida iter faciunt, aut O-
pium aliaque Narcotica sumserunt. Tertiò obstru-
ctione, ex humore frigido obstruente ventriculos
cerebri, sed non adhærente parietibus ventriculo-
rum, nec ita debilitante temperiem cerebri, ut in
apoplexia, vel à vapore crasso, à toto corpore, ven-
triculo, hypochondriis, &c. quod accidit in rigore
februm. Huc referri poterit obstructio aut interce-
ptio carotidum, de qua supra.

Catalepsi.

Catalepsi & Catochus vocabula ambigua
sunt. Nam catochus pro comate vigilante, & aliis
similibus affectionibus interdum sumitur, & cata-
lepsi ab Hipp. pro A phonia sc. pro apoplexia, aliis-
que affectibus, in quibus subitò vocis, sensus, & mo-
tus privatio. Verùm *auth. Galeno. comm. in 3. Aphor.*
sect. 2. idem propriè est catalepsi & catochos, ac u-
troque vocabulo eadem affectio denotatur, nimi-
rum latinis detentio, occupatio, & congelatio, quod
laborantes eo corporis habitu permaneant, quo cor-
repti primum erant, statuatque referant. Hæc passio,
quo ad formam corporis, tetano non absimilis est:
in utroque enim corpus rigidum est, verùm in te-
tano partes contrahuntur, à depravato musculo-
rum motu, & nec sensus, nec imaginatio læditur:
in catalepsi muscoli planè quiescunt, immemores
officii sui, & qua forma dispositæ sunt partes, per-
manent, quasi congelatæ, indeinde ægri puncti pun-
ctionem non sentiunt, quod phantasia abolita sit,
licet, teste Galeno, aliquando audiant, & videant;
præterea respiratio manet, interdum ira exigua est,

Signa.

S s ut

VI.

ut nulla appareat, pulsus debiles crebriq; sunt, facies subrumida rubore tincta, urina alvusq; supprimitur: qui minus graviter afficiuntur liquorem ori infusum deglutiant; si à malo victi sunt ad nares rogorum. Quare læditur cerebrum potissimum, quo pars, undè nervi motorii, scilicet posterior, sicut in caro anterior magis, in apoplexia utraq; pars cerebri afficitur. Causa hujus mali putatur intemperies cerebri frigida sicca, principium nervorum quasi gelu contractum detinens, & spiritus animalis immobiles reddens; Verum quia subito fit, subitoque solvitur, non erit à sola intemperie, sed potius à materia cerebrum afficiente aut principium nervorum obstruente, constringente, & tendente, undè muscoli omnesque partes inflexiles redduntur, eademque forma permanet. Materia illa plerumque est humor melancholicus omnium aptissimus ad tensionem illam efficiendam, deinde pituitosus, potissimum pituita vitrea: non raro vapor crassus pituitosus aut melancholicus, qualis in paroxysmis febrium, in suffocatione uteri, morboque hypochondriaco aliquando accidit. Nam initio paroxysmorum interdum Catalepsia oritur, quæ in declinatione febris desinit. Aëtius Catalepsiam fieri quoque dicit ob tensionem vasorum ex repletionem capitis, ut in adolescente illo, qui quarto die per hæmorrhagiam liberatus fuit.

*Definitio**Catalepsis.*

Quare erit Catalepsis abolita functio principum facultatum cum tactus & voluntarii motus destructione, in qua agri servatâ respiratione corporis habitu permanent, quo correpti erant, orta quidem plerumq; ab intemperie frigida sicca, sed propriè ex materia, humore aut vapore cerebri posteriora obstruente & tendente, spiritusque congelante.

Cere-

Cerebro ut communi sensorio vigiliæ anima-
lis functio, & somnus ejus quies propriè & primò
accidit. Nam vis vitalis hac quiete non indiget &
naturalis vehementis in somno operatur, quando
sensus omninò feriantur, sive quando parùm aut
nihil virium à cerebro influit. Quo autem minus
virium influit, eò profundius dormit animal. Ve-
rùm non omnis impotentia sensus somnus propriè
dicitur: sed naturalis, instaurationis virium ani-
malium gratia, ab utili humore cerebrum madefa-
ciente; vel quæ à naturali magnitudine parùm dif-
fert; non toto genere præter naturam; quæ somnus
non naturalis stupor & insensibilitas dicitur, qualis
accidit in sopori feris affectibus.

Læduntur autem functiones sensus primi tri-
bus modis, ut alibi dictum est. Somnum propriè
excitant, quæ humectant. Vigiliæ quæ nimium
exiccant, stuporem verò inducunt & insensibilita-
tem, quæ nimium refrigerant. Contra sensus ir-
ritant & perturbant, quæ nimium calefaciunt: mor-
dent, erodunt, &c. Quare quæ cerebrum refri-
gerant, & simul humectant, ut sunt pituitosi mor-
bi stuporem cum sopore gignunt, & affectus om-
nes soporiferos. Quæ verò nimium calefaciunt
& exiccat vigiliæ cum irritatione sensuum & de-
lirio inducunt. Attamen in omnibus affectibus so-
poriferis frigida intemperies primas obtinet; in sen-
suum perturbationibus, calida.

Coma, & Cataphora, Galen & Hipp. eadem Coma &
passio est, licet Cataphora, 13. Meth. med. tanquam Cataphora.
genus omnium stuporum sine febris sumatur. Signi-
ficat autem uterque nihil aliud, quàm propensio-
nem sive delationem in somnum, quod ægri vigilan-
tium munia obire, & oculos apertos tenere neque-
ant, sed perpetuò vel verè dormiant, vel quod palpe-
bras conniventes, aut clausas more dormientium
habe-

habeant, cum tamen re ipsa non dormiant. Pro-
indè comatis species duæ erunt, una in qua ægri
profundè & diu dormiunt quæ Coma vel Cata-
phora simpliciter dicitur, plerumque cum adjectio-
ne, Coma somnolentum, symptoma non facultatis
principis, sed sensus communis, *ut in s. cap. path.
dictum est.* Altera in qua ægri palpebras conniven-
tes, & clausas habent, spe somni conciliandi, cum
tamen rarò dormiant, & plerumq; multis phantas-
matibus infestentur, quæ principem facultatem de-
pravant, ac verum somnum impediunt. Hæc, Co-
ma aut Cataphora simpliciter nunquam dicitur, sed
quia ex contrariis affectionibus componitur, cum
adjectione coma vigilans. veteres verò, ante Gale-
num, *κατωχὸν* appellarunt. Causa autem comatis
somnolenti est intemperies frigida, vel humida, vel
frigida simul & humida, plerumque cum materia,
scilicet cum humore pituitoso; vel vapore in cere-
brum ascendente, primum sensorium nimis hume-
ctante, & ligante, ac liberam spirituum animalium
distributionem impediante, verum ubi frigiditas
dominatur, cum gravi sopore, sensus mentisque stu-
por semper conjungitur, unde alii affectus sopori-
feri, ut supra demonstratum est. Quare erit Coma
functio diminuta sensus communis aut somnus
profundus & immodicus, ortus ab intemperie fri-
gida humida plerumque cum vapore vel humore pi-
tuitoso cerebrum afficiente. Cataphoræ vigilan-
tis plures sunt species. Nam aliquando sine delirio
esse potest, cujus generis est illa passio, qua ægri ob
imbecillitatem virium, genas apertas tenere neque-
unt, cum tamen parum, aut nihil dormiant: plerum-
que cum delirio conjuncta est, vel simplici, vel
phrenetico. Coma vigilans cum simplici delirio,
in ebrietate interdum accidit, ob mixtos vapores
acres & humidos in cerebrum ascendentes. Coma
vigi-

vigilans cum delirio phrenitico, mixta affectio est, ex Lethargo & phrenitide, ac febrem symptomaticeam conjunctam habet, sub hoc continetur Catapora pigra, cujus meminit Hipp. 3. Epide. & illa affectio, quæ *τὸ φομανία* à nonnullis dicitur. Causa verò Comatis vigilantis, quæ ex infirmitate virium non oritur, est mixta intemperies cerebri, orta ex bile, permixta cum pituita, vel ex sanguine copioso & pituitoso cum bile, vel ex vaporibus biliosis & pituitosis. Bilis autem cum pituita in cerebro coacervata, si non putrescat, sive inflammationis expers sit, cataphoram vigilantem, non phreniticam gignit: si putrescat & inflammetur, cataphoram phreniticam producit, omnesque mixtas ex Lethargo & phrenitide passiones, quæ ex dominio sive exuperantia bilis aut pituitæ distinguuntur. Nam ubi exuperat pituita, ad somnolentiam ægri magis inclinant; ubi bilis, ad vigilias & phrenisim; ubi verò utraque æqualiter dominatur, & ad finem usque desipientia cum somnolentia persistit, affectio planè media oritur, quàm *τὸ φομανία* veteres nonnulli vocarunt.

De pervigilio.

Profundiori somno opposita est dormiendi impotentia, quàm Græcis *ἀγρυπνία* vocant, Latini pervigilium, immodicæ aut superfluas vigilias. Hoc symptoma depravata functio sensus primi est, non quod per immodicas vigilias aliter, quàm secundum naturam sentiamus, sed quod diuturniori tempore, quàm vires exigunt, & præter voluntatem nostram in ea functione perseveremus. Somnus naturalis, quies sensus primi fit, quia retracto calore nativo ad interiora effluxus spiritus animalis in organa sensus, motusque prohibetur ab unli vaporibus cerebrum madefaciente, viresque ejus ligante.

Quare

VI.
Definitio
pervigilii

Causa.

Quare pervigilium erit immodica functio facultatis sentientis, orta à nimia effusione spiritus animalis, à cerebro in organa sensus & motus, ob defectum utilis vaporis cerebrum madefacientia, cum irritatione sensus communis. Causa præcipua pervigilii est defectus vinculi illius sensus primi contra naturam irritato & excitato sensu communi. Deficiunt autem vapor utiles in cerebro, quia non generantur in corpore, quia geniti absumuntur, aut à cerebro avocantur & evertuntur. Non generantur propter inedia aut usum ciborum acrim flatulentorum & similium, qui nullos benignos vapores excitant, ac corruptione ciborum in ventriculo. Absumuntur & dissipantur vapores humidi, simulque sensus communis excitatur à calida sicca intemperie ipsius cerebri, aut totius corporis sine vel cum materia Calida autem intemperies primas partes in cerebro irritando & vaporibus discutiendis obtinet; secundarias sicca, quæ vapores humidos exiccando absomit.

Materia illa, quæ cum intemperie conjungitur, est humor aut vapor; & humor acris calidus vel siccus, ut bilis flava adusta, melancholia, pituita falla; vapor verò est calidus acris, aut malignus ex vino potenti, calidis succis genitus: ab his omnibus interdum totum cerebrum afficitur, aliquando ventriculi & universa vasa, ut in febribus ardentibus accidare consuevit, nonnunquam materia per meninges & substantiam cerebri disseminata est, ut in phrenitide & Mania, ubi vigiliæ continuæ cum delirio sunt. Vapores utiles à cerebro avocant, simulque discutiunt, sensumque primum excitant, dolores vehementes non solum capitis, sed etiam cuiuscunque partis corporis, deinde vehementes animi perturbationes, ut ira, timor, tristitia, curæ,
 item

item fluxus sanguinis, evacuationes alvi immodice, & quæcunque siccant, sensusque irritant.

De paralyfi & convulsione cæterisque symptomatibus motus suo loco dicemus. Catarrhus symptomata quidem facultatis non animalis, sed naturalis cerebri est, aut exiens mutatum præter naturam, tamen cum multorum morborum causa sit utile esse existimavimus ejus considerationem cæteris cerebri symptomatibus subungere.

De Catarrho.

Est autem catarrhus propriè defluxus præter naturam humoris excrementitii, à capite in subjectas partes, geniti ob læsionem concoctionis cerebri, vitio alteratricis ejusdem, vel alimenti. Nam ut in omni fluxu, ita catarrho quatuor considerantur. 1. quod defluit, 2. terminus à quo, 3. terminus ad quem decumbit, 4. via per quam: Quod defluit, est humor excrementitius, sive excrementum cerebri præter naturam modum redundans. Cerebri autem ampla medulla est, quæ copioso alimento indiget, & copiosum excrementum gignit, sed eo copiosius quo vis concoctrix cerebri debilior fuerit, & alimentum affluens magis copiosum, aut minus comperens.

Definitio catarrhi.

Nam redundantia excrementorum in capite causa præcipua est, frustratio facultatis concoctricis, vitio vel allevatricis cerebri, vel alimenti: Læditur vis alteratrix, quia in sua substantia debilitatur ex intemperie cerebri, præcipuè frigida humida, rarius calida, aut sicca, & tantum cum materia, vel quia impeditur morbo aliquo cerebri organico, aut communi. Vitia alimenti sive humorum ascendentium in caput sunt nimia copia, & aliena qualitas. Nam nonnulli sunt quibus caput aptissimum est, ut impleatur, & universi corporis habitus, ad id implendū admodum idoneus; nimirum corpora composita ex membris contrarii temperamenti, quorum cere-

Causa redundantia excrementorum cerebri.

CAP.
VI.

cerebrum frigidum debileque est & hepar calidum; in quibus sanguis vaporosus generatur. Humor excrementitius cerebri magna ex parte tenuis pituitosusque est, naturam cerebri referens, & vel simpliciter talis, vel cum humore biliolo aut melancholico permixtus. Hoc excrementum, si moderatum fuerit, ex sinibus cerebri per palatum & nares sine noxa expurgatur: sin immodicè redundaverit; aut qualitatem præter naturam contraxerit, partes ad quas decumbit, variè afficit, atque hic defluxus catarrhus propriè est.

*Causa de-
stillatio-
nis.*

Defluit humor coacervatus in capite sua tenuitate & copia irritata expultrice plerumque ab externis causis, ut nimio frigore, aut calore, crapula, &c. Undè qualis passio est diarrhæa ex mala concoctione ventris, talis catarrhus ex mala concoctione cerebri. Terminus à quo defluit humor & locus, ubi primò coacervatur, est aut intra cranium maximè in ipsis ventriculis cerebri, aut extra potissimum sub cute verticis, quo venarum in caput irrepentium extrema desinunt, quem demonstrat tumor mollis dolorque externus, qui contactu aut in versis pilis exacuitur,

*Differentia
catarrhi.**Destilla-
tio inter-
na.*

Ab his locis in subjectas partes plerumque defluit humor. Quare via per quam, & terminus ad quem duplex à Fernelio judicatur, ac ipsa destillatio quoque duplex: una interna; altera externa. Nam primùm è cerebri ventriculis, partibusque sub calvaria in partes internas prolabitur humor & pro natura partium ad quas decumbit varios morbos efficit; ac interdum ipsa destillatio peculiare nomen accipit; ubi enim in superius os, aut capacitatem pectoris defluit, generis nomine catarrhus dicitur; ubi in nares, coriza; in fauces brachus sive rauco; si ad initium nervorum, paralytia, aut tremorem excitat; in sensuum organa cœcitatē, surditatem

ditatem, &c. sin ad pulmones, tussim, peripneumonia-
m, asthma, sputum, sanguines, &c. in ventricu-
lum, & intestina, diarrhæam catarrhalem, &c. De-
inde à parte capitis extra calvariâ fertur humor,
non tantum inter cutem & carnem, ut Fernelius
voluit, sed etiam per continuitatem musculorum,
membranarum, nervorum, ac per venas & arterias
in partes externas, ut in oculos, unde epiphora ca-
tarrhalis: addentes, maxillam, cervicem, unde do-
lores & tumores; in scapulas, brachia, articulos,
unde arthritis, &c. His modis feruntur plerumque
humores à capite; verum fluxiones omnes non
semper ita concitantur. Nam natura irritata copia
aut qualitate humorum ab interioribus partibus ad
exteriores eos per venas & arterias aut continua-
tem nervorum & membranarum interdum propellit.
Quare, ex dysenteria aut diarrhæa intempestivè sup-
pressa, ac ex colicâ converso humoris impetu ad
venas arthritis sæpè orra fuit, item ex suppressione
consuetæ evacuationis sanguinis, ac in crisis, &c.
Quare unus catarrhus multorum morborum causa
est, licet omnium nec sola nec semper, ut infra appa-
rebit.

CAPUT VII.

*De Causis Symptomatum Quinque Sensuum
externorum.*

Læduntur singuli sensuum externorum tribus *Causa*
modis. Causa verò læsionis triplex est. Nam *symptoma*
læditur sensus, sicut & motus, læsa facultate *tum quin-*
sentiendi; deinde affecto primo sensus instrumento; *quæ sen-*
tendi aliqua illarum partium quæ primo instru- *sum,*
mento subserviunt. Spiritus animalis sive facultas
T sens

*Causa la-
sionis fa-
cultatis
vitio ce-
rebri.*

sentiens à cerebro ut à fonte promanat, & per ner-
vos peculiares in organa singulorum sensuum di-
stribuitur, ut in physiologicis demonstratum est.

Quare læditur facultas sentiendi vitio cerebri,
ubi spiritus gignuntur, deindè nervorum per quos
in organa sensuum distribuuntur: Cerebri autem,
quia spiritus non generantur aut non debita quan-
titate, ob gravem intemperiem, præcipuè frigidam
aut defectum spirituum vitalium, ut in morituris,
in gravi syncope, & immodicis evacuationibus san-
guinis, quibus etiam spiritus animales in ventricu-
lis geniti resolvuntur. Deindè quia spiritus in cere-
bro distrahuntur & discutiuntur, quod in magnis
vulneribus capitis, aliquando temporum accidit,
ubi oppositæ partis paralytis oritur ob dolorem &
calorem spiritus in partem læsam trahentem. Tertiò
quia spiritus in cerebri ventriculis obruuntur & eli-
duntur, copioso humore confertim irruente; vel vi
spirituum intercipiuntur, propter angustiam om-
nium ventriculorum cerebri, ut in epilepsia; aut
apoplexia: aut quarundam cavitatum, per quas spiri-
tus ad nervos distribuuntur, qualis affectus apople-
xiam interdum consequitur.

Quartò quia cerebrum spiritus crassos, opa-
eos aut humidos gignit, ex intemperie cerebri cum
humore, aut vapore pituitoso vel melancholico, vel
spiritus inficiuntur, & impuri redduntur à parvis te-
rrisque vaporibus permixtis vitio proprio cerebri,
ut in phrenitide & vertigine & melancholia prima-
ria; vel per consensum ex vaporibus ascendentibus
à toto corpore, sive omnibus venis, ut in febribus
ardentibus, vel à parte, & potissimum à ventriculo,
jecore, liene, primis venis, ut in hypochondriacis, vel
ab utero ut hystericis, &c.

Affectus

Per nervos non distribuuntur spiritus aut non
debite

debita quantitate, ob intemperiem frigidam humi-
dam cum materia, aut angustiam nimirum obstru-
ctionem à crassis humoribus infarctis; constipatio-
nem ex inflammatione aut tumore in substantia
nervi; compressionem à tumore partis incumbentis;
& subsidientiam à siccitate & tabe; tandem propter
solutionem continui, ut sunt vulnus, contusio, &c.
Ab his causis ipsi nervi, & quibus inseruntur orga-
na paralyfin, torporem, tremorem aut convulsio-
nem patiuntur, undè sensus aut tollitur aut dimi-
nuitur, aut depravato modo perficitur. Deinde pars
instrumentaria sive primum instrumentum in sin-
gulis sensibus est, cui cæteræ organi sensitivi partes
subserviunt, quemadmodum in Physiologicis de-
monstratum est.

*De visio-
ne læsa.*

Quare ut à sensu visus incipiamus, cujus or-
ganum adæquatum est oculus. Pars instrumentaria
est humor crystallinus, cui subserviunt cæteræ par-
tes oculi, primum nervi optici, qui vim sensus com-
municant, deinde humor aqueus, & vitreus, sex tu-
nicæ, ac gratia motus musculi, nervique motorii.
Adduntur palpebræ, cilia, supercilia, cæteræque
partes, quæ commoditatem aliquam visioni præ-
stant.

*Affectus
nervorum
opticorum*

Affectus ergo sensum videndi lædens, vel est in
cerebro, aut in nervis opticis, vel in humore cry-
stallino primo visus instrumento, vel in aliqua par-
tium, &c. quibus adduntur morbi toti oculo com-
munes. Quomodo lædatur facultas vitio cerebri
aut nervorum ex supra dictis constat. Lædi autem
visum ex consensu cerebri dignoscitur, si cum
visu alii quoque sensus afficiantur, & gravitas do-
lorque capitis percipiatur, aliaque circa caput acci-
denta.

Peculiariter nervorum opticorum morbi sunt,
T 2
valida

Cæcitas.

ἀμεύ-
ρωσις.

valida intemperies, solutio continui, & angustia; ut obstructio, compressio, subsidentia; his additur dissolutio in cruciationis nervorum opticorum, ubi uniuntur species, & absolvitur visus. Ab hac dissolutione oritur depravata visio, quæ omnia, quæ videntur, duplicia apparere facit. A cæteris morbis aut spiritus influere prohibetur, undè cæcitas, aut non debita quantitate, undè debilis visio, veluti à perfecta angustia nervorum opticorum oritur ἀμεύρωσις Latinis obfuscatio, à nonnullis gutta serena, quia nullo vitio in oculo apparente perit visus: ab imperfecta nervorum angustia fit ἀμβλυπία visus debilis, sive hebes.

Per nervum opticum spiritus descendere non judicatur, si uno oculo clauso alterius pupilla non dilateretur. Nam confluit spiritus animalis in crystallinum & locum inter crystallinum & foramen rhagoidis complet & dilatat.

Aff. Etio-
nes spiritus
animalis.

Deinde spiritus animalis in oculo, qui ministrat crystallino sua natura, multus, purus, tenuis si-
ve æthereus esse debet, non paucus, crassus aut impurus: paucus autem redditur, ut jam dictum est, crassus aut impurus vitio cerebri, ubi gignitur & vitiosis vaporibus permiscetur, aliquando vitio oculorum, ubi determinatur.

μυωπία.

Paucus autem licet purus μυωπίαν gignit, sive lusciosos facit, qui propinqua exactè discernunt non remota: At paucus simul impurus & humidus nec propinqua nec remota exactè discernit, multus sed crassus & humidus remota & propinqua videt quidem, verum non exactè discernit, crassities spirituum & tunicarum cū debilitate cerebri νυκτέλωπας facit, qui interdiu vident, noctu aut in obscura luce nihil.

νυκτέλω-
πία.

Tertio

Tertiò affectus visum lædentes in ipso Cry-
 stallino humore præcipuo instrumento visus sunt
 i. intemperies simplex & composita sine & cum
 materia, undè nimia tenuitas & raritas CrySTALLINI
 specierum retentionem impediens, aut nimia cras-
 sities, quando agri non vident, aut obscurè, aut qua-
 si per nebulam, quod malum propriè *γλαύκωμα*
 dicitur. Verùm alia species *γλαυκώματ* secun-
 dum Aëtium est ex prægressa suffusione, humore
 circa pupillam vehementissimè congelato. Deinde
 morbi compositionis crySTALLINI vel in superficie
 sunt, si non satis polita ad speculi morem est, sed
 aspera & obscura, ut species recipere nequeat: Vel
 in quantitate, si nimium diminuatur: Vel in situ,
 si è sede sua transferatur. Nam quando sursum &
 deorsum transfertur, dissolvitur incurciatio nervo-
 rum opticorum, eaque species Strabismi oritur,
 quæ duplicia omnia, quæ videntur, apparere facit:
 Sin ad angulos, quia non dissolvitur incruciatio,
 nulla quidem in ipsa objecti perceptione apparebit
 noxa, sed hallucinatio tantum ratione situs, scilicet,
 ut quod videtur magis dextrum vel sinistrum appa-
 reat, sicut de pupilla testatur, *Galen. 10. de Usu part.*
cap. 12. Tandem solutio unitatis CrySTALLINI, quan-
 do in partes dividitur ab erodentibus, secantibus &
 similibus, visionem labefactat, quæ rarò evenit sine
 totius oculi corruptione.

Post crystallinum autem sequuntur tenuiores
 tunicæ, inter quas est *αεζχοειδής*, quæ crystallinum
 cum vitreo conjungit. His tunicis eadem vitia acci-
 dunt; quæ corneæ, Peculiariter dissecta aranea crys-
 tallinus à sua sede exit, & in foramine uveæ cum aqueo
 coincidit, qui crystallinum humectat, & a lucis splen-
 dore & cornea defendit.

Albuginei autem humoris vitia sunt augmen-
 tum

T 3

Morbi hu-
 moris cry-
 stallini:

γλαύκωμα

Hallucina-
 tio visus.

Morbi par-
 tium mini-
 strantium.
 Tunica a-
 ranea.

Albugines.

tum & diminutio, crassities & coloris mutatio. Aucto autem humore albugineo non solum pupilla magis dilatatur, sed etiam crystallinus magis obumbratur, spiritusque in transitu obtunduntur, unde visus hebetatur. Contra diminuto aut evacuato hoc humore, tunica contrahuntur & corrugantur; ac simul pupilla contrahitur minorque efficitur, deinde spatium inter tunicas & crystallinum, ubi externi splendores occurrunt, brevius redditum per similem gignit affectum eorum, qui nictando solem intuentur.

*Suffusio
que & quo
duplex.*

Crassities verò aquei humoris impediens transitum spirituum & specierum visibilibus, visionem lædit, quæ dupliciter contingit. Uno modo dum humor aqueus in tota substantia patitur ab exiccatione potissimum: Alio dum humor aliquis præter naturam ei permiscetur, spirituum transitum impediens, sive tenuis aqueus humor à cerebro per nervum opticum, aut meninges inter tunicam rhagoidem & crystallinum humorem sensim defluens, concresecit, quæ propriissimè suffusio dicitur. Verum suffusio duplex est: Alia vera morbus proprius oculi ex humore aqueo concreseciente inter corneam & crystallinum humorem: Alia spuria per consensum, quando visa suffusorum similia ante oculos obversantur ex vaporibus aut fumis à ventriculo, cerebro, toto corpore ad oculos delatis. Quod evenit interdum instante crisi, vomitu, hæmorrhagia, item vertigine & similibus. A vera suffusione pro modo materiæ oritur non solum abolita & diminuta visio, sed etiam depravata. Nam si materia opplens pupillam stabilis fuerit crassa & copiosa cecitatem, si pauca, rara, æquabilis diminutum visum excitabit. Sin vaga aut per partes raras crassasque divisa; phantasmata & imagines ob oculos volantes. Verum si materia concreta centrum pupillæ

pillæ occupaverit omnia fenestrata apparebunt: Sin circumferentiam tantum, visio noxa carebit. Coloris mutatio visum potissimum depravat. Nam si in glaucum vel fuscum colorem vergat, per nebulam aut fumum se videre putabunt. Sin glaucus ille color oritur ex prægressa suffusione, vehementique congelatione humoris circa pupillam, altera *γλαυκώματ* species secundum Aëtium orietur, quæ cæcitatem inducit. Sin in alium colorem mutetur aqueus, ejus phantasiâ visibilibus impertit & simul consistentiâ, & figuram, si inæqualis fuerit.

*γλαυκώματ
παρόρασις.*

Deinde pupillæ (sive pro foramine Rhagoidis sumatur, seu pro spatio inter crystallinum & hoc foramen) affectus sunt nimia amplitudo & angustia.

Pupilla affectum.

Nimia autem amplitudo & relaxatio pupillæ sive naturalis ab utero, sive morbosa quæ propriè *μυδίασις* dicitur, quia spiritus dissipare finit & in conum non cohibet, visionem debilitat, unde hoc modo affecti ut aliquid exactè videant, genas contrahunt sive adductis & conniventibus oculis acutius cernunt. Angustia verò sive constrictio pupillæ nativâ spiritus cogit & auctam visionem efficit, præternaturalis à morbo visum semper lædit. Dilatatur pupilla propter tensionem Rhagoidis vel propria ratione ab intemperie quidem humida, sed cum humoris aquei copia replente & descendente. Deinde ab exiccatione tunicam contrahente ut foramen dehiscat. Item ab inflammatione & disruptione tunicæ; Ex accidente ab humoribus distendentibus. Angustia verò pupillæ oritur ab humectatione dilatante & relaxante tunicam sive tensionem, non aliter quam in cribri foraminibus accidit quando humectantur. Deinde contractionem tunicæ ex diminutione & evacuatione humoris aquei. Ad angustiam pupillæ refertur obstructio forami-

μυδίασις.

Angustia pupillæ.

VII.

nis ab humore & vapore, ut in suffusione, de quibus supra.

*Affectus
in e Rhagoidis.*

*Uvea pro
cidentia &
tensio.*

*Cornea af-
fectus.*

Affectus autem ipsius tunice Rhagoidis potissimum sunt intemperies aliqua, solutio continui, ut sunt ulcus & vulnus, disruptio, &c. quibus si tenuis humor effluat, coincidit uvea super crystallinum, aliquando totus spiritus à cerebro in pupillam non pervenit, sed per ulcus exit, atque hoc modo oritur uveæ procidentia. His accedit tensio uveæ facta à siccitate vel ab humore redundante, tumorem aliquem excitante: Item à copia contentorum humorum inter uveam & crystallinum.

Post uveam est cornea pupillæ objecta sua natura dura & pellucida, ut partes contentas defendat, & lumen speciesque visibiles commodè admitat, cujus vitia sunt: 1. Crassities nimia, densitas, humiditas & rugositas, specierum transitum impediens. 2. Coloris mutatio. Tertium vitium accidit ob coherentiam vicinarum partium affectatam scilicet adnatæ in ophthalmia, si augeatur affectus, ut corneam & pupillam obscuret. Verùm proprii morbi sunt corneæ, 1. Intemperies sine, plerumque cum aliqua materia, corneam crassam, spissam, humidam, aut rugosam efficiente, aut alio colore tingente. Nimia crassities interdum à sola frigiditate oritur vel simplici, ut in decrepitis, vel à medicamento opiat, plerumque tamen cum affluxu materiæ, unde cœcitas, aut obtusa visio, aut quasi per nebulam. Corrugatio verò corneæ fit à nimia siccitate, ut in senibus, aliquando diminutione pupillæ ab effluxu humoris aquei. Coloris mutatio fit, quia alieno humore colorato imbuatur, nimirum flavo, rubro, & similibus. Unde hallucinatio visus, qualis accidit ictericis & in sugillatione, potissimum, si pars pupillæ objecta tincta fuerit, & eundem

eundem colorem albugineus suscepit. Secundum genus morborum corneæ sunt pustulæ, & tubercula, ex affluxu humoris, cuius ratione distinguuntur: Nam pustulæ, aliæ à sanguine sunt, ut *ἐξανθήματα*, variolæ, &c. aliæ à sanguine bilioso, ut *φλύκταιναι*: quædam ab humore aqueo, ut *ψυδράκια*, &c. Deinde in oculo à melancholico & adusto humore, oritur cancer & carbunculus, gravissima mala, quæ cæteris partibus plerumque communicantur. Ruptis pustulis, & tumoribus ulcera cava oriuntur.

Tertium genus morborum corneæ est solutio continui, sub qua ulcus, vulnus, disruptio. Ulcus ex tumore, pustulis, aut erosione oritur. Ulceris autem sicut & rupturæ variæ sunt differentiæ. Nam alia exulceratio superficialis dicitur; alia cava. Ex superficialiis una cava est similis aeri caliginoso colore cœruleo propè, Caligo dicta. Altera profundior, minor, alba quodammodò, Nebula 3. In nigro oculi profundior colorem cinericiū referrens *ἐπίκαιμα*: Quod si exulceratio altius penetraverit, cum crusta in nigro & albo oculi, *ἐγκαιμα* vocatur.

Ulceracornea.

Caligo. Nebula.

ἐπίκαιμα.
ἐγκαιμα.

Hæ exulcerationes ab Aëtio superficialiæ dicuntur, licet duæ posteriores ita interdum augeantur, ut ad uveam pertingant, & humores effluant.

Ulceracava juxta Paulum quadruplicia sunt.

Unum cavum, angustum, purum *βότρυον* à fossula. *βότρυον*.

Alterum latius sed minus profundum *ηρίλωμα*. Tertium in iridis circulo nascens, ita ut intra iridem albus, extra rubeus color appareat, *ἀργεμον*. Quartum ulcus sordidum crusta obductum, quo repurgato humores oculi effluunt, quod *ἐπίκαιμα* à Paulo dicitur, sub quo continetur *ἐπίκαιμα* & *ἐγκαιμα* Aëtii.

T 5

Ex

ὕπόπυον.
ὄνυξ.

Ex ulcere corneæ oritur ὑπόπυον collectio puris sub cornea translucens, quæ si determinata fuerit circulo iridis, à similitudine ὄνυξ vocatur. Ex erosione & ruptura corneæ oritur descensus uvæ & prolapsus pupillæ morbus in situ ad totum oculum pertinens. Rupturæ autem corneæ quatuor species recenset Paulus, quarum una quia exigua est adhuc

μενοκέ-
φελ.

σαφύλωμα
μύλον.
ἥλ.

μενοκέφαλ. dicitur. Altera, quia amplius succrevit, ut acinum uvæ referat σαφύλωμα. 3. Quando ita augetur ut extra palpebras emineat μύλον malum. 4. Ubi obducta cicatrice occalluit ἥλ. clavus.

λδωμά-
ζα.

Adnata af-
fectus.

πτερύγιον.

Post curationem ulceris & vulneris corneæ oriuntur cicatrices visionem lædentes, quæ si tenuiores magisque superficialiæ fuerint, nebula: Sin crassiores λδωμάζα appellantur.

Adnata tunica quia pupillam non tegit, igitur morbi eius non per se primò sed ex accidenti videndi actionem lædunt, nimirum si ita augeantur, ut in consensum aliæ partes trahantur & pupillam obscurant, quod in πτερύγιον aliquando accidit & in ὀφθαλμία si in χύμωσιν degenerarit. Morbi adnatæ sunt intemperies, tumores, pustulæ, &c. ut in cornea. Peculiariter verò morbi adnatæ sunt, πτερύγιον & ὀφθαλμία. Pterygium autem est membranosa adnatæ tunica ex crescentia ex affluxu crassi vitiosi sanguinis ibi concreti.

Hæc à majore angulo oculi plerunque exoritur & motum palpebræ interdum impedit, quæ si augeatur pupillam tegens, visum obscurare solet: Sub hoc affectu continetur Sebel Arabum substantia venosa in superficie Corneæ.

Ophthalmia.

Sub ophthalmia communiter continetur τάρχεσις, ξηρόφθαλμία & χύμωσις. Verum propriè ophthalmia est inflammatio membranæ adnatæ ex

ex affluxu materiæ vitiosæ, quæ duplex est: Alia humida propriissime dicta ex sanguine potiss. aut humore crassiore; tumore cum dolore, rubore, lachrymis & materia crassa adhærente. Alia sicca *Ξηροφθαλμία* ab humore tenuiore magisque bilioso, *Ξηροφθαλμία* quæ ulcus magis inducit *Χύμωσις* est inflammatio *μία* magis profunda consequens ut plurimum ophthalmiam & non solum tunicæ adnatæ, sed etiam corneæ & palpebrarum.

Nam oritur propriè, quando inflammatio ita augetur ut rubedo nigrum oculi occupet, albumque sublimius appareat simulque palpebræ ita invertantur, ut oculos contegere nequeant.

At *τάραξις* conturbatio oculi levis inflammationis cum exiguo dolore & rubore à fumo, sole & similibus causis externis. *τάραξις*

Hi morbi partes oculi propriè dictas primò *Morbi toti* obsident. Ad totum globum oculi referuntur non *us oculi* nulli morbi, qui ab una parte initium habent, ut pterygium, chymosis & procidentia pupillæ. Verùm toti oculo communes affectus sunt, i. ratione situs *ἐκπιεσμός* elisio seu prominentia oculi cui opponitur nimia cavitas & strabismus. *ἐκπιεσμός* *ἐκπιεσμός* autem est mutatio situs oculi versus exteriora, ut à palpebris contegi nequeat, aliquando & malas contingat, proveniens à strangulatione, plaga, gravi fluxione, aliquando ex ulceribus tunicarum carbunculosi ruptis.

Strabismus verò est oculorum convulsio, qua *Strabismus* in obliquum ita contorquentur ut amborum unus aspectus esse nequeat. Oritur similis affectus interdum ex prava consuetudine in pueris, propriè verò ex convulsione musculorum oculos moventium. Huc referri potest paralytis oculi resolutis oculi musculis aut nervis, ut oculus nequaquam intendi queat nec consistere. Deinde morbi totius oculi ratione

VII.

ἀποφία.

tione magnitudinis sunt ἀποφία oculi, extenuatio & diminutio eiusdem, quando minor redditur defectu alimenti, cui opponitur immodica oculi magnitudo ob redundantiam superfluae materiae, siue a tumore. Præterea ratione formæ accidit oculi confusio συνχυσίς, quando humores permixti sunt citra eruptionem, proveniens potiss. à vehementissima plaga, aliquando ab inflammatione tunicae Rhagoidis ruptis in ipsa vasis.

συνχυσίς.

ἐπίφορος.

Ad totum oculum ejusque ambitum refertur ἐπίφορος, latinis delachrymatio, licet nonnulli ad solos angulos ejusque carunculas lachrymales referant.

Est autem ἐπίφορος fluxus tenuis humoris lachrymarum specie à capite ad oculos. Humor autem ille nunc frigidus est fluens sine ardore, nunc calidus, salsus, acris cum ardore palpebras exulcerans, fluitque plerumque à pericranio, aliquando à vicinis venis ad angulos oculorum totumque oculum palpebrasque afficiens & potiss. cilia. Ab epiphora differunt involuntariae lachrymae, quæ oriuntur ex rhyade morbo carunculæ lachrymalis in majore angulo oculi,

Morbi angulorum.
ῥύας.
ἐγκανθίς.

Nam morbi angulorum sunt, i. ῥύας diminutio carunculæ in majore angulo oculi ab erodentibus, qua ipse angulus augetur & lachrymae involuntariè fluunt.

αἰγίλοψ.

Deinde ἐγκανθίς quæ Rhyadi opponitur, immodica carunculæ illius eminentia ex redundantia humorum. Tertiò αἰγίλοψ & αἰγίλωψ, quæ duo sumuntur cōmuniter pro inflammatione & abscessu inter majorem oculi angulum & nares.

Verùm proprie juxta Paulum abscessus priusquam in ulcus erumpat, Angilops, post eruptionem, si in fistulam dehiscat, αἰγίλωψ vocatur,

Palpe-

Palpebrarum vitia per se visum non lædunt, nisi ad tantam deveniant magnitudinem, ut partes oculi in consensum trahant. Vitia palpebrarum, 1. Ratione formæ sunt: *ερίχμα* asperitas interioris partis palpebrarum ex defluxione acrimie humorum & scabie, quæ si augeatur palpebras distendens & incisuras faciens, *σύνκωσις*, si callum contrahat, *τόλωσις* sicitur. Huc refertur à nonnullis, scabies pruriginosa palpebrarum, ex salis humoribus. 2. Ratione magnitudinis sunt tumores palpebrarum, in quorum numero est *εμφύσιμα* tumor laxis, mollis œdemati similis: in ipsis ciliis *κρηή*, id est, hordeolum, tuberculum in abscissum plerumque desinens: & *χαλάζιον* seu grando tuberculum durum mobile. 3. Ratione situs & consensus morbi sunt *σύμφυσις* oculi, quando oculorum palpebræ ex ulcere vel viscosis humoribus ita glutinantur ut appetiti nequeant. Item *ἐντρεπίον*, si superior palpebra invertatur ob cicatricem vel carnis excrescentiam. Huc refertur *μαδάρωσις*, defluxiū pilorum, & *δυσερίχμασις*, generatio & inversio pilorum cum pediculis interdum.

Læsiō cæterorum sensuum eodem penè modo fit, quo visus: præcipuè verò auditus. Nam facultas communis est, & extremitas auditori meatus, ubi nervus dilatatus cum aere incluso conjungitur, crystallino correspondet, similiter quæ circa anfractum auris sunt, pupillæ, & cæteris quæ circa crystallinum. Quare læditur auditus læsa facultate audiendi à morbo nervi auditorii cerebri ipsius, qua parte hi nervi oriuntur. Deinde primò auditus instrumento affecto sc. aere congenito & extremitate auditorii meatus: tertio læsis partibus ministrantibus, hoc est, affectis ipsis meatibus tympano,

Morbi palpebrarum.

ερίχμα.

σύνκωσις.

τόλωσις.

εμφύσιμα.

κρηή.

χαλάζιον.

σύμφυσις.

ἐντρεπίον.

μαδάρωσις.

δυσερίχμασις.

σις.

Causa ' Symptom. auditus.

vicinisque partibus. Facultas læditur ab iisdem causis, ut in visu: vitia aeris congeniti sunt defectus, & impuritas, ut species sonorum non debite repræsentet. Extremitatis auditorii meatus & tympani morbi sunt intemperies, solutiones continui, inflammationes, alique tumores præter naturam, quibus tria auditus officula à sua sede interdum remouentur. Morbi meatuum sunt obturatio sive angustia.

*Surditatis
causa.*

Quare ut à surditate incipiamus, quæ à gravi auditu solâ magnitudine differt. Oritur ea primum læsâ facultate vitio cerebri, vel nervi quinti paris. & peculiariter extremitatis auris, ubi nervus ille dilatatur. Deindè defectu aut impuritate aeris congeniti, qui sonos repræsentat. Defectus autem fit, quia aut egreditur ob vulnus, ulcus, aliamvè solutionem continui: aut dissipatur ex ingenti sonitu, gravi contusione capitis, vehementi cerebri affectu, &c. aut ipse meatus auditorius, ubi continetur aer, complanatus est, malevè conformatus; quod aliquibus ab ortu, & ex malo hæreditario evenit; aut ex parte vel toto repletus est vitiosis humoribus, aut crassis vaporibus, à quibus etiam ipse aer congenitus impurus redditur.

Omnis autem humor collectus intra meatum internum auditorium, surditatem inducere poterit, & non solum humor crassus pituitosus, qui maxime sensus obrundit, sed etiam biliosus: quare in febribus acutis bile sursum delata, aut repressis biliosis alvi dejectionibus surditas ori ut, quæ teste Hipp. 28. Aph. 4. bilis dejectione sanatur. Tertio fit surditas obturatione, sive angustia meatus interni vel externi: ea angustia est vel obstructio à crassis humoribus influentibus, à sordibus, & rebus externis illapsis; vel constitutio est inflammatione aliove tumore præter naturam, aut tuberculo carnosio, aut callo, ex ulcere male curato: interdum compressio meatus ex ictu

fractura ossium. Præterea fit surditas nimia crassitie & dēfinitate tympani, inflammatione aut tumore præter naturam. Tandem dislocatione, malaque conformatione trium ossiculorum auditus ex affluxu humoris, aut inflammatione, solutione continui, ut ulcere, vulnere, &c. Nam in interiore auris parte, & circa tympanum oritur nonnunquam inflammatio, quæ vehementi calore, dolore & pulsatione cum febricula se prodit. ea dum in pus convertitur rupta, aut exesa membrana, ulcus excitat, unde multa sanies emanat potissimum in iis, quorum cerebrum imbecillum est: solet etiam sanies ab ipso cerebro manare ad aures, si in eo apostema disruptum fuerit. In aure, ulcere neglecto sæpè caro excrefcit, quæ auris meatum obturat. Hæ causæ si leviores fuerint pro surditate gravem auditum tantum excitant.

Παθησις Latinis obauditio est perceptio soni intra aures absque externa causa, propriè veniens ex commotione aeris congeniti præter naturam à flatulento spiritu, aut vapore in auribus. Habet quidem aer congenitus, teste Aristotele, motum naturalem, cuius ratione ab acri subtilique sensu leves susurri noctu potissimum audiuntur, sed hæc affectio opus naturæ est. Obauditio Symptomatica oritur ex commotione aeris congeniti præter naturam: Cujus causa præcipua est, vapor aut spiritus flatulentus aerem congenitum movens. Hic vapor aut spiritus interdum in ipsis auribus aut capite gignitur, aliquando ab inferioribus partibus sursum ad aures ascendit, vel ex ambitu totius corporis, & ex arteriis potissimum propter commotionem humorum in vasis, qualis in febribus initio paroxysmorum ac instante crisi per hæmorrhagiam accidit, vel à parte aliqua, præcipuè à ven-

*Obauditio
tionis de-
finitio.*

Causa

ventriculo, liene, jecore, primis venis, ut in hypochondriacis, ab utero in hysteriis, &c. Vapores flatulenti sursum ascendentes, per venas & arterias, vel nervum auditorium, vel membranarum continuitatem in interiorem auris meatum feruntur, & non aliter ferè sensum auditus, quam falsa suffusio visionem lædit. Plerumque ipsæ arteriæ circa aures spirituoso aut flatulento sanguine distentæ ex calida expiratione sursum ascendente, dum vehementius pulsant, multum calidi spiritus in caput & aures effundunt. Quare corporis & capitis repletio & agitatio, ictus aut percussio temporum, Parotis sive inflammatio post aures, ulcus auris malè curatum ob auditionem excitat. Differentiæ ob auditionis oriuntur à tenuitate aut crassitie, quantitate, & motu vaporis flatulenti. Nam ex tenui vapore, minusque copioso exiliter labente sibilus; ex motu spirituum interrupto, ultro citroque impulso, tinnitus; ex crasso flatu plenius erumpente, sonitus: ex crassiore validius impulso, strepitus, ex magis adhuc crasso, fluctuatio in auribus percipitur.

*Causa
symptomatum
olfactionis.*

Tertio olfactus læsio consequitur morbus vel cerebri, vel primi instrumenti, nimirum processuum ab anteriore cerebri parte prope meatus ossium colatoriorum desinentium: Vel partium inservientium. Inserviunt autem meatus & membranæ internæ narium & ossium colatoriorum, ac sine his meatibus in homine non fit olfactus. Aufertur igitur aut diminuitur olfactus, quia facultas à cerebro non descendit. Deinde affectis processibus mammillaribus intemperie, ut plurimum frigida cum materia pituitosa à cerebro defluente ut in gravidine, aut interdum ex naturali debilitate ab utero aut vitio ætatis. Præterea ab inflammatione, abscessu aut ulcere purulento circa anteriores cerebri ventriculos, à quo foetidus halitus semper expirat. Unde

cx

lēxiis qui ozœna laborant aliqui nihil prorsus olfaciunt. Præterea obturatione foraminis ossis colatorii, aut meatus narium: angustia meatus est vel compressi à contusione & ictu, vel constipatio à carnis excrecentia aut intra nares persistens vel extra dependens, quæ polypus dicitur, aliquando ab inflammatione, quæ in abscessum & ulcus fœtidum interdum terminatur. Nam ulcus narium oritur ab inflammatione, vel ab erosione ex acrimonia humorum præterlabentium; quod in lue venerea sæpè accidit, interdum ab externis causis, ut vulnere contusione: Ulcus diu neglectum si sordescat putridum & grævolens fiat, ozœna appellatur. Hoc ulcus latè depascens tenera ossa exedit, nariumque alas ac interdum serpendo palatum perforat, & loquelam vitiat. Ulceribus recentibus neglectis caro sæpè excrefcit *ὀστέα κάρκινος* quæ si in longitudinem tantum excreverit, ut è naribus aut foraminibus palati prolabatur à varietate coloris polypus vocatur, qui in cancerum abire solet. Depravatus olfactus oritur ab ulcere putrido à pravis & corruptis succis in naribus pravam odorem exhalantibus & suo halitu instrumentum odoratus ita lædentibus, ut externos etiã odores non rite percipiat sed sub aliena specie.

Causa symptomatum gustus, aut est in cerebro aut in nervis, per quos descendit facultas, vel in lingua proprio gustus instrumento, vel aliquo ministrantium. Præcipua causa gustum tollens est *παράλυσις* sensus tactus in lingua & palato, refrigeratis aut incisis nervis gustatoriis, tertii & quarti paris cerebri, aliquando affecto cerebro gravi morbo, ut in aliis sensibus. At depravatus gustus oritur, quia lingua humore sapido præter naturam imbuta est, quæ per se gustum movet nimirum humore

V

salso,

Causa
symptoma
tum gustus.

CAP.
VII.

falso, amaro, &c. sicut in febribus ardentibus accidere solet. Nam quo sapore lingua imbuta est, eodem objecta omnia, quæ offeruntur, prædita judicantur.

Causa
symptoma
tum tactus.

Tandem nullus tactus abolitus aut diminutus excepta hæmodia, quæ dentium stupor est, ab acidis & acris cibis propria appellatione exprimitur. Nam torpor ex diminuto sensu & motu compositus est, & paralyxis ex utroque abolito. Propriè tamen & simpliciter, ut admonet *Galenus. lib. 3. de Loc. aff. cap. ult.* privatio motus paralyxis dicitur, non autem sensus; Unde nonnulli privationem sensus non absolutè, sed cum adjectione paralyxin sensus vocant.

Causa stu-
poris & pa-
ralysis sen-
sus tactus.

Omnis autem affectus, qui facultatem à cerebro per nervos in totum corpus vel partem aliquam influere planè prohibet, sensum motumque tollit. Talis in apoplexia est obstructio ventriculorum cerebri & carotidum; in paralyxi partium, obstructio, compressio, solutio continui, ut est sectio, immo dica crassities, & refrigeratio spinæ vel nervorum. Nam in paralyxi partium omnium infra caput, initium spinæ aliquo ejusmodi affectu laborat; in manus quinta vertebra, ejusque nervi, &c. ut infra de paralyxi motus latius dicemus. Hæ eadem causæ si minores fuerint, & transitum facultatis non omnino impederint & nervi spiritum eo penè modo transmisserint, quo aer caliginosus & fumidus, aut aqua limosa splendorem solis transmittere solet, pro paralyxi stuporem tantum inducunt.

Cur sen-
sus pereat
illeso mo-
tu & con-
tra.

Accidit interdum ut partis alicujus motus aboleatur sensu illæso: sicut è converso ut sensus aboleatur servato motu; Verùm ubi idem nervus sensum motumque suppeditat, motus quidem aboleri poterit servato sensu, sed nunquam sensus aboletur motu illæso. Nam sensus patiendo, motus agendo

gendo exercetur. Ad agendum verò major vis spirituum influentium, quam ad patiendum requiritur, & sensus parva virtute perficitur. Ubi verò alius nervus sensum, alius motum suppeditat; poterit sensus aboleri servato motu, & motus servato sensu. *Causa voluptatis & doloris in sensibus.*

Omnibus sensibus voluptas, & tristis sensatio dolor communiter dictus accidit ab objecto non proportionato. Verum dolor propriè dictus sensui tactus tantum accidit, cæterisq; sensoriis, quatenus tactu participant. In sensu autem tria concurrunt: 1. apprehensio objecti sub ratione propria. 2. Apprehensio sub ratione jucundi vel molesti. 3. Persecutio jucundi, fuga molesti. Apprehensio autem objecti sub ratione propria & sub ratione jucundi aut molesti re ipsa & tempore non differunt, ac una sensatione perficiuntur. Nam ubi objectum est proportionatum jucundam sensationem affert, ubi non proportionatum, tristem & molestim, ut in gustu dulcis & amari manifestum est. In perfecta sensatione 2. requiruntur, 1. l' impressio ab objecto seu receptio speciei in sensorio. 2. Receptionis perceptio seu dignotio vi facultatis internæ residentis in cerebro. Quare læso cerebro sensuq; interiori, passio seu receptio in sensorio dignosci nequit. Unde Hipp. 6. Aph. 2. Qui parte dolentes dolorem non sentiunt, id est, dolotificam causam, iis mens laborat. Ex quibus colligitur quod effective voluptas in sensu sit *Quid voluptas & dolor in sensibus.* sensatio jucunda ab objecto proportionato, Dolor communiter dictus sensatio tristis ab objecto non proportionato. Omne objectum, quod organo sensitivum vehementius movet, quam sensus ratio patitur, five omnis affectio præter naturam repente & affatim incidens ratione proprii objecti sensorium lædit, vel tristem sensationem five dolorem efficit; maxime verò in tactu, ut alibi dictum est: in cæteris & ratione proprii objecti, & quoq; tactu, quo omnes participat.

CAP.
VII.*De dolore
proprio
dicto.**Subiectum
causa do-
loris.**Definitio
doloris.*

Nam sensui tactus & cæteris sensibus, partibusque corporis, quatenus tactu participant, dolor evidentissimus & vehementissimus accidit, unde tristis sensatio in tactu propriè dolor dicitur, in cæteris sensibus à proprio objecto non proportionato, quales in sensu visus sunt illustrissimi splendores, in auditu vehementissimi fragores, in gustu sapor amarus &c. simpliciter molestia aut tristitia vocatur, non propriè dolor.

Subiectum doloris est pars sensu tactus prædita nervosa aut nervis non destituta. Quare quæ omni sensu carent ut ossa, cartilagines, &c. propria ratione non dolent. Causa autem excitans dolorem est repentina alteratio partis sensitivæ, aut solutio continui. Alteratio autem violenta & subita à calore & frigore primario dolorem excitat. A siccitate verò & humiditate quatenus calori & frigori junguntur. Solutio verò continui scilicet erosio, sectio, ruptio, tensio, quatenus fit, dolorem infert, non quatenus facta est, nisi ex accidente. Quare dolor erit tristis sensatio partium nervosarum proveniens à repentina alteratione aut continui solutione. Solutionem unitatis hinc intelligo evidentem & manifestam, quæ partem à parte separat, & non obscuram, ut in dolore ab alteratione. Nam caliditas dilatando, frigiditas constringendo dolorem gignit. Verum ea dilatatio & constrictio, quia evidens non est, solutio continui dici non solet. Deinde quæ alterant etsi continuum solvant, non tamen illa solutione dolorum per se faciunt, sed sua intemperie & alteratione vehementi. Constat enim natura non minus temperamento quàm unione. Quare ubi solutio manifestè sentitur, dolor à solutione erit, ubi intemperies tantum, ab alteratione vehementi sentitur verò solutio quando fit, sive in motu est ex ipso motu per se & non mediante intemperie aliqua
ut

ut Averrhoes arbitratur. Delectamur autem in omni sensus genere, dum per idonea contraria, quæ per se immediatè agunt, ad naturalem statum simul & celeriter reducimur & non paulatim. Verùm eadem doloris & delectationis ratio in omnibus partibus non est, sed major semper in illis, quæ exquisito magis sensu tactus præditæ sunt. Exquisito sensu prædita sunt membra genitalia, ac vis expultrix seminis in viris; attractrix uteri in foeminis vehementer est, quam comitatur ingens voluptas: Verùm dolor, qui ex retento semine oritur, quia paulatim fit, illi voluptati non correspondet. Exquisitissimè autem sentit superius orificium ventriculi ob nervos maximè sensibiles & dolores gravissimos atq; symptomata plurima sustinet non solum per se, sed etiam ob consensum, quem habet cum cerebro & corde, ut alibi dictum est. Nam nullum est membrum quod utrunq; principium ita secum afficit, ut os ventriculi.

Per se ventriculo naturaliter inest appetentia quædam animalis ex defectu cibi vel potus gratia nutritionis. Hoc desiderium naturaliter vel est ex defectu alimenti siccisive cibi, unde fames, vel humidis, undè sitis. Symptomata verò appetentia humani sunt *ἀνορεξία*, debilis appetentia, & depravata, sub qua continetur *βελίμητος*, canina appetentia, pica, malacia, sitis immodica. Hæc appetentia, primæ concoctioni servit: quare de causis horum symptomatum dicemus in explicatione symptomatum ventriculi.

Deinde ventriculo ratione sensus tactus simpliciter considerati, dolor accedit ex repentina alteratione, vel continui solutione; propriè verò superioris ejus orificio, quod exquisitissimo sensu præditum est, & ob vehementiam symptomatum, quæ

*Symptoma
ventriculi
ratione ap-
petentia an-
imalis.*

Dolor ventriculi.

καρδιαλ-
γία.καρδιώ-
γμῳ.

καρδιακή.

Quomodo
dolores ven-
triculi cor
aut cerebri
in consensu
trahant.

iis similia sunt, quæ à corde proveniunt, veteres Græci καρδίαν vocāt, καρδιαλγία propriè dicta, & καρδιακή. Καρδιαλγία autē est dolor ventriculi ex acris humo-rib. superius os ventriculi afficientib. sive mordenti-bus; qualis biliosos vomitus & dejectionis plerum-que antecedere solet: morsus autem orificii ventri-culi à Galen. Com. 14. Aph. 4. καρδιώγμῳ vocatur, quâ significatione coincidit: καρδιαλγία & καρδιώγμῳ, verum propriè, ut notat Gal. Com. 65. Aph. 4. καρδιώ-γμῳ est motus depravatus cordis palpitationi simi-lis, de quo in symptomatibus cordis dicemus.

Καρδιακή propriè est vehemens oris ventricu-li dolor, cor in consensum trahens, cum sudore im-modico, anxietate, & exolutione caloris nativi, λυπα-θυμία, &c. proveniens à virulentis & malignis humo-ribus os ventriculi infestantibus, hi humores vel o-rificio ventriculi impacti sunt, unde vehemens anxi-etas, vel in capacitate ventriculi tantum continen-tur, Deinde generantur aliquando ex cibis pravis, aut putredine humorum in vasis, à quibus in ven-triculum confluunt, ut in febribus malignis accidere consuevit.

Propter dolores orificii ventriculi trahuntur in consensum aliæ partes, potissimum autem cor, & cerebrum.

Cor autem ob vicinitatem per arterias, unde lypothymia, syncope cardiaca, pulsuum privatio-nes, &c.

Cerebrum verò per nervos, unde Epilepsia, Melancholia, coma, &c. Cor simul & cerebrum, unde apnæa, dyspnæa.

In his gravissimis affectibus ex consensu qua-tuor concurrere solent, Primus vehemens affe-ctus ventriculi, Secundus sensus acer stomachi. Ter-tius nervi & arteriæ debiles. Quartus cor aut cere-brum infirmum. Vehementes autem affectus ven-triculi

riculi sunt frigus validum orificii ventriculi ex pi-
uita vitrea, alimentis aut medicamentis refrige-
rantibus, item vitiosi humores, aut flatus disten-
dentes. Præterea erosio & morsus ab acribus &
mordacibus succis, ut bile flava æruginosa, atra, pi-
uita falsa, corruptione ciborum in ventriculo,
&c. quibus non modo stomachus ipse, sed etiam
cum eo per nervos cerebrum; per arteriam ma-
gnam, venamque cavam, cor in consensum tra-
hitur.

Secundò accidit etiam aliis partibus sensu
præditis dolor propter nervos, membranas, & ten-
dines, ex repentina alteratione & continui solutio-
ne, ut capiti propter membranas affectas, Cepha-
lalgia, &c. auribus ὠταλγία; dentibus ob nervos
insertos ὀδονταλγία; intestinis, dolor colicus, & i-
iacus; articulis arthritis; renibus ex calculo νεφρι-
τις, &c.

Dolor autem capitis recens cephalalgia, diu-
turnus & inveteratus levi occasione recurrens totius
capitis, cephalæa & galea, partis dimidiæ cum tem-
porum pulsatione Hemicrania dicitur; ad quam re-
ferri poterit clavus & homonopogia, ubi in una
parte dolor altè infixus est.

Est autem dolor capitis tristis sensatio parti-
um nervosarum capitis orta ex subita alteratione
aut continui divisione. Nam in capitis dolore partes
affectæ sunt nervosæ sensu tactus præditæ, ut menin-
ges & pericranium, deinde cutis & nervi.

Causa verò est alteratio subita ab intemperie,
vel continui solutione:

Intemperies illa est simplex, vel compo-
sita sine aut cum materia; simplex intem-
peries est primario calida & frigida, deinde
sicca, tandem humida non per se sola, sed
qua;

*Dolores ali-
arum par-
tium.*

*Cephalal-
gia.*

Cephalæa

*Hemicra-
nia.*

Clavus.

*Pars affe-
cta.*

Causa.

quatenus cum caliditate aut frigiditate conjuncta est. Plerumque intemperies cum materia est humore aut vapore, qui sanguineus, biliosus, melancholicus, aut pituitosus, vel ex his mixtus, genitus aliquando in cerebro, plerumque ascendens à toto corpore, & ambitu vasorum, vel à parte, ut à ventriculo, hepate, liene, utero, unde dolor capitis alius primarius, alius per consensum. Nam plerisque eorum, qui cephalæa aut hemicrania infestantur, caput debile est, sive aptum ut impleatur, & universi corporis habitus ad id implendum idoneus, in quibus sanguis calidus & vaporosus generatur, quo arteriæ turgescunt vehementius pulsant partesque nervosas concutunt. Materia autem dolorem excitat, aliquando sola qualitate, alterando, interdum solvendo continuum quatenus replet, gravat, & distendit, vel mordet & erodit membranas capitis. Adduntur his causis externæ, ut vulnus aut ictus capitis, aeris vehemens intemperies calida aut frigida, crapula, & ebrietas potissimum ex vino, cibi flatulenti, aut qui caput facile petunt, venus intempestiva, vigiliæ immodicæ, ira, tristitia, timor, &c.

*Differentia
doloris &
signa.*

Sola intemperies dolorem fixum facit sine ulla gravitate, aut tensione; sed intemperies calida cum sensu caloris; frigida cum sensu frigoris: sicca cum squallore: humor aut vapor acris, aut biliosus membranas erodens dolorem acrem excitat; humor crassus frigidus, aut pituita aut melancholia partes premens dolorem gravantem debilemque: flatus aut humores mitiores minus copiosi dum intra membranas se insinuant, easque distendunt dolorem distendentem. Deinde dolor intra cranium profundus est ad radices oculorum perringens: extra cranium superficialis & ad cutis capitis contactum, levemque compressionem exacerbatur.

Tertio

DE DOLORE.

313 CAP.
VII.

Tertiò *ὠζαλία* dolor auris oritur ab intem-
perie, aut solutione continui partium nervosarum *ὠζαλία*
auris: Intemperies ratio sine affluxu materiae est,
nisi frigida, quae auribus aliisque membranosis, os-
seisque partibus inimica est: nonnunquam à calida
intemperie fit, sed cum materia, praecipue sanguine
acri & bilioso, qui vel membranas alterat, vel divel-
lit, & erodit, unde ulcus; vel replet & distendit, un-
de inflammatio, adduntur his vulnus, contusio au-
ris, &c.

Quartò dentibus vehemens dolor accidit pro- *ὠδονζαλία*
pter affectos nervulos insertos, aut gingivas, Affe-
ctus est intemperies non sola sine affluxu materiae
excepta frigida, quae peculiariter dentibus inimica
est. Nam plerumque oritur dentium dolor à destil-
latione, ex humore calido, vel frigido delato, vel in
dentium radices & nervulos, vel in ipsas gingivas,
qui eas alterat, vel erodit & divellit, vel replet & di-
stendit, inflammationemque inducit. Destillatio sæ-
pe recurrens dentes exedere & excavare solet. Exci-
tatur quandoque dentium dolor à vermiculis genitis in
cavitatibus dentium ex materia excrementitia, aut
cibis ibi relictis.

Quintò *ῥῥεῖς* communiter pro quovis ar- *De Arthri-*
ticulorum dolore ex affluxu humoris sumitur, pro- *tide.*
priè pro dolore, qui omnes aut plerosque articulos
afficit. Nam dolor, qui unam partem ejusque ar-
ticulos affligit, ab ea interdum denominatur, ve- *χειράγρε.*
luti qui articulos manus *χειράγρε*; qui pedum *ποδά.* *ποδάγρε*
γρε; qui genua *γονάγρε*; qui coxendicem *ἰχίας* vo- *γονάγρε*
catur; cæteri dolores proprio nomine carent, ut ho- *ἰχίας.*
μοπλατᾶ humeri, dorsi, &c.

Definiri poterit Arthritis communiter sum-
pta dolor articulorum ex intervallis serè affligens
ortus ex affluxu humoris ob debilitatem laxa, va- *Definitio*
cuaq; *Arthritidis.*

V S

VIII.

Pars affecta

cuaque articulorum spatia implentis, partes nervosae divellentis comprimantis & alterantis. Pars affecta articulus dicitur, compositio ossium unà cum ligamentis, cartilaginibus, tendinibus, &c. gratia voluntarii motus. Verùm pars affecta propriè non est totus articulus, sed tantùm partes ejus nervosae sensu præditæ, ut tendines musculorum, quibus adduntur nervi & ipsa cutis.

Morbus
causa doloris

Morbis causa doloris non est sola intemperies, sed potius continui solutio ex affluxu materiæ, quatenus partes replet & distendit, vel à se mutuo divellit vel comprimit. Nam affluxu humoris ad articulum replentur & tenduntur possimū membranæ ac etiam ligamenta, & simul teste Aëcio permadescunt; Comprimuntur vero aut à vicinis partibus divelluntur nervi & tendines. Nam si replerentur & distenderentur necesse erit arthriticos convelli, & inter nodiis dolorem sentire.

Causa morbi.

Causa morbifica (*Gal. Com. 25. Aph. 4.*) est imbecillitas articulorum & affluxus materiæ vitiosæ, quæ duo propriè in arthritide requiruntur, cum una sine altera efficax non sit.

Imbecillitas autem oritur ex debilitate caloris nativi in articulis, ex raritate & laxitate ligamentorum & tendinum; contrahitur ea imbecillitas nonnunquam à parentibus hæreditario malo, plerumq; ab adventitiis causis, ut vino, venere, inordinata victus ratione, &c. Deindè coacervatur in parte superflua materia per congestionem, & influxionem, verùm cum arthritide non sensim fiat, sed confertim, non orietur per congestionem, sed influxionem; quamquam circa articulos per congestionem materia superflua coacervari soleat, undè dolor periosii sine tumore excitatur: qui lue venereâ laborantibus quandoque accidit, qui propriè arthritidis non est.

In-

In fluxione quatuor considerantur; materia si-
 ve humor influens, deinde pars mandans, tertio *Opinio Fer-*
 pars recipiens, quarto spatium sive via per quam. *neli de cau-*
 Pars recipiens, ut diximus, est articulus & potissi- *sis Arthri-*
 mum ligamenta & tendines. De cæteris dubitatur. *tidis.*
 Nam Fernelius materiam illam arbitratur excre-
 mentum cerebri, sive pituitosum aut serosum hu-
 morem: Deinde partem mandantem, undè proflu-
 it, esse pericranium ad occipitium potissimum;
 tertio defluere ab occipitio non per venas & arte-
 rias, non per continuitatem nervorum aut muscu-
 lorum, sed solum inter carnem & cutem, & subsi-
 stere in articulorum ligamentis & membranis. Ve-
 rum quod defluit, non est semper pituitosus aut
~~serosus humor~~, sed etiam interdum sanguineus,
 biliosus aut melancholicus, raro sincerus plerum-
 que ex pluribus permixtus, ac interdum maligna
 qualitate affectus. Nam ingens dolor, calor rubor,
 febris aliaque symptomata, quæ juvenibus naturâ
 calidis & biliosis arthritide laborantibus æstate me-
 dia contingunt humori pituitoso ascribi neque- *Causa ma-*
 unt. Quare materia causa arthritidis diversa erit, *terialis.*
 plerumque humor pituitosus, serosus, aliquando
 sanguineus, aut biliosus, nunquam solus humor
 crassus aut melancholicus. Nam ut humores crassi
 fluant, tenuium vehiculo semper indigent. Deinde *Pars man-*
 pars mandans non semper est pericranium, nec *dans.*
 spatium per quod fluit humor inter cutem & car-
 nem, sed plures sunt & fontes, & viæ fluxionis.
 Nam pars mandans plerumque est caput, inter-
 dum jecur, lien, venter, uterus, renes, omnia *Via fluxio-*
 viscera aut totum corpus. Via verò, per quam *nis.*
 fluit, est aut inter cutem & carnem, aut per
 continuitatem membranarum, musculorum,
 nervorum aut vasorum, aut per ipsas venas &
 arterias, plerumque enim à pericranio inter car-
 nem

nem & cutem humor in articulos defluit, quod arguunt præcedens capitis gravitas, tumor ac dolor ad occipitium, qui contactu exacuitur.

Origo fluxionis.

Verùm nullis ejusmodi signis præcedentibus, sæpè arthritidis oritur materia à toto corpore, ut in plethoricis, aut à jecore per venas in articulos dimissa, cui phlebotomia sæpè profuit; quod non eveniret, nisi materia per venas influeret. Deinde teste *Gal. Com 6. Epid. sect. 4.* ex dysenteria, aut diarrhæa intempestivè suppressa; aut ex colica converso humoris impetu per venas ad articulos, arthritidis orta fuit; item ex nephritide, conversa pituita à renibus ad articulos; ex suppressione hæmorrhoidum; & in mulieribus menstruorum, aut consueta venæ sectione omissa. Præterea suppressione evacuationis per habitum corporis, materia in ambitu ejus collecta, ad articulos interdum decumbit. Tandem per arthritidem febres critiche solvuntur, materia per venas ad articulos transmissa, imò in ipso paroxismo arthritico partes ferè omnes ad articulos sua excrementa transmittunt.

Quomodo concitatur fluxio.

Concitatur fluxus humoris à membro mandante per expulsionem; aut à recipiente per attractionem. Nam pars mandans irritata qualitate, aut copia humoris, sua vi expultrice à se propellere conatur ad partes magis debiles, & hæ vicissim ad debiliores: attrahit pars recipiens, præcipuè intemperie calida, deinde ratione doloris, quatenus partes vicinas commovet ut spiritum cum sanguine, in partem dolentem transmittant. Aduvant hunc motum ipsius humoris tenuitas, deinde viarum amplitudo & laxitas.

Causa redundantia humoris.

Coacervatur humor ille superfluous ex prava viscerum constitutione & mala victus ratione, ut sunt repletio, crapula, vini & Veneris immodicus usus, quare poetæ podagram Bacchi & Veneris filiam

liam finxerunt, deinde ex suppressione consueta evacuationis ex otio, vita delicata, unde Podagra Dea $\mu\iota\sigma\acute{o}\pi\omega\chi$ vocatur, id est odio habes pauperes, &c. Colligitur in parte mandante humor per congestionem aut transmissionem, qui ut molestus esse cæperit, vi expultricis facultatis ad partes imbecilliores expellitur, tandemque ad articulos decumbit. Quare arthritidis erit è numero affectuum, qui accessiones habent certis que periodis recurrunt. Nam ubi ad articulos materia defluit, dolor incipit, cessante influxu, & discussa omni materia tam diu remissiones habet, donec nova materia coacervetur; unde novus fluxus recurrit. Verum post paroxysmum aliquando crassus viscidus humor in articulis diu contentus, resolutis partibus tenuioribus à validè discentibus, aut congelatis, à refrigerantibus, in tophum aut callum concrevit, qui ibi relictus motum articulorum impedit. De dolore iliaco colico nephritico, &c. in progressu dicitur. Præter dolorem sunt aliæ species depravati sensus, ut pruritus, sensus ulceris, lassitudinis, quæ cum motu complicantur, aut sine motu non perfectè intelliguntur, de quorum causis dicitur in explicatione symptomatum motus.

CAPUT VIII.

De Causis Symptomatum Motus.

Sensum motumque voluntarium ab uno fonte emanare, & lædi, vel læsa facultate influente à cerebro per nervos, vel primo instrumento, vel aliquo ministrantium, in singulis sensibus supra demonstratum fuit: Consequens nunc est, ut in motu voluntario idem ostendamus; & primò causas sym-

CAP.
VIII.

*Differentia
symptom.
volunta-
rii motus
eorumque
causa.*

symptomatum motus voluntarii; Deinde illorum motuum depravatorum, qui licet animalis facultatis propriè non sint, sed virtutis expultricis: tamen quia sine animale virtute nec planè intelliguntur voluntarii motus symptomatibus annumerantur.

Symptomata autem motus, quædam sunt naturæ sive facultatis opera, sed coactæ & irritatæ à causa præter naturam: alia morbos consequuntur, naturâ nihil conferente ad eorum generationem; nonnulla utriusque opera sunt. Morbi autem solius opera sunt convulsio, Paralysis & palpitatio. Symptomata quæ opera naturæ sunt irritatæ sensu rei molestantis ab unâ eademque facultate immediatè non fiunt, nec uno eodemque modo: nam nonnulla ab animali facultate, sed irritatæ à expultrice naturali immediatè perficiuntur, ut sternutatio, tussis, oscitatio & pandiculatio, ac motus convulsivi ut in Epilepsia. Quædam à naturali producuntur, quatenus cum animali virtute concurrunt, ut ructus & singultus, quibus addi poterunt expultrices motus ventriculi, uteri vesicæ, intestinorum, &c. qui immediatè quidem ab expultrice naturali fiunt, sed adjuncta motu musculorum. Nonnulla à vitali facultate violento motu caloris nativi à corde: ut timor, ira, aliæque perturbationes animi: aliqua ab omnibus tribus, ut rigor & horror: Utriusque opera morbi scilicet & naturæ sunt tremor & torpentium motus, lassitudo spontanea. Motuum verò depravatorum quatuor genera sunt vibrans, convulsivus, tremulus & palpitans: sub convulsivo continetur convulsio, singultus, sternutatio, tussis, &c. De horum symptomatum causis ordine dicemus, initio facto à symptomatibus solius voluntarii motus. Functionis autem voluntariæ, quæ musculis perficitur, symptomata propriè sunt, paralysis, stupor,

con-

convulſio & tremor, quæ in particularibus inſtru-
mentis ſpeciem & nomen interdum variant: his ad-
di poterunt vertigo & incubus. Fit autem paralyſis
& torpentium motus in toto aut parte aliqua cor-
poris ab iis affectibus, à quibus paralyſis ſenſuum, &
ſtupor: licet voluntarius motus, qui muſculis abſol-
vitur, plus virtutis & roboris requirat, & nervos du-
riores ſiccioresque quam ſenſus. Quare à leviori
cauſa tollitur motus quàm ſenſus:

*Definitio
paralyſis.*

Definiri autem poterit paralyſis, abolita fun-
ctio voluntarii motus in partibus citra ablationem
actionū principis facultatis cauſa à prohibente ſpi-
ritus animales influere, in organa motus. Dico citra
ablationem functionum principum, ad differentiã
apoplexiæ. Cauſa immediata eſt omne quod influ-
rum animalis ſpiritus, per nervos in muſculos pro-
hibet. Prohibetur affecto vel cerebro, vel ſpinali
medulla, unde nervi motorii, vel iſſis nervis, qui in
muſculos diſtribuuntur. Quare pars primario affe-
cta erit aut cerebrum iſſum, aut ſpinalis medulla,
aut nervus, adduntur muſculi ſecundum tendines,
partesque nervoſas, quatenus vim per nervos ſu-
ſcipiunt.

*Pars affe-
cta.*

Quomodo verò vitio cerebri ſpiritus per ner-
vos non influit initio præcedentis capitis demon-
ſtratum fuit. Propriè paralyſis oritur, quando diſtra-
hitur & diſſolvitur ſpiritus in cerebro, quod in ma-
gnis vulneribus capitis & temporum accidit, ubi op-
poſitæ partis paralyſis oritur, ob inflammationem
ſpiritus in partem læſam trahentem. Deinde quia
intercipiuntur ſpiritus ob anguſtiam non omnium
ventriculorum, ut in apoplexia, ſed ſinum & cavi-
tatum partis dextræ aut ſiniſtræ, unde hemiplexia,
vel læſo cerebro aut meningibus in exortu peculia-
rium nervorum.

*Cauſa pa-
ralyſis vi-
tio cere-
bri.*

Plerum;

*Causa pa-
ralysis vi-
tio spina-
lis medul-
lae aut ner-
vorum.*

Plerumque morbus causa paralytis est in spinali medulla, vel ipsis nervis. A spinali medulla omnes sub facie partes exceptis visceribus & vocis organis nervos accipiunt. Deinde quo pars laesa superior est, eo gravior. Morbi autem spinalis medullae aut nervorum, qui influxum prohibent sunt intemperies, meatuum angustia, & solutiones continui, intemperies autem est vehementer frigida, & plerumque una humida, quae nervos relaxat, sensusque obtundit crassioresque reddit, qualis interdum sine materia est ex contactu torpedinis, piscis, usu opiatorum, longa mora in aqua, aut aere frigido, &c. plerumque cum materia frigida, ut humore pituitoso. Angustia meatuum spinæ & nervorum est potissimum obstructio, compressio, & constipatio. Obstructio autem spinæ & nervorum est per animam medullarem substantiam ut plurimum ex humore pituitoso, deinde ex melancholico sanguineo, aut ex mixto non propriè à bile, licet ex colica biliosa, teste Paulo, & febris biliosa, teste Fernho, paralytis interdum oriatur, sed quia bili multa pituita permixta est, aut febrilis calor pituitam in cerebro colliquat, & tempore rigoris ad nervos propellit. Compressio spinæ aut nervorum oritur ex contusione aut ictu, vel à luxatione vertebrarum, spinæ ad latus, vel à tumore extrinseco comprimente, vel à vinculis injectis partibus nervosis, &c. Constipatio fit præcipuè à tumore in substantia spinalis medullae vel nervi. Additur his à nonnullis subsidencia meatus, spinæ & nervorum à siccitate substantiam cogente & contrahente, sed à tali affectu potius convulsio fit & si augeatur, transitum spirituum impedit.

Tertium genus morbi influxum spirituum impediens est solutio continui, præcipuè vulnus & sectio spinæ vel partis nervosae per transversum con-

contritio nervi à gravissima contusione, &c. Atque hæ causæ paralytis, si leviores fuerint, pro paralyti stuporem aut motum torpentem inducunt cunctibus in unum morbo & facultate.

*Differentia
Paralytis.*

Differentiæ paralytis sumuntur à parte affecta. Nam affecto cerebro secundum dextram aut sinistram partem, dextræ aut sinistræ partes corporis, & faciei resolvuntur, & unà vox impeditur; si morbus totum spinæ exortum afficiat omnes sub facie partes: si dimidiam tantum nimirum dextram partem, dextra pars sensu motuq; privatur. Verum si alibi morbus sit, partes quæ inde nervos accipiunt, tantum resolvuntur; ut brachia & manus affectis vertebriis cervicis, pedes læsis vertebriis lumborum, ubi vero una pars sensum motumque amittit, in illius nervo, aut ejus exortu affectus erit, veluti resolutio motu oculorum in secundo pari nervorum cerebri, resolutio motu linguæ in septimo pari ejusdem, ablata voce, in nervis recurrentibus, resolutio diaphragmate in quarto pari cervicis, &c.

*Signa loci
affecti.*

Secundò convulsio paralyti opponitur, utraque partibus motui dicatis propriè accidit: sed in resolutione pars affecta mollis & laxa redditur, & à sana attrahitur: in convulsione pars læsa dura, intenta & contracta sanam ad se trahit. Deinde in paralyti & convulsione nervi quidem & musculi afficiuntur sed in paralyti magis nervi, in convulsione potius musculi: nam non contrahitur pars, nisi musculo contracto à nervo.

De convulsione;

Σπασμὸς Latinis convulsio non eodem modo semper sumitur. Nam aliquando tam la è accipitur, ut omnem motum convulsioni similem sive convulsivum comprehendat, plerumque magis propriè pro involuntaria contractione musculorum, quæ duplici modo fit, vel ab expultrice facultate partium nervolarū irritata à causa dolorifica,

X

fica,

*Convulsio
legitima.*

Illegitima

*Definitio
convulsio-
nis legiti-
ma.*

fica, ut id, quod noxium est, expellat; vel à morbo abbreviante, & violenter tendente partes nervosas. Hæc affectio, quia morbi solius opus est *αὐτὸν τὰ νοσή*, convulsio exquisita propriissimæ quæ dicta est: illa illegitima tantum. Definitur autem legitima convulsio contractio involuntaria & perpetua musculorum versus suum initium, orta ob brevitatem nervosarum partium ex inanitione & repletionem. Dico contractionem perpetuam ad differentiam convulsione illegitimæ, quæ *ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ* est. Nam in vera convulsione musculi, qui contrahuntur, à morbi initio ad finem rigidi & contracti permanent. Contrahuntur autem musculi ut in motu voluntario ad suum initium, non secundum ventrem à facultate, sed præter voluntatem à nervo affecto sive contracto; qui musculos una contrahit, & in eodem situ detinet.

*Morbis
causa im-
mediata
vire con-
vulsione.*

*Pars af-
fecta.*

*Causa
morbifica
inanitio*

Quare causa immediata veræ convulsione erit contractio sive brevitatis nervorum, deinde musculorum, quæ morbus est in magnitudine diminuta, cum quo plerumque coniuncta est solutio illa continui, quæ spasma sive divulsio dicitur, ac ad quam consequitur totius membri vitiata figura. Pars primario affecta sunt nervi, aut initium aliquod nervorum, nimirum cerebrum aut spinalis medulla: Deinde propter nervos, musculi, ac propter musculi articuli. Nam dum principium nervorum violenter contrahitur, contrahuntur una nervi, & dum nervi ipsi etiam in quos distribuuntur musculi, quare membra in quæ tendines musculorum inferuntur, necessarîo contrahuntur, à sua naturali figura deficiunt ac vehementi dolore torquentur.

Causæ autem omnes brevitatis sive contractionis partium nervosarum ab Hipp. ad inanitionem & repletionem reducuntur; quas Gal. 2. de Sympt.

causa.

DE CONVULSIONE.

323 CAP.

VIII.

aus. cap. 2. exemplo chordarum in musicis instru-
mentis explicat; dum enim nervi replentur, eorum
tutudo dilatat, & proinde longitudo minuitur;
tum exsiccantur sive evacuantur, longitudo cum
tutudine contrahitur.

Convulsionis autem ex repletione causæ dux *Cause con-*
sunt G. lib. de Tremor. ap. ult. affluxus materiæ ten- *vulsionis*
dentis nervos sine inflammatione; deinde inflam- *ex repleti-*
natio nervosarum partium, præcipue cum in ner- *one dua.*
vorum principio aut propè ipsum inflammatio ex-
citatur: tum enim inflammatio nervos attrahens
endit, prout artifices extrinsecus instrumentis chor-
das. Affluxus ille materiæ non est secundum medul-
larum nervorum substantiam meatuum spirituum ob-
struens, nervosque relaxans, ut in paralyti; sed potius
secundum tunicas, sive dum inter tunicas colligi-
tur, eas replens & distendens, qualis materia præci-
pue est humor pituitosus, deinde melancholicus.
Verum pituita non salsa, nec tenuis, sed magis cras-
sa & viscida, quam in paralyti, & interdum flatulen-
ta. Deinde oritur inflammatio in spina, aut circa ex-
ortum nervorum ab ictu, contusione, ex affluxu
sanguinis, aliquando ex punctura nervi. Verum
convulsio universalis ex punctura nervi illegitima
est. Inflammatio partis vicinæ nervos tendens con-
vulsionem excitat, unde gravem anginam consequi-
turnonnunquam convulsio. Ad eundem modum
luxatio vertebrarum, quatenus nervos secum trahit
tenditque, convulsionis quandam speciem inducit.
Deinde ubi ad latera luxatio fit, nonnunquam agri
in ea parte, quâ vertebræ inclinatae resolvuntur,
ab altera convelluntur, teste Galen. 4. de locis aff.
cap. 3.

Cause con-

Convulsio ab inanitione oritur, quia nervi *vulsionis*
breviores redduntur ob nativæ humiditatis cōsum- *ab inani-*
ptionem. Consumitur autem ab exsiccantibus non *tionem.*

X 2

len.



*De convul-
sione ille-
gitima.*

*Definitio
convulsio-
nis illegi-*

*Pars affe-
cti.
Morbus.*

sensim, sed conferim magna que violentia, qualia sunt quæ evacuant, vel sensibilibiter, ut immodicus sanguinis, aut alvi fluxus, sudores copiosi, vomitus vehementiss. ex helleboro, &c. vel insensibilibiter, quæ vehementer calefaciunt & exiccant, ut febres ardentes, phrenitides lethales perpetuæ vigiliæ, curæ, labores, inedia, alimenta immodicè calefacientia, ut vinum potens, &c. adduntur cauteria aut vesicatoria nervosis partibus temerè admota. Hæ causæ convulsionem excitant, si nervi debiles & dispositi fuerint, & affectus nervosas partes invaserit.

Convulsio illegitima est *ἀνόμοτος* & non solius morbi opus, sed motus expultricis naturalis nervorum & musculorum, Deinde causa ejus non est materiæ redundantia aut defectus, sed affectio dolorifica stimulans nervosas partes, ut iere concutiant, quare à nonnullis convulsio non proportionata ad materiam dicitur, quod inter partem affectam & materiam nulla sit proportio. Definatur igitur ista convulsio, depravatus motus instrumentorum voluntarii motus, ob facultatem expultricem partium nervosarum stimulatam ab affectu dolorifico, ut sua contractione & concussionem, quod noxium est, extrudant. Pars primariò affecta sunt partes nervosæ potissimum nervi & tendines musculorum. Causa proxima, est affectus dolorificus nimirum intemperies & solutio continui: intemperies autem illa fit ex repentina alteratione sine, aut cum materia, & vel a qualitate evidente potissimum calida vel frigida, vel venenata & maligna, ut ex ictu scorpil, &c. Materia verò est humor aut vapor, & vapor vel flatulentus, vel spiritus aut aura venenata, qualis oritur ex febre maligna, ex ulcere maligno, punitione nervi, &c. Continui verò solutio est velerosio morsus ab acribus malignis humoribus, vel punctio nervorum aut tendinum, vel

vel distensio a flatibus aut flatulentis humoribus, &c. Hæ causæ convulsionem efficiunt, vel per essentialiam ex proprio partis nervosæ affectu, vel per consensum, dum alteri membro nervi compatiuntur aut nervorum principium. Compatiuntur autem nonnunquam per nudam condolentiam, plerumq; vel à parva qualitate alteratis per cōtinuitatem partibus, donec ad initium nervorum deveniat passio, vel spiritu flatulento, aut aura maligna per partes nervosas transmissa, quando vetò ad initium nervorum & ventriculos cerebri pervenit affectio, Epilepsia oritur. Fit autem convulsio per consensum primum orificii ventriculi, vel ab acri & maligno humore, ut æruginosa bile aut à veneno aut vermicibus os ventriculi mordentibus, aut potu aquæ vehementer frigida, ubi ventriculus valdè sensibilis est. Deindè per consensum uteri, ut in hystericeis aut vasorum spermaticorum ex semine retento, &c. ac partis habitu corporis ex ulceris putridi virulenta aura per nervosas partes transmissa, &c.

Ex his patet, quid & quotuplex sit convulsio, *Differentia* verum ratione loci affecti dividitur convulsio in u- *convulsio-* niversalem & particularem: convulsio illegitima *nis illegiti-* universalis cum sensus & mentis oblatione est Epi- *ma.* lepsia, sine sensus mentisque latione, convulsio universalis simpliciter vocatur: convulsio illegitima particularis est spasmus flatulentus vulgò Gramphus ex flatulento spiritu replente musculos aut tendi- *Differentia* nes, præcipuè pedum, qui levi frictione sanatur, &c. *convulsio-* Convulsio legitima nulla tam universalis est quam *na legitima* Epilepsia, sed ea propriè uniuersalis vocatur, ubi musculi caput & spinam moventes, vel anteriores, vel posteriores, vel utrinque convelluntur, unde triplex convulsio; una *ἐμπροσθεν*, quando musculi anteriores partes fluentes contrahuntur, ut mentum annectatur pectori, corpusque carinam

X 3 repræ-

repræsentet: altera ὁμιόδοτος, ubi musculi posteriores caput partesque extendentes convelluntur: Tertio πῆξις motus compositus; quando musculi tam anteriores, quam posteriores ita contrahuntur, ut caput totumque corpus erectum & rigidum maneat; malum peracutum quod citò interimit. Horum causa in exortu spinalis medullæ, nisi cum universo corpore musculi faciei convellantur: Nam tùm in cerebro erit. Particularis convulsio legitima fit contractis musculis partis alicujus a nervo, quæ ab effectu interdum peculiare nomen sortitur. Nam convulsio musculorum oculi σπασμοί, mandibularum & musculorum temporum πῆξις: oris, contracto lato musculo ab una parte, convulsio canina; ab utraque risus Sardonius: item convulsio musculorum peniς, ~~varicella~~ *varicella* vocatur. In cæteris similis ratio est, licet propriis nominibus careant.

Signa.

Signa instantis convulsionis generalis, sunt tremor, dolorque circa cervicem & juncturas frequens coloris mutatio, urina viridis, partium faciei distortio, anhelitus suspiriosus sive offendens, &c. præsentis; partium involuntaria contractio, pulsus parvus, durus seu cordosus, vigiliæ, deliria, &c. Pars verò quæ convellitur intenta dura, immobilis redditur, ac sanam oppositam ad se trahit. Particularis convulsio, denotat morbum esse in exortu proprii nervi; totalis sub facie, in initio spinæ; si facies unà convellatur in cerebro; si ab inanitione accidat, subitò accessio non fit, sed paulatim cum membri diminutione, præcesseruntque causæ exiccantes; contraria ratio est in convulsione ex repletione, &c.

Tremor.

Tertio tremor naturæ & morbi opus, est motus depravatus, compositus ex contrariis duobus

bus motibus sibi invicem succedentibus sine sensibili quiete, scilicet ex motu sursum ferente, aut in rectam lineam continente: & ex motu deorsum trahente. Sursum autem ducit & in rectum continet facultas animalis: deorsum trahit infira partis gravitas. Oritur enim tremor non in quiete relaxatis omnibus membris, sed musculis agentibus vi facultatis animalis. Agunt autem muscoli non solum quando partem aliquam extendunt & contrahunt, sed etiam quando extentam in rectum continent; Nam ut in ambulatione ita in statione aut manus extensione duo concurrunt facultas partem continens & movens mediantibus musculis, deinde naturalis partium gravitas deorsum deprimens. Quare si facultas valida fuerit, motus sine molestia erit, & quando pars movetur non tremit: at si tam infirma fuerit, ut non vincat naturalem contentionem partis, quæ movetur, sed facultas movens & id quod movetur pari virtute & robore simul certent, tremor oritur. Quare erit Tremor motus voluntarius depravatus ex contrariis compositus sursum deorsum assiduus ex pari mutuaque contentione facultatis debilis movere conantis, & ponderis membri deprimentis. Dico facultatis movere conantis ad differentiam convulsionis, rigoris & similium. Nam dum quiescit membrum non tremit; sed dum erigitur, potissimum si facultas ponderi membrorum par non fuerit, ut enim valida virtus non omni oneri par esset nec debilis ponderi suorum membrorum, ut in decrepitis apparet, qui ob virium debilitatem tremunt, quod corpus ipsis oneri sit. Causa tremoris est debilitas facultatis nervorum, quæ duplici modo oritur, nimirum virium exsolutione & oppressione. Exoluunt autem vires immodicis evacuationibus alvi, sudoris, sanguinis & similium, intempestiva venere, longo morbo, immodico gaudio, &c.

*Tremoris
definitio.*

X 4

quæ

Quæ spiritus confertim evacuant. Huc adduntur, quæ calorem nativum extinguunt, nervosq; debilitant, ut frigida intemperies, vapor hydrargyri, &c. Oppressio verò oritur plerumque à crassis humoribus leviter obstruentibus nervos, aliquando à copia humorum in venis, à crapula, frigida potione, &c. Item à timore, verecundia & similibus, quibus calor nativus ad interiora confertim revocatur.

Palpitatio

Palpitatio morbi solius opus, illis partibus tantum accidit, quæ dilatationem suâ natura admittere possunt; quare ut tremor partes à loco non transfert, sed dilatare & subsidere in se alternatim cogit: Nam propriè palpitatio est depravatus motus ex dilatatione & subsidentia compositus in partibus dilatationi idoneis, ortus à vapore multo, crasso celeriter distendente, & per partem fluentem & resluentem. Dico vaporem crassum & multum pro capto loci aut cavitatis in quo continetur: nam paucus & tenuis vapor facile discutitur, nisi pars frigore condensetur & pori constipentur. Quare duæ erunt palpitatiois causæ; una spirituum crassities & copia, ut faciliè discuti nequeant; altera pororum & meatuum nimia constipatio & condensatio. Verùm cordi peculiaris quædam accidit à cæterarum partium palpitatione diversa, de qua dicitur in explicatione symptomatum cordis.

*Causa symptomatum
motuum
depravatorum
expultricis
facultatis.*

Sequuntur symptomata motus depravati, quæ solius facultatis animalis non sunt, sed expultricis naturalis stimulatae sensu rei molestantis, cujus generis sunt pandiculatio, oscitatio, rigor, horror, singultus, vomitus, tussis, sternutatio &c. Horum omnium causa communis est irritatio facultatis expultricis propter sensum rei molestantis, scilicet mordentis, pungentis, erodentis aut gravantis. Nam omnibus partibus inest alieni odium & aversatio; quod autem aversantur id facultate naturali expellunt,

lunt, & eo magis quo acriori sensu tactus præditæ sunt, magisque molestiæ sensu stimulantur. Deinde hi omnes motus depravati inter se quandam proportionem habent; omnibusque commune est, expultricem vehementius concitatam ea quæ contristant persequi, unde qualis motus ventriculi est in vomitu, talis pectoris & pulmonis in tussi, &c. Differunt tamen modo agendi, ratione partium, facultatum & causæ moventis. Nam partes aliæ ut noxia expellant, sese violenter contrahunt, aut concutunt, aliæ sese contrahere, aut concutere nequeunt. Deinde omnes ejusdem facultatis organa non sunt, nec eadem vi moventur, sed aliæ animalis facultatis sunt, aliæ vitalis, aliæ naturalis. Præterea causa expultricem stimulans, aut continetur in cavitatibus, ut in vomitu, sternutatione, tussi; aut in solida substantia, ut in pandiculatione, singultu, rigore, &c. Et vel violenter movet & irritat, ut in rigore, vomitu, sternutatione, vel minus violenter ut in horrore, nausea. Quare motus omnes ejusdem formæ, magnitudinis, velocitatis & frequentię esse nequeunt. Nam primum partes, quæ contrahi possunt, nunc fibrarum contractione & compressione, nunc relaxatione, interdum particularum omnium concussionem, quod noxium est expurgant. Peculiariter verò instrumenta naturalia ea, quæ cavitatibus continentur, compressione exprimunt & expellunt, ut ventriculus in vomitu: Vis vitalis impulsu caloris cordis cum spiritu & sanguine, ut in rigore, agonia, &c. Instrumenta animalia, nervorum & musculationum contractione & relaxatione, aut partium omnium concussionem, ut in motu convulsivo, &c. Instrumenta verò, quæ contrahi & hoc modo agere nequeunt, ut sunt viæ respirationis, os & nares spiritu utuntur, qui incitatus cum impetu sibi vias aperit, ut noxia violentur expurget, quemadmodum

X ; in

in tussi & sternutatione apparet: nam tussis vehementissima spiritus efflatione, quæ in pectore pulmonibus & aspera arteria continentur expurgat: similiter sternutatio ea protrudit, quæ nasum & anteriores cerebri partes offendunt. Nilominus tussis sine constrictione musculorum pectoris & compressione pulmonis non fit, & sternutatio non sine concussione cerebri. Præterea ubi in ipsa substantia partium sensibilibus aliquid erodens continetur, quod vehementius movetur, facultas & animalis & naturalis violentè irritata cum calore nativo refugit, & tamen id quocunque modo potest expellere festinat omnium partium concussionem & vibrationem, nimirum singulis particulis se constringentibus & contrahentibus; & unaquaque particula portionem excrementi, quod in se continet protrahente. Hoc modo si omnes partes simul moveantur, Rigor propriè dicitur, concussio scilicet & vibratio totius corporis: At si sola cutis concutitur, horror propriè vocatur. Ubi verò id quod in partibus substantia continetur, non movetur nec vehementer irritat, sensum tantum inæqualitatis inducit, unde varia symptomata, ut post apparebit. Quare prout facultas magis aut minus aut frequentius irritatur, ita agit, & quo robustior est, eo vehementiores & validiores motus facit. Vehementes & validi motus expultrices sunt sternutatio, tussis, singultus, rigor: his minores pandiculario, oscitatio, horror, &c. At prorsus lassitudo ulcerosa & similia, magis sunt sensus quam motus. Causa communis horum omnium symptomatum est, quod tristem sensationem sive dolorem excitat, præcipuè verò intemperies inæqualis & infieri, non æqualis & jam facta: nam dum natura mutatur à statu suo dolet, tantaque doloris & molestiæ est magnitudo, quanta intemperiei, ut in febribus ardentibus apparet, dum solidæ partes mutantur.

As

At morbis incipientibus aut instantibus inæqualitas quædam plerumque sentitur, quæ duplex potissimum est; Una rei alienæ dispersæ per corporis molem, quæ nomine caret: alia cum sensu lassitudinis, unde lassitudo spontanea vocatur. Hactenus in genere de causis symptomatum depravati motus expultricis, superest ut de singulis in specie agamus & primum de symptomatibus, quæ fiunt ex viciosis excrementis in habitu sine substantia corporis: Deinde in cavitatibus. Vitiosa autem excrementa, quæ intemperiem inæqualem, sensumque inæqualitatis excitant, vel vaporosa sunt, facileque discutiuntur, vel magis infixa, & simul acria & mordacia. Ob sensum autem inæqualitatis ex vaporosis excrementis in habitu corporis, ægri maximè pandiculantur, partesque distendant sese tuendi gratia, atque etiam oscitant. Est autem pandiculatio propriè dilatio musculorum irritatorum ob sensum evaporantium à carne per poros excrementorum vaporosorum, ut illa excrementa expurgentur. Oscitatio verò est motus musculorum faciei maxillam inferiorem aperientium ut halituosa excrementa expellantur. Hæ affectiones à somno ex porrectis potissimum accidunt, cum in carne halituosa excrementa sentiuntur, collecta ex concoctione alimenti & cessatione à motibus.

Lassitudo autem spontanea, quæ labores non consequitur, est impotentia movendi membra, ob sensum quendam molestiæ in partibus. Sensus ille motum impediens triplex est, unde triplex est lassitudo: Una tensiva, quâ intendi videtur corpus, orta à plenitudine vel copia humorum fibras distendente; Altera ulcerosa ubi ægri, cum moventur, ulceroso sensu afficiuntur, seseque pungi aut multas quasi spinas infixas habere putant. Hæ ex humoribus acribus pungentibus & quasi vulnerantibus cutē & subjectam carnē excitatur: Tertia contundens vocatur, quan.

*Pandicula-
tio.*

Oscitatio.

*Lassitudo
spontanea
triplex.*

quando ægri moventur : sibi omnia membra con-
quassata & contusa arbitrantur , & calorem cum
morsu & tensione sentiunt , talis oritur ab humore
vitioso copioso transfuso in totam corporis molem,
qui musculos excalefactos ita attollit , ut phlegmo-
ni persimilis affectus videatur. In omni lassitudi-
ne spontanea , sensus molestus est , sed ad eam mole-
stiam excutiendam , non semper facultas exurgit.
Nam qui lassitudine contundente tenentur , & quasi
ossium fatigatione ; pandiculationem , concussionem
omnemque motum reformidant , quod in cæteris æ-
qualitatibus non semper fit , nisi nimium augean-
tur ; qui verò ulcerosa lassitudine afficiuntur , ante-
quam moveantur , quasi inæqualiter afficiuntur , &
quasi horrere videntur , magis verò horrent , quan-
do moventur : si vehementius exerceantur plane ri-
gent , humoribus per sensiles partes delatis. Hæ o-
mnes affectiones à mordacibus excrementis oriun-
tur , quemadmodum sensus pruritus , ulceris , sca-
biei atque inæqualitatis , sed differunt inter se ex-
crementorum illorum multitudine & paucitate ; mo-
tu & quiete ; qualitate magis vel minus mordente :
Præterea robore virtutis expultricis corporis & sen-
sus acumine.

Causa sen-
sus inæqua-
litatis ma-
gnis minus-
que evide-
ntis. Nam primum sensus inæqualitatis , (quando
aliquid molestiæ in corpore percipitur , quod quale
id sit exprimere non possumus) causa est levis alte-
ratio , aut intemperies inæqualis à materia acri mi-
nus copiosa extenuata , aut in spiritum versa , per
corporis habitum dispersa ; At causa sensus inæqua-
litatis magis evidentis , erit gravior intemperies &
alteratio ab humore acri immoto vel immobili.

Causa sen-
sus Pruritus
Ulceris. Nam pruritus sensus excrementorum salso-
rum , &c. circa cutem consistentiam oritur à
succo salso , tenui paucò & immoto. Ulcerosus af-
fectus à paucò quidem immoto , sed magis mordaci
lon-

longiusque penetrante: Scabies à succo salso immo-
to, ut pruritus: sed crassiore copiosiore longiusque
penetrante Horror verò à paucò tenui mordaci cum
exiguo motu, at si idem succus vehementius mo-
veatur aut copiosior mordaciorque fuerit, rigorem
inducit. Ratione autem subjecti hi motus variant,
nam corpus debile acuti sensus, facillè irritatur &
dolet: contra corpus robustum sensus hebetioris.
Ipsa autem motus vehementia augetur ex duabus
causis, scilicet mobilitate causæ facultatem irri-
tantis, & robore expultricis partium. Nam pro-
pter mobilitatem causæ fit, ut idem qui dum quie-
scit, inæqualitatem tantum sentiat, dum movetur
horrorem, dum exercetur rigorem pariat: pro-
pter robur verò facultatis fit ut natura majori im-
petu & celerius moveatur, quo noxia facilius ex-
pellat.

Oritur autem horror & rigor à mordaci cau-
sa delata per partes sensiles. Infra est partibus o-
mnibus vis, quæ id quod noxium est pro naturæ
modo, à se propellunt. Dum igitur per partes sensi-
les noxii aliquid defertur naturali quodam insti-
tu ad excretionem expultrix insurgit, singulæque
particulæ sese colligentes, instrumento caloris na-
tivi à corde, impetu quodam ultrò citroque, id
quod noxium est à se propellunt. Hic motus si cuti
omnibusque musculis accadat concussio dicitur,
sub quo continetur rigor & horror. Nam concus-
sio cutis, potissimum horror vocatur, concussio ro-
tius corporis omniumque musculorum rigor, vehe-
mentior affectio à vehementiori causa, quam hor-
ror. Qui enim rigore corripitur distendi & con-
trahi videntur, non aliter quam si nimio frigore de-
tenti essent, simulque quasi contrahuntur, quia vi-
bratis musculis tendines & nervi & simul articuli
concuriuntur.

De rigore
& horro-
re.

In

CAP.

VIII.

*Modus generationis
rigoris.*

In rigore autem corpori aliquid occurrere debet, cujus vi partes sensiles tanto molestiae sensu afficiuntur, ut calor innatus, cujus fons est cor, ad interiora repellatur & refugiat: repulso autem calore ad suum principium, cum ibidem manere nequeat nisi suffocetur, sese recolligens, & cum vehementia adversus ea, quae transitum ejus impediunt, iterum atque iterum insurgit, & erumpit: quo erumpente membra sensitiva facultate sua expultrice causam illius molestiae excutere conantur, se seque concutunt, sed dolor rursum calorem refugere cogit, atque haec ultro citroque celeriter fiunt donec vincente calore & depulsa causa noxia membra omnia incallescant & febris succedat: quod si vero causa vincant mors subsequitur. Succedit quidem rigori propriè dicto naturâ vincente febris, & non necessariò rigori horrido, qualis affectio his accidit, qui in desidia nimium se repleverunt, & à cibo sapelavarunt, sed ea magis horror, quam rigor dici debet. Oritur autem horror & rigor a causa mordaci mota per partes sensiles: Verùm rigor propriè dictus, motus scilicet totum corpus vibrans, nunquam fit à solo frigido succo, sed à calido acri mordaci tantum. At horror ab iisdem causis fieri potest, à quibus rigor, sed mitioribus, paucioribusque minusque motis, ac præterea à frigidis succis delatis per sensiles partes, ut in febribus pituitosis. Quare febres quartanae ob utraque causas rigorem horridum propriè habent.

*Definitio
rigoris.*

Horroris.

Ex his omnibus colligitur quod rigor sit vibratio omnium muscatorum totius corporis dependens ab expultrice irritatâ à causa acri & mordaci per sensiles partes delata mediante reciproco caloris innati motu à corde. Horror verò motus minor, quam rigor est concussio solius cutis, cum sensu frigiditatis & doloris, à causa mordente per sensiles partes

partes delata, mediante caloris innati motu. Dico
 mediante motu caloris nativi, quod calor natus
 sit præcipuum instrumentum animæ, & peculiari-
 ter facultatis motricis in rigore & horrore, unde ri-
 gor passio caloris nativi dicitur: nam naturalis ca-
 loris intrò forasque delatio spiritum cum sanguine
 una trahit, quod in affectibus animi apparet. Qua-
 re dolor vehemens corporis cor in consensu n tra-
 hens, animumque afficiens intra ad cor & viscera ca-
 lorum cum sanguine & spiritu refugere cogit: un-
 de ægris membra refrigerantur, rigentque, quo
 tempore si virtus ita debilis sit, ut ad ea profligan-
 da, quæ offendunt, insurgere nequeat, aut in pu-
 gna deficiat; primum pulsus, privatio, & syncope,
 demum mors subsequitur. At si pugnare queat,
 donec omnia excusserit, ex valido ejus in ea, quæ
 offenduntur, impetu & collectione caloris in pro-
 fundo corporis post rigorem cum tanta vehemen-
 tia calor ad exteriora revertitur, ut febris accenda-
 tur, quare excitatur motus ei similis, qui in vere-
 cundia. Correspondet autem dolor & delectatio in
 sensu tactus, affectibus animi; & dolor, timori; de-
 lectatio, cupiditati similique modo spiritum cum
 sanguine impellunt. In affectibus autem aver-
 sio & fuga ex opinione mali instantis, aut præsen-
 tis, calorem cum spiritu ad interiora revocat: con-
 tra cupiditas aut desiderium ex opinione boni præ-
 sentis, aut futuri ad interiora movet, sed non eo-
 dem modo. Nam timor, aversio mali instantis, spi-
 ritum cum sanguine confertim, tristitia, ægrotudo
 ex opinione mali præsentis paulatim contrahit, ex-
 ternis partibus refrigeratis: contra ira. Cupiditas

*Motus de
parvati
cordis.*

Cupiditas

Gaudium

Agonia

In

CAP.
VII.
*Verecun-
dia.*

*De singul-
tu.*

*De sternu-
tatione.*

In verecundia verò, quæ metus aut conscientia tur-
pitudinis est, calor ad interiora primum refugit: de-
inde rursus distantia anima nihil esse metuendum,
confestim redit. His motibus pulsus quoque cor-
respondent: nam in ira pulsus magnus & vehemens
est, in timiditate parvi & debiles; in agonia inæ-
quales.

Ex his omnibus apparet, quomodo facultas
expultrix irritata è corporis habitu noxia sensui mo-
lesta expellit. In horum quoque symptomatum nu-
mero singultus est, de cuius causis in ventriculi affe-
ctibus dicitur Symptomata verò, quibus ea expel-
luntur, quæ in capacitare vasorum & cavitatum
præter naturam continentur, sunt primum sternu-
tatio & tussis, deinde vomitus, ructus, alvi fla-
xus, &c. quæ omnia excepta tussi & sternutatione,
symptomata sunt magis facultatis naturalis quàm
animalis. Correspondet autem tussis & sternu-
tatio, ut dictum est, sed sternutatio motus violenti-
or est, quàm tussis. Deinde tussis ea propriè ex-
purgat, quæ in viis respirationis præter naturam
continentur, verùm sternutatio per se primum, quæ
in naribus continentur & anterioribus cerebri par-
tibus nisi adsit catarrhus: aliquando quæ asperæ ar-
teriæ contumaciter adhærent, ex accidente gulam
& ventriculum purgat ac singultui medetur. Qua-
re si non adsit repletio capitis; sternutatio non pa-
rùm cerebro prodest, interdum utero, pectori,
ventriculo. Est autem sternutatio vehementissima
efflatio cum sono, per nares erumpens, orta a de-
pravato motu expultricis facultatis cerebri, irrita-
ta à re molestante nares, adjuta motu muscutorum
capitis & thoracis, ut ea expellantur, quæ naribus
aut anterioribus cerebri partibus infesta sunt. Con-
currunt enim ordine in sternutatione causa vel
externa vel interna, mordax, irritans primum nares,
& ex

DE RIGORE ET HORRORE. 337

CAP.
VIII.

& ex consensu anteriores cerebri partes: deinde concussio cerebri à vi expultrice unà cum vehemētissima efflatione per nares, concurrente motu musculorum capitis & thoracis: Nā aer in sternutatione per narium foramina erumpens, nares anterioresque cerebri partes expurgat, cerebro seipsam contrahente, ut id quod molestum est, excutiat, non aliter ferè, quàm in Epilepsia, unde Avicenna sternutationem parvam Epilepsiam vocat: ergò proxima causa sternutationis est depravatus motus cerebri: Deinde narium excitatus à re aliqua stimulante nares primum, deinde cerebrum. Talis vel extrinsecus accedit, ut usus pharmacorum, rerumque acrium, vel intrinsecus per calefactionem attenuatis humoribus in cerebro ut ad nares descendant easque irritent, aut repleto cerebro humoribus mordacibus & vaporosis. De tussi dicetur in sequenti capite. Cetera symptomata, quæ ex capacitate vasorum compressione aut fibrarum contractione noxia expellunt, ut ructus, vomitus, crepitus ventris, fluxus alvi, excretiones uteri, vesicæ, motus uteri in partu, &c. propriè sunt motus expultricis naturalis adjuncta motu musculorum. Proinde de eorum causis infra dicemus.

CAPUT IX.

*De Causis Symptomatum Loquela, Vocis,
& Respirationis.*

ANtequam symptomata cordis accedamus lætæ respirationis causas prius considerabimus: cum respiratio functio maxima ex parte animalis sit à natura instituta ut cordi præstantissimo viscere inserviret, & aeris frigidioris inspiratione, ac
Y fulgi-

fuliginum expiratione calorem cordis in sua tem-
perie conservaret. Eadem instrumenta ferè omnia ex
aere, quem reddimus dum expiramus, ad vocem &
loquelam quoque formandam serviunt. Demonstra-
tum est in Physiologicis quinque actiones esse, quæ
inter se consequentia quadam conveniunt, nimirum
expirationem, exsufflationem sine strepitu, strepen-
tem, exsufflationem, vocem, & loquelam; quarum
prima si lædatur, cæteras omnes lædi necesse est;
ultima læsa, cæteræ ejus causæ haudquaquam læ-
duntur. Verùm cum loquela & vox sint functiones
exquisite animales; respiratio verò partim anima-
lis, partim naturalis, ordo postulat, ut primum de
causis vitiatæ loquelæ & vocis, deinde respirationis
agamus. Formatur vox ex percussione aeris, quæ
cum exsufflatione expiramus ad laryngem: vocem
verò, cum aere dum sursum fertur, lingua ad pala-
tum & dentes allidens, adjuta motu labiorum arti-
culatim distinguit, & loquelam perficit.

*De vitiis
loquela.*

Læditur loquela, quando vox aufertur, aut
potius quando sine omni dearticulatione profer-
tur, ut in mutis; Nam rarissimè muti voce destitu-
untur: aut ubi debilitè dearticulatur, ut in illis,
qui submisse & tardè loquuntur, aut mutilas & man-
cas voces edunt, aut initio tardè in sermonem pro-
rumpunt, & non nisi linguam & labia multoties mo-
veant, deinde citra obstaculum satis festinanter lo-
quuntur; aut literas R, L, K difficulter pronunciant:
Vel depravato modo dearticulatur, ubi unam lite-
ram pro alia proferunt, aut primam syllabam bal-
butiendo repetunt, quos Galenus *πρωλῆς* Latini
balbos vocant. Causa læsionis est vitium vel vocis,
vel facultatis linguam moventis, vel ipsius linguæ,
vel alicujus partium ministrantium, ut palati, den-
tium, narium, labiorum.

Pro-

DE VITIIS LOQUELÆ.

339

CAP.

IX.

*Causa ob-
mutescen-
tia.*

Propriè autem obmutescencia oritur ex a^{po}-
xia, aut ex his causis, à quibus vox aufertur, Dein-
dè quia usus loquelæ perit & ignoratur, ut in sur-
dis à nativitate. Tertio lassa facultate animali, vel
quia viæ spirituum intercipiuntur, ut in apoplexia
aut dissolvuntur, ut in lyncope, & in his, qui vicini
sunt morti; vel non transmittuntur per nervos se-
ptimi paris, qui per musculos linguæ disseminan-
tur, undè ipsi muscoli paralyin patiuntur: fit quo-
que obmutescencia ex convulsione linguæ propter
contractionem nervorum septimi paris. Quando pro-
prio linguæ affectu nimirum ipsius linguæ defectu,
aut amputatione; vel magnitudine supra modum
aucta, sive ea sit ab ortu, sive post, ex affluxu hu-
moris: deinde quia à vinculo ita contrahitur & liga-
tur, ut moveri nequeat, aut fauces vicinae que partes
vehementer intumescunt, &c.

*Causa lo-
quæ lae-
debilis & de-
pravata.*

Ab iisdem causis sed levioribus oritur debi-
lis loquela. Nam voces debiliter aut depravato mo-
do dearticulantur, quia ipsa vox debilis & depravata
est. Deinde quia spiritus animalis non iusta quan-
titate per nervos influit, unde motus linguæ torpi-
dus aut tremulus redditur; aut spiritus multi absum-
pti sunt, viresque debiles ex gravi morbo: aut alio
convertuntur ex ira, timore, &c. aut linguæ pars di-
midia ejusque nonnulli muscoli resoluti sunt. Ter-
tio quia lingua proprio affectu laborat, nimirum
nimia humiditate sive ab ortu, ut in pueris nonnul-
lis qui balbutiunt; sive ascititia ex ebrietate, aut ca-
tarrho, deinde è nimia linguæ siccitate aut scabri-
tie, item crassitie & brevitate propter malam mu-
sculorum compositionem. Præterea quia lingua à
vicinis partibus ita contracta est, ut libère moveri
nequeat, quod evenit vel ab ortu propter ligamen-
torum sub lingua breviterem & duritiem, vel post
à dura cicatrice relicta ex ulcere sub lingua: qui

Y 2

tali

tali affectu laborant ἀγυλογλάσοι propriè vocantur. Tandem vitatur loquela, quando lingua partium ministrantium commodo subsidio destituitur, veluti quando palatum erosum & perforatum est, quod ex morbo gallico nonnullis accidit, qui obfcurè & quasi per nares quodammodò loquuntur, deinde quia nares coryza, polypo, aut crustis obturatae sunt: aut dentes anteriores deciderunt: aut labia ab ortu, aut post ex vulnere, vel ulcere deformata sunt, unde fit, ut literæ, quæ horum ministerio efformantur, deterius pronuncient. His additur tumor mollis, lusus, βάρραχ dictus sub lingua, è quo aperto exit mucus ovi albo persimilis.

Formatur vox ex percussione aeris quem cum efflatū exspiramus motu musculorum laringis. Læditur itaque vox, quando non satis spiritus cum efflatu ad laringem alliditur, perforato thorace, aut resolutis musculis thoracem moventibus, &c. Secundò læsa facultate movente musculos laringis, vitio cerebri, aut nervorum vocalium, præcipuè recurrentium, ut in loquela dictum est, unde musculi laringis paralyfin, tremorem, aut stuporem patiuntur, & præterea ubi contrahuntur nervi, musculi unà convelluntur. Ex convulsione aut paralyfi omnium musculorum laringis vox tollitur; à cæteris, debili, aut depravato modo perficitur. Tertiò, affecta laringe, morbi laringis præcipui sunt, intemperies & angustia. Intemperies illa est membranae succingentis guttur & fauces, eam aut nimium humectans, aut exiccans & exasperans. Humectantur autem & permadescunt guttur aut fauces à gravi catarrho, maximè ex humore pituitoso, unde primùm rauco oritur; deinde si affectus augeatur, vox obscura redditur aut tollitur. Exiccatio

verò & exasperatio gutturis ex febris ardente, pulvere, fumo, acerbis vaporibus, defluxu humoris biliosi, vocem asperam, acutam aut clangoriam reddit. Deinde angustia gutturis interdum est constipatio à tumore, intra tunicam laringis asperam quæ arteriæ, nonnunquam obstructio ex columella elongata, plerumque compressio à tumore aut inflammatione, vel ipsius laringis, vel vicinarum partium ministrantium, ut faucium; vel ob luxationem vertebrarum versus interiora, atque hæ affectiones sub angina continentur.

Indiget vox commoda columellæ & faucium ministerio ac etiam duarum glandularum, quæ tonsillæ & amigdalæ vocantur. Tonsillæ autem interdum frigida destillatione à capite tument sine ardore & tantum obstant, nec cibi potusque facile videntur: Aliquando inflammatione tentantur sive tumore cum ardore, dolore, siti, qui auctus respirationis & deglutitionis difficultatem inducere solet. Inflammatio autem ipsarum glandularum Amygdalæ; partium vero inter glandulas, aut quæ glandulis contiguæ sunt *peritonsillarum* vocatur. Concocta inflammatione, disruptaque cute, ulcus oritur gravem halitum exspirans. Exulcerantur etiam tonsillæ & fauces ex acro catarrho ut plurimum in lue venerea.

Morbi tonsillarum.

Columella è palati extremo propendet, primum ut plectrum vocem modulans & sonoram reddens. Deinde ut frigidiorē aerem per inspirationem attractum temperet, &c. Læduntur hæ actiones primum ubi columella à multo humore defluente relaxatur, & ita elongatur, ut deglutitionem aut respirationem aliquo modo impediat. Deinde quando inflammatur sive intumescit cum ardore, dolore, rubore, deglutiendi difficultate, &c.

Columellæ affectus.

IX.

Per inflammationem si pars ima crassa, rotunda; superior verò gracilis & nigra appareat à similitudine *σφαλή* sive uvula appellatur. Præterea cum exulceratur aut eroditur, aut omnino desideratur sive excisa sit sive, putrefacta a morbo gallico aliove affectu.

*De Angina.**Angina nostra.*

Tertiò omnis affectus strangulandi vim habens nullo existente in pectore aut pulmonibus vitio *κυνάγχη* ab Hipp. communiter dicitur, Latinis angina, talis affectus est angustia gutturis, faucium orta interdum à causa externa, ut fume aut laqueo, &c. Plerumque interna, ut à multa pituita madefaciente tunicam gutturis, aut ex defluxione humoris pituitosi ad musculos cervicis tumorem sine rubore, dolore & febre excitante, sed hi affectus acuti non sunt nec veræ anginae. Præterea ex luxatione vertebrarum cervicis versus interiora ex ictu, casu, humoris defluxu ligamenta relaxante oritur angustia, quæ inter Anginosorum affectus à Gal & Hipp. numeratur.

*Definitio**vera Angina.*

Verum angina exquisita propriissime dicta, est difficultas respirationis & deglutitionis cum febre continua, orta ex inflammatione musculorum gutturis aut faucium. Pars primariò affecta est guttur aut fauces, secundum musculos interiores vel exteriores. Quare ratione partis affectæ, medici tempore Galeni quatuor anginae species numerarunt, quarum prima est *κυνάγχη* in specie dicta, orta ex inflammatione interiorum musculorum gutturis; in hac nulla inflammationis indicia in faucibus & cervice apparent, & tamen in gutture plurimus dolor sentitur, tantaque respirationis & angustia; ut strangulari videantur, ac interdum citò extinguantur. Altera est *συνάγχη* quando inflammatio interioris faucium musculos apprehendit, & deglutitionem potius

*κυνάγχη**συνάγχη*

potissimum impedit: In hac aperto ore & depressa lingua, rubor & tumor introsipientibus tantum apparet, & non in externis partibus. Tertia *ῥαγγη* *ῥαγγη* ubi externi musculi & partes circa guttur inflammatione laborant. Quarta *ῥαγγη* *ῥαγγη* cum inflammatione externos faucium musculos partesque afficit. In his duabus tumor ardorq; in externis partibus conspicitur, ac minori angustia respirationis aut deglutinis tentantur.

Causa anginae primaria est morbus in via nimirum angustia faucium vel gutturis, deinde magnitudo aucta sive inflammatio vias comprimens. Sub inflammatione comprehendimus omnem tumorem calidum dolorificum genitum ex affluxu humoris. Humor autem ille praecipue calidus est sanguineus, aut biliosus, raro sincerus plerumq; ex pluribus permixtus, nunquam sola pituita nec melancholia, cum vera angina morbus acutus sit, cum febre, tumore calido & dolorifico, quare tumor gutturis & faucium a frigido humore inter nothas anginae species recensetur. Morbus igitur causa exquisitae anginae erit ex genere phlegmonis aut erysipelatis geniti ex sanguinea aut biliosa defluxione a vicinis jugularium ramis, propter plenitudinem vere potissimum, post crapulam, exercitia & balnea intempestiva, &c.

Consequens est ut de causis laesae respirationis nunc agamus. Naturalis respiratio mediocritatem obtinet, & in medico omnis excessus & defectus est, non naturalis a mediocritate ad alterum extremorum recedit. Dividitur respiratio ut pulsus pluribus modis: i. ex quantitate motus expirationis & inspirationis, in magnam, parvam & mediam: Deinde ex spatio temporis quo absolvitur, in velocem, tardam, mediam: Tertiò ex intervallo

*De vitiis
respirationis.*

*Differentia
laesae respirationis.*

utriusque quietis, in ratam, frequentem sive densam & mediam, &c. ut in pulsu. Magna autem respiratio à Gal. dupliciter dicitur propter dilatationis thoracis magnitudinem, vel ob aeris inspirati magnam copiam: additur his respiratio sublimis dicta, quia à sublimioribus thoracis partibus inspiratur, ad quam perficiendam concurrunt non solum diaphragma & intercostales muscoli, sed etiam superiores, qui scapulas movent. Respiratio autem naturalis media ordinata & æqualis est: At respiratio magna, velox, frequens, cum strepitu, inæqualis, inordinata, sublimis sub depravata respiratione sive dyspnœa comprehenduntur, cuius tres species sunt, ut capite de different: symptomatum dictum, dyspnœa in specie, Asthma, & orthopnœa. Sub debili aut diminuta respiratione continentur parva, tarda, rara. Debilitas autem si ita augeatur ut respiratio ad sensum pereat, *ἀπνοια* vocatur. Ad depravatam quoque respirationem reducitur tussis cum nil aliud sit, quam vehementissima efflatio cum strepitu gratia respirationis à natura instituta, ut infra apparebit.

*De causis
læsæ respira-
tionis.*

In respiratione naturali tria concurrunt; primo usus, ut calor cordis actionibus proportionatus per calidarum fuliginum expirationem, & aeris frigidi inspirationem in sua temperie conserveatur. Deinde facultas thoracem per musculos movens sufficiens, satisque robusta: tertio pulmonis cæterorumque instrumentorum spiritalium, quæ facultati obsequuntur, habilitas: quorum unum si desideratur, respiratio à naturæ modo recedit. Quare læsæ respirationis tres causæ erant, usus naturalis mutatio; facultas læsa; & instrumentorum inhabilitas. Ac primum mutatur usus, calor cordis à sua temperie recedit, & vel nimium augetur, vel debili-

*Tres respirationis læsæ causæ.
I. Usus mutatur.*

biliteratur & diminuitur: auctus calor magnam frigidosorum vaporum expirationem, & aeris frigidi inspirationem requirit: contra debili calori exigua refrigeratio sufficit; proinde cum usu ipsa respiratio augetur & minuitur.

Deinde facultas movens læditur, si spiritus animalis à cerebro per nervos in diaphragma musculosque intercostales non influat; aut non iusta quantitate; vitio vel cerebri, vel spinalis medullæ, vel nervorum, præcipuè quarti paris cervicis, qui diaphragmati implantantur, ut in præcedente capite dictum est, unde motus musculorum resolvitur, aut debilis, torpidus vel tremulus redditur: Aliquando causa debilitatis motus, est in ipsis musculis & præcipuè in septo transverso ex intemperie, solutione continui, aut tumore interdum scirrroso relicto post inflammationem.

Tertiò læditur respiratio, quia instrumenta spiritalia facultati non obsequuntur aut sufficienter contrahi aut dilatari nequeunt ex affectu proprio, aut per consensum. Affectus proprius est angustia pulmonis asperæque arteriæ potissimum; additur gutturis & faucium, ut in voce deperdita dictum est, Angustia autem pulmonis, vel est obstructio, orta interdum à crasso vapore, plerumque ab humore vel copioso confertim defluente à capite, undè catarrhus suffocativus, vel à crasso viscido humore infracto branchiis pulmonis: qui tussim vehementissimam excitat, quâ vix quicquam extruditur, tantamque angustiam, ut ægidum magna velocitate & frequentia respirare coguntur, stertorem & sibilum emittant & anhelando respirent, quæ dyspnœæ species asthma ob id dicitur, & si augeatur, ut non nisi erecta cervice respirare queant *ἀσθμα* dicitur. Pituita viscida longo tempore in pulmonibus re-

Y 5 ten-

Compressio.

tenta vi caloris in materiam gypseam, tandemque in grandinem & calculum concrevit. Deinde angustia fit per compressionem vasorum, pulmonis, vel ex inflammatione, quæ peripneumonia dicitur, vel ex tuberculo crudo, unde Asthma, vel cocto & in abscessum desinente ex quo rupta vomica; empyema oritur, aliquando phthisis. Comprimitur etiam pulmo ut sufficienter dilatari nequeat ob angustiam capacitatis ipsius thoracis ex luxatione vertebrarum versus interiora, aut fractura costarum, vel inflammatione membranae succingentis costas, quæ pleuritis dicitur, vel à copia humoris aut puris collecti in capacitatem thoracis. Tertiò angustia vasorum potest esse constipatio à tumore intra tunicas asperæ arteriæ, aliquando subsidencia, quando substantia pulmonis ulcere ita consumpta est, aut exiccata, ut dilatari nequeat quod phthisicis ante mortem accidere consuevit.

*Constipatio.**Subsidencia.**Morbilantes respi-**ratione per*
consensum.

Per consensum impeditur dilatatio constri-
ctioque pectoris à dolore aut opressione diaphrag-
matis & thoracis. Nam dolor ipsius thoracis ut in
pleuritide, aut vicinarum partium, quæ in respira-
tione agitantur & commoventur, respirationem
mutare cogunt à magna, in parvam densamque.
Depressio verò diaphragmatis tumore jecoris,
ventriculi, lienis, aut materia copiosa collecta in
abdomine, liberam thoracis dilatationem impedit,
undè quia hoc modo affecti sunt, respirationem
parvam, velocem & frequentem plerumque habent,
& per intervalla interdum magnam. Complican-
tur sæpè hæc tria causarum genera, & aucta neces-
sitas cum angustia instrumentorum, ut in peri-
pneumonia, aut cum debilitate facultatis, ut in
phthisi.

Ex his causis intelligitur forma modusque
læsa respirationis. Nam ubi in corde calor accen-
ditur

ditur citra debilitatem facultatis, aut instrumento-
rum angustiam agri magna respiratione utroque
modo agunt, nimirum pectus plurimum dilatant
& multum aëris frigidi attrahunt. Deinde si calor
flammeus reddatur, ut in febribus ardentibus ma-
gnitudini accedit primum velocitas, deinde fre-
quentia, ac proinde cum magna velocitate & fre-
quentia multum calidi spiritus exsufflando emit-
tunt. Verum si non sufficiens sit facultas, nec mem-
brorum habilitas pro magna succedit primum re-
spiratio velox, deinde frequens. Præterea qui-
bus adest angustia spiritualium sine calore aucto, di-
latatio thoracis maxima est, verum aër, qui inspira-
tur, dilatationi non correspondet, & minus quam se-
cundum naturam attrahitur, unde qui hoc modo
affecti sunt cum magna velocitate & frequentia
respirare coguntur, aliquando cum stertore, si adsit
angustia magna. Unde asthma, & si augeatur or-
thopnoea oritur, communiter asthma sicut & ortho-
pnoea pro omni magna respirationis difficultate su-
mitur, non solum sine febre, sed etiam cum febre,
ut in peripneumonia. Propriè Asthma est respira-
tio valde frequens cum anhelatione tussiq; vehemen-
tissima sine febre, orta ab humore crasso viscidoq; re
bronchiis pulmonis infarcto, aut à tuberculo in sub-
stantia pulmonis. Orthopnoea verò est tanta respirati-
onis difficultas, ut nisi erecta cervice respirent suffo-
cari videantur, orta à pulmonis angustia ex eadem
causa, ut in asthmate vehementer aucta. Signa obstru-
ctionis sunt catarrhus præcedens, difficultas respira-
tionis subito oborta cum stertore, pulsus inæqualis,
tussis gravissima, quia nonnihil humoris peccantis
interdum educitur, accessiones graves tempore, lo-
coq; humido &c. quod si malum sit à tuberculo nullo
ante cedente catarrho respirationis difficultas sensim
angetur sine stertore cum tussi vehemente, sed planè
secca.

*Causa laesa
respiratio-
nis in specie.
Causa ma-
gna respira-
tionis.*

*Veloci &
frequens.*

*Definitio a-
sthmatis.*

*Ortho-
pnoea.*

Tan-

X.

Causa sublimis resp.

Tandem ubi vires valde debilitantur, respiratio sublimis evadit, nam præcipuum signum debilitas virtutis, est respiratio sublimis, ubi ex naribus fit exsufflatio, ac dum ægri inspirant, pinnas narium & scapulas contrahunt, dum expirant, contractio coacervata fit thoracis. Nam ubi vires debilitantur ad respirationem concurrunt præter diaphragma primum musculi intercostales, deinde scapulas moventes, quos tamen validè magnaque celeritate movere nequit, sed sensim tantum.

Causa debili respi.

In debili & abolita respiratione contraria ratio est, quàm in depravata. Nam parva respiratio fit à necessitate diminuta, sive à debili calore cordis ex intemperie frigida, aut à facultate imbecilla; additur instrumentorum inhabilitas, quæ facultati non obsequuntur. Verùm si necessitas & facultas adhuc minuatur, accedit primùm tarditas, deinde raritas, & tandem abolita ad sensum respiratio, quæ ἀπνοια dicitur. Nam oritur ἀπνοια primum quando usus penè tollitur, sive nativus calor cordis ita refrigeratur, ut ab omnimoda extinctione non distinguantur, quod accidit mulieribus, quæ gravissima uteri suffocatione tentantur, & ex gravi syncope; interdum ex esu fungorum, cerussæ, ex lacte coagulato, &c. Deinde ubi facultas tollitur, ut in gravissima apoplexia; addunt nonnulli angustiam perfectam instrumentorum spiritalium, interceptantem omnem aeris attractionem, & emissionem; verum ex tali affectu ægri subitò suffocantur potius quam ἀπνοια corripiuntur. Qui ita afficiuntur; à mortuis tantum distinguuntur, quod in eorum visceribus exiguus calor adhuc conservetur. Nam ut respiratio ita pulsus eorum adèò obscurus est, ut sensum fugiat.

Tussis.

Symptomatibus respirationis annumeratur
tussis

tussis, non quæ simpliciter voluntaria est, sed coacta à morbifica causa. Nam ea propriè est depravatus motus partim naturalis; partim animalis instrumentorum respirationis, à natura concitatus pro respirationis conservatione, ut ea propellantur, quæ organa respirationis infestant. Quare definitur *Definitio tussis.* tussis vehementissima efflatio cum strepitu per guttur erumpens orta ab expultrice organorum respirationis irritata ex spiritu copioso prius attracto per velocem musculorum pectoris constrictionem celerimè effuso, ut cum spiritu ea excludantur, quæ irritant & infestant. Causa proxima tussis est expultrix instrumentorum spiritalium ad expellendū irritata, adjuncta veloci motu musculorum pectoris constringentium; Irritat causa morbifica quatenus sensum molestiæ inducit, nimirum exasperat, mordet, vias intercipit & angustiores reddit, Partes autē thoracis respirationi servientes plures sunt, quarum una non semper primario affecta est, attamen tussis quia à pulmone immediate perficitur, & noxia non solum per asperam arteriam extrudit, sed etiam ut extrudere queat, à capacitate thoracis sæpè attrahit sive transumit, ideo consentaneum est in tussi pulmonem aut per se affici, aut in consensum trahi. Ubi eunq; vero fuerit causa pectoris, pulmoque à sensu rei molementis irritatus, ad expellendum insurgit, sed cum per se impotens sit, auxilium à sepro transverso & musculis thoracem constringentibus mutuatur, qui veloci pectoris constrictione dum spiritum multum ex inspiratione retentum celerimè foras effundunt, vehementissimum efflationem cum sonitu efficiunt, & simul cum spiritu, quæ infesta sunt, propellere tentant: quod si per primam concussionem & efflationem perficere nequeant, aliquoties eundem motum repetunt, donec id quod noxium est, prorsus expellatur, nisi aliter nobis visum fuerit.

Causa

CAP.

IX.

*Causa tussim exci-
tantes.*

Causa facultatem stimulans, tussimque exci-
tans aliquando externa est, ut fumi & vapores acres,
pulvis, acida, acerba, & acris alimenta aut medica-
menta, ac quæ inter edendum & bibendum in gut-
tur dilabuntur, &c. plerumque interna, ut morbi in-
strumenta respirationis laedentes per se, aut per con-
sensum. Per se autem intemperies interdum sola &
inæqualis, præcipue frigida ex aere frigidissimo, vel
calida, sicca, guttur & tracheam arteriam exaspe-
rans unde tussis arida concitatur. Plerumque intem-
peries est cum materia, quæ vel humor est, vel pus,
vel vapor. Humores autem vel à partibus thoracis
affectis confluunt, vel ex catarrho à capite deflu-
unt, vel ab alia parte, aut toto ad pectus transmi-
tuntur, cum totum corpus confluxile & conspirabile
sit. Ex inflammatione pulmonis, pleuræ, aut dia-
phragmatis, exsudat primum tenuis ichor, humor,
aut sanguis in capacitatem thoracis, deinde pus,
præcipue rupta vomica.

*Differentia
tussis pro
ratione
humoris.*

Humor autem unde quaque ad pulmones con-
fluat, triplex est, tenuis fluidusque, aut crassus visco-
sus, aut mediæ consistentiæ; humor mediæ consi-
stentiæ à spiritu facile sursum evehitur, tussimque
humidam faciemque præstat: tenuis vero aquosus
humor cum impulsu aeris subterfugiat, & prius
delabatur, quam ab aere sursum compelli queat,
tussim siccam & difficilem reddit, magis difficilem
& molestam tussim facit, humor crassus viscidus
sed diverso modo, quia bronchiis pulmonis ita te-
naciter adhæret, ut maximo conatu vix avelli queat.
Hic humor si copiosus valideque impetus fuerit,
non solum vehementissimam tussim concitat, quæ
tamen parum aut nihil extruditur, sed etiam ma-
gnam respirationis difficultatem cum anhelatione
& stertore, unde Asthma; ex hac materia concre-
scente oritur, ut diximus, substantia, grandinis aut
cal-

calculi speciem referens, quæ post vehementissimam
tussim interdum expellitur. Materia tussim excitat
non solum quando vias respirationis intercipit, sed
etiam quia exasperat, erodit & exulcerat, aut venas
arteriasque pulmonis aperit, undè sanguis exit, qui
tussi rejicitur. Deinde quâdo ex capacitate thoracis à
pulmone, dum dilatatur, spongiæ ritu attrahitur &
transmittitur, ac vicissim dum contrahitur, in aspe-
ram arteriam cogitur. Materia autem in capacitate
thoracis collecta est humor aliquis, aut sanguis pu-
trulentus, aut pus ex vomica disrupta, aut ulcere tho-
racis aut pulmonis, &c. Præterea fit tussis vehemens,
cum ex humore substantiæ pulmonis impacto in-
flammatio oritur, ut peripneumonia aut tubercu-
lum crudum, quod concoctione in abscessum trans-
mutatur, ex quo rupto in capacitate thoracis, colli-
gitur pus, undè Empyema, deinde phthisis. Insuper
concoquitur tussicula arida ex pravis acribusque va-
poribus guttur tracheamque arteriam infestantibus
& exasperantibus vel à toto corpore, ut in febribus
ardentibus & malignis, vel à ventriculo ob corrup-
tionem humorum aut vermium, vel ab obstructio-
ne jecoris, lienis, &c. ut in hypochondriacis, &c.
Tandem per nudam consensum oritur interdum
tussis sicca ex depressione aut pondere gravante dia-
phragma, ex tumore jecoris, lienis, abdominis, &c.
aliquando propter condolentiam ex affectu do-
lorifico partium nervosarum, nimirum aurium,
quando vehementer scalpro aliavè re irritantur, i-
nterem ventriculi, à vermibus mordentibus, vesicæ, ex
inflammatione, &c.

Quo causæ hæc tussis, sicut & læsæ respirationis,
plenius intelligantur, de morbis præcipuis pectoris &
pulmonum in specie dicemus initio facto à pleuriti-
de quæ à parte affecta, costæ & costas succingente mē-
brana

XI
De pleu-
ritide.

Notha
pleuriti-
dis spe-
cies.

Definitio
vera pleu-
ritidis.

brana (utraque enim *πλοῦρα* vocatur) nomen sortitur, à Latinis verò morbus aut dolor lateralis nuncupatur. Nam communiter pleuritis accipitur pro omni dolore cujuscunque partis thoracis sub cute à materia distendente. Partes autem thoracis subcutaneæ sensu præditæ, quæ dolore affici possunt, sunt primariò membrana succingens costas pectusque, cui additur à nonnullis pericostium, deinde musculi intercostales, & qui extrinsecus costis incumbunt. Vera autem sive exquisita pleuritis est dolor pectoris ex inflammatione membranae succingentis costas: Notha verò pleuritis pluribus modis evenit, primò ex catarrha à capite defluente ad musculos exteriores vel interiores pectoris, deindè ab inflammatione ex humore calido influente à vicinis venis ob repletionem, ictum, casum, &c. Tertiò ex vapore flatulento membranas musculosque pectoris distendente. Ex his omnibus oritur dolor distendens cum difficultate respirationis, sed si causa sit flatu, dolor vagus erit, qui calidis fomentis faciliè discutitur: si inflammatio, dolor pulsatilis, febris acuta, pulsus frequens, non durus, nec dolor punctorius, nisi juncta inflammatione musculorum intercostalium membrana succingens distendatur, & in consensum contrahatur. Præterea oritur, teste Aëcio dolor pleurítico similis sine febre cum summa respirationis difficultate, & pulsu debili tardoque, ex crasso viscido humore collecto in capacitae thoracis & pulmonis membranis inhaerente, aut copia sua distendente, atque hæ omnes affectiones sub notha pleuritide comprehenduntur.

Exquisita vero pleuritis propriè definitur dolor lateris punctorius & distendens cum febre acuta, dispnoea, pulsu duro inæquali frequenti, & tussi vehementi, orta ex inflammatione membranae succingentis costas pectusque dividens. Pars affecta est

DE VITIIS ORGAN. RESPIR. 353

CAP.
IX.

est membrana, quæ costis adhærescit, & ubi duplicatur & mediastinum vocatur, pectoris capacitatem bifariam dividit. Verùm tota nunquam afficitur, sed plerumque pars aliqua membranæ, quæ costas succingit, rarius mediastini, nimirum utriusque, pars dextra vel sinistra; anterior vel posterior; superior ad jugulum, vel inferior ad hypochondria pertingens. Ex quarum partium affectarum differentia dividitur etiam pleuritis: ubi autem membranæ exterioris pars dextra aut sinistra afficitur in latere sano facilius decubitus est; comprimitur enim si super affecta parte cubent: contra ubi pars dextra mediastini laborat super oppositum latus decumbentes magis dolebunt suspensa parte affecta.

Causa propria doloris cum febre acuta necessario est inflammatio, aut tumor calidus membranæ istius, ortus ex affluxu humoris potissimum à ramis venæ *αζυγῆς*, qui præcipuè biliosus est, aut sanguis sincerus, vel bilioso humori permixtus, rarius sanguis pituitosus, rarissime melancholicus: nisi atra bilis tenuior & maligna ex adustione, ut in peste: Nam membrana humorem crassum difficilime admittit. Unde morbus causa doloris pleuritici erit erysipelas, phlegmone exquisita, vel erysipelatores; deinde phlegmone cedematodes, raro carbunculus nisi in febre pestilentiali. Humor peccans, tumorque non solum ex modo febris dolorisque, sed etiam ex sputo æstimatur, quod colorem & substantiam humoris peccantis semper præ se fert; rubrum enim sputum, sanguinem; flavum, bilem; spumosum, pituitam: lividum aut nigrum omnium pessimum, atram bilem imprimis arguit. Nam in pleuritide, ut in ophthalmia ob naturam membranarum, ut plurimum statim ab initio aliquid effluit de natura inflammationis, & eo plus quod magis concoquitur quod rursus postea evacuatur. Quod si nil effluat.

Z

effluat.

CAP.
IX.

Signa.

Peripneu-
monia.

effluat, materia aut non concoquitur, & pleuritis cruda vocatur; aut tota in membrana detenta suppuratur, & proinde nihil effatu dignum cum tussi evacuatur. Nam terminatur inflammatio rarissime per solam resolutionem, plerumque per suppurationem, idque dupliciter, nonnunquam enim ut suppuratur pars materiae, ita per sputa evacuatur, simulque desinunt sputa purulenta & inflammatio: aliquando tota materia in abcessum desinit, ex quo rupta vomica pus in cavitatem thoracis colligitur, unde Empyema, quod nisi intra dies 40. expurgetur eroso pulmone phthisis excitatur, aliquando tamen pus per urinas aut ventrem excernitur, statimque ab omni molestia liberantur. Tertio permutatur inflammatio rarissime in scirrhum; saepius materia per haemorrhagiam sudores aliumve modum criticè evacuatur, aut ad alias partes, & in alium affectum permutatur, ut in peripneumonia. Postremo terminatur ad mortem ob malignitatem materiae & suffocationem caloris nativi. Signum pathognomonicum pleuritidis colligitur ex concursu quinque symptomatum, quae in definitione exquisitae pleuritidis ponuntur, quibus additur à nonnullis capitis dolor: Ex his conjunctis pleuritis ab aliis cognatis affectibus, ut inflammatione jecoris, peripneumonia, &c. discernitur.

Secundo *Πνευμονία* à parte affecta nomen habet, & ab eadem causa ferè oritur, unde pleuritis nimirum ab inflammatione calido vè tumore, verum quia pulmo laxam substantiam habet, fluxioni recipiendae idoneam, ideo peripneumonia à sanguine magnis pituitoso, pleuritis à magis biliolo oriri dicitur, verum exquisita peripneumonia à quovis sanguine impacto & putrescente in substantiam pulmonis fieri poterit. Notha verò ex tenui acrique

acrique catarrho à capite per asperam arteriam ad
pulmones, magnum respirationis difficultatem,
cum febre lenta, tussi vehementi, sine sputo cruento
inducens. Exquisita autem peripneumonia est in-
flammatiō pulmonis ex sanguine immodicam spi-
randi difficultatem sensumque gravitatis sine dolo-
re febre continuam, tussimque vehementissimam
excitans, cum sputo spumoso cruento. Causa illius
inflammationis est sanguis cujuscunque generis
substantiæ pulmonis impactus ibique putrescens;
coacervatus in pulmonibus raro per congestionem,
plerumque per viam influxus ex vena arteriali à
dextro sinu cordis; aut à capite aliisque partibus per
venas, interdum quia alteri morbo succedit, ut pleu-
ritidi, aut Anginæ per translationem materiæ ad
pulmones, quare ab eodem humore procreatur, &
inflammatio illa pulmonis aut erit phlegmone ex-
quisita, aut notha, ut erysipelatodes, œdematodes,
scirrholes, interdum œdema, aut erysipelas, phleg-
monides. Symptomata pulmonis inflammationem
consequentia sunt magna respirandi difficultas, &
major quam in pleuritide, adeo ut ne suffocentur,
erecta cervice spirare cogantur; Deinde dolor acu-
tus non sentitur, quia pulmo sensu caret, sed tan-
tum sensus ponderis aut gravitatis sternum & spi-
nam dorsi contrahentis, nisi membranæ, quibus pe-
ctori secundum longitudinem connectitur, inflam-
mata fuerint & tum dolor distendens est: tertio fe-
bris continua ob vicinitatem cordis, ut in pleuriti-
de, quæ ardentior est à bilioso sanguine, debilior à
pituitoso: quartò tussis vehementior, quam in pleu-
ritide ac plerumque cum sputo cruento aut colora-
to aut spumoso pro natura humoris peccati-
tis. His additur pulsus undosus, id est, mollis, ve-
lox, frequens, inæqualis; deinde malarum rubor ob
evaporationem sanguinis. Terminatur peripneu-
monia ut pleuritis.

*Definitio
exquisita
peripneu-
monia.*

Causa:

CAP.

IX.

De spūto
cruento.Locū af-
fectus.Causa spu-
ti sangui-
nis.

Tertiò cruenta expūitio aut sanguinis rejectio per os symptoma est in genere excretorum præter naturam. Pars affecta unica non est, quæ ex modo rejectionis, sanguinisque natura potissimum deprehenditur. Nam sanguis ab oris partibus simplici expūitione rejicitur; à faucibus, sreatu; ex gula, ventriculo vicinisque partibus, vomitu; ex gutture, frequenti tussicula cum dolore laringis; à pectus & pulmonibus, vehementi tussi, verum ubi pectore afficitur dolor aliquis in parte pectoris percipitur, & sanguis crassus nigricansque est: ubi pulmo multis floridus, calidus, spumofus confertim exit sine ullo dolore. Causa spūti sanguinis cum tussi rarò est *διὰ πύθης* transcolatio sanguinis per tunicas vasorum: plerumque *ἀνασφύγις* orificiorum vasorum apertio, aut *διαίρεσις* solutio unitatis vasorum. Apertio orificiorum vasorum fit irritata expultrice à copia, acrimonia vel commotione humorum; aut debilitata retentrice ob relaxationem vasorum ab humectantibus, &c. Solvitur vero continuitas potissimum per ruptionem aut erosionem. Disrumpuntur vasa nimia humoris copiâ distenta, facillimè ab ingenti tussi, magno clamore, cum ira, ictu, percussione, magnaque frigiditate. Erodunt & exulcerant humores tenues, acres aut falsi à capite ad pulmones defluentes, unde sicca tussis. Descriptio aut exulceratio pulmonis nisi cito consolidetur, & inflammatio oboriat, ulcus ferè insanabile relinquitur. Nam ob assiduū pulmonis motum, & laxitatem ulcera ejus rarissimè aut nunquam consolidantur. Quare ex ulcere sordido Empyema sive tussis purulenta, deinde phthisis oritur.

Empyema

Sumitur autem Empyema communiter pro omni tumore ad abscessum vel suppurationem tendente. Deinde pro putrefactione humoris collecti
in

in capacitate thoracis ex catarrho à capite, vel afflu-
xu ab aliis partibus; verum ista affectio exquisitum
empyema non est, licet eadem ferè symptomata ex-
citet & temporis progressu pulmonem exulceret.

Exquisitum verò Empyema est collectio puris in
capacitate thoracis difficultatem respirationis cum
tussi sputoque purulento inducens orta ex abscessu
vel vomica disrupta & ulcere sordido. Pars ubi col-
ligitur pus est capacitas thoracis, sive inter thora-
cem & pulmones, sed cum thorax per mediastinum
in duas partes dividatur, vel in utraque parte vel in
altera solum puris collectio fieri poterit. Pars affe-
cta.

cta, ubi pus generatur, unica non est Nam primum
fit Empyema ex peripneumonia, inflammatione
in pus conversa abscessuque disrupto. Deinde ex
vomica sive ex guo abscessu rupto, qui dupliciter
generatur. Nam primum in pulmone tuberculum

crudum oritur, unde Asthma, ut diximus, quod ar-
teriis cordis adhærescens pulsum inæqualem & in-
tercissum, palpitationem cordis & similia inducit,
hoc tuberculum ubi cōcoquitur, in vomicam trans-
mutatur. Deinde in phthisicis non rarò ex vena a-
perta, rupta aut erosa portio sanguinis in particulam
pulmonis secedens, in pus convertitur, & in summa
siccescens cystim efformat. Tertio ex pleuritide o-
ritur Empyema ubi abscessus in membrana succin-
gente collectus subito rumpitur, ut dictum est. Præ-
terea ex angina materia purulenta à faucibus ad pe-
ctus & pulmones conversa. Oriuntur quoque sputa
purulenta ex sordido ulcere, primum pulmonis, de-
inde thoracis, vel asperæ arteriæ ex apertione ruptio-
ne aut erosionem vasis, oborta inflammatione pri-
usquam consolidari aut ulcus ad cicatricem perdu-
ci queat, undè fit, quod scribit Hipp. ex sanguis
sputo puris sputum. Esse autem pus effusum in ca-
pacitatem thoracis, ex respirationis difficultate au-

Definitio.

*Pars affe-
cta.*

Causa.

cta, & sono fluctuationis in pectore dum ægri à latere in latus se convertunt, deprehenditur. In quo verò latere ex calore, pondere ejusdem, & difficiliore decubitu in latere sano, quàm affecto, quod pus ex sublimiori loco pendens, pulmone incumbat. Pus verò in capacitare thoracis collectum, nisi intra 40. dies tussi expurgetur, croso sive exulcerato pulmone *phthisis* sive *phth*, Latinis *Tabes* oritur.

De phthisi.
Definitio.

Nomen *phthisis* interdum latè sumitur pro omni consumptione sine aut cum febre, propriè pro consumptione totius corporis cum febre lenta, respirationis difficultate, tussi, sputoq; purulento orta ex ulcere pulmonis potissimum, dico potissimum. Nam consequitur etiam phthisis quædam, sed minus exquisita exulcerationem thoracis aut asperæ arteriæ progressu tantum temporis, si ulcus augeatur & pulmo in consensum trahatur. Pars primariò affecta in phthisi exquisita est pulmo & per consensum pulmonis, cor. Nam nequit totum corpus consumi, tabesque oriri, nisi cor animantis principium afficiatur. Morbus causa consumptionis est ulcus pulmonis; exulcerato autem pulmone cor sensim exiccatur, & primum rorida ejus substantia, deinde fibrosa, tandem membranosa consumitur; ac cum corde totum corpus simili modo necessariò contabescit. Ulcus autem pulmonis oritur affecto pulmone primario, vel secundario, primario ex abscessu aut vomica pulmonis rupta; aut post sanguinis sputum vase aperto rupto aut eroso: secundario ex affluxu materiæ pulmonem progressu temporis erodente, vel à capite ex catarrho tenui aerique, vel ex pleuritide, aut angina, aut ulcere gutturis, effuso pure in capacitatem thoracis, ut in *Empyemate* dictum est. Huic malo

Pars affecta.

Causa phthisis.

maxi

DE VITIIS CORDIS.

359 CAP.

III.

maximè oportuni sunt, qui ex tabida stirpe prognati sunt, & ab ortu vitiosos pulmones, depressum angustumque pectus, collumque oblongum nacti sunt, ut scapulæ promineant, quos alatos Hipp. vocat, ac præterea qui catarrhis obnoxii sunt. Dignoscitur phthisis ex consumptione totius corporis conjuncta cum difficultate respirationis, & initio febricula, quæ noctu potissimū affligit, tussi, sputoque purulento, quod aquæ injectum subsidet. Procedente verò morbo consumptio corporis febrisque invalescit, color natus, vigor corporis sensim perit, capilli defluunt, ungues curvantur, tandemque hypochondria sursum convelluntur, viresque omnes debilitantur, &c.

Signa.

C A P. X.

De laesa Facultate vitali sine vitiis cordis.

COR fons vitæ & caloris nativi est præcipuum præstantissimumque corporis membrum, quo languescente aut deficiente omnes totius corporis functiones & vires necessariò languescunt aut deficiunt. Functio autem cordis primaria est participatio in calore nativo; aut spiritus vitalis generatio & distributio sive communicatio. Deinde propter spiritus istius generationem & distributionem perennis ille motus systoles & diastoles, qui pulsus dicitur, quem arteriis quoque impertit. Adduntur affectus animi, verum cum animi perturbationes ex appetitu & imaginatione dependeant & temperiem corporis immutent, ideo inter causas morborum cap. 2. libri huius recensentur,

Functiones
cordis.

Z 4

ac

X.

ac interdum ut symptomata considerantur morbos nonnullos consequentia, ut ira furorem; timor & tristitia, melancholiam, &c. Usus finisque functionis cordis est perenni illo motu pulsus, calorem nativum in ipso fonte conservare, spiritumque generare, deinde mediante spiritu per arterias in totum corpus vim vitalem distribuere.

Symptomata cordis.

Læditur functio cordis aliarum instar maxime respirationis; si aboleatur, aut vitiosè edatur. Abolitam autem functionem cordis hîc intelligo, non absolutè omnique ex parte, sed ubi sensibus evidens non est, ut in syncope & ἀσφυξία ac etiam apnœa; quando cum pulsu respiratio abolita videtur. Hæc symptomata ad valdè imminutam cordis functionem potius, quàm prorsus abolitam propriè refertur; cum actio cordis, dum vivimus, penitus cessare nequeat. Deindè vitiosè editur functio cordis ubi à naturali mediocritate recedit, per remissionem aut depravationem: per remissionem autem si functiones cordis diminuuntur, unde lipothymia sive leviores animi defectiones ac pulsus exiles, tardi, rari. Depravatio verò dupliciter accidit, uno modo quando pulsus quidem manet, sed vel supra naturæ modum augetur, ut si vehementior, velocior, frequentior fiat, vel aliam differentiam à naturali alienam acquirat, qualis est inæqualis, inordinatus, intercurrents, caprizans, &c. Alio modo ubi præter differentiam pulsus, alia motus forma præter naturam concitatur, qualis est palpitatio, aut motus palpitationi aut tremori similis.

Causa symptomatum cordis.

Causa horum symptomatum est frustratio facultatis vitalis & pulsificæ cordis, frustratur autem aut ipsa facultate læsa aut propter externum errorem, facultas autem cordis læditur, quia vel labefactatur in sua substantiâ ab intemperie, vel impeditur

ditur à morbo instrumentali, vel & labe si statui & impeditur à solutione continui.

Nam si structuram cordis respicias nil ob stare *Morbi cor-* videtur, quin omni morbi genere laborare queat, *dis.* verum quia plerique statim initio aut paulò post interrimunt, ideo medici paucorum mentionem faciunt. Considerantur primùm intemperies cordis *Intemperies cordis.* secundum partes ipsius solidas continentes, humores contentos, & spiritus impetum facientes, qui vim vitalem caloremque à corde influentem deferunt. In partibus autem solidis residet calor innatus secundum substantiam, ac facultas pulsfica generatrixque spiritus vitalis calorisque influentis; & pro modo substantiæ caloris illius innati, & qualitate ejusdem operatur functionesve producit: Substantia autem caloris innati consistit in humido primogenito, quod à suo calore assiduè consumitur & ex alimentario humida assidua refectione indiget; qualitas verò caloris & innati & influentis, moderata actionibusque proportionata esse debet. Quare quæ substantiam caloris præter naturam minuunt, aut qualitatem ejus supra modum intendunt, aut debilitant, facultatem cordis in sua substantia labefactant; ea intemperies efficit. Laborare autem cor poterit intemperie omnis generis simplici, composita, sine vel cum materia humore scilicet aut vapore, καὶ ἔξιν aut καὶ χέσιν, ac etiam venenata. Intemperies autem in solidis cordis partibus firmata est καὶ ἔξιν: in humoribus aut spiritibus est tantum καὶ χέσιν.

Intemperies autem calida, febris dicitur, quæ calorem nativum in corde accendit, & per arterias in totum corpus distribuit. Nam febris nil aliud est, quam calor nativus in igneum conversus, sive ad tantum excessum deductus, ut functionibus vitæ

Z 5

officiat:

Febres.

C A P.

V.

Febres Di-
aria. Putrida.
Hectica.

officiat: accenso calore nativo in corde sive in suo fonte necessario cum spiritu vitali per arterias in totum corpus distribuitur, nisi impediatur. Accenditur autem calor nativus cordis, vel in spiritibus, unde febris diaria, vel humoribus putrescentibus, unde febris putrida; vel in solida cordis substantia, unde hectica: febris diaria & putrida qualitatem caloris nativi augent, pulsusque veloces frequentes ac etiam magnos efficiunt; sed si calor putridus vehemens sit & violenter confertimque alteret, partes solidas colliquat, & substantiam caloris nativi & virium brevi tempore dissipat & dissolvit; febris verò hectica sensim substantiam caloris & virium consumit.

Frigida in
temperies.

Humida in
temperies.

Marasmus.

Contraria ratio est in intemperie frigida. Nam primum qualitatem caloris nativi debilitat, pulsusque exiles, tardos, raros reddit; deinde si augeatur, ipsum calorem nativum in substantia cordis extinguit. Humida cordis intemperies, quæ cum materia ferè semper est, ut in anasarca caloris nativi vim obtundit, pulsusque languidos & molles facit; ubi cum materia augeatur, veluti ignis à multis viridibus lignis, ita calor nativus obruitur & suffocatur. Contra siccitas per se caloris nativi vim acuit, pulsusque duros, densosque efficit; si intendatur, solidam cordis substantiam invadit, humidumque ejus primogenium consumit, unde Marasmus. Nam marasmus propriè est consumptio viventis corporis à siccitate. Subjectum autem marasmi est cor secundum partes solidas, ubi tanquam in fonte residet calor nativus secundum substantiam, consumpto verò humido radicali cordis, necesse est substantiam cæterarum partium cum suo humido consumi. Consumitur humidum hoc secundum ordinem naturæ, decursu ætatis; unde senectus & Marasmus naturalis; vel præter ordinem natu-

DE VITIIS CORDIS.

353 CAP.

X.

naturæ, à morbo; morbus ille est sicca intemperies, aut sola ex inedia defectu alimenti, immodicis evacuationibus, vigiliis, &c. unde simplex marasmus; aut cum intemperie calida, quæ hæctica Marasmodes dicitur: vel cum frigida, oriturque in viris aut juvenibus marasmus naturali senectuti similis, quem Philippus Medicus teste Galeno senectutem ex morbo vocavit. Additur his marasmus syncoposus, quia ægros ad syncopen deducit ortus ex siccitate cum magna inæqualitate caloris & frigoris.

Marasmus

simplex.

Hæctica marasmodes.

Senectus ex morbo.

Marasmus syncoposus.

Oriuntur hæ intemperies cordis ex affectu primario vel secundo, & per consensum alterius partis, quæ vel suam calidam intemperiem per continuam alterationem cordi communicant, unde febres symptomaticæ vel transmissæ humore aut pravo vapore, quod hypochondriacis & hysteriis accidere consuevit. Aliquando intemperies venenosa est, orta à qualitate rei venenatæ tota substantia cordi & calori innato inimica, quæ substantiam caloris nativi & virium cordis corrumpit, interdum sine magna pulsus mutatione, subitamque virium dejectionem mortemque inducit.

Intemperies venenosa.

Deinde cordi ut aliis partibus accidere poterit solutio continui, nimirum ulcera & vulnera: licet à vulnere superficiali vix quisquam diu supervivere soleat, & si ad ventriculos pervenerit, subitam mortem necessario inducat.

Morbi instrumentales, qui cordi accidere possunt, sunt primum in magnitudine, vel aucta ut tumores in substantia cordis vel pericardii, vel vasorum, vel in diminuta, ut ex marasmo accedit, deinde vasorum angustia & dilatatio; angustia autem vel est obstructio à crassis humoribus aut vaporibus; vel compressio aut constipatio à tumore.

Morbi instrumentales.

X.

*Lesio cordis
ab errore ex
terno.*

moribus ipsum cor aut vasa ejus occupantibus; vel subsidencia ex nimia inanitione vasorum; addunt nonnulli vermes, qui in ventriculis in peste interdum gignuntur, item lapillos, flatum, succos collectos in pericardio. Hi morbi organici actiones cordis impediunt, & plerumque statim initio calorem nativum planè obruunt, spiritusque intercipiunt, ac subitam mortem inducunt. Læduntur functiones cordis sæpè ab externo errore, vitio objecti, aut eorum, quæ ad objectum pertinent, nimirum quia sufficiens aut competens materia pro generatione spirituum cordi non suppeditatur; aut spiritus geniti evacuantur & dissipantur, aut obruuntur & suffocantur, de quibus infra, ubi de causis synopes agitur, dicemus.

*Palpitatio
cordis.*

Hactenus de causis læsionis vitalis facultatis in genere, sequuntur causæ symptomatum cordis in specie. Depulsuum differentiis & causis in doctrina signorum dicetur. Deinde accidunt cordi motus inordinati, quos omnes sub nomine palpitatio- nis Græci complexi sunt. Ex recentioribus nonnulli palpitationem à cordis tremore distin- guunt, & utrumque cordi tribuunt; palpitationem autem quando initar utrum à spiritu flatulento exi- tum quærente, ac proinde influente & refluxente cor dilatatur & deprimitur: tremorem verò motum sursum & deorsum assiduum, quia facultas movens debilitatur aut gravatur: Alii hos motus inordina- tos pulsativos esse putant palpitationi tremori- que tantum similes; palpitationi autem similes, quando motus inæquales sunt, nunc majores nunc mino- res, & quasi cum saltu; tremori verò ubi minores crebrioresque qualis motus est cardiogmos, teste Galeno Com. 4. aphor. 25. De causa quoque dissent- iunt medici: Verùm cum tremor motus voluntarius sit, cordi propriè non competit. Deinde si præter pulsum

pulsus in corde palpitatio eodem tempore sentia-
tur, ut Vidus & Donatus arbitrantur, & motus pal-
pitationis arteriis non communicetur, non erit cor-
dis palpitatio, idem quod depravata pulsatio. Præ-
terea si tanta palpitatio vis interdum sit, ut co-
stas effringere & mammam è sua sede depellere
queat, necesse erit cor non solum dilatari & con-
trahi, sed etiam à suo loco violenter elevari, & de-
primi; quod in legitima palpitatione non accidit.
Quare palpitatio cordis unica non videtur, nec ab
una immediata causa, sed duplex, quarum una le-
gitima, altera illegitima dici poterit. Legitima au-
tem est motus cordis inordinatus ex dilatatione & *Legitima
palpitatio.*
subsidentia compositus, ortus à vapore crasso flatu-
lento, copioso influxu cor dilatante, deinde irri-
tante, ut contractione sua vicissim depellat & discuti-
at. Nam cum palpitatio celeriter fiat & desinat,
causa proxima ejus non erit solida substantia, aut
humor, sed vapor flatulentus, qui celeriter in abdi-
tos cordis sinus ingredi rursusque egredi aut re-
pelli queat; deinde crassus nebulosus & copiosus,
qui non facile discutitur, genitus à debili calore ex
materia crassa, viscida, frigidaque, aliquando sicca
circa cor aut pericardium, plerumque per arterias
aut venas aliunde transmissus, nimirum à ventriculo,
lieue, utero, &c. quare hypochondriaci & mulieres
hysterica palpitationibus cordis plerumque infestantur.
In hac palpitatione dilatatio cordis fit, quia u-
trium modo à spiritu flatulento repletur, verum con-
tractio oritur non propriè, quia evacuatur, sed potius
quia à facultate expultrice irritata cor contrahitur,
ut quod noxium est, depellatur, quo nomine dif-
fert palpitatio cordis ab aliarum partium palpi-
tatione. Illegitima vero palpitatio est motus cordis
inordinatus palpitationi similis à pulsu magnitudi-
ne tantum differens, & propriè motus pulsatorius *Illegitima
palpitatio.*
depra.

depravatus ortus à facultate cor dilatante & constringente incitata ex usu immodice aucto. Nam causa hujus motus est facultas cordis pulsifica irritata, ut sese violenter contrahat & dilater: ac proinde cor non dilatatur, quia impletur, sed contra impletur, quia dilatatur folium instar, qui dilatati aerem attrahunt, compressi eundem vicissim expellunt.

Causa incitans facultatem triplex esse poterit, Primum, defectus spirituum, quem cor inæquali & frequenti pulsatione resarcire conatur; qualis defectus oritur ex immodicis evacuationibus, dolore ingenti orificii ventriculi, inedia aliisque supra enumeratis: secundò calor vehemens inæqualiter auctus in corde, ut in febribus acutis & malignis, unde motus crebri, veloces, qui *καρδιασμος* à Galeno dicitur; tertio ab aliena substantia cor excitante, ut violenta dilatatione & contractione eam extrudat & depellat.

Nam cor ut causam hanc expellat, modo dilatatur, modo contrahitur, magnaque inæqualitate movetur, ac vehementer sursum deorsumque salit. Substantia autem aliena stimulat vel qualitate, vel copia vel utroque; & quod magis stimulat, eo violentius movetur. Substantia vero illa primum non est pravus vapor, aut sanguis maligna qualitate affectus, potissimum non attrahibilis: deinde sanguis vi cum spiritu in cor influens ex vehementi timore: tertio aer pestilens, venena assumpta, aut venenati humores; item vermes cor mordentes. Prætereat tuberculum in arteriis pulmonis propè cor exortum; quod Antipatro Medico contigisse tradit *Gal. en. 4. de locis*; unde post pulsum inæqualem in palpitationem & asthma incidit, ex quo subito interit. Insuper tuberculum pericardii, aut pustula quæ hydatides vocan-

vecantur, lapilli ac magna serosi humoris aut flatus copia collecta in pericardio, &c. Palpitatio, si vires debiles sint, & spiritus confertim evacuētur, in syncopen transire solet.

Symptoma abolitæ aut valdè diminutæ functionis vitalis est συγχωπή, sicut debilis est λειποθυμία, λειποφυγία & έκλυσις, quæ tria pro eodem plerumque sumuntur, licet nonnulli levem animi defectionem έκλυσιν; graviolem ubi pulsus admodum parvi, rari, & tardi redduntur, λειποθυμίας & λειποφυγίας vocent; gravissimam ubi pulsus ad ultimam debilitatem perducitur, & exoluto calore sudor frigidus erumpit, syncopen. Omnium horum symptomatum eadem causa esse poterit, sed major semper in syncope, minor in lipothymia.

De syncopē.

Definitio.

Συγχωπή à συγχέπω, id est, concido; nomen habet, quod omnes corporis vires repente concidant. Nam propriè est præceps virium lapsus, facultate vitali propter magnam spirituum vitalium diminutionem ita debilitata, ut nil influat à corde; sed quicquid spiritus calorisque adhuc in corpore superest, in cor repente contrahatur & confluat. Dico præcipitem virium lapsum ad differentiam illorum affectuum, qui sensim vires eorumque debilitant, donec mors subsequatur. Pars affecta est cor. Nam non fit syncope, nec ullum animi deliquium, nisi cor & facultas vitalis lædatur; debilitata autem vel abolita functione vitali cæteras omnes corporis vires debilitari vel petire necesse est. Igitur in syncope omnes vires corporis ad sensum pereunt; sed primario facultatis vitalis, deinde propter vitalem vires naturales & animales.

Pars affecta.

Conf.

C.P.A.

X.

Causa.

Consistit essentia virium, quibus corpus regitur in spiritibus & temperamento solidarum partium, & tamdiu vires integræ manent, quamdiu substantia spirituum unâ cum solidis partibus, tum in qualitate, tum in quantitate naturaliter se habent. Quare ubi vires concidunt, aut spiritus, aut solidarum substantia, aut utrumque præter naturam afficitur. Vitia autem spirituum sunt defectus, sive imminutio. Cor verò omni ferè genere morborum laborare poterit, ut supra dictum est, verum cum syncope sit præceps virium lapsus, causa ejus immediata propriè non erit vitium cordis, sed spirituum vitalium, licet in syncope & animi deliquio cordis substantia omni ametria non careat: Nam morbi cordis per se mortem inducere solent, sed non syncope nec ulla animi deliquia, nisi quatenus spiritus vitales imminuunt. Defectus autem spirituum vitalium causa immediata syncopes, non est planè totalis omnium spirituum (nam talis subitam mortem inducit) nec exiguus levisque sed tantus ut ne vires cordis exolvantur reliquum spiritus cum calore concentrari cogatur, & in cor confluere; quò verò defectus major est, eò exiguus spiritus, qui adhuc superest, in cor magis aggregatur & contrahitur, adeò ut in gravi syncope extra cor nullus spiritus & calor reperiatur, quare pulsus & respiratio ita debilis efficitur, ut non percipiatur; membra quasi mortua videntur, & quia nativo calore solidæ partes destituuntur, qui eas regit & continet, ideo humidum suum retinere non valent, sed foras effluere sinunt, undè circa frontem & cervicem potissimum ex propria solidarum humiditate sive dissolutione solidæ substantiæ sudor frigus erumpit, qui diaphoreticus & syncopticus ob id dicitur. Causa defectus spirituum vitalium est quia sufficienti copia non regenerantur; aut geniti foras evacuantur.

Causa sudoris syncoptici.

Causa defectus spiritus vitalis.

evacuantur & dissipantur; vel intra corpus alterantur & corrumpuntur; vel obruuntur & suffocantur & primum non regenerantur vitio facultatis generatricis spirituum, aut materiæ scilicet aeris & sanguinis ex quibus generantur: facultas generatrix læditur affectu proprio cordis aut per consensum. Morbi autem cordis sunt primum magna in intemperies sine vel cum materia naturali in intemperiem cordis labefactans, aut substantiam partium & caloris nativi depascens & consumens, aut obruens, ut febres acutæ & malignæ aut colliquantes, hæcticæ marasmodes, febres pestilentes ac syncopales, &c. his accedunt morbi cordis instrumentales & continui solutiones, quæ subito enecare solent. Per consensum plurium partium cor afficitur virtus quæ vitalis debilitatur, primum orificiū ventriculi ob magnam cum corde communitatem exquisitum quæ sensum, unde syncope stomachica sive cardiaca. Deinde uteri & vasorum spermaticorum à tetrīs vaporibus in cor exhalantibus, ex corruptione sanguinis menstrui aut seminis; unde non solum præfocatio uteri & syncope, sed etiam apnœa; aliquando per consensum septi transversī, cerebri, pulmonum, jecoris, &c. Vitiā materiæ, ex qua generantur spiritus, sunt defectus aut aliena qualitas: defectus autem sanguinis oritur ex atrophia, longis morbis, inedia, magnis evacuationibus, &c. aliena qualitas est magna cruditas & sanguinis corruptio, ut in febribus syncopalibus. Deficit verò aer, quia læsa respiratione aut transpiratione iusta quantitate non attrahitur: alienam qualitatem contrahit, quando corrumpitur, pestilens redditur, tertio aut vitioso vapore inquinatur, &c. Deinde spiritus confertim foras evacuant & dissipant, primum immodicæ evacuationes, vel sensiles, ut fluxus sanguinis, vomitus, alvi dejectiones, sudor

X.

res immoderati, tumores aut abscessus magni, subita eruptio, vel introrsum, ut in Empyemate, vel extrorsum, ut in hydropicis: vel insensiles per habitum corporis ob nimiam raritatem substantiæ corporis & cutis, succorum in venis tenuitatem & acrimoniam, immodicos labores, magnum calorem aeris ambientis, sub cane aut in balneis & hypocaustis: Dissipant quoque & foras spiritus evacuant profusum gaudium, vigiliæ immodicæ, vehementes exercitationes addunt nonnulli dolores ingentes, quia à corde in partem affectam spiritum violenter attrahunt. Tertio in corpore alterant & corrumpunt spiritus gravis intemperies cordi & præcipuorum vasorum (nam una causa pluribus modis spiritus imminuere poterit) qualitas venenata ex aere pestilente, ex venenis assumptis, & admotis, aut humoribus venenatis intra corpus genitis ex corruptione & putredine.

Tandem intra corpus, spiritus suffocant & obruunt, gravis timor & animi cōsternatio, acingens inæror, sed non ita confertim ut timor. Deinde vehementes dolores partium nervosarum potissimum orificii ventriculi ob exquisitum sensum, tunc syncope cardiaca.

Nam ut de rigore dictum est, dolor ingens cor in consensum trahens, timori correspondet, & spiritum cum calore ad interiora refugere cogit: deinde spiritus, quia ad partem dolentem magnâ copiam confluent suffocantur potius, quàm foras evacuantur. Præterea obruunt spiritus, interceptiones venarum & arteriarum à magna plenitudine: Obstructiones magnorum vasorum à crassis & crudis humoribus, ut in febris syncopali humorosa, ac in initiis accessionum constipatio magna pororum, cutis, &c. Ab his causis spiritus vitales minuantur, verum suam vim in eos facilius imprimunt,

inunt, qui ad talem dissolutionem sunt propensi, ejusmodi sunt pusillanimes & debiles à natura aut morbo, ut, fœminæ potiùs, quàm mares, pueri & senes, quàm viri, qui raræ texturæ sunt potiùs, quàm qui densum compactum quæ corpus obtinent.

CAP. XI.

De Causis Symptomatum Primæ Concoctionis: Seu Morbis & Symptomatis ventriculi & intestinorum.

Naturales actiones cum brutis & stirpibus communes principales tres sunt: duæ quibus individuum conservatur & perficitur, Nutritio & Auctio: tertia, quæ species ab interitu vindicatur, Generatio. Ministrantes functiones, quæ principalibus subserviunt 4. Attractio, Retentio, Alteratio. Expulsio, quibus nonnulli addunt Appetitionem & usum Veneris. Generatio certis determinatis instrumentis, nimirum spermaticis perficitur: Nutritio, auctio quæ omnibus membris communis est ex alimento in substantiam partium converso. Quatuor ministrantium functionum, quæ in elaborando alimento subserviunt, triplex est series & concoctionum sibi mutuò succedentium tres gradus sunt. 1. in ventriculo, 2. in jecore, 3. in singulis particulis, ut alibi dictum est. Inest omnibus singulis quæ partibus corporis desiderium convenientis, & alieni odium. Quod autem desiderant, vi naturali attrahunt: quod averfantur, à se expellunt, nisi impediuntur. Peculiariter verò ventriculo vasisque spermaticis præter naturalem appetitum

A a z

animâ

XL.

animalis appetitus inest. Attrahit pars id, quod cōueniens est, ut eo fruatur, et frui nequit, nisi prius retineat, deinde concoquat & aliena expellat. Hæ omnes functiones calore perficiuntur, maximè verò concoctio nutritioque; à frigore verò omnes læduntur. Differunt tamen inter se, quod, excepta concoctrice, cæteræ, quæ agibiles à Galeno dicuntur, cum loci mutatione fiant, & rebus roquirant, ac instrumentum magis siccum. Nam mediantibus fibris potissimum agunt. Concoctio verò & Nutritio quiete perficiuntur & humiditate indigent. Proinde in pueris humida constitutione præditis, melior cōcoctio nutritioque est, quam in juvenibus, Sed cæteræ functiones imbecilliores, præcipuè Retentio. Senum corpora ad omnes actiones naturales malè disposita sunt.

*Causa communes
symptom.
Naturalium
facultatum.*

Hæ actiones quatuor naturales omnes & singulæ tripliciter læduntur, ut alibi dictum est. Causa communis læsionis, est facultatis frustratio. Frustratur autem facultas, vel ipsa facultate læsa vitio partis, vel ab externo errore. Læditur facultas, aut quia in sua substantia labefactatur per intemperiem, aut quia impeditur per morbum Organicum, aut quia partim impeditur, partim labefactatur per morbum communem. Error externus accidit ratione objecti & eorum, quæ ad objectum spectant, & triplex est: unus in alimentis; alius in extremis, tertius in vitæ ratione. Sub errore in alimentis, continentur immodica quantitas, aliena qualitas, additur in prima concoctione intempestiva assumptio & ordo præposterus. His præmissis, de causis symptomatum functionum naturalis in specie nunc dicemus, initio facto à ventriculo, cujus præcipua functio est alimenti prima concoctio, quæ chylificatio dicitur, in quem finem reliquæ omnes ipsius functione referuntur. Nam non alia causa

VON.

ventriculus cibum appetit, & ab ore præparatum per gulam attrahit, & attractum amplexatur & continet, quàm ut probè conficiat, sive pro sanguine gignendo concoquat; eodem quoque fine peracta concoctione supervacanea per inferius orificium ad intestina propellit. Læduntur singulæ harum quinque functionum tribus modis.

Causæ læsionis sunt morbi ventriculi & error externus, ut dictum est. Ventriculus sicut & gula, quæ ventriculo servit, omni morborum genere laborare poterit, quorum primum est intemperies, eaque simplex vel composita sine vel cum materia, humore scilicet aut vapore. Simplex autem rarior est, & sola non diu durare solet. Singulæ intemperies non alias causas habent, quàm quæ supra capite de causis morborum propositæ sunt. Si intemperies calida sit, aderit sitis inexplebilis cum sensu caloris, appetentia frigidorum, & levamen à frigidis ructus nidorosus ex calidis cibis assumptis, &c. In frigida intemperie contraria sunt, ut nulla sitis major appetentia, sed concoctio tarda, ructus acidus ex cibis frigidis, &c. Si intemperies humida sit, nulla sitis, nec insignis fames, levamen à siccis, multa expuitio & saliva, &c. Si sicca his contraria. Deinde quando intemperies est cum humore sentitur in ventriculo gravitas, anxietas, nausea: si cum flatu eructationes, fluctuationes, motus errabundi sine gravitate, humor autem si acris sit, aderunt fastidium ciborum, dolor erodens major anxietas, vomitus biliosi, &c. si frigidus velut pituita dolor gravans cum sensu frigoris, vomitus multaque expuitio pituitosa, &c.

Secundò morbi compositionis ventriculi sunt *Signa.* potissimum angustia & tumores præter naturam, quibus addit Avicenna parvitatem ventriculi, Angustia autem est ut plurimum orificii inferioris, trans-

Causa symptomatum ventriculi. Intemperies.

Morbi compositionis ventriculi.

Aa 3 itum

itum chyli impediens; unde vomitus; aliquando superioris orificii, ac etiam gulæ deglutationem & attractionem ciborum intercipiens; ea vel est constipatio à tumore in tunicis ventriculi, vel compressio à tumore partium incumbentium, vel obstructio à crassis viscidis humoribus tenaciter tunicis adhærentibus. Tumores verò ventriculi sunt ex sanguine simplici bilioso pituitoso aut melancholico substantiæ ventriculi impacto, ac proinde omni genere tumoris laborare poterit, imprimis phlegmone exquisita vel notha, unde febris, acuta, sitis dolor ingens cum tensione & gravitate; vomitus & dejectio frequens nisi pylorus inflammetur, nam tum nihil dejectur, sed omnia sursum regurgitant.

*Solutiones
continui.*

Tandem accedit ventriculo solutio continui, ut vulnus; quod incurabile ferè est, deinde ulcus ab abscessu disrupto aut acri humore vel medicamento caustico erodente, unde frequens vomitio & dejectio alvi purulenta, febris lenta, consumptio corporis, &c. Afficitur quoq; ventriculus ex consensu aliarum partium, ut infra dicetur.

*De Appetē-
tia ventri-
culi.*

*Definitio ap-
petentiæ ven-
triculi.*

Nunc causas symptomatum ventriculi ordine considerabimus, initio facto à vitiis appetitus. Præter appetitum naturalem omnibus partibus communem, quo sibi conveniens attrahunt, ventriculo inest animalis quidam appetitus, qui concitatur ex tristi sensu defectus alimenti, dum venæ propter inanitionem corporis ex ventriculo sugunt. Quare appetitus iste animalis nil aliud est, quam desiderium repletionis ex tristi sensu in orificio ventriculi, dum venæ à ventriculo vacuo sugunt. Nam in animali appetentia ventriculi, hæc quinque sese ordine consequuntur, 1. partium solidarum inanitio, 2. partium inanitarum naturalis appetitus, 3. suctio per

per venas à ventriculo, 4. suctionis sensus, ex defectu alimenti, 5. animalis appetitus desiderium illius alimenti. Hujus appetitus ac etiam sensus suctionis sedes est superius orificium ventriculi, quod exquisitissimo sensu præditum est. Nam in hoc orificio viget appetitus sicut in inferiori ventriculi parte concoctio.

Nutrimur ex iis, unde constamus; constamus autem ex mixtione sicci & humidi per actionem calidi & frigidi alimenti duæ partes sunt substantia sicca & humida, sive cibus & potus, & duplex appetitus, unus substantiæ siccæ, famis; alius substantiæ humidæ, sitis. *Quid famis & sitis*

Quia verò defectu sicci alimenti corpus refrigeratur sive calor obtunditur; defectu humidii acrior redditur (nam qui sicciori sunt corporis habitu calorem acriorem habent) ideo in fame est appetentia sicci & calidi; in siti appetentia humidii & frigidi.

Utraque appetentia si naturæ modum servaverit legitima, si à naturæ modo recedat, morbosa & non naturalis vocatur. Recedit à naturæ modo si aboletur, diminuatur, aut depravetur. Abolita cibi & potus appetentia uno nomine *ἀνορεξία* vocatur, abolita cibi appetentia aliquando sola famis absentia est, interdum cibi abominatio, & fastidium ita ut oblato cibos sine molestia ægri aspicere nequeant, quos Hipp. *ἐποσίτης* & *ἀσίτης*, teste Galeno, appellat. *Symptomata appetitus cibi.*

Diminuta famis est, quando minus aut tardius cibus appetitur, quam naturæ ratio exigit.

Depravata ciborum appetentia duobus modis fit, uno quando intenditur, sive in quantitate modum superat, quæ inexplata famis dicitur, sub qua continetur *βέλμη* & canina appetentia propriè dicta. Alio

*Sympto-
ma a appe-
tentia potus*

quando in qualitate peccat, sive ægri ea appetunt, quæ præter naturam & rationem alimenti sunt, ut carbonem calcem, &c. hæc appetentia *πίστα* sive pica & *μαλακία* nuncupatur. Ad cibi proportionem potus quoque appetitus læditur, nimirum auferitur, diminuitur & depravatur, & tum vel intenditur & sitis immodica oritur; vel ægri liquores alienæ qualitatis & naturæ desiderant ut urinam &c. quæ affectio sub pica continetur, de singulis ordine dicemus.

*αίρορεξία
ciborum.
Causa.*

Ac primum cibi *αίρορεξία* est abolita appetentia alimenti sicci, calidi, ex defectu sensus suctionis in orificio ventriculi. Deficit autem sensus suctionis, vel quia vis sentiendi in ventriculo perit, vel suctus per venas non fit: suctus autem non fit, quia ventriculus non corrugatur; aut vis attractrix venarum labefactatur; aut substantia corporis non evacuatur.

Perit autem vis sentiendi in ventriculo, vel ex proprio affectu, nimirum gravi morbo, qualis est vehementis intemperies cum materia, inflammatio, &c. vel per consensum, vitio vel cerebri, à quo influit spiritus animalis propter morbos, impediunt, ut apoplexiam, &c. vel avertunt, ut sunt affectus, in quibus mens laborat; vel vitio nervorum sexti paris, per quosvis sensus orificio ventriculi communicatur, ex obstructione, compressione & similibus.

Suctus verò per venas non fit primum, quia ventriculus non corrugatur, ob gravem intemperiem mordentem, aut relaxantem ventriculum, aut materiam fundentem, item propter redundantiam multorum crassorum crudorumque humorum in ventriculo. Deinde læsa attractrice venarum ab intemperie, vel ob interceptionem viarum ab obstructione, &c. aliquando vitio objecti, quia nulla adest

adeft indigentia five penuria ex redundantia alimen-
ti in jecore, majoribus venis totoq; corpore. Terriò
quia fubftantia corporis non evacuat, vel ob con-
ftipationem pororum, cutisque denfitatem vel calo-
ris nativi debilitatem, ex vifcerum immodica frigi-
ditate, defidia, &c. Ab his iisdem caufis fed debilio-
ribus oritur diminuta appetentia, nimirum tribus il-
lis actionibus nondum deperditis, fed propè ut pere-
ant perductis.

Inexpleta
fames eius-
que caufa.
Inexpleta fames, eft immodica ciborum ap-
petentia, excitata à vehementi fenfu fuctionis in o-
re ventriculi; vehemens autem ille fenfus fuctionis
oritur, quia fenfus augetur ex proprio affectu cor-
rugente os ventriculi; vel immodica fuctio per ve-
nas fit, ob magnam venarum inanitionem, aut plu-
rimam fubftantiæ corporis evacuationem. Incita-
tur & augetur fuctionis fenfus in ventriculo ab iis,
quæ præter naturam os ventriculi constringunt &
corrugant & fimilitudine famis naturalis contra-
hendo & vellicando appetentiam excitant; cujus
generis eft intemperies frigida ficca, aliquando fi-
ne materia, qualis, teftè Aetio, nonnullis accidit, qui
per nives iter fecerunt; sæpe cum materia acida, ut
melancholia aut pituita acida orificio ventriculi
impacta. Deinde fuctio immodica per venas ori-
tur, quia plurimum evacuantur, ob retentricis im-
becillitatem & expultricis motum depravatum. E-
vacuatio autem illa vel fenfibilis eft; ut immodicus
fluxus fanguinis, alvi, urinæ, fudoris, &c. vel infen-
fibilis per habitum corporis ab immodico calore
fubftantiam partium & humorum diffolvente &
diffipante, propter fuccorum tenuitatem, fubftan-
tiæ corporis raritatem, & pororum laxitatem. Huc
referri poterit fames à vermibus chylum depafcen-
tibus. Hæ omnes fpecies fub fame canina aut buli-
mia communiter dicta continentur. Verùm pro-

X I.

Canina ap-
petentia.
βελίμος

propiè appetentia canina est vehemens & assidua ci-
borum appetentia cum vomitu orta ob intemperie
frigida cum materia acida os ventriculi corrugante;
βελίμος vero est fames magna, sed non diutur-
na orta ab intemperie frigida, in qua ægri initio a-
vidè cibos expetunt & non vomunt, deinde aucta
intemperie sensim appetitus dejicitur, omnesque
vires.

Trallianus statuit bulimum fieri ab immo-
dico oris ventriculi calore & imbecillitate, unde
nisi ægri immodicè alimentum assumant, animo
deficiunt & concidunt, sed an hæc affectio ullam
inexpletam famem excitare, imò an ægri valdè co-
piosum alimentum ferre queant, dubitatur? Acci-
dit quidem ex vitioso humore in ventriculo debili
tempore inedia, mortuus orificii ventriculi, qui
nisi alimentis reficientibus statim contemperetur,
ægri animo deficiunt, sed hoc symptoma propriè nec
βελίμος nec canina appetentia est.

μαλακία
& πίσις

Μαλακία sive πίσις Latinis pica est, appe-
tentia vitiosa alienæ substantiæ solidæ vel liquidæ
præter naturam & rationem alimenti, orta extrin-
sensu suctionis ex vitioso excremento tunicis im-
bibito peculiari substantiæ proprietate os ventriculi
infestante.

In hoc malo laborat ventriculus semper affe-
ctu proprio ex humore pravo tunicis ventricu-
li impacto, qui pro natura speciei & qualitatis
à tota substantia per corruptionem genitæ os
ventriculi infestat, ac ob id dum alterat contraria-
rum rerum cupiditatem excitat, quas naturali in-
stinctu omnes partes appetunt, ut per eas affectus
præter naturam tollatur. Nam ut in firi, ita in
pica quamdiu ventriculus præter naturam altera-
tur, tamdiu id desiderat, quod hosti maximè con-
trarium est, sibi que ad id utile, fugiens in quod ini-
micum

maicum est, verum si succus post alterationem longo consuetudine ventriculo familiaris efficiatur, tum non contraria, sed similia appetuntur. Hic succus vitiosus si fuerit frigidus, oritur alieni cibi appetitus, si calidus alienæ potionis: Affectio ista gravidis sæpè accidit tribus primis mensibus; & viris, qui elephantiasin, aut simili affectu laborant.

Inappetentia potus oritur ex defectu sensus suctionis humidi alimenti in ventriculo. Deficit autem sensus suctionis vel quia vis sentiendi in ventriculo perit, ut supra de inappetentia cibi; vel quia suctionis humidi alimenti per venas non fit ob magnam succorum humidorum in venis totoque corpore copiam, aut quia ventriculus frigidus multa pituita dulci perfunditur, &c.

Symptoma.
ta appetentia potus.
Cause in appetentia potus.

Tandem sitis inexplebilis est immodica positionis sive alimenti humidi frigidi cupiditas, orta à tristitia sensu suctionis in ore ventriculi ex defectu & alteratione propriæ humiditatis. Pars affecta, ubi sensus suctionis perficitur, orificium ventriculi. Causa immediatè tristis sensus est subita alteratio & consumptio propriæ humiditatis imprimis alimentariæ. Alteratur autem consequiturque vel in ipso ventriculo ex affectu proprio, vel in aliis partibus, quæ ob indigentiam statim à venis humiditates attrahunt, & venæ vicissim à ventriculo; unde per consensum ex vehementi suctione alimentarii humidi tristis sensatio in orificio ventriculi excitatur, simulque appetentia humidi, quæ sitis dicitur. Affectus humiditatem alterans & exhaustiens; est, intemperies inæqualis propriè (Nam absolutè æqualis tristem sensum non parit) quæ vel sicca est vel calida vel utraque interdum sine, interdum cum materia, nimirum calido, acri, salso humore, aut vapore. Nā oritur situs primum inopia aliqua propriæ humiditatis ventriculi à sicca intemperie,

Sitis inexplebilis
quid?

Causa.

Dein

Deinde ex effervescencia ipsius humiditatis ab in-
temperie vel calida, vel calida sicca, contracta ex ca-
lidis acribus salisque alimentis, condimentis &
medicamentis, &c. sæpè cum humore calido acri,
vel salso aut putrido tunicis ventriculi impacto, aut
in cavitate ventriculi contento, vel cum vapore a-
cri calidoque ex putridis corruptisque humoribus
genitis in ventriculo, vel aliundè transmissis. Præ-
terea oritur sitis ex consensu aliarum partium, aut
etiam totius corporis, alterato aut exhausto eorum
naturali humido, dum venæ à ventriculo sugunt,
nimirum ex intemperie calida sicca cordis; jecoris;
totius corporis, ut in febribus ardentibus & colli-
quantibus, &c. renum, in diabete; intestinorum, in
magnis alvi fluxionibus; non rarò pulmonum par-
tiumque oris ex aere calido attracto aut acribus fu-
liginosis vaporibus à corde susceptis. His accedunt
exercitia & labores immodici, æstus aeris, &c. quæ
humiditates corporis alterant & exhaustiunt.

*Symptoma-
ta deglutio-
nis & attra-
ctionis cibo-
rum.*

Post appetentiam sequitur ciborum & in ore
præparatorum deglutitio & per gulam ad fundum
ventriculi attractio. Deglutitio ciborum, actio gu-
læ est adjuncta motu linguæ, & musculi qui initio
gulæ præest, gula autem & ventriculus medianti-
bus fibris rectis interioris tunicæ cibos ab ore attra-
hit, & fibris transversis deorsum naturaliter petru-
dit. Abutitur quoq; natura fibris transversis in vomitu
ad ea sursum propellenda, quæ os superius ventri-
culi infestant. Læditur autem deglutitio & attra-
ctio ciborum ad fundum ventriculi, si aboleatur de-
biliter, depravato modo gula aut ventriculus at-
trahat. Abolita deglutitio oritur vel labefacta fa-
cultate, propter resolutionem fibrarum rectarum
& transversarum ab intemperie præcipuè frigida
humida, cum materia pituitosa à capite defluente, a-
liquando extinctione caloris nativi: ut in iis, qui
morti

mōrti vicini sunt, vel impedita facultate propter angustiam gulæ, ut constipationem aut compressionem à tumore, &c. aut propter ulcus. Deinde læso musculo, qui initio gulæ præest, motuque linguæ, ex resolutione aut convulsione aut inflammatione gulæ vicinarumque partium, ut in Angina dictum est. Quando inflammatio infestat cum angustia vorandi, adest dolor distendens, calor, sitis, &c. Si ulcus, in affecta parte dolor sentitur potissimum assumpto acido, acri, salso cibo: affecta pars si gula, dolor in dorso sentitur, si causa sit intemperies, difficultas deglutitionis sensim augetur sine dolore & tumore, aut angustia gulæ, &c. Debilis deglutio & attractio ciborum ab iisdem causis fit, sed levioribus, ac etiam vitio objecti, quando cibus ingratus, viscidus, asper, durus, siccus, &c. De depravata attractione, in vomitu dicemus.

Ventriculus concoquere nequit, nisi ita complectatur ut inter ventriculum & cibos spatium nullum intercedat, iustoque tempore retineat. Hæc actio perficitur fibris obliquis tunicæ interioris versus inferius orificium. Læditur autem tripliciter, si omnino non complectatur vel debiliter, vel depravate. Abolitam retentionem fluctuationes cum sonitu, debilem flatus magis consequuntur. Fluctuationes autem, quas Græci κλυδωνας vocant, sunt inordinatus motus ventriculi, intra fluctuum in mari, quibus cibum, quem retinere nequit, à se propellit: Oriuntur tales motus cum sonitu, quia ventriculus vehementer refrigeratus est, aut immodicā potius copiā ita oppressus, ut nullum vaporem aut flatum excitare queat. Flatu vero fiunt, quando ventriculus nec vehementer frigidus, nec satis calidus, aut cibi sua natura flatulenti, ut infra latius dicemus. Oritur autem abolita comprehensio ab

*Causa
symptoma-
tam reten-
tricu ven-
triculi.*

*Fluctuati-
ones ven-
triculi.*

extre-

XI.

*Abolita
retentio
nisi causa.*

*Depravata
retentio.*

*Symptoma
mata concoctionis.*

Cruditates

Απεψία.

*Causa
abolita concoctionis.*

extrema imbecillitate retentricis, fibris obliquis planè resolutis, ex intemperie potissimum frigida humida, cum materia pituitosa, cum copioso potu fluctuante in ventriculo, vel quia impeditur a tumore, ut inflammatione; aut immodica pylori apertione ex relaxatione tunicarum, ut cibi statim effluant, aut ulcere, &c. accidit etiam ab errore, vitio cibi Nam ob duritiem aliamve pravam qualitatem cibos non complectitur. Diminuta aut debilis retentio ab iis causis, sed minoribus fit. Depravata comprehensio oritur, quando ventriculus in amplectendo cibo, quasi tremit ob imbecillitatem à frigore plerumque cum materia: vel palpitat ex flatibus contentis; vel concutitur ut in rigore; vel quasi convellitur ut in singultu Abolitam ciborum retentionem in ventriculo consequitur cruditas & licentia, debilem colica affectio, &c. de quibus in fluxionibus alvi dicemus.

Retinet ventriculus alimentum, ut eo fruatur & concoquat, ac in qualitatem sibi similem convertat pro bono sanguine gignendo quæ actio chylificatio dicitur. Læditur hæc ut cætera functiones tripliciter. Communiter omnis concoctio ventriculi vitata cruditas vocatur, quæ triplex est; una ἀπεψία, & propriè cruditas quando cibi nihil omnino transmutatur à ventriculo: altera βεβήδυρεψία concoctionis imminutio & tarditas: tertia δυσπεψία prava concoctio aut corruptio ciborum. Απεψία autem est abolita alimentorum concoctio in ventriculo eveniens ex frustratione facultatis alteratricis ejusdem: frustratur autem vel per se, vel ex accidente læsa retentrice, aut expultrice ventriculi: per se labefactata aut impedita alteratrice facultate, aut ab externo errore. Ac primum labefactatur vis alteratrix aut concoctrix ventriculi ab insigni intemperie activarum qualitatum, quæ bre-

breviori tempore fieri solet, maximè vero ex intemperie frigida, aliquando ob intemperiem passivam: Verùm intemperies humida ut in Anasarca, aut sicca, ut in marasmo & senectute, non nisi longiori tempore concoctionem labefactant. Intemperies illa frigida vel positiva est ab alimentis, medicamentis aut humoribus refrigerantibus, vel privativa ex defectu substantiæ caloris nativi à magnis evacuationibus, longo morbo, gracilitate omenti & musculorū abdominis; quæ cum intemperie sicca semper conjuncta est. Intemperies istæ aliquando nudæ sunt, plerumque cū humore vel vapore vitioso. Deinde impeditur vis cōcoctrix à morbo instrumentali, vel communi ut sunt tumores omnis generis, inflationes, abscessus, parvitas ventriculi, ulcera, &c. Tertio, frustratur concoctio debilitata aut abolita vi retentrice ventriculi, ut cibus non complectatur, aut nō justo tempore, ut supra dictū est, vel irritata expultrice ante debitū tempus à causa mordēte vel gravante. Tandem ab errore externo frustratur concoctio, qui tripliciter consideratur, vel in excrementis in ventriculo coacervatis, vel in ipsis alimentis assumptis, vel in somni tempore cæterisq; causis non naturalibus. Nā humores excrementitii maxima copia in ventriculo coacervati cōcoctionē prorsus tollunt; minori copia aut debilitant aut depravant. Secundo lædit concoctionem cibi potusq; major quantitas quā natura regere & superare queat; deinde nō competens qualitas quæ vel manifesta est, ut nimia frigiditas, crassities, visciditas, &c. vel occulta, maligna, venenata alimentis à natura insita, aut ex putrefactione genita tertio intēpestivus alimentorum usus, quando novus cibus ingeritur priore nōdum confecto, quando ordo incongruus, quando primò præmittuntur quæ difficilis cōcoctionis, deinde quæ faciliè alterantur & putrescunt, &c.

Tanti

CAP.
XI.Βραδυ-
πείψια.

Δυσπείψια.

Causa.

Tandem error in somno, quando sufficienter comedunt, sed parum dormiunt in causa est, ut concoctio lædatur; similiter intempestiva exercitia, venus, balnea, animi perturbationes, &c. Nam concoctiones in somno magis vigent & quiete indigent. Hæ eadem causæ si leviores fuerint pro ἀπείψια βραδυπείψια efficiunt, id est, tardam debilemque concoctionem, ubi cibus convenientem mutationem non suscipit vel longo tempore, &c.

Δυσπείψια est corruptio ciborum in qualitatem alienam, eveniens ex frustratione facultatis concoctricis ventriculi. Aliena illa qualitas est fumosa, & nidorosa, vel acida, unde ructus nidorosis, vel acidus. Causa frustrationis est primò intemperies ventriculi; nam nidorosa corruptio, caloris soboles est; acida, frigoris, nisi diuturnitate temporis humor acrimoniam contraxerit, unde Trallianus ructum acidum à calore fieri voluit. Nihilum autem alimentum supracalefactum in ventriculo imputre durare potest, corrumpitur verò quodlibet pro sua natura, quare alia, quando corrumpuntur, virus olent, alia tanquam limum, quædam erudos pisces aut indicibilem alienam corruptionem. Peculiariter corruptionis nidorosæ causæ sunt affectus calidi, deinde redundantia biliosorum calidorumque humorum in ventriculo, tertio alimenta calida, quæ in calido ventriculo facile in bilem vertuntur, aut corrugantur. Corruptionis verò acidæ causæ sunt, intemperies frigida, redundantia pituitosorum frigidorum humorum, & alimenta frigida. His adduntur ordo alimentorum præposterus, ut in debili ventriculo si assumantur primo loco cibi difficilis concoctionis, deinde faciliis, item expultricis debilitas, unde chylus & excrementa in ventriculo diutius detenta necessario corrumpuntur.

Ex

Ex debili concoctione ventriculi flatus, flatuosaque distensiones, ructus & similia gignuntur. Fit autem flatus à calore deficiente & impropor-
 nato, cibos flatulentos, & pituitosos aut melancho-
 licos succos in ventriculo non prorsus conficien-
 te, sed aliquo modo dissolvente, & in halitum con-
 vertente. Nam intensa frigiditas, quia alimenta &
 humores non immutat, halitus non excitat; fortis
 verò calor, flatus non gignit, nisi materia suâ natu-
 râ flatulenta sit & rebellis. Ex flatibus, quatenus
 expelluntur corpore vel retinentur, varia sympto-
 mata proveniunt. Nam flatus per os cum strepitu
 erumpens, ructus vocatur; per anum deorsum, fla-
 tus strepens, qui pro ipsius excrementi copia &
 quantitate, deinde viarum, per quas impellitur, an-
 gustia & amplitudine, varias sonorum species edit.
 Flatus enim siccus tenuisque, magis acutum; hu-
 midus crassus, gravem parvumque sonum excitat.
 Deinde quò via latior fuerit, eò graviolem; quò an-
 gustior, eò tenuiorem. Quare ex crassis intestinis
 vacuis graviores soni sive bombi erumpunt; ex te-
 nuibus intestinis, tenuior, clarior, acutiorque so-
 nus. Verùm si in intestinis humiditas fuerit, mur-
 mur illi excitatur, significans futuri humidi deje-
 ctionem. Cum verò flatus in neutram partem e-
 rumpunt, *ἐμπύκνωσις* gignunt, & peculiariter
 in colo intestino colicum affectum: sin intra capa-
 citatem abdominalis coerceantur, Tympanitidem;
 ut infra dicemus.

*Flatuum
causa.*

*Sympto-
mata ortu
ex flatibus.
Ructus.*

*Crepitus
ventri.*

*Inflatio-
nes.*

Tandem peraeta concoctione ventriculus na-
 turaliter mediantibus fibris obliquis excretionem
 per interius orificium ad intestina molitur. Læ-
 ditur ista quoque actio tripliciter si aboleatur, de-
 bili aut depravato modo fiat. Abolita actio expul-
 tricis ventriculi, ubi nil per inferius orificium ad

*Causa læ-
se expul-
tricis fa-
cultatis.
Abolita.*

B b

intē.

intestina detruditur, oritur primum labefactata expultrice ab intemperie potissimum frigida humida resolvente fibras obliquas, quæ ut plurimum cum materia pituitosa est. Deinde impedita expultrice ab angustia pylori, quæ vel obstructio est ex crassis viscidis humoribus tenaciter tunicis & orificio ventriculi adherentibus, vel compressio à tumore vicinarum partium; vel constipatio à tumore, vt inflammatione pylori; tertio frustrata expultrice copia, crassitie; visciditate, & lentore excrementorum in ventriculo. Hæ causæ si minores fuerint, debilem sive diminutam expulsionem efficiunt, fiunt quoque diminutæ evacuationes, si retentrix robusta sit, & expultrix infirma, sicut contra copiosæ evacuationes expultrice existente robusta & retentrix infirma.

*Causa de-
pravata
expulsi-
onis.*

Depravata expulsio est, vbi ventriculus expellit qualia, quantum, vel quomodo secundum naturam non oporteat, dependens à facultate expultrice irritata. Expelluntur autem, quæ qualia non oporteat in lienteria; quantum, in diarrhæa, quomodo, in vomitu, quantum & quomodo, in cholera. Causa proxima est irritatio facultatis expultricis ventriculi. Irritatur aut per se, aut ex accidente debilitata expultrice, ut supra dictum est, undè lienteria. Per se stimulat expultricem causa dolorifica ventriculum contristans, sive gravans aut mordens, vel ut primum intemperies ventriculi cum materia copiosa acri, aut mordaci: deinde inflammatio & ulcus ventriculi: Ad huc Avicenna parvitatem, ubi ventriculus magnam alimentorum copiam non sustinet. Tertio copia aut acrimonia excrementorum & humorum in ventriculo, aut alimentorū & medicamentorum assumptorū, ut infra de vomitu dicetur.

Quæ ventriculum contristant, & in cavitate eius contenta sunt, si ad superius os vergant expul-

tri x

trix per superiora rejicere conatur, oriturque ex materia humorosa aut sensili vomitus, & nausea; ex vaporosa sive flatibus, ructus; si ad pylorum descendant, per intestina propellit, unde alvi dejectiones crepitusque ventris; si ad utrumque os vergant, oriuntur & vomitus & alvi dejectiones, unde cholera. Quæ verò tunicis ventriculi infixæ sunt, & os superius infestant, expultrix dum celeri fibrarum transversarum contractione & relaxatione excutere nititur, singultum efficit. In singultu constringitur ventriculus secundum partem superiorem potiss. In vomitu & nausea contrà: nam secundum partem inferiorem constringitur, secundum superiorem valdè dilaturatur, unde motus hic à nonnullis ventriculi subversio vocatur.

Deindè post sanguinis excretionem nulla evacuatio magis præternaturam existimatur, quam vomitus. Nam venter cum pro naturæ lege se habet, trahit superius per stomachum, deorsum excernit; nihilominus quia motus his naturæ instrumentis perficitur, scilicet villis transversis tunicæ exterioris ventriculi, & naturæ interdum utilis est: toto genere præternaturam non est, ut sanguinis evacuatio, sed quatenus vomitus oritur non cum tollerantia & conferentia ægri, à causa morbifica expultricem irritante, & violenter cogente. Nam vomitus duplex est, unus opus naturæ, per os superflua in ventriculo contenta expellens cum tollerantia & conferentia: aliter non naturalis & symptomaticus naturæ inutilis, nimirum motus depravatus ventriculi, dependens ab expultrice ipsius irritata, expellente præternaturam sensibiliter per os materiam in capacitate ventriculi contentam. Dico sensibiliter ad differentiam ructus. Causa hujus motus depravati, licet non accidat sine intemperie superius os ventriculi debilitante, &

*Vomitus
naturalis.*

*Vomitus
morbosus.*

*Causa
vomit.*

ad vomitum proclive reddente; tamen quia in vomitu semper requiritur materia expultricem irritans, quæ per os sensibilibiter evacuatur; præcipua igitur causa vomitus erit materia illa in ventriculo contenta supernatans, vergens ad superius os, facultatem expultricem ita stimulans, ut eam versus superiora expellat. Irritat autem expultricem materia, vel nimia copia, vel qualitate mordaci, vel substantiæ ratione: nam nimia cibi potusque copia in ventriculo supernatans, retentricem gravans suâ naturâ expultricem cogit per superiora sese evacuare, supernatant alimenta pingua leviaque, aut ubi primò astringentia duraque præmittuntur, deindè exhibentur multa pingua dulciaque, vel quia ventriculus multis flatibus refertus est, ut in hypochondriacis. Secundò vomitum excitat qualitas acris, mordax alimentorum aut humorum in ventriculo, venena & medicamenta acris assumpta, alimentorum autem qualitas vel naturalis est, vel acquisita, vitio concoctionis, veluti cum alimenta acida aut nidorosa redduntur, aut alio modo corrumpuntur: humores verò vitiosi expultricem irritantes potiss sunt bilis flava vitellina, æruginosa, atra, aut pituita non naturalis, ut salsa, vel humor corruptus aut malignus, humor autem vitiosus aut in ventriculo genitus est, aut aliundè transmissus, nimirum vel a toto corpore, ut in febribus malignis, initiis paroxysmorum & in crisi bus, vel à parte aliqua primaria, ut à jecore, cerebro, intestinis, utero, renibus, &c. Nam ex catarrho à capite ad ventriculum vomitus interdum oritur, deinde affecto jecore aut vesicula fellis sæpè portio vitiosæ materiæ in ventriculum irruens vomitum excitat, similiter longa inedia propter biliosos humores in ventriculum effusos: præterea vulnerato cerebro plerumque biliosi vomitus superveniunt. Accidit etiam vomitus

gus ex consensu læsis intestinis. Unde Ileos, renibus in nephritide, utero, &c. Terriò fit etiam vomitus à materia contenta in ventriculo facultatem stimulante non tam qualitate, aut quantitate; quàm substantiæ ratione, quia aliena minime què familiaris, aut utilis ventriculo, licet sua natura prava non sit; ac proinde ut supervacanea à natura expellitur: ita sanguis in ventriculum effusus vomitum excitat, pus, pituita dulcis, &c. Præterea externæ nonnullæ causæ, quatenus corpus & humores conturbant, vomitum excitant, ut graves fœdique odores, horrenda spectacula, motus vehementes, agitatio corporis, præcipuè navigatio, &c. proclives verò magis sunt ad vomitum, natura, aut ex morbo debiles, quibus os ventriculi magis exquisito sensu præditum est. Nausea inanis vomendi conatus ab *Nausea.* iisdem causis oritur, sed levioribus, veluti si materia minus copiosa & acris sit, sed magis crassa, lenta & impacta, aut vaporosa, deinde os superius ventriculi non ita debile. In nausea propriè nihil eijcitur, verum post conatum ut plurimum materia tenuis & aquea sponte ex ore profluit. Materia vomitum procreans dignoscitur, ex ructu, sapore doloris proprietate, ac etiam substantia & colore eorum, quæ vomitu rejiciuntur: si in ventriculo genita sit; præcessit prava victus ratio, gravitas aut dolor aliquis ventriculi, &c. sin ab aliis partibus confluit, ad- *Cholera.* runt signa aliqua partis mandantis, &c,

Ab iisdem causis totum ventriculum & utrumque os instantibus oritur cholera, quæ ex *Cholera arida.* Hipp; duplex constituitur; una arida, vehemens dolor cum inflammatione totius ventriculi sine vomitu alviq; dejectione ab acri flatulento spiritu. Hæc cholera notha videtur, & à nonnullis ad ilia- *Cholera humida vera.* cam passionem aut colicam reducitur. Altera est *humida veraque cholera,* quæ propriè definitur mo- *que.*

tus depravatus expultricis totius ventriculi materiam, quæ eam contristat & irritat per utrumque os expellentis. Pars primario affecta est utrumque os ventriculi, deinde totus ventriculus. Causa, affectio dolorifica à materia vitiosa utrumque os afficiente. Materia illa, quæ sensum molestiæ inducendo expultricem stimulat, est non solum bilis flava, vitellina, &c. (unde cholera à Gaidiis medicis nomen accepisse putatur, licet Trallianus potius ab intestinis dici malit, quæ cholades Homerus vocat) sed etiam quælibet corruptio humorum. Gignuntur autem & coaccervantur illi pravi & corrupti humores, aut in ventriculo ex pravis alimentis, ut sunt fungi, carnes porcellorum, fructus horarii, pepones, vel ex corruptione ciborum in ventriculo, aut circa primas venas, jecur, pancreas, &c. unde ad ventriculum transmittuntur, aliquando assumpto valido medicamento, ut helleboro, &c. quod sua natura humores violentur ad ventriculum attrahit. Ab his humoribus ventriculus graviter stimulatus ad excretionem insurgens humorem per utrumque os, sive vomitu alviq[ue] dejectione cum vehementi perturbatione expellere nititur, unde sitis, vehemens dolor, tandem animi defectio; aliaque symptomata gravissima.

Singultus.

Singultus inter motus convulsivos numeratur, quia ex contractione & relaxatione compositus est, verum motus convulsivus propriè symptoma est instrumentorum facultatis animalis; singultus & vomitus naturalis: ac proinde singultus erit tantum motus quasi convulsivus. vomitui genere similis. Nam oritur singultus irritata expultrice ventriculi à materia tunicis infixæ, quam ut valentius excutere queat, primùm refugiens, fibras tendit, deinde statim recollectis viribus easdem subito distringens, veluti arcus sagittas emittens ab
colli.

Definitio.

collisionem aëris sonitum edit. Quare erit singultus motus quasi convulsivus ventriculi cum sonitu, ortus ab expultrice irritata noxia tunicis ventriculi infixæ celeri tensione & distictione fibrarum excludere nitente, Pars affecta ventriculus, sub quo œsophagus continetur, verum potissimum afficitur superius os affectu proprio, aut per consensum. Actio laesa est, primariò expultrix irritata; unde fibræ omnes quidem violenter contrahuntur, sed præcipuè transversæ. Causa fibras tendens, est inanitio, repletio aut qualitas rei mordacis tunicis infixæ. Inanitio oritur ex immodica evacuatione sanguinis, sudoris, alvi, &c. Repletio verò à copia materiæ tunicas gravante, & distendente, &c. ut in convulsione.

Pars aff. 2a

Causa.

Humore verò mordax tunicis impactus, vel sola qualitate expultricem stimulans singultum edit, similiter venena acria assumpta, medicamenta aut alimenta acria, ut piper, &c. si fibris ingerantur: unde *Gal. Com. 39. Aph. 6.* singultum oriri dicit, si quis acre aliquid (ut piper) deglutiat, mox vinum bibat aquâ temperatum, devehens acria ad interiores fibræ ventriculi. Excitatur etiam ex consensu aliarum partium, ut ex inflammatione jecoris, affectibus cerebri, uteri, febribus malignis, translato humore ad os ventriculi, aut à tetto vapore os ventriculi feriente, qualis oritur à vermibus, & in lethargi vulvulo. Excitatur etiam singultus ab affectione ventriculi distendente, ut ex hernia intestinali in senibus, qui non curatur, nisi reposito in suum locum intestino, quod si violenter reponatur subitam mortem introducit: huc refertur compressio orificii ventriculi à costa contorta, cujus meminit *Fernelius*.

Post ventriculum sequuntur intestina, quæ licet aliarum concoctionum excrementa suscipiant & nu.

De intesti

Bb

4

quasi

XI.

*Vl. intesti-
norum.*

quasi communis sentina totius corporis videantur; tamen primæ concoctioni peculiariter inserviunt. Nam ventriculus cibum potumque assumptum in chylum convertit, deinde à ventriculo chylum intestina tenuia suscipiunt, distribuunt, & tamdiu continent, donec portio utilis pro sanguine gignendo pervenas portæ à jecore exugatur; quæ suscepta partem crassam & inutilem, quæ feces dicuntur, intestina crassa suscipiunt, & per anum foras extrudunt. Quare intestinorum duo præcipua officia sunt, chylum distribuere, & excrementa alvi detrudere, quibus additur utriusque muneris gratia vis quædam sentiens, quæ in tenuibus intestinis magis exquisita est, quàm in crassis. Læduntur hæ functiones, ut aliæ omnes tribus modis.

*Symptoma-
ta intestino-
rum.*

Ac primum vitatur chyli distributio si intestina nihil aut parum à ventriculo suscipiant abolita vel debilitata expultrice ventriculi, vel attractrice intestinorum: vel si chylum susceptum à ventriculo intestina justo tempore non retineant, sed prius per alvum ad crassa intestina descendant, quam venæ suo officio fungi queant; unde fluxus alvi chylosus; aut sursum violenter propellantur, ut in Illo. • Secundò expulsio intestinorum aufertur, ubi nihil excrementi per anum foras detruditur, quæ omnimoda alvi suppressio dicitur; vel diminuitur quando pro assumptorum ratione pauca excernuntur tardè, & rarè ægrè, unde alvi astricto: vel excretio depravatur cum aliter sit, quàm secundum naturæ legem, nimirum, quando ea expelluntur, quæ expelli non debent, ut in lienteria, fluxu alvi chyloso aut sanguinolento; aut qualia non conveniunt, scilicet corrupta, foetida, purulenta; aut quantum, id est, plus quàm per assumptorum ratione, ut in diarrhæa; aut alieno tempore veluti frequenter & assidue, ut in omnibus magnis alvi fluxionibus,

bus, aut modo non naturali nimirum per alvum cum dolore & torminibus, &c. ut in dysenteria aut motu peristaltico sursum violenter, ut in Ilio & gravi colica. Tandem sensus, quo intestina prædita sunt, interdum penitus tollitur ex paralyfi graviq; apoplexia; vel diminuitur ex torpore nervorum aut usu narcoticorum; vel depravatur, ut in dolore intestinorum, qui pluribus modis fit peculiariter vehemens dolor tenuium intestinorum præcipuè Ilii. Iliacus, crassorum intestinorum, ut coli, dolor colicus vocatur.

Oriuntur hæc symptomata intestinorum ex affectu proprio, aut per consensum; aliquando ab errore externo vitio assumptorum & humorum, ut in ventriculo dictum est. Morbi proprii ventriculi sunt intemperies, Morbi instrumentales & communes. Intemperies intestinorum cujuscunque generis esse poterit simplex, composita, siue vel cum materia vel alluente intestina, vel impacta & in tumorem attollente, quæ dignoscitur, ut in ventriculo.

*Morbi intesti-
norum.*

Intemperi-

es.

Morbi compositionis primum in conformatione sunt ratione cavitatis, vel superficiei: ratione cavitatis, nimia dilatatio, à relaxantibus, aperi-entibus, &c. aut angustia, quæ vel constipatio, ab aliquo tumore, ut inflammatione in ipsis intestinorum tunicis: vel compressio à tumore vicinarum partium incumbentium; vel obstructio à fecibus crassis, sic- cis, induratis, longoque tempore retentis ex alvi a- strictione; aut à crasso, viscido, lento humore (qua- lis est pituita crassa, vitrea, &c.) adhærescente tuni- cis intestinorum totam cavitatem, aut maximam ejus partem sensim implente. Humor iste inter- dum in ipso ventriculo & intestinis gignitur & co- acervatur. debilitata concoctione ex alimentis grassæ viscidæ substantiæ, aliquando ab aliis parti-

*Morbi con-
formationis
intest:*

Bb s bus

bus potissimum à capite defluit. Crassus verò humor diu coercitus in cellulis coli intestini, vi caloris, primum in materiam gypseam, deinde in calculos concrefcere interdum solet. Morbi ratione superficiali; sunt asperitas & levitas. Exasperantur autem intestina acris mordacibus humoribus defluentibus, & ab alimentis aut medicamentis detergentibus. Levigantur à viscida pituita interiore superficie oblinente, unde chylus & excrementa citò dilabuntur. Secundum genus morbi compositionis est in magnitudine vel diminuta, cum intestina valdè extenuantur, quod ex marasmo accidit; vel actu, ut tumor præternaturam.

*Tumores
intestin.*

Accidunt aut intestinis tumores omnis generis, ut ventriculo, præcipuè inflationes à multis crassis flatulentis vaporibus, tunicis infarctis: deinde inflammatio, tumor calidus dolorificus adveniens cum febre continua, &c. Verum inflammatio crassa intestina frequentius infestat, quæ multa carne prædita sunt, ut rectum, unde inanis desidendi cupiditas, &c.

Tertiò obnoxia sunt intestina morbis in numero præcipuè aucto, ut vermibus, deinde calculis, ut jam dictum est,

Lumbrici.

Lumbrici autem sive vermes in compluribus partibus corporis gignuntur, sæpè in ulceribus fordidis proveniunt, sed nuspiam plures & frequentiores, quàm in intestinis. Considerantur diversimodii nonnunquam ut symptomata vitiatæ concoctionis, vel in genere excretorum & retentorum præternaturam; nonnunquam, ut causæ morbificæ, quatenus intestina obstruunt, mordent, pravæ exhalationes suscitant, chylum absumunt, unde varii morbi: A Galeno aliisque compluribus gravioribus authoribus, ut morbi in numero aucto toto genere præternaturam. In numero aucto id, quod partem præ

præsentia sua disponit, speciei constitutionem ingreditur vicemque formæ gerit, ac causæ continentis rationem habet; quæ posita ponitur, sublata tollitur morbus.

Quare lumbrici sunt animalia toto genere præter naturam in intestinis genita ex crasso lento excrementitio humore putrescente à calore vivido; functiones intestinorum impediunt. Aristoteles 5. de Historia Ani. cap. 19. vermes qui in animalibus gignuntur ἐλμίνθες appellat, eorumque tria genera ponit, quorum unum est latorum, alterum rotundorum, quos Galenus 14. Methodi ἐλμίνθες propriè vocat; tertium parvorum rotundorumque in extremitate crassi intestini, qui ἀσκαρίδες nominantur. Deinde subjungit latos illos vermes, qui intestinis adhærescunt, parere quid simile cucumeris seminibus; quo indicio medici id genus lumbrici esse intelligunt; unde nonnulli existimarunt latos longosque illos gignere vermes parvos latosque, quos à similitudine cucurbitinos nominarunt. Verùm Fernelius aliique non pauci, longos latosque non parere; sed ex parvis illis cucurbitinis unitis aut mira serie inter se coherentibus longum latumque verum fasciæ instar oriri, & interdum tam longè se extendere, ut per omnia præcipuè crassiora intestina extendatur.

Locus generationis vermium, ut demonstrat Aristoteles, non est ventriculus, ubi viget ciborum concoctio; licet à ventriculo interdum sursum repant; sed intestina ubi sit segregatio: verum rotundi in tenuibus intestinis magis gignuntur, unde in ventriculum ascendunt; Ascarides in recto intestino: Lati longique in utrisque intestinis, sed præcipuè crassis interdum in cæco & cellolis coli.

Definitio
lumbrici.

Differentia

Locus generationis.

Mare-

*Causa ver-
mium.*

Materia ex qua generantur, non est biliosa aut melancholica (nam amara & acrida vermes necant) sed humor pituitosus, crassus lentus & excrementitius, qui dum a natura non regitur ob humiditatem facile putrescit. Suppeditant hanc materiam cruditates, crapula, nimia satietas, cibi qui facile putrescunt, succumque crassum, lentum gignant, ut caseus, lac, legumina, fructus horarii, dulcesque, &c. Causa efficiens non est simplex putredo humoris excrementitii, ubi externo calore humidum substantificum in quo consistit calor connatus dissolvitur, & cum suo calore evocatur; sed in putrefactione, vivifica quædam ἀπόκρισις. Nam dum humor putrescit, & calor natus in exitu est, ne deserto proprio subiecto planè intereat, superveniente vi quadam plastica & vivifica, quicquid benignioris materiæ adhuc superest, segregat, & ad novam generationem promover, ac pro qualitate & quantitate materiæ novum animal efformat. Materia autem illa si fuerit pituita mucilaginosa intestina obliens, oriuntur *κεφάλαια* sive longi latique lumbrici; si fuerit in recto intestino vermiculi iis similes, qui in caseo putrido conspiciuntur, & quia assidue ferè rectum intestinum pungunt & irritant, ἀσκαρίδες vocantur: sin materia crassa viscida, putrescens collecta fuerit in cavitate intestinorum præcipuè tenuium, oriuntur vermes rotundi longitudine ut plurimum unius, raro duorum aut trium palmorum. Hi sæpè ad ventriculum ascendunt, & à ventriculo ad os sursum & nares interdum repunt & profluant, puerosque præcipuè infestant. Paulus & Aetius latos lumbricos fieri volunt ex permutatione pelliculæ intrinsecus intestinis adnatæ in corpus quoddam vivum, sed per membranam illam adnatam non videntur intelligere propriam tunicam intesti-

testi.

testinorum, quæ ad vermium generationem planè inepta est, & lethalia symptomata induceret, sed humorem oblinentem intestina, membrarum ritu. Quò autem materia magis corrupta vitiosaque est, eò deteriores censentur. Præterea nascuntur vermes & in febribus & citra febres, differentes multitudine, magnitudine, calore, & temporibus morborum. Nam qui nascuntur in initis morborum substantiam capiunt ex subiecta corruptione; circa statum ex malitia morbi, in declinatione ex permutatione morbi in melius, naturâ illos cum reliquis excrementis propellente, quod bonum indicium est: meliores censentur, minores, maioribus, pauci, multis, albi, rubris. Vermes ubi excitantur, varia gravissimaque symptomata excitant, quieti nullam conspiciam læsionem afferunt.

Symptomata vermium sunt somnus inquietus cum saltu, tremore, dentium stridore, deinde pruritus narium, sicca tussis, pallor faciei, ventris distentio ad instar hydropicorum cum inurmure, tensione, erosione potissimum tempore inediæ, interdum fluxus alvi, vertigines, anhelitus foetidus, &c. Peculiariter latotum vermium symptomata sunt, in expellibilis ciborum appetentia, gracilitas corporis & atrophia, cum excrementis excernuntur nonnulla semini cucurbitæ similia. Rotundorum morsus vehemens ventris, tussicula valdè sicca frequensque, febris inordinata cum extremorum perfrictione, ubi in ventriculum ascendunt cardialgia, singultus, nausea, vomitus, exconversio cordis, syncope cardiaca, &c. Ex con sensu cerebri vertigines, epilepsia, tremores, deliria, & dum dormiunt sæpè exiliunt cum clamore ac mox in somnum feruntur, &c. Ascaridum proprium est pruritus podicis molestissimus cum gravitate in dorso, stercoreis graveolentia, &c.

Symptomata vermium.

Quarto

XI.

*Morbi in-
testinorum
in situ.*

ἐν περὶ κήλη.

βιβωνο-

κήλη.

ἰξόμφαλοι.

Vulnera

*Vlcera in-
testinorum.*

Quartò laborant intestina quandoque morbo in consensu & situ, quando è suo loco exeunt, rupto aut laxato peritoneo, & vel in scrotum prolabuntur, unde ἐν περὶ κήλη vel ad inguina, unde βιβωνοκήλη; vel disrupto peritoneo circa umbilicum sub cutem prorumpunt, quod mulieribus nonnumquam in difficili partu contingit, &c.

Tandem morbi communes intestinorum sunt vulnera, deinde ulcera genita, vel ex abscessu intestinorum disrupto vel ex materia acris mordaci, quæ vel statim erodit vel primùm detergendo exasperat, deinde sensim exulcerat: cujus generis sunt interdum acris alimenta, sed præcipuè medicamenta valide detergentia, & purgantia, ut colocynthis, scammonium, &c. Item affluxus bilis flavæ vitellinæ atræ salis, aut pituitæ aut humoris corrupti, acrisque, &c. Ex ulcere intestinorum oritur dysenteria & tenesmus.

*Morbi per
consensum.*

Hi sunt propriè intestinorum morbi cum intestinis coheret anus, de cujus affectibus paulò post dicitur. Per consensum læditur functio intestinorum, ubi vim sentiendi per nervos sexti paris non accipiunt, vel bilem (qua ad excretionem irritantur) à vesicula fellis; aut ventriculus graviter affectus est; vel septum transversum musculique abdominis ad excrementa detrudenda non concurrant, &c.

*Differentia
colica, &
iliaca.*

Restat nunc ut causas symptomatum intestinorum in specie consideremus initio factò à colica & iliaca. Utraque passio propriè dolores sunt intestinorum, sed differunt parte affecta, modo doloris, & symptomatum. Nam ἐν colica dolor est tenuium intestinorum & potiss. ilei: Colica, crassorum, potissimum coli. Deinde dolores Ilici multò periculosiores sunt colicis: Præterea in colica non ita frequens vomitus est, nec fœdus, pravusque, ut in iliaca, à qua depravatur & attractrix & expultrix, unde

unde ob violentum morum intestinorum versus superiora, magnamque angustiam, nihil per inferiora descendit, aut multo minus multoque difficilius, quam in Colica.

Est autem Colica propriè dolor intestinorum crassorum, proveniens à causa dolorifica. Causa autem dolorifica, est intemperies & continui solutio; verum à nuda intemperie colica fieri non videtur, sed potius à continui solutione, aut intemperie cū materia replente, distendente, mordente, &c. Causa verò continuum solvens juxta Paulum quadruplex est, una crassus pituitosus humor intra tunicas intestini, coli receptus, eas distendens, divellens, unde dolor terebrans, gravans cum vomitu interdum pituitoso. 2. crassus flatulentusque spiritus, impactus exitum non habens, unde dolor tensivus, errabundus sine gravitate. 3. Inflammatio intestini, unde omnium gravissima colicæ species, quæ in ileum transitionem minatur, quæ dignoscitur dolore pulsante, suppressione urinæ & fecum, febre acuta, sit nausea, vomitu bilis, quæ agrum non levant. 4. Acres humores & mordaces, intestina erodentes; unde dolor pungens, sitis, ardor, febris, biliosa dejectiones, &c. Huc refertur Colica ex assumpto veneno aut medicamento acri, ut Scammonio, Colocynthide, &c. Additur his 4. speciebus, obstructio à fecibus duris, aut à copia viscosæ materiæ, ut pituitæ vitreæ unde dolor gravans & distendens. Accidunt ventri dolores colico consimiles ex flatulento spiritu vel acris humoribus peritoneo, & membranis conclusis, sæpè post febres, materia per crisi imperfectam eo translata, qui nullis medicamentis assumptis aut injectis expurgatur nec ut colici dolores fomentis digerentibus, & Anodynis mitigantur. Ejusmodi tormina & dolores, sicca hydrops consequi solet. II. Aph. 4.

*Colica
causæ &
differentiæ.*

*Colica
Notha.*

Elia

XI.

*Passionis**Iliaca**causa.*

Είλεος Latinis Volvulus nomen habet ab Ileo intestino, aut quia accidit cum dolore, tormi-
nibus, vomitu & tumore ventris ad similitudinem
chordæ involutæ, unde χορδάψος vocatur. Vo-
mitus autem tam fœdus & vehemens est, ut non-
nulli in fine stercus & clysteres per superiora reji-
ciant. Est autem Είλεος dolor intestinorum cū vehe-
menti fœdoque vomitu & tumore ventris ad si-
militudinem chordæ involutæ procedens affectu
dolorifico intestina ad expellendum irritante quæ
cum deorsum movere nequeant contractione fi-
brarum versus superiora humores & excrementa
contenta retrudere, aut sursum violenter propellere
coguntur. Contractis, verò fibris intestinorum ver-
sus superiora, partes quò ano propriiores sunt magis
coarctantur, unde morituris aut in gravi Ileo podex
irrastrictus est, ut neque specilli extremum suscipe-
re possit. Pars affecta sunt plerumque intestina
tenuia, præcipuè Ileum, unde nomen mutuatur a-
liquando crassa etiam intestina. Causa dolorum
excitans & expultricem intestinorum stimulans est
affectio dolorifica, ut morsus, erosio, distentio, &c.
Deorsum verò expultrix movere non valet, quia
pars dolens, pondus & acrimoniam humorum, aut
excrementorum præterlabentium non sustinet, aut
quia viæ ad anum obstructæ sunt, quare facultas ir-
ritata per contractionem fibrarum versus superiora
motu peristaltico sursum primum noxia protrudit,
deinde ob violentiam motus quæcunque intestinis
continentur. Plerumque ileos fit ob inflammati-
onem tenuis intestini ex contusione, plaga, vulnere,
acervata portione frigida, sudate adhuc corpore, &c.
Deinde ab intestino in scrotum cum stercore devo-
luto, indeque violenter retruso ut inflammetur. Præ-
terea à veneni portione aut acribus & corruptis hu-
mori-

inoribus in tenuibus intestinis, ob feces induratas in crassis, & circa tenuia impactas, unde durities admota manu percipitur. Oriuntur corrupti humores ex continua ciborum corruptione, præcipuè si accipiantur multi varique & pingues, ad quos non consuevimus, &c. Familiaris affectio pueris est: senes si in eam incidant, ferè nunquam convalescunt, Multi ex dolore initio intereunt, aliquibus inflammatio suppuratur, & intestinum putrescit, eoque modo pereunt. Initio est dolor circumvolutus, stomachi exolutio, ructus inanes; nihil allevantes, cohibitio fecum, & flatuum, si augeatur affectio, omnia sursum feruntur primùm pituita & bilis cum spirandi difficultate, tandem feces vomitu rejiciuntur, anus astrictus est, lotium supprimitur, syncope sublequitur.

Quemadmodum ea, quæ ventriculum continent & ad superius os vergunt, vomitus per superiora: ita quæ ad πύλωγον descendunt, & in intestinis continentur, dejectio alvi per inferiora expurgat. Verùm dejectio magis naturalis evacuatio est, & citra dejectionem nemo vitam transigere potest. Symptomata autem dejectionis sunt, ut diximus, *alvi suppressio, & profluvium*. Considerantur autem in dejectione primò tempus, an citò aut tardè: deinde modus excernendi, an rarò aut frequenter, an assiduè aut cum longa intermissione: tertio quantitas dejectionis, an pauca aut copiosa: tandem qualitas & substantia illius, quod excernitur, an utile vel inutile. Dejectiones tardæ, raræ, paucae, & cum longa intermissione, sub alvi astrictione: citæ, copiosæ, frequentes, assiduæ, & cum utile excernitur, sub alvi profluvio.

Peculiariter citæ dejectionis, quæ debitum tempus anticipat, causæ sunt assumptorum copia, supra ventriculi vel capacitatem vel vires, vel utramque.

Symptomata Dejectionis alvi.

Causa citæ dejectionis.

*Causa de
iectionis
tarda.*

que, ipsum ventriculum gravans, & ad expulsionem excitans: deinde punctio & morsus ab acris ali-
mentis vel excrementis: item irritatio à re aliena
minusque familiari: Præterea assumptio alimen-
torum promptè delabentium per intestina, scilicet
humidorum, graviumque, levi ambulatione subse-
quente, cum epultricis robore.

Tardæ deiectiones à contrariis causis fiunt:
verùm cum ad alvi deiectionem quatuor requisita
sint: 1. ut excrementa qualitate, & copia expultri-
cem stimulent. 2. ut stimulus ille sentiat. 3. ut
expultrix intestinorum ad feces expellendas insurgat.
4. ut concurrat motus musculorum, cum abdomi-
nis tum pectoris: quorum unum si desideretur, tar-
dior sit deiectio, quàm pro naturæ modo: Igitur 4.
erunt causæ tardæ deiectionis, una in excrementis,
quia pauca sunt parum gravantia expultricem, ex ci-
bis paucis, minimeque excrementosis, aut quia per se
acria & mordacia non sunt, aut quia stimulus, bilis
flava, à vesicula felle ad intestina non descendit quod
ictericis evenit: deinde tardæ deiectiones fiunt, quia
intestina non sentiunt stimulum; vel propter obtu-
sum sensum ex medicamentis stupefacientibus; aut
in morbis soporiferis; aut propter longam fecum re-
tentionem; aut quia spiritus abducuntur gravissimis
cogitationibus, aut vis sopita iacet somno, otio, &c.
aut quia vehementior stimulus antecessit scilicet
magna purgatio, acrius enema, &c. Tertiò fiunt e-
tiam, tardæ deiectiones potissimè quia intestina ad ex-
pulsionem non insurgunt, facultate expultrice inte-
stinorum valde debilitata, intemperie frigida sicca,
vel impedita angustia viarum, nimirum obstructio-
ne à fecibus duris, aut excrementis crassis, lentisque
adherentibus, constipatione, compressione, aut
tumoribus intestinorum, aut vicinarum partium,
item

item refrigeratione recti intestini, musculos an coarctante: vel frustratâ facultate expultrice, quia excrementa non promptè delabuntur in intestina, ob ipsorum excrementorum duritiem, tenacitatem, præposterumque ciborum ordinem, scilicet quando astringentia humidis præmittuntur: deinde ob retentricis robur: nam excrementa diutius retenta, sicciora redduntur, & ad excretionem minus sunt apta: Præterea ob immodicam vim attractricis jecoris & venarum, ob caliditatem, & violentas motiones corporis: raudem ob nimiam evacuationem per urinas, & per sudores, aut quia per habitum corporis excrementa nimium distribuuntur, & exhalant ob caliditatem & raritatem cutis & habitus corporis, unde Hipp. 6. Epid. cutis raritas, ventris densitas. Ultima causa tardæ dejectionis est, quia muscoli abdominis & pectoris expulsiorem naturalem non adjuvant, aut quia debiles sunt, ex longo morbo, aut evacuatione, aut quia vis non influit a cerebro, ut in apoplecticis: aut quia in ipsis, aut subjunctis partibus est inflammatio, aut alius affectus dolorificus.

Paucæ & copiosæ dejectiones in comparatione ad ipsa assumpta alimenta dicuntur. Nam paucæ vocantur, quæ minores sunt, quàm pro multitudine assumptorum: copiosæ, contra. Paucæ dejectionis causa præcipua est vehemens distributio & digestio alimenti in corpus: qua non solum excrementa sicciora redduntur, sed etiam pauciora, quàm pro alimentorum copiâ. Huic adde alimenta paucæ, parumque excrementosa. Excitant vehementem digestionem & distributionem immodici labores, exercitia, immodica perspiratio, nimiaque corporis raritas & similia.

Copiosæ dejectionis duæ sunt causæ: una defectus digestionis & distributionis alimenti in corpus.

Ec 2

pus:

pus: altera confluxus humorum à supernis partibus in ventrem. Deficit autem digestio alimenti in corpus ab omnibus causis à quibus perspiratio, & venarum suctus impeditur. Confluunt verò excrementa à supernis partibus jecore, cerebro, &c. in ventrem, propter facultatis retentricis imbecillitatem, vel expultricis validum motum: item ob alimenti excrementosi copiam.

Causa assidua dejectionum.

Assidua dejectionis causæ tres potissimum sunt: 1. Imbecillitas retentricis ventriculi & intestinorum. 2. facultas expultrix intestinorum præter naturam irritata. 3. Resolutio musculorum sedis. Retentricis imbecillitas ex intemperie frigida humida potissimum oritur. Expultrix irritatur duobus modis: primum propter vehementem ventriculi & intestinorum sensum, sive naturalem, sive præter naturam ex ulcere: deinde propter punctiorem & morsum à rebus acris, mordacibus, contentis in ventriculo. Ea contenta vel sunt alimenta, in ventriculo corrupta vel acris medicamenta, vel excrementa genita in ipsis intestinis, aut ex toto corpore, aut ex parte aliqua, ut infra apparebit. Dejiciuntur naturaliter per alvum excrementa primæ concoctionis, nimirum feces, cum parte illa excrementorum secundæ concoctionis, quæ ad ventrem relegatur: præter naturam, læta retentice facultate intestinorum alimenta & humores crudi, aut corrupti per se, vel cum naturalibus excrementis & flatibus. Oriuntur autem hi humores vitio intestinorum, ventriculi, jecoris, lienis, aut totius corporis: unde diarrhæa, lienteria, cœliaca, dysenteria, Temelismus, &c.

Profluviū alvi eius- què differtentia.

Ac primum diarrhæa pro omni profluvio alvi communiter sumitur. Est autem profluvium alvi celer materiæ liquidæ per alvum exitus, propter depravatam expultricem aut retentricem intestinorum.

gū. Materia illa aut est cibus, unde lienteria & celiaca: aut chylus, unde fluxus chylosus: aut feces, unde fluxus stercoralis: aut sanguis simplex, vel cum pure, unde dysenteria: aut aliquid de substantia partium per colliquationem, unde fluxus colliquativus; aut humores excrementitii, nimirum biliosi, melancholici, pituitosi, sinceri aut corrupti, unde diarrhæa propriissime dicta.

Quare diarrhæa propriè erit frequens alvi dejectionio humorum excrementitiorum, proveniens à debilitate retentricis, aut expultrice irritata copiâ, aut qualitate humoris defluentis in alvum. Causa autem prima fluxus alvi est, aut natura sola, aut natura irritata & coacta violenter à morbo: unde communitur diarrhæa, alia naturæ opus dicitur, alia symptomatica, opus morbi. In illa talia evacuantur, qualia evacuari oportet, id est, humores cocti & superati à natura, cum tolerantia & conferentia: In hac non evacuantur qualia oportet, sed cruda, vitiosaque, cum molestia, perturbatione, viriumque dejectione. Sub illa continetur non solum critica fluxio in ægris, à natura vincente morbum, sed etiam spontaneæ evacuationes in sanis, naturâ sese exonerante à superfluis humoribus. In symptomatica diarrhæa propriissime dicta læditur vis expultrix aut retentrix intestinorum per se, aut vitio humorum pravorum affluentium: Et in ea considerantur primum materia ipsa quæ fluit, deinde pars mandans, à qua descendit ad intestina. Materia autem potissimum sunt humores excrementitii, biliosi, melancholici, aut pituitosi, aliquando corrupti, aut maligna qualitate affecti: unde diarrhæa alia biliosa, melancholica, pituitosa, &c. Defluunt verò humores ad intestina aliquando à ventriculo, ex corruptione ciborum, interdum à toto corpore. quod non solum in crisis febrium

acutarum evenit, sed etiam in epidemicis diarrhæis: plerumque à parte aliqua peculiari, ut à capite, unde fluxus catarrhalis & pituitosus; vel à iecore, & vesicula felle, unde diarrhæa biliosa: vel à liene, unde diarrhæa melancholica. Sub diarrhæa continetur à nonnullis profluvium alvi stercorale, à redundantia excrementorum, aut cibis excrementitiis, & corruptis in ventriculo: deinde fluxus alvi colli-

Diarrhæa.
συντηλην. quativus, quæ diarrhæa *συντηλην* dicitur, orta ex colliquatione substantiæ corporis & humorum in venis, à valida intemperie solidarum partium calida, cum debilitate retentricis, qualis accidit in hectica, & pestilentialibus febribus, ubi materia pinguis, quasi adipe perfusa, per alvum deicitur. Deinde lienteria & cæliaca: affectiones sunt stomachicæ: verum lienteria duplex est: una legitima,

Lienteria. altera notha, sub qua continetur cæliaca & fluxus chylosus. Lienteria propriè nomen habet à levitate intestinorum, verum fluxus iste à sola levitate non fit, sed quia ventriculus non continet cibos concoquendos, unde non transmutati deiciuntur: Proinde erit lienteria propriè dicta celer ciborum non transmutatorum per alvum transitus, orta à facultate retentricæ ventriculi abolitâ. Causa præcipua est abolita functio retentricis, cibos non retinentis & complectentis, cuius ratione impeditur concoctio. Non complectitur ventriculus cibos, læsa retentrice per se intemperie frigida, humida, plerumque cum materia pituitosa in ventriculo genitâ, vel à cerebro transmissa, ventriculum relaxante, aliquando per accidens, expultrice ventriculi depravatâ, atque ita irritatâ, ut statim cibos assumptos deorsum propellat. Irritatur expultrix ulcere ventriculi & tenuium intestinorum: interdum à mordacibus humoribus in ventriculo; aut à maligna

igna qualitate ventriculum afficiente, ex veneno assumpto, aut putredine humorum. Addit Paulus & Aërius tertiam causam, scilicet cicatricem intestinorum tenuium post dysenteriae curationem, unde non vera lienteria, sed fluxus tantum chylosus.

Celiaca à lienteria magnitudine differre videtur, levior enim est affectio, à leviori causa, in qua deiciuntur humida excrementa, alimenta aliquomodo transmutata, ventriculo ob imbecillitatem retentricis non perfecte concoquente: Quare *Celiaca* erit celiaca assumptorum aliquomodo transmutatorum per alvum transitus, proveniens ex debilitate retentricis ventriculi. Debilitatur retentrix ab iisdem causis, ut in lienteria, sed levioribus. Fernellius profluvium chyli celiacam vocat, quod non vitio ventriculi, sed intestinorum tenuium potissimum evenit, aut ob cicatricem relictam post dysenteriae curationem, aut impedita chyli distributione propter obstructionem venarum mesaraicarum, & debilitatem attractricis venarum. *Fluxus chylosus.*

Dysenteria communiter pro omni sanguino. *Dysenteria* lenro fluxu alvi sumitur, sanguinolentus autem fluxus triplex est: unus ab ulceratione intestinorum, *communis* quæ dysenteria vera dicitur: cæteri tres fluxus hepatici sunt & dysenteriae nothæ. *Dysenteria* Dysenteria autem proprie dicitur, proprie est dejectio truenta cum torminibus ventris, *fla.* orta ab exulceratione intestinorum. Exulcerantur intestina, ut supra dictum est, præcipue à materia acerbabridente & erodente, qualis primum est bilis flava, vitellina adusta, pituita salsa melancholica potissimum adusta, item humores corrupti aut prava qualitate inquinati aliquando à contagio, unde dysenteria Epidemica. Hi humores vel in ventriculo & intestinis gignuntur ex corruptione ciborum, sæpè ab aliis partibus transmittuntur, ut biliosi humores, à iecore & vesicula felleis, melancholici à liene; pituita

*Differentia
dysenteria.*

salsa à capite ex catarrho; interdum à toto corpore, omnibusque venis, ut in febribus malignis, &c. Ab his humoribus abraditur primum pinguedo intestinis adnata, undè exiguus sanguis exit; deinde superficies; tandem interiorem substantiam tunicæ invadit. Præterea exulcerantur intestina à medicamentis vehementer detergentibus, & purgantibus assumptis, vel clystere injectis qualia sunt colocynthis, elaterium, &c. ac ab alimentis acris & corruptis. Differentiæ dysenteria sumuntur à parte affecta, & magnitudine exulcerationis. Pertinet dysenteria propriissime dicta ad omnia intestina supra rectum: tenesmus ad rectum tantum. Proinde in dysenteria exulceratio, aut est in intestinis tenuibus, & tum cruor cum excrementis perfecte miscetur: aut in crassis intestinis est, præcipue in colo, & tum cruor & feces seorsum descendunt. Deinde pro magnitudine exulcerationis dysenteria tres gradus assignantur 1. quando exulceratio in superficie tantum intestinorum incipit, & pinguià exiguo admodum cruore perfusa dejiciuntur: 2. quando abrasio altius nonnihil penetrat, ac fibræ ac ramenta cum copiosiori sanguine exeunt. 3. Quando frustula substantiæ carnosæ intestinorum, vi ulceris depascentis, egeruntur.

tenesmus.

Tenesmus & dysenteria ab eodem affectu oriuntur, scilicet ab ulcere intestinorum: Differunt tamen sede affecta, ut supra dictum est: Deinde quòd dysenteria sit fluxus alyi, cum ventris torminibus, & à materia magis tenui & acris: Tenesmus egerendi cupiditas cum tensione & pondere recti intestini, quâ tamen præter mucosum & subcruentum nihil magnopere excernitur, orta ex ulcere recti intestini, à materia magis crassa, lenta, quæ difficulter excernitur & plurimum irritat.

Discernitur vera dysenteria à cæteris cruentis

tis dejectionibus, quod excretiones minutim & crebro fiant, aliàs veri sanguinis, aliàs grumosi cum pinguedine, pure, fibris, aut ramentis intestinorum, semperque cum torminibus sive vehementi dolore ventris. Nam in aliis cruentis dejectionibus confertim per longiora intervalla multus sanguis sine torminibus & abrasionibus perfunditur; Has omnes Medici dysenterias nothas vocant, & communi nomine hepaticos fluxus: Nam magna copia sanguinis per alvum rejecta ab epate promanat. Igitur sub dysenteria notha continetur hepatica fluxio propriissimè dicta, & cruenta dejectio propter magnam sanguinis copiam: hi fluxus ad jecur se habent, ut vomitus ad ventriculum, quia per easdem vias sanguis regurgitat, nude susceptus est.

In dysenteria notha dejectio est, vel sanguinis sincerioris rubentis, vel nigrioris quam splendentis, vel tenuioris & aquosi: Quare tres erunt species dysenteriarum notharum. Una excretio sanguinis sincerioris rubentis, vi & providentia naturæ separantis id, quod superfluum est: Nam natura robore virtutis expultricis sanguinem aliis per hæmorrhoidas; aliis per nares, mulieribus per uterum evacuat. His consuetis evacuationibus suppressis, deinde plethoricis, intermissis exercitiis, ac quoque iis, quibus membrum aliquod insigne mutilatum est, per circuitus dejectiones sanguinis per alvum contingere solent, precipuè verò ob redundantiam tantam sanguinis, gravantis hepar & vasa: Profunditur sæpè sanguinis apertis internis hæmorrhoidibus, sed sanguis ille ita copiosus non est, nec cum excrementis permiscetur.

Deinde fluxus hepaticus propriè dictus est dejectio alvi cruenta, orta à facultate expultrice depravata aut attractrice & retentrica debilitata, cujus duæ species numerantur: una dejectio sanguinis

Cc s nigrio.

*Quomodo
distinguitur
vera dysen-
teria a no-
tha.*

*Notha dysenteria
tres species,
1. Fluxus
sanguinis
purioris.*

Fluxus hepaticus duplex.

XI.

2. Fluxus
sanguinis
nigr. oru.

3. Fluxus
sanguinis.
à debilita
te iecoris.

nigrioris & splendentis, expultricem jecoris stimu-
lantis, qui ita quodammodo ad jecur se habet, sicut
fluxus chylosus ad ventriculum: oritur itaque talis
dejectio, quia sanguis in jecore post sufficientem
delectationem non distributus perassatur, aut pu-
trefcit, perassatus sanguis jecur mordens, gravans-
que vi expultricis jecoris & venarum, ad intestina
detruditur.

Altera species hepatici fluxus est deiectionis san-
guinis aquosi, ad formam loturæ carnis recens ma-
etatae, orta ab insigni intemperie substantiæ iecoris,
vires eius labefactante & debilitante: hæc affectio
ita se habet ad jecur, sicut stomachica affectio aut
cæliaca ad ventriculum. Debilitatur autem inter-
dum attractrix, & tunc deiectiones magis chylosæ
sunt, aliquando retentrix, quando chylus per venas
attractus à iecore iusto tempore non retinetur, nec
à vena cava attrahitur, sed ante perfectam conco-
ctionem sanguis nondum elaboratus per easdem
vias, undè chylus susceptus est, ad intestina delabi-
tur, aut ab expultrice irritata vitio retentricis pro-
pellitur. Oritur imbecillitas alteratricis iecoris a
quavis intemperie valida, vim & robur substantiæ
iecoris labefactante, primariò ab intemperie frigi-
dâ humidâ, quæ suâ naturâ alteratricem debilitat,
crudumque sanguinem gignit, undè assiduæ deiectiones
ad similitudinem loturæ carnis recens ma-
etatae, sine siti, morfu & dolore ventris: Deinde, ab
intemperie calida cum putredine humorum, fæbri-
que lentâ; aut à iecoris inflammatione, substantiam
eius debilitante & colliquante, undè sanguis pri-
mum tenuis corruptus, hinc biliosus, acris, ali-
quando adustus gignitur, qui ad ventrem relegatus,
deiectiones cruentas tenues, biliosas, graviter olen-
tes, interdum melancholicas excitat, cum inappe-
tentia, siti, aliquando morfu ventris: dico intem-
periem

periem debilitantem iecur, quia hepate existente calidiore, excrementa fiunt dura, nisi addit ipsius visceris & retentricis debilitas. Complicantur interdum hi affectus, teste Galeno 5. de Locis affect. c. 7. aut sese mutuo consequuntur, & initio nonnunquam ob frigidam intemperiem, tenuis, crudusque sanguis excernitur; deinde tractu temporis, ex putrefactione, febris lenta oritur, unde sanguis melancholicus, tandemq; bilis atra, sincera deicitur.

Ad dysenteriam notham reduci poterit fluxus alvi purulentus sine torminibus, qualis accidit interdum in empyemate & suppuratione pectoris materia purulenta à pectore ad alvum transmissa, deinde ex abscessu ventriculi, iecoris, lienis & etiam mesenterii.

Fluxus alvi purulentus.

In mesenterium eiusque glandulas humores ex venis confluentes, varios tumores excitare solent; qui dolore vacant, quod pars sensu careat, & tam altè sepulti sunt, ut non nisi pressu animadvertantur: Ex humore autem frigido, initio mollis laxusq; tumor oritur, qui progressu temporis in scirrhum induratur.

Ex humore calido inflammatio, quæ ex febricula lenta, siti cum gravitate deprehenditur; ac in abscessum plerumq; terminatur, ex quo primum sanies rubra, hinc pus album per venas ad intestina relegatur, magnaue copia sine torminibus per alvum evacuat. De causis flatuum & symptomatibus flatuum retentionem & expulsionem consequentibus supra dictum est.

Terminantur intestina in ano, per quem excrementa deiciuntur, ideò de ani vitis hic quoque dicemus. Componitur anus ex intestini extrema parte; deinde tribus musculis quorum duo ingefendi conatu anum foras impellunt in propriam sedem.

De Ani vitis.

X I.

sedem retrahunt, tertius σφιγκτηρ exitum intesti-
ni claudit, ad tempus opportunum nobis desidendi,
ne feces nobis invitis exeant: His adduntur venæ du-
plices, interiores à ramo splenico venæ portæ, exte-
riorēs à vena cava, quibus permiscuntur nonnulli ra-
muli à vena porta.

Symptoma-
ta Ani.

Officium ani est feces in intestinis pro libitu
continere & foras extrudere. Læditur igitur hæc
actio si nobis invitis quocunque tempore profluant,
ac anus procidat, ob resolutionem, vel foras extru-
di nequeant, ob convulsione[m], aut angustiam ani,
à tumore; vel difficulter cum dolore & molestia fe-
ces per anum exeant propter inflammationem, ul-
cus, rhagades, tubercula, ut condylomata, thymi-
ficus, hæmorrhoides cœcas, &c.

Resolutio
musculorū
ani.

Convulsio

Resolutio autem si accidat musculo clauden-
te anum, feces nobis invitis exeunt, si cæteris duo-
bus musculis, ani proeidentia oritur. Convulsio
verò sphincteris alvi dejectionem impedit; aliorum
duorum musculorum anum ita sursum retrahit, ut
in egerendi conatu foras impelli nequeat. Resolvun-
tur musculi ani aliquando ex affectu proprio scilicet
valida intemperie frigida humida cum materia pitui-
tosa, interdum per consensum affectis nervis, qui ad
musculos ani surculos mittunt.

Inflamma-
tio ani.

Inflammati[o] ani oritur ex influxu humoris
calidi, concitati à multa dura equitatione, & non
raro consequitur alios ani affectus, ut hæmorrhoi-
das clausas, rimas, &c. In his dolor acerbus est febris-
que, & alvus difficulter aut summo cū dolore deji-
tur, aut planè supprimitur, & ob vicinitatem vesica in
consensum trahitur; Inflammati[o] si ad suppuratio-
nem tendat, ulcus purulentum relinquitur, unde sæ-
pè fistula, quæ interdum rectum intestinum perfo-
rat, & ad vesicam penetrat.

Vlcus ani.

Sub

DE VITIIS ANI.

473 CAP.

XI.

Sub genere ulcerum continentur rhagades
fissuræ in extremitate ani. Nam ulcuscula sunt ob-
longa cum ardore & dolore orta ab humore ero-
dente aut siccante, aliquando à fecibus duris & pro-
pter condylomatum inflammationem, si partes cir-
cumflæ rumpantur.

Rhagades

Condylomata autem propriè sunt tubercula
rugarum ani ad similitudinem eminentiarum in ar-
ticulis, dum manus clauduntur, quæ κόνδυλοι vo-
cantur, orta à confluentibus vitiosis humoribus;
hæc tubercula interdum mollia sunt sine inflamma-
tione, aliquando dolorifica cum inflamma-
tione.

Condylomata.

Thymi verò sive mariscæ, sunt tubercula car-
nosa, oblonga quasi verrucæ, ad cutem tenuia supra
lata, subrubra, aspera, florem thymi referentia, unde
nomen sortiantur, quæ cum vulnerantur amplius,
quàm pro magnitudine sanguinem profundunt, ge-
nita à melancholico sanguine, cui aliquid acris hu-
moris permixtum est, aut ex melancholia adusta;
plerumque propter attritionem sedis, verum thymi
ali parvi simpliciter dicti, alii magni, qui ex simili-
tudine ficus propriè appellatur. Deinde thymi
benigni sunt nimirum carunculæ parvæ, asperæ al-
bicantis aut subrubri coloris sine dolore; alii mali-
gni quiduriotes, asperiores, majores sunt, coloris
subnigri aut liuidi cum dolore pungente, naturam
canceri referentes.

Thymi.

Tandem ratione venarum ani non solum ipse
anus vehementissimis doloribus tentatur; dum re-
pletæ distenduntur, inflammantur, aut exulceran-
tur, sed etiam vires omnes corporis enervantur varii-
que morbi frigidi oriuntur ex earum nimia apertio-
ne, quia immodica sanguinis copia profunditur.
Quæ omnes affectiones sub nomine hæmorrhoi-
dum continentur.

Ficini.

Nam

*Hæmor-
rhoides.*

*Differentia
hæmorrhoi-
dum.*

Nam communiter hæmorrhoides sunt fluxus sanguinis per venas ani, aut tumor in illis ex affluxu crassi sanguinis. Verum propriè hæmorrhoides sunt fluxus sanguinis ex apertione venarum; Pars affecta sunt venæ ani, quæ duplices sunt, ut diximus, exteriores à vena cava, interiores à ramo splenico venæ portæ, unde hæmorrhoides, aliæ externæ, quæ foris conspiciuntur; aliæ internæ, quæ intus latent.

Causa est vasorum apertio & intumescencia; quare hæmorrhoides aliæ apertæ sunt, quæ sanguinem fundunt, aliæ cœcæ, quæ tument, sæpeque dolent, ac nihil sanguinis emittunt. Fluxus sanguinis quidem est symptoma excretorum toto genere præter naturam, attamen hæc evacuatio sanguinis, quia in multis salutaris est, nimirum quando oportune fit, sive sponte à natura pervices jecur & venosum genus à melancholico sanguine, & plenitudine evacuat, cum tolerantia & conferentia; id oportum opus naturæ est, & non symptoma, ut fluxus menstruorum. Nam hoc modo natura multos morbos præsentis ex melancholia & plenitudine curat, & ab imminentibus tuetur: evacuant enim internæ hæmorrhoides melancholicum feculentum sanguinem à jecore, liene, venis mesaraicis, &c. Externæ verò sæpius plenitudinem totius corporis ex vena cava, unde sanguis magis purus coctusque exit, non raro melancholicum sanguinem à liene, &c. per exiguos ramulos venæ portæ, qui permiscuntur ramulis à vena cava derivatis. Quare qui assueti sunt his opportunis evacuationibus per hæmorrhoides, læduntur non solum si modum excedant, sed etiam si præter consuetudinem parcius fluant, & supprimantur aut intumescant. Igitur symptoma hæmorrhoidum sunt immodica sanguinis profusio, deinde præter consuetudinem suppressio,

par-

parciorque fluxus ac etiam in tumescencia, &c. In profluxu sanguinis tria considerantur, facultas fluxionem concitans, deinde materia profluens, tertio instrumenta, à quibus & per quæ fluunt. Quare causæ hæmorrhoidum erunt, vel in facultate præcipuè expultrice & retentrice, vel in sanguine, vel in instrumentis: itaque immoderati fluxus hæmorrhoidum causæ sunt, expultrix non modo venarum, sed etiam iecoris aliorumque viscerum vehementer irritata, aut retentrix debilitata, deinde sanguinis copia, tenuitas & acrimonia, tertio venarum laxitas, raritas, immodica apertio, erosio, disruptio. Nam sæpè iecur visceraque affecta, ad hæmorrhoides, venas maxime ignobiles, debilesque viciosos suos humores deponunt, potissimum si lienis tanta sit debilitas ut sæculentum sanguinem ad se non alliciat. Irritant autem violenter expultricem nimia sanguinis copia aut acrimonia, commotio humorum, usus medicamentorum acrum validè purgantium aut aperientium. Debilitatur retentrix venarum propter relaxationem orificiorum ab humectantibus, &c. vel erosionem ab acris humoribus aut ulcere ani, vel vulnus & plagam, &c. Accidit ut naturâ etiam invitâ sanguis effluat ob tenuitatem, quando serosus, aquosus aut biliosus est vasa rara laxaque. Ac contrariis causis fit hæmorrhoidum suppressio, nimirum à debilitate facultatis expultricis iecoris plerumque viscerum & venarum. Deinde sanguinis paucitate, crassitie, visciditate ac etiam aversione ad alias partes, ut ad nares, uterum, &c. tertio constipatione ac angustia orificiorum venarum ani, ab astringentibus, refrigerantibus, exsiccantibus &c. Propter angustiam autem non solum fluxus suppressitur, sed etiam ipsæ venæ dum à sanguine crasso impactæ dilatantur, in tumorem attolluntur, interdum cum inflammatione, unde cæcæ hæmorrhoides gignuntur.

DE

*De Causis laesæ sanguificationis & nutri-
tionis.*

CHyli utiliore partem, jecur per ramos venæ portæ à ventriculo tenuibusque intestinis exugit, & in sanguinem, alimentum toti commune transmutat. Est autem jecur sedes animæ vegetantis principium venarum, officina sanguinis. Nā in substantia valde eius sanguinea radicata est venæ portæ & cavæ, sanguinisque elaboratio. Ad sanguinis verò elaborationem & distributionem, quatuor ministrantibus facultatibus utitur. Nam per venas portæ chylum attrahit, & attractum tam diu continet, donec infra proprietate in perfectum sanguinem transmutaverit, quo tempore separato excremento bilioso ad vesiculam fells; melancholico ad lienem; purum sanguinem cum vesiculo sero in venam cavam detrudit, ubi à renibus percolatur.

*Vsus
Vesicula
fells.*

Lienis.

Quare ad actiones inculpatas perficiendas indiget jecur utili ministerio non solū venæ portæ, quæ chylum ab intestinis & ventriculo exugit & venæ cavæ, quæ sanguinem elaboratum in totum corpus distribuit, sed etiam vesiculæ fells, quæ excrementum biliosum allicit & ad duodenum intestinum expellit; lienis qui sanguinem feculentum attrahit, digerit, conficit, quod superfluum est, expellit, &c. Præcipuè autem functio jecoris est sanguificatio: Nam cæteræ gratia sanguificationis sunt, quibus legis sanguis sufficiens, aut comperens pro naturæ inodo non generatur.

Quare

Quare læditur sanguificatio non solum læsa CAP. XII.
 facultate alteratrice, sed etiam attractrice, retentri-
 ce, vel expultrice jecoris & venarum; singulæ ha- Sympto-
 rum functionum tripliciter læduntur, semperque mata ie-
 vitia secundæ concoctionis vitii primæ correspon- cori.
 dent, ut tertiæ vitii secundæ & à similibus causis fi-
 unt. Primum autem abolita sanguificatio, est ubi
 sanguis non generatur, aut loco sanguinis aquosus
 humor qualis in ascite, deinde diminuta quando Sympto-
 aut parum boni sanguinis gignitur, unde atrophia, mata al-
 aut qui generatur semicoctus est, qualis est in ca- teratrice.
 chexia, anasarca, fluxu hepatico à frigida causa &c.
 Tertiò depravata sanguificatio, ubi gignitur sanguis
 impurus, vitiosus, ut biliosus, melancholicus adu-
 ctus, &c. qui coacervatus circa viscera primasque
 venas, hypochondriacam affectionem, &c. in venis,
 cacoehymia varias species facit, unde cacotro-
 phia, &c.

Accidunt hæc eadem symptomata secundariò Sympt: al-
 vitio cæterarum trium facultatum, quæ alteratrici tractricis.
 ministrant. Læditur autem attractrix facultas &
 aëradosis, ubi jecur pro sanguinis generatione nihil
 per venas melaraicas attrahit, aut non justa quan-
 titate, unde facultas concoctrix frustrata nihil, vel
 parum sanguinis gignit: aut depravatè sive immo-
 dicè attrahit, ita ut humiditatem quoque fecum ex-
 ugat, ex qua gignitur sanguis vitiosus. Deinde facul-
 tas retentrix læditur, quando materiam attractam Retentri-
 non continet, aut non debito tempore, unde cis.
 sanguis crudus, aquosus, &c. qualis in fluxu hepa-
 tico, aut depravatè & ultra justum tempus ita ut
 aduratur, &c. Tandem expultrix læditur si bilio- Sympt: ex-
 sum aut melancholicum excrementum à sanguine pultrici.
 non secernat, sive vesicula fellis biliosum, lien me-
 lancholicum non suscipiat & attrahat, unde caco-
 chymia

CAP.
XII.Symptom:
nutritio-
nis.

chymia, icterus, &c. vel si sanguinem post concoctionem & sufficientem delectationem in venam cavam non detrudat, & vena cava non attrahat, quare in jecore ultra tempus permanens adurit, aut putrescit, deinde ad intestina sæpè propellitur ut in fluxu hepatico dictum est, Qui magnà debilitate jecoris laborant, hepatici vocantur.

Ob principatum læsiones jecoris toti corpori communicantur, vitio sanguinis nutritio quoque læditur, quæ omnium naturalium maximè necessaria est, cui cæteræ subserviunt. Sub nutritione comprehendimus nutrimenti appositionem sub halitus specie, deinde agglutinationem, tertio assimilationem, quæ reipsa à nutritione non differt.

Quare si una harum trium desideretur, læsa erit nutritio, veluti ubi parum, nihil sanguinis partibus apponitur & agglutinatur, atrophia oritur, quando sanguis appositus & agglutinatus non perfectè assimilatur, cacotrophia. Nam nutritio, quæ prorsus non fit, aut infra justum modum Atrophia; quæ depravatè & vitiose, cacotrophia appellatur, sub qua continetur vitiligo, Elephantiasis, scabies, &c.

Huc etiam referri poterunt omnes affectus, qui fiunt ab humore vitioso effuso in habitum corporis, qui aut sub vaporis specie non apponitur, aut non perfectè agglutinatur & assimilatur, ut cachexia, hydrops, icterus, &c. Nam excrementa & humores vitiosi collecti in venis pro sua qualitate cacochymiam gignunt, in corporis habitu varia symptomata & morbus excitant, veluti bilis flava non expurgata, sed effusa in habitum corporis icterum propriè dictum, in parte coacervata Erysipelas: melancholicus succus in habitum corporis effusus icterum nigrum, in parte scirrhum exquisitum, melancholia adusta in toto Elephantiasin, in parte cancerum

crum ulceraque canerosa; pituita naturalis in toto, Anasarcam, in parte œdema; pituita salsa scabiem, serosus humor in capacitate abdominis ascitem, in parte phlyctenas. Mixti humores inter se & cum sanguine mixtas affectiones producant.

Cause

Causa læsæ sanguificationis ac symptomatum *symptoms* omnium jecoris, est frustratio facultatis ex affectu *jecoris.* proprio, aut ab externo errore vitio chyli, vel quia destituitur utili ministerio venarum, lienis, vesiculæ *Morbi ie-* fellis, &c. Jecur omni terè morborum genere labo- *coris.* rare poterit, quorum præcipui sunt intemperies, quæ facultates in sua substantia labefactant. Deinde obstructions, tumores, ut inflammationes, scirrhi, abscessus, ac ulcera, quæ functiones propriè impediunt. Nam debilitas jecoris, à qua ægri hepatici propriè dicuntur, oritur ab intemperie citra tumorem continui solutionem, aliuvè manifestum affectum: hepatica verò affectio ita ad jecur se habet, ut stomachica & cæliaca ad ventriculum.

Intemperies autem jecoris est simplex vel compo- *Intempe-* sita sine vel cum humore intemperiem fovente, ali- *ries.* quando cū vapore, simplex sola diu non subsistit nec sine materia. Verùm non omnis intemperies jecoris hepaticos efficit, sed quæ harmoniam & naturalem temperiæ substantiæ hepatis dissolvit. Quare intemperies aliæ jecur & humores contentos pro sua qualitate tantum alterant, aliæ simul harmoniā substantiæ ejusdem dissolvunt: Illa si calida fuerit, calidos adustos humores gignit, inapetentiam ciborum, sitim, febres, vomitus biliosos, extremorum calorem, &c. efficit frigida contraria nempe pituitosum crudumque sanguinem, &c. In sicca intemperie humores & excrementa sicciora redduntur, corpus aridum ægriq; magis sitiunt, &c. In humida contraria, &c.

Intemperies istæ si invaluerint & harmoniam *Debilitas* substantiæ siue naturalem ejus temperiem dissol- *jecoris.*

D d 2

vere

CAP.
XII.

verè cœperint, imbecillitas hepatis, sive hepatica affectio oritur. Est autem imbecillitas hepatis defectus in propriis ipsius functionibus proveniens à quavis insigni intemperie naturalem substantiæ jecoris temperiem labefactante & dissolvente: Causa proxima est insignis intemperis substantiæ jecoris. Nam ut naturalis temperies robor substantiæ & vires integras conservat, ita intemperies illam naturalem temperiem corrumpens, imbecillitatem virium efficit. Intemperies ista est cujuscunque generis maximè in qualitatibus activis & frequentius cum pravo humore aut tetto vapore substantiam jecoris contaminante.

*Debilitatis
omnium &
singularum
facultatum
causa.*

Facultates jecoris propriæ sunt quatuor, ut diximus, quæ si maximus sit recessus à naturali statu, ita ut proportio temperamenti destruat, & amittatur, omnes ex æquo debilitantur, sin tantus non sit pro varia transmutatione intemperie, una facultas magis labefactatur, & nunc concoctrix, nunc attractrix, aut retentrix, aliquando expultrix. Attractrix autem si debili sit, jecur per venas meseraicas parum, aut nihil chyli attrahit, & alvus liquida chylosa dejicit, nullo existente vitio in ventriculo & intestinis, aut obstructione in venis portæ: ubi retentrix infirma est per alvum quandoque aquosus sanguis aut liquida lotura carnis recens mactatæ similia rejiciuntur, in progressu sæpè sanguis liquidus spontè exit per nares, uterum, hæmorrhoides, spura, interdum ex venis in extrema cute. Excretrix si infirma sit, excrementitios humores à sanguine non secernit, ut dictum est, unde cachexia, &c,

*Debilitas
alteratri-
cis.*

Sin alteratrix vis languet, & ob intemperiem in concoquendo aberrat, cruditates corruptiones quæ sunt, & irritata expultrice, initio sanguinolenta, tenuia & diluta dejiciuntur, deinde crassiora, color

lor naturalis mutatur, pedes intumescunt, &c. Ab intemperie calida colliquationes fiunt primum humorum, deinde carnis ipsius jecoris, ex qua initio tenuia biliosa acria, post foetida, crassa satis colorata, aliquando nigra dejiciuntur, febris intensa adest, vomitus sæpè biliosus, virulentus, color faciei & corporis flavus est, urina rufa, pulsus celer, sitis, inappetentia ciborum, &c. Ab intemperie frigida dejectiones, nec ita multæ, nec assiduæ fiunt, ut in calida & sæpè alvus cum suppressa videtur repente copiosa profundit, initio liquida aquosa, deindè varii colores, interdum crassa quasi fecem sanguinis, sed nec acria, nec graviter olètia, nisi jam humor putrescere cœperit: In hac, febris nulla aut languida color faciei pallidus aut albus, urina alba tenuis pulsus tardus, sitis nulla, appetentia ciborum major. Ab intemperie humida facies non coneidit, oculi tumidi sunt, excrementa liquidiora & copiosiora, sitis nulla, &c. In sicca contraria omnia.

Secundò accidit jecori, vasorum angustia, distributionem alimenti impediens, quæ vel obstructio est à materia cavitatem occupante, vel constipatio aut compressio à tumore coarctante aut comprimente. Frequentissimè obstructione tentatur, quod exilibus & angustissimis radicibus venæ portæ & cavæ intertextum sit per quas sanguis deferatur.

Obstructio autem est angustia venarum jecoris, distributionem alimenti impediens, orta à materia cavitatem earum occupante. Pars affecta est hepatis, secundum vasa, quæ vel sunt venæ portæ in cava parte, jecoris præcipuè, vel venæ cavæ in gibba parte, unde obstructio alia in gibba, alia in cava.

Causa obstruens interdum est vapor crassus, flatulentus, qui facilè non discutitur, plerumque humor crassus, vel calidus, qualis est bilis flava, quæ

propter obstructionem vesicæ fellis in iecore diu detenta crassescit; unde periculosissimæ obstructions, vel frigidus, crassus, viscidus, ut crudus pituitosus, aut melancholicus, ortus ex alimentis visceri crassi succi qualia sunt, carnes & pisces salii & fumo indurati, lac caseus, legumina, crassa vina & cerevisia crudæ, &c. interdum vitio ventriculi, qui crudum aut vitiosum chylum gignit, aut ex catarrho à capite ad ventriculum, aut ex liene vel utero affecto humorem suscipit, aut suppressione consuetæ evacuationis, vel ex toto corpore feruntur humores vitiosi ad iecur, quia debile est, aut vi caloris & doloris attrahit, aut ob externum errorem in victu, quando à cibo statim, exercitiis, balneis aliisque utuntur, quæ crudos succos in venas rapiunt. Accedit hic usus intempestivus alimentorum aut medicamentorum astringentium. Ad obstructions iecoris proclives sunt, qui angustas venas habent, si crassa victus ratione utantur.

*Signa ob-
struct.*

Signa obstructionis sunt sensus tensionis aut gravitatis in dextro hypochondrio, præcipuè cum spiritus magna fit attractio, aut cum à cibo exercentur, quod si à vapore flatulento orta sit, maior intensio, & dolor percipitur; si ab humore maior sensus gravitatis; sine febre humorem frigidum arguit, nisi iam putrescere inceperit. Obstructio insignis si convexam partem occupaverit, tensio exterius sentitur, dum contrectatur & difficultas respirationis maior dum loca sublimia scandunt. Ex diuturna obstructione inflammatio aut tumor aliquis sæpè exoritur.

*Tumores
iecoris,*

Infestatur iecur variis tumoribus pro varietate humoris, qui ex venis in meatus substantiæ iecoris effusus, eos implet, & impactus distendit; sanguis enim, phlegmonem; bilis, erysipelas; melancholia, scirrhum non exquisitum, &c. Verum

Gale-

DE VITIIS IECORIS.

423 C A P.
X I.

Galenus 4. de pres. ex pulsibus in jecore œdemata fieri non arbitratur, quod ab ipsius calore tenuis pituita facile digeratur.

Adduntur his primùm hydatides, id est, vesiculae aquae plenae in membrana jecur ambiente quibus ruptis hydrops oritur. Deinde tumor magnus ex materia collecta intra membranas jecur ambientes, quæ interdum est vapor crassus, si turbulentus genitus ex cruditatibus, &c. unde magna distentio & dolor sine gravitate, deinde citò incipit, faciliè discutitur, aliquando humor viscosus a substantia jecoris excussus, & intra membranas eius coërcitus, qui non facile discutitur, ex quo major gravitatis sensus, &c.

Tumor in membrana jecoris.

Jecur inflammatione & scirrho frequentius tentatur, quàm alio tumore. Veteres ut eos, qui inflammatione pulmonis laborant, peripneumonicos, ita qui inflammatione jecoris hepaticos vocarunt: Verum nunc illi hepatici propriè appellantur, qui imbecillitate jecoris afficiuntur, & ipsa inflammatio jecoris à nonnullis hepatites. Est autem inflammatio jecoris tumor calidus, ortus ex sanguine impacto, & putrescente in substantia jecoris, adveniens cum febre continua dolore ac sensu magni ponderis gravitatis in dextro hypochondrio, &c. Sub calido tumore comprehendimus hic phlegmonem exquisitam ex puro sanguine, vel notham, ut erysipilarodes, œdematodes, scirrholes ex sanguine redundante, cum bile vel pituita, vel melancholia, item Erysipelas phlegmonides ex bile redundante cum sanguine.

Inflammatio.

Inflammatio jecoris oritur nō aliter, quàm in aliis partibus. Præcipua enim causa est influxus sanguinis maior, quàm pars exigit, ubi humor è vas in spatia jecoris inania effusus ea implet; sanguis verò impactus dū putrescit & inflammatur, substantiam jecoris labefactat & corrumpit. Causa excitans fluxiones, est

Causa inflammationis.

Dd 4 san.

XII.

sanguinis copia aut tenuitas & acrimonia, ac commoto humorum in venis, plerumq; ab externis causis, deinde quia ratione doloris aut caloris jecur attrahit, vel imbecillitatis fluxiones à toto vel parte concitatas faciliè suscipit. Ab his inflammatur raro totum jecur, plerumque pars gibba, aut cava.

Signa.

Dignoscitur inflammatio jecoris primum ex febre continua, quæ noctu potissimum affligit, rariùs accessiones habet, & eò semper ardentior; quò inflammatio Erysipelatis magis particeps; remissior à sanguine pituitoso aut melancholico: Quare ratione caloris & febris lingua rubra, aut nigra, asperaque redditur, sitis, fastidium ciborum, nausea, vomitus, pulsus celer, frequens ac etiam densus & aliquo modo durus oritur, &c. Deindè tumor & renitentia in sinistro hypochondrio percipitur cum dolore, sensuque gravis ponderis hepatis deorsum inclinantis, diaphragma præcordia retrahentis, qualis dolor ad jugulum interdum pertingit propter pleuram, quæ cum diaphragmate divellitur, aut venam cavam, quæ violentius intenditur; oriturque respiratio parva, crebra, per intervalla magna; tussis sicca, & inanis, his additur coloris corporis mutatio &c. Ubi pars cava inflammatur dolor magis gravans est, & ventriculus in consensum trahitur; & nausea, vomitus, sitis, singultus magis affligit, si virtus debilis sit, fluxus hepatis consequitur, Sin gibba iecoris afficiatur, ob ligamenta, quibus diaphragmati & dorso alligatur, pectus magis in consensum trahitur, & dolor magis punctorius est, ac ad dorsum acutior, respiratio difficilior, tussis gravior, tumor iecoris contractu facilius deprehenditur, urinæ rufæ sunt, &c.

*Quomodo**distinguitur
inflam.*

Accidit nonnunquam, ut musculi iecori incumbentes inflammentur, quare nonnulli decepti eam jecoris inflammationem esse putant; distinguuntur

tue

tur tamen, quia jecoris tumor rotundus & circumscriptus ad figuram jecoris est, & major apparet corpore ad sinistrum latus inclinato; minor rursus ad dextrum devoluto; & curis incumbens naturali modo conspicitur. At musculorum tumor oblongus est juxta musculi longitudinem magisque eminet, curis incumbens circumtenditur, dolor quidem vehementior, sed febris minor cæteraque symptomata.

Deinde ob symptomatum similitudinem à pleuritide jecoris inflammatio non facile interdum discernitur, verùm in pleuritide dolor magis punctorius est sine sensu magni ponderis in dextro hypochondrio, respiratio difficilior, tussis vehementior non semper sicca, sed ut plurimum cum sputo colorato, pulsusque durior, magisque serratilis, coloris corporis nulla mutatio, supra oppositum latus facilis decubitus, &c.

Inflammatio jecoris malum gravissimum & periculosissimum, unicaque spes salutis, virium robur. Terminatur autem sæpè immediatè ad mortem aut in tabem, hydropem, &c. Aliquando post concoctionem criticè ad salutem per hæmorrhagiam, dextræ naris, sudores, &c. rariùs tota inflammatio discutitur, sæpiùs decussa aut expressa parte tenuiore materiæ, in scirrhum terminatur, ut mox dicetur. Non rarò inflammatio in abscessum aut suppurationem vertitur; ex quo disrupto pus exit. Suppuratio autem quando fit, febres & dolores augentur, rigores nullo ordine fiunt, &c. quæ confecto pure se remittunt; sed vires multo debiliores relinquantur. Disrupto abscessu pus confertim effluens, ubi vires valdè debiles sunt, subitam mortem affert, sin non ita debiles & abscessus in cava jecoris ruptus sit, per alvum & vomitum pus magis profunditur, in gibba per urinas potius, ac post ru-

matio iecoris & musculorum abdominis.

Quomodo distinguitur à pleuritide?

Quomodo terminetur inflammatio?

Abscessus jecoris.

Dd 5 prum

prum abscessum ulcus insanabile ferè relinqui-
tur.

Ulcus iecq.

721.

Oritur etiam jecoris exulceratio interdum ci-
tra abscessum ex erosione & colliquatione substan-
tiæ jecoris ab humore acri bilioso, corrupto aut ve-
nenato. Hanc affectionem Archigenes teste Aërio col-
liquationem hepatis vocavit, in qua venter cruenta
& saniosa excernit, his similia, quæ ex hepatis absces-
sibus promanant, aut ex mortuorum cadaveribus,
quare quidam in experti hanc passionem dysenteri-
am suspicati sunt, verùm dolor circa loca ulcerosus
est, ad claviculam pertingens: Periculosa affectio est,
sanguis vitiosus generatur, vires deiciuntur, corpus
atrophiâ laborat, sive non alitur aut colliquatur, aut
verè contabescit, aliquando hydrops insanabilis sub-
sequitur.

*Scirrhus he-
patum.*

Tandem post lienem nullum viscus magis scir-
rho infestatur, quàm jecur, quod quasi sanguinem
lutosum contineat; scirrhus autem duplex est, unus
exquisitus, tumor durus renitens doloris expers,
ortus à melancholico succo impacto & concreto
in substantia jecoris; alius minus exquisitus tumor
durus quidem, sed nec planè renitens, nec sensus ex-
pers, genitus, sæpè à pituita crassa, viscida, inter-
dum ab alio humore impacto, & concrecente in
substantia jecoris Gignitur autem scirrhus aliquan-
do sponte post validas obstructions ex humore
crasso, qui interdum sensim coacervatur in jecore,
plerumque confertim à venis influit in vacua jecoris
spatia, ubi exiccatur absorptaq; tenuiori parte con-
crescit & induratur. Deindè, ut diximus, relinqui-
tur scirrhus ex inflammatione dupliciter, uno modo
dum discussis partibus tenuioribus à flammeo calo-
re inflammationis, vel errore medici ab exiccanti-
bus & digerentibus pars crassa relinquitur, sive san-
guis impactus exiccatur & crassescit, naturamque
melan-

melancholiæ acquirit. Deinde errore medici, quando urgente inflammatione immodicè refrigerantibus & repellentibus utitur, à quibus non modo per expressionem humores veluti concreſcunt, ſed etiam calor natus ita labefactatur, ut alimentum proprium digerere nequeat, & humores quaſi congelatos reliquat. Conſiſtit ſcirrhus ut inflammatio in parte gibba vel cava. Verùm ſcirrhi ſponte aut initio orientes frequentiores ſunt in cava, quæ iniuriis craſſorum alimentorum magis patet, & ſanguinem magis craſſum continet. Scirrhi verò per tranſmutationem inflammationis, in gibba parte potius oriuntur; quod ea pars expoſita ſit magis externis refrigerantium & exiccantium iniuriis.

Scirrhus ut inflammatio ſitu & figura viſceris circum ſcribitur, ſed ſcirrhus cum febre non accedit, nec evidenti dolore, tumor tamen multò durior, quàm inflammatione tangenti ſe prodit corpore erecto & in dextrum latus inclinato, præcipuè ſi non adſit hydrops, decubitus dexter facilior, quàm ſiniſter, caloris mutatio ad nigredinem pallore permixtam, corpus conſumitur, ſuperiores partes graciles redduntur, pedes intumeſcunt.

Diuturnus hic morbus eſt, qui tandem ad hydropem inſanabilem ægros deducit, verùm nonnulli quaſi tabeſcentes diutius vivunt, aliqui citius intereunt, illique præcipuè quibus per alvum liquida copioſè ſiunt, ob anguſtiam vaſorum in cavo iecoris.

Atque hi ſunt præcipuè morbi iecoris, quibus vires eius labefactantur, aut impediuntur. Læduntur etiam functiones iecoris per conſenſum aliarum partium, ut cordis quia calor influens deficit, vel immodicè augetur, &c. Præcipuè verò quia deſtituitur utili miniſterio ventriculi, tenuium inſeſtinorum, & venarum meſeraicarum, ex defectu

Signa ſcirrhi.

Vitia partium miniſtrantium iecori.

defectu aut prava qualitate chyli ex quo in jecore sanguis generatur, vel vesiculæ fellis, lenis, renum, ob suppressam evacuationem excrementorum ipsi hepatis.

Lesio sanguificationis ex consensu ventriculi vitio chyli.

Ex defectu autem sive inopia chyli cujus pars utilior per venas meseraicas à jecore attrahitur, sanguis debita quantitate non generatur. Deinde à vitioso chylo, pravusq; vitiosusque sanguis oritur. Nam secunda concoctio non perfectè emendat primam, sicut nec tertia secundam. Defectus chyli sive materiæ sanguinis in jecore fit, quando in ventriculo non iusta quantitate gignitur, vel ad intestina tenuia descendit, ut in præcedente capite dictum est, vel quia per venas meseraicas non distribuitur attractrice ipsarum, vel labefactata à gravi intemperie potissimum frigida humida, vel impedita, ab obstructione, à crassis humoribus infarctis, aut compressione à tumore mesenterii vicinarumque partium, vel frustrata, vitio chyli, quando ita crassus & viscidus est, ut attrahi, & per venas ad jecur distribui nequeat. Deinde chylus pravus redditur interdum à prava ipsorum ciborum assumptorum qualitate, plerumque quando in ventriculo corrumpuntur, &c. ut in præcedente capite dictum est.

Vitia venarum meseraicarum.

Symptomata cystis fellis.

Secundè functio cystis fellis est à bilioso excremento jecur sanguinemque evacuare sive bilem attrahere debito modo & retinere, & ad duodenum intestinum expellere. Læditur hæc actio, ubi nihil aut parum bilis à jecore attrahit & suscipit, vel ad duodenum expellit, aut depravato modo evacuat.

Morbi cystis fellis causaque symptomatum.

Abolitæ & debilis functionis causa est infignis intemperies vesiculæ & vasorum vim attractricem à jecore, & expultricem ad intestina labefactans, deinde angustia ductus vel à jecore, & tum vesicula vacua est, vel ad duodenum, & tum plena est; orta à cras-

à crasso viscido humore infarcto, vel calculis in vesicula genitis ex crassa bile concrecentibus, vel à magna bilis copia vesicam distendente, ut sese contrahere, & expellere nequeat, aliquando ob compressionem ex tumore jecoris vicinarumque partium incumbentium. Suppressa hac evacuatione per alvum, bilis cum sanguine in totum corpus distribuitur, & icterus oritur, urinae flavæ, rufæ crassæque redduntur, adeò ut nigrescant, alvus pigrior est, feces albicant, &c. Depravata sive immodica bilis evacuatio, fit ab expultrice cystis fellis proritata à copia aut magna acrimonia bilis. Vesicula autem vehementius stimulata interdum omnem ferè bilem violenter propellit ad intestina, aut ventriculum, & biliosas diarrhæas, dysenterias, vomitus, &c. concitat, aliquando in jecur & venas eructat, ac icterum quoque efficit, ut infra latius dicetur.

Tertiò correspondent jecoris & lienis symptomata, & similibus morbis infestantur. Munus autem lienis est fœculentum sanguinem à iecore attrahere, elaborare & concoquere, ut meliori parte nutriatur, tandemque reliquum ad ventriculum & intestina expellere. Læduntur hæ functiones, ut a

*Officium
Lienis.*

*Symptomata &
morbi.*

Excrementum autem melancholicum in jecore relinquitur sive à sanguine non segregatur, si lien nihil, aut minus quàm par est attrahat, ipsa attrahente lienis debilitata, ab insigni intemperie potissimum frigida, humida, aut impedita, angustia meatuum & venarum, aut ob tumorem lienis ac ipsius excrementi crassitiem, tenuitatem. Aliquando depravate

*Causa
symptomatum.*

*Sympto-
mata con-
sequentia
laesionem
functionū
Lienis.*

pravatè sive majorum sanguinis copiam, quàm pat-
est, attrahit, ob calorem, aut dolorem, humorumq;
tenuitatem, undè lienis inflammatio, &c.

Humor verò melancholicus in jecore deten-
tus, calorem ejus nativum debilitans hydropem gi-
gnit; per venas distributus, febres quartanas, melan-
choliā, &c. in habitu corporis, scit hos exquisitos;
in eum effusus, Icterus nigrum, si aduratur sca-
biem, lepram, caneros, &c. Deindè læditur conco-
ctrix lienis, ubi succus melancholicus à jecore at-
tractus non sufficienter elaboratur, & concoquitur,
ob debilitatem alteratricis ex intemperie frigida
&c. aut corrumpitur & aduritur ab intemperie ca-
lida, inflammatione, &c. Tertio vitiosus humor in
ipso liene præter naturam retinetur, expultrice vel
debilitata ab intemperie, vel impedita ab angustia
meatum aliove morbo instrumentali. Humor verò
in liene diu retentus vasa ejus obstruit, undè melan-
cholia hypochondriaca plerumque è vasis in sub-
stantiam ejus effusus tumorem gignit, à quo facul-
tates lienis debilitantur, corpus melancholico hu-
more repletur, &c. Quare apud veteres vulgatum
adagium fuit, ut ait *Gal. 2. de Nat. Fac.* quibus lien
florescit, id est, intumescit, his corpus tabescit, præ-
visvè humoribus inquinatur, sicut vice versa, quibus
corpus florescit, lien tabescit, sive imminuitur. Præ-
terea humor vitiosus à liene quandoque depravato
modo expellitur, aut ad non propria loca, ut cum
in venas meseraicas, & loca circa ventriculum ef-
funditur, ubi detentus corrumpitur, & per ebulli-
tionem evaporans, ventriculum subvertit, flatu-
lentos ac tetros vapores sursum ad cerebrum mit-
tit, deliria melancholica sive hypochondriacam me-
lancholiā producit, aliquando humor vitiosus
magna copia in ipsum ventriculum protruditur,
qui si acidus fuerit caninam appetentiam, si adustus
vomitus

vomitibus perniciosos humoris attrahit, interdum in intestina propellitur, qui si adustus fuerit, dysenteriam lethalem, sive cancerum, intestinorum incurabilem efficit.

Affectus proprii lienis, qui functiones ejus laedunt, sunt, ut diximus, primò n. *Morbi lienis.* intemperies omnis generis, quam vis simplices, & sine materia non animadvertantur, nisi ita increverint, ut functiones manifeste labefactent, quæ dignoscuntur, ut iecoris intemperies, frequentissime lien, frigida humida intemperie laborat, ex consimili diæta, usu aquarum palustrium & stagnantium &c. Nam lien magis frigidis morbis obnoxium est, quam hepar, ac sæpius obstructione & scirrho infestatur: ob melancholicum succum, quo nutritur & qui difficulter purgatur, ac substantiam laxam fungosam, quæ humiditates facile imbibit.

Ex intemperie vires lienis labefactante, melancholici humores in primis venis & in toto corpore coacervantur, obstructiones, tumoresque lienis oriuntur, corpus colore nigro & plumbeo inficitur, &c.

Deinde accidit lienis vasorum angustia præcipue obstructio, ex melancholico humore venis aut arteriis infarcto, qui à liene non expurgatur, adveniens cum levi tensione gravitate sinistri hypochondri, &c. Oritur etiam angustia per compressionem vasorum à tumore lienis, aut constrictionem ab astringentibus, &c. *Angustia lienis.*

Præterea infestatur lien variis tumoribus, quarum unus latus non renitens est œdemati similis situ & figura visceris circumscriptus, ortus proprie ab humore crudo aquoso substantiæ ejus impacto, sit etiam tumor initio quidem latus ab humore melancholico, sed qui sensim induratur. *Tumores lienis.*

Secun-

XII.

2. *Inflatio
lienis.*

Secundò inflatio lienis est tumor ex vapore flatulento lieni incluso, genito ob debilitatem caloris, & succos aut cibos flatulentos vel in ipso liene, vel in ventriculo, à quo in lienem postea transferuntur. Hinc tensio magis, quàm gravitas aut durities ulla percipitur, dolor major & acutior, quàm in obstructione & cirrho. Nam ubi dolor vehementer excitatur, aut erit à flatulento spiritu in angusto loco intercepto, aut inflammatione, sed hæc duo febris distinguit.

*Inflam-
matio.*

Tertiò inflammatio lienis est tumor calidus dolorificus ex sanguine impacto & putrescente in substantia lienis. Causæ eadem ferè, quæ in jecoris inflammatione; verùm sanguis qui influit rarissimè aut nunquam purus est, plerumque crassus melancholicus, aliquando biliosus aut adustus; igitur inflammatio lienis rarò, aut nunquam est phlegmone exquisita, plerumque notha, ut phlegmone scirrhus aut scirrhosus phlegmonides, interdum erysipelatodes, &c. dignoscitur ex tumore duro, situ, figura lienis circumscripto, tensione, gravitate sinistri hypochondrii, dolore vehementi & febre continua, quæ per quartum diem plerumque accessiones habet & aliis signis, ut in inflammatione hepatis. Terminatur quoque ut jecoris inflammatio, aliquando critice per hæmorrhagiam sinistræ naris; aliquando in abscessum ex quo disrupto, pus magna copia profluit, ulcusque relinquitur; sæpius verò, quàm jecur in scirrhum desinit.

*Scirrhus
lienis.*

Qui scirrho lienis laborant ad H'pp. σπληνῶδεις vocantur, oritur autem scirrhus lienis, ut jecoris dupliciter, uno modo sponte ex humore melancholico è venis effuso & concreto in substantia lienis, verùm plerumque à tumore laxo minusque duro incipit, qui sensim concrescit & in scirrhum

thum obdurascit. Deinde oritur non raro ex inflammatione lienis, tenuioribus partibus discussis, aut expressis ut in scirrho jecoris dictum est. In hoc affectu ipse tumor situm & figuram lienis retinet, prorsusque durus est, cum tensione & magna gravitate comprimente diaphragma, unde difficultas aliqua respirationis præcipue cum acclivia loca scandunt, dolor ad sinistrum jugulum interdum pertingens corpus sublivido aut plumbeo colore inquinatur, concoctio ventriculi vitatur, flatus copiosi gignuntur sursum deorsumque cum murmure erumpentes. In propectu vires debilitantur, metus, morositia & ignavia oboritur, sæpeque hydrops, gingivæ interdum corrumpuntur, ulcera prava in tibiis nascuntur, &c.

De vitiiis renum & vesicæ sequenti capite dicitur. Consequens nunc est ut causas nonnullorum præcipuorum symptomatum explicemus, quæ morbos jecoris partiumque ministrantium consequuntur: Ac primum cachexia latè sumpta & evēgia opponuntur, ac ut bonus habitus omnibus partibus sanis communis est, ita malus habitus ab omnibus malis propagatur. Verum cachexia propriè dicta est universi habitus corporis prava dispositio seu inflatio & subtrumiditas malusque color corporis procedens ex errore nutritionis vitio sanguinis potissimum.

Cachexia

Nam causa primaria, est cacochymia sive sanguis vitiosus, qui sub halitus specie partibus perfectè agglutinari & assimilari nequit, qualis sanguis in cachexia est frigidus crudus, puitosus aut aquosus, non propriè biliosus aut melancholicus ex quo icterus & cacotrophia potius, quàm cachexia oritur, licet sæpe aliquid melancholici aut biliosi succi affluat; secundaria causa est intemperies rotius habitus corporis frigida humida contraria à

*Causa ca.
chexia.*

E c

longo

*Morbi ex
quibus ori-
tur cache-
xia.*

longo morbo, & propriè ex redundantia frigidi pituitosi, aut aquosi sanguinis, quem partes solidæ elaborare & digerere nequeunt, sed eas potius alterat & copia inflat. Sanguis autem crudus generatur, ob debilitatem caloris nativi, primùm jecoris, deinde ventriculi, aliorumque viscerum, ac vitio quoque ciborum, ob debilitatem caloris ventriculi, & cibos frigidos difficilis concoctionis. Unde chylus crudus, ex chylo crudo sanguis quoque crudus generatur. Nam secunda concoctio primam perfectè non emendat. Debilitatur calor natus, primùm à frigida intemperie, deinde quia vehementer dissipatur immodicis evacuationibus, longo morbo, &c. aut opprimitur consueta aliqua evacuatione ommissa, nimia repletionem, tumore, obstructione, &c. Quare cõsequitur cachexia febres longas & pituitosas, obstructions, & scirrhus jecoris & lienis, morbum gallicum malè curatum, vel diuturnos fluxus alvi, immodicos fluxus sanguinis per uterum, hæmorrhoidas, vulnera, &c. suppressionem menstruum urinae, ac in summa omnes affectus, qui calorem nativum jecoris debilitant, ita ut pro sanguine bono pituitosus, serosus, multis excrementis permixtus generetur. Affluunt excrementa interdum biliosa melancholica corrupta ex impuritate viscerum, præcipuè jecoris & lienis à scirrhus, obstructione, aut corruptione substantiæ visceris aut humorum ejus perpetua affusione sanguis vitiosis excrementis redundat.

Signa cachexia.

Sanguis vitiosus in habitu corporis, quia non digeritur, partes solidas sua copia inflat, siue in tumorem cedematofum attollit, easque relaxat, emolliat, colorem nativum corporis in eum mutat, qui cum virore albescit, pallescit, aut livescit, interdum si affluat, bilis flavescit: in progressu membra invalida redduntur, cibi fastidium oritur, respi-

ratio

tatio rara & debilis evadit, pedes vespere intumescunt, & palpebræ à somno, urina & sudores pauci sunt ob aquosam humiditatem retentam, &c.

Ut imbecillitas jecoris via ad cachexiam est, ita cachexia ad hydropem.

Hydrops. Latinis aqua intetcus sumi-
tur aliquando pro symptomate excrementi præter naturam retenti in habitu corporis, oritur habentis ex sanguificatione debilitata vel prostrata, cujus vitio succus, quo partes alendæ sunt, in materiam nutritioni ineptam, ut sanguinem pituitosum, aut serosum humorem, aut flatus degenerat, quæ partibus sub halitus specie agglutinari & assimilari nequit, sed ob debilitatem expultricis detenta eas in tumorem attollit: sæpè pro morbo sumitur, & tum *Definitio hydropis.*
definitur tumor totius habitus corporis aut ventris, procedens à labefactata virtute sanguifica ob debilitatem caloris nativi jecoris venosique generis ex materia nutritioni inepta, quæ partibus affluens non agglutinatur, nec expellitur.

Dico tumorem totius corporis aut ventris, quia in omni hydropem non intumescit totius corporis habitus, sed in anasarca tantum, in tympanitide solum venter, ac etiam in ascite; ubi verò in ascite ad fœmora & pedes tumor interdum producitur, tum ut statuit Aetius hydrops componitur ex ascite & sarcitide sive anasarca, alii tamen sub Ascite propriè comprehendunt. Deinde dico, labefactata vi sanguifica, &c. quia primaria causa hydropis sicut cachexiæ, est sanguis vitiosus nutritioni ineptus, scil. pituitosus aquosus aut flatulentus, genitus ex debilitate concoctricis jecoris, ut mox dicetur, quæ ob alienam qualitatem & copiam partes non agglutinant, nec digerunt, neque etiam à se expellunt. Oritur quidem hydrops ut vult Paulus, ac etiam, Gal. 3. de Symp. causa cap. 2.

excolliquatione corporis aut succorum in serofam
faniem, sed hæc species rarissimè accidit, & notha
hydrops videtur.

Species hy-
dropis tres
præcipua.

1. *Anasar-*
ca.

Species hydropis tres præcipuæ sunt materia
differentes, quarum una *ἀνασάρκα, ὑποσάρκα,*
σπερμὰς & λευκόφλεγματῖα vocatur, quæ pro-
priè est tumor totius habitus corporis & ventris,
ortus ob eorum facultatis nutrientis, à debilitate
sanguificationis sive alteratricis jecoris, ex sangui-
ne pituitoso, qui partibus non agglutinatur, nec as-
similatur. In hoc malo pituita alba copiosa per cor-
poris habitum disseminatur, interdum intra car-
nem & cutem, aut circa carnem colligitur, ut in-
star spongiarum universa caro perhumida prorsus
appareat.

2. *Ascites.*

Altera *ἀσκίτης* vocatur, quod totus venter
ab aquoso humore repletus utrem aqua plenum re-
præsentat, hæc propriè est tumor totius ventris ali-
quando scroti & fœmorum, pedumque ex seroso
humore defluente plerumque inter peritoneum &
intestina, rarius intra peritoneum & externam ab-
dominis cutem.

3. *Tympa-*
nism.

Tertia *τυμπανισμός* dicitur, quod ventre ma-
nibus percusso tympani percussi sonum imitetur,
aliquandò sicca hydrops vocatur, hæc tumor ven-
tris est à flatibus intra peritoneum & intestina col-
lectio. Initio sola inflatio esse videtur, deindè fla-
tus inspissatur & quasi nubilus redditur, atque ita
cum flatu, quasi nebulosus humor congregatur, ali-
quando serosus humor affluit mixtaque affectio o-
ritur.

Hydrops
ex colli-
quatione.

Additur, ut diximus, hydrops ex colliquati-
one corporis & succorum in venis, quando multa
fanies sub cute colligitur. Nam in colliquatione
id quod colligitur, interdum tenuè est, & per sudo-
res

res excernitur, aliquando crassum, & ad ventrem re-
legatur, unde diarrhæa *συνχληρὴ*, sæpè serosa sanies
est, quæ à renibus, si sani sunt, attrahitur: si non attra-
hatur, oritur hydropis species, quæ à Paulo sub ana-
sarca continetur,

Illarum trium causa primaria est, ut diximus, *Causa hy-*
error sanguificationis ob debilitatem caloris nativi *dropis.*
jecoris. Debilitatur calor natus à contrario fri-
gore, frigidoq; morbo, deindè quando cum spiritu
calor natus dissipatur, & dissolvitur immodica san-
guinis evacuatione per hæmorrhoides, uterum, na-
res, vulnera, diuturno alvi profluvio, itè inflammati-
one jecoris, febris valida, substantiam virium exhau-
riente, longo morbo, &c. Tertiò si suffocetur aut op-
primatur nimia humoris copia virtutem jecoris ob-
ruente, coacervata ex plenioris & inordinata victus
ratione, suppressione consuetæ alicujus evacuatio-
nis per uterum, alvum, urinas, sudores, hæmorr-
hoides, &c.

Morbi hepatis, unde hydrops immediatè & *Morbi jeco-*
præcipuè oritur, sunt intemperies frigida, obstru- *ris.*
ctiones, scirrhus & abscessus, ulcera. Intemperies
autem frigida interdum primaria, sæpè secundaria
est.

Nam origo mali non semper incipit à jecore,
sed plerumque ab aliis partibus vehementer refrige-
ratis, quæ hæpar in eandem dispositionem dedu-
cere valent: afficitur enim sæpè jecur liene refrige-
rato, scirrhus obstructionibus affecto, aliquando
ventriculo affecto, & intestinis, præcipuè tenuibus,
in lenteria, cæliaca affectione, dysenteria, &c. pul-
monibus ex orihopnæa, phthisi: renibus refrige-
ratis, & ita debilitatis, ut serum non sufficienter
attrahant, similiter septo transverso, utero ex scir-
rho, immodico fluxu, aut suppressione menstru-
rum, &c. In his omnibus ex sola jecoris refrigera-
tione

tionem incipere solet hydrops; post plerumque obstruitur, tumorem præter naturam contrahit. Accipit etiam hydrops ex acervata frigida portione sudant corpora, & ab omnibus morbis, à quibus cachexia. Debilitato caloris nativo jecoris venosique generis sanguis pituitosus, serosus aut flatulentus gignitur.

*Anasarca
causa.*

Particularim in Anasarca jecur per se initio minus afficitur, ipsumque malum plerumque originem sumit ex copia humoris pituitosi in venis, quam ob suam debilitatem, aut materie vitiosæ copiam emendare nequeunt: unde partes, quia id, quod attrahunt, non agglutinant, nec evacuant, totius corporis habitus in tumorem mollem, laxum assurgit, corpusque colore pallido aut subalbido emortui instar apparet.

Ascitis causa.

In Ascite plerumque malum incipit à jecore & venoso genere ex debilitate non tantum concoctricis, sed etiam virtutis expultricis, quæ serosum humorem à sanguine non secernit ob debilitatem caloris nativi, aliquando ex imbecillitate vasorum emulgentium, & renum, unde sanguis scorsus, impurus redditur, & ad membra alenda inidoneus; repletis seroso sanguine primis venis, aliquid instar roris sensim in peritoneum defluit, aliquando per cæcas vias ipsæ venæ serosum humorem in capacitatem ventris transfundunt, unde totum abdomen paulatim intumescit, sæpè scrotum, pedes, omnesque inferiores partes. Ex seroso humore circa jecur & intra peritoneum, interdum hydatides sive vesiculæ, aqua plenæ oriuntur, ex quibus ascites, quæ per fluctuationes quasdam inæquales deprehenduntur, & certo loco quasi circumscriptæ sunt. Fernellius serosum humorem defluere in capacitatem abdominis arbitratur, solutâ continuitate jecoris aut vasorum. Verum tùm una cum seroso humore

ali-

aliquid sanguinis unà influeret, quod fieri non so-
let. Colligitur serosus humor potissimum inter
peritoneum & intestina: aliquando inter perito-
neum & externam abdominis tunicam; deinde ad
inferiora decumbit: interdum in pectus portio aliqua
erumpit.

In tympanitide à ventre & intestinis magis *Causa Tym-*
incipit malum, & desinit in jecore: unde *Galen. 3. panitidis.*
de sympt. caus. § 11. Aphor. sect. 5. videtur tympa-
nitidis causam ventriculo ascribere. Nam conse-
quitur plerumque inflationem, aut tormina ven-
tris, quæ nec naturâ, nec medicamentis solvantur:
flatus verò debilitatem ventriculi & intestinorum,
ut supra demonstratum est.

Colliguntur autem flatus inter peritoneum
& intestina, totumque abdomen distendunt sine
gravitate: aliquandò cum flatibus aliquid serosi hu-
moris intra capacitatem abdominis coacervatur,
mixtaque affectio oritur.

Signa communia hydropis sunt tumor ven- *Signa.*
tris, vitatus color, ciborum fastidium, potionis
appetitus, maximè in ascite ob salsum serosum hu-
morem putrefactum, ex quo febris lenta, quæ hy-
dropem sæpè consequitur. In anasarca tota cor-
poris moles intumescit, ut diximus, pulsus magis
undosi sunt; in cæteris ventre intumescente, supe-
riores partes magis extenuantur: In ascite tumor
ventris variato corporis situ mutatur; in tympanitide
non &c.

Icterus Latinis Arquatus & morbus Regius, *De Ictero e-*
symptoma est facultatis excreticis, ac etiam quali *iusq; causis*
tatis corporis mutata, & duplex constituitur à me- *& differenti-*
dicis: unus propriè dictus symptoma excreti- *is.*
cis biliosi humoris: alter impropiè dictus, &
cum adjectione Icterus niger, symptoma excreticis

melancholic humoris. Icterus propriè dictus, est foedus corporis color, citrinus, pallidus, &c. productus ex effusione biliosi humoris per summa cutis, ex debilitate interdum attractricis, plerumque expultricis non segregantis, aut non propellentis bilem per debitas vias, aut transmutatione alimenti in bilem.

Causa Icteri.

Causa immediata coloris vitrei est humor biliosus per summas cutis partes diffusus, qui plerumque citrinus, aut pallidus est, rarsissimè porraceus, &c. Diffunditur autem in cutem præcipuè quando à sanguine non segregatur, aut propellitur propter nimiam biliosi humoris copiam, aut quia vis expultrix jecoris infirma est, aut attractrix vesiculae felle à jecore, & expultrix ad duodenum intestinum debilitatur aut depravatur, id est, non naturali modo, aut per alienas vias expellit irritata facultate.

Ac primùm oritur Icterus, ubi major bilis copia generatur, quam cystis felle attrahere & suscipere queat, i. ob calidam intemperiem jecoris & alimenta calida, quæ in biliosos humores faciliè convertuntur, aut ob ferventem jecoris inflammationem, cujus vi sanguis in bilem mutatus per venas in totum corpus distribuitur. Deindè fit etiam interdum Icterus ex calida solidarum partium intemperie, dum id quod ratione alimenti iis offertur, in bilem transmutant. Tertio ex motu venenatae bestiae, ut viperæ, aut veneno assumpto, sanguinem alterante & substantiam corporis transmutante in colorem porraceum, citrinum, &c. IV. oritur Icterus, quando jecur bilem à sanguine non segregat, & separat; aut ad cystin felle non expellit, ob intemperiem substantiae vim secrettricem & expultricem debilitantem, aut ob angustiam meatuum & ductum ex jecoris substantia in vesiculam felle, quæ

quæ vel obstructio est à crassis humoribus infarctis, vel compressio à scirrho aliove tumore jecoris V. fit etiam arquatus ex debilitate virtutis vesiculæ felle bilis à jecore non attrahentis, aut à se ad duodenum expellentis, ob intemperiem substantiæ ejusdem, deinde ob angustiam ductus, seu meatus ad duodenum, quæ plerumq; obstructio est à crasso humore, calculo, &c. aut compressio à tumore partium incumbentium, ut supra dictum est. Tandem gignitur repentè Icterus bile ab interioribus partibus in cutem effusa, facultate expultrices concitata vel à natura, ut in crisis febrium biliosarum potissimum: vel symptomaticè vesicula felle ad expellendum concitata à copia, magnaq; acrimonia bilis, dum eam in jecur & venas eructat, ut supra de affectibus vesiculæ felle dictum est.

Deinde Icterus niger est sublividus, aut niger *Icterus niger.* totius corporis color procedens eb effusione melancholici humoris in summam cutem. Humor iste melancholicus est, qui à liene naturaliter attrahitur & expurgatur, ejusque tenuior portio, interdum etiam melancholia adusta. Diffunditur autem in cutem, ut flava bilis, quando facultas jecoris à sanguine segregare, & per venas ad lienem eum expellere nequit. Deinde quia ipsa facultas attrahitrix & expultrix lienis debilis est, ob intemperiem, aut impedita, propter obstructionem, scirrhum, aliumve tumorem, aut viæ & venæ obstructæ sunt, per quas à jecore attrahitur, aut à liene propellitur; aliquando quia melancholicus humor in habitum corporis, irritatâ natura, copiâ aut quantitate humoris propellitur.

Signa communia icteriorum, coloris corporis *Signa communia* mutatio, album oculorum, malæq; pallorem, aut livorem ostendunt, venæ sub lingua replentur, difficultas motus & pigritia, ac pruritus corporis comi-

Et ratur,

tatur, cibos dulces magis, quam acidos & amaros
 averfantur, multis imaginationibus moventur. Par-
 ticulatim in Ictero flavo, urinæ flavæ, rubræ turba-
 tæ sunt, quibus autem ratione bonæ crisis in feбри-
 bus oritur, iis feces & urinæ naturali modo se ha-
 bere videntur, ac eo adveniente cessat febris, quibus
 verò cum febre & biliosis dejectionibus alvi, inva-
 dit, si in dextro hypochondrio sit gravitas & dolor,
 causa Icteri erit jecoris inflammatio, sine gravi-
 tate, calida jecoris intemperies, copia bilis, &c.
 quando paulatim oritur, fecesque naturali modo
 se habent, intemperies calida solidarum partium,
 quibus citra febrem alba excrementa dejiciuntur, si
 nulla adest gravitas, aut tensio dextri hypochon-
 drii, existimandum vires secretrices jecoris infir-
 mas esse, aut attractricis & expultricis cystis fellis
 ab intemperie: si cum sensu gravitatis & tensionis,
 angustiam aliquam vesicæ fellis, & meatuum esse,
 &c. In Ictero nigro, ut in citrino dignoscitur cau-
 sa ex excrementis, febre, gravitate sinistri hypo-
 chondrii, &c. urina magis nigra, aut sublivida est,
 &c. si humor sit adustus gravius afficiuntur, mor-
 dacitas circa ventrem oritur, difficultas respirati-
 onis, cibos averfantur tristitia multisque imagina-
 tionibus infestantur, feces colorem chalcanti re-
 ferunt, &c.

Scorbutus

Ictero nigro affinis est affectio locis nonnul-
 lis, & nautis imprimis familiaris, quam Plinius Sce-
 letyrben & stomacacen vocavit, recentiores scor-
 butum, aliqui gingipedium à gingivis & pedibus
 corrupto sanguine infectis, & ad magnos lienes Hipp.
 referunt, eorumque symptoma videtur.

*Descriptio
Scorbuti.*

Nam propriè videtur scorbutus prava quædam
 nutritio, aut vitiosus corporis habitus, sæpè cum
 crurum debilitate & maculis, gingivis tumidis &
 sanguinolentis, nautis populisque nonnullis mari-
 timis

timis familiaris, proveniens à melancholicis corruptis humoribus ex vitiosis alimentis in jecore genitis, qui à liene affecto non attrahuntur & expurgantur, sed in corpus distribuuntur. Afficitur autem lien in hoc modo plerumque obstructione aut tumore aliquo: Lien obstructus aut ex crassis humoribus intumescens à jecore feculentum excrementum attrahere nequit, quare cum sanguine per venas distributus, corporis habitum labefactat, tabida quadam corruptione inquinat, &c. Nam ex hoc corrupto humore crura cum dolore debilitantur, ut vix ægri interdum consistere queant, multisq; maculis rubris purpureis nigris variegatis inficiuntur, aliquando etiam brachia, aliæque partes; gingivarum tumor & corrosio, dentium laxitas, oris graveolentia, difficultas respirationis, aliquando febris lenta, tabida, &c. consequitur. Humor iste vitiosus pravam qualitatem magna ex parte contrahit ex prava qualitate alimentorum, quam jecur aut ventriculus non corrigit, sed viscera potius inquinat, cujus generis sunt primum, aquæ corruptæ stagnantes palustres crudæ, defectus aquarum dulcium, deinde pisces, & carnes falsæ fumo induratae, rancidæ, crassi succi, legumina, panis submucidus, aut ex mucidis & corruptis frugibus, &c. His additur aeris constitutio calida humida, regio palustris, vigilia, curæ, &c.

Symptoma.

Atrophia, cui opponitur plethoricus corporis habitus, sumitur interdum pro ipso defectu nutritionis, sæpe pro macie aut attenuatione corporis. Macies autem corporis tribus modis oritur, 1. Ob defectum alimenti in venis, ex inedia, immodicis evacuationibus, longo morbo, &c. 2. Ob consumptionem substantiæ corporis, vel subito à calore colliquante, ut in febribus ardentibus & malignis, vel lentè à siccitate humidum nativum depascente,

que

XII.

*Atrophia
quid & quo
ruxplex?*

Causa.

quæ affectio marasmus dicitur. Tertiò à debilitata aut deperdita nutritione, quandò partes alimento non fruuntur, hoc modo atrophia propriè dicta oritur, à cæteris non nisi impropiè. Itaque vera Atrophia est macies aut attenuatio corporis, orta à facultate nutriente labefactata non valente frui debito alimento. Attenuatur autem sæpè totum corpus, interdum pars una, ut manus, pes, &c. unde Atrophia alia totius corporis, alia partis. Causa immediata est, quod partes debito alimento non fruantur, vitio proprio facultatis nutrientis, ob gravem intemperiem, calorem nativum debilitantem aut extinguentem, vel vitio alimenti sive sanguinis, quia pervenas non distribuitur, propter intemperiem aut angustiam vasorum, aut ad nutritionem aptus non est. Atrophia autem, quæ unam partem obsidet, causa est ipsius partis peculiare vitium, nimirum intemperie calorem nativum debilitans, vel sanguinis vel spirituum defectus, ex interceptione, obstructione, compressione venarum, arteriarum, ac etiam nervorum, ut in paralyfi, nam partes resolute attenuantur, &c.

*Atrophia
totius corpo
ris causa.*

Atrophix verò totius corporis, causa prima videtur affectus alicujus præcipui visceris, (ut cordis, jecoris, cerebri, ventriculi) calorem nativum cum spiritibus debilitans, obtundens, & extinguens, Facultas autem nutrens in toto corpore, & quæ ei subministrant, læduntur plerumque ab intemperie potiss. frigida, sicca, aliquando à morbo instrumentali, ut angustia vasorum. Nam ob validam intemperiem, calorem nativum debilitantem, vis alteratrix partium alimentum attractum non agglutinat, nec in substantiam corporis convertit, interdum attractrix debitam sanguinis copiam non attrahit, vel retentrix tamdiu non retinet, donec agglutinetur, aliquando simul expultrix irritata copia, aut aliena

liena qualitate materiae, vehementius insurgens u-
rilia cum inutilibus expellit, ut in hepatico fluxu
Ratione sanguinis Atrophia nascitur, si *ἀνατομία*
sive distributio alimenti per corpus impediatur ex
validis venarum meseraicarum, & jecoris obstructi-
onibus, &c. qualis hypochondriacis supervenire so-
lent. Deinde ob pravam qualitatem alimenti, ut
partes eo non fruantur, veluti si sanguis in venis, li-
cet copiosus substantiae bonitate & fibris careat, &
biliosus adustus corruptusque sit, & proinde parri-
bus perfectè apponi & assimilari nequit. Oritur
quidem Atrophia vi alteratrice infirma, sed non
semper, nec uno eodemque modo. Nam ubi at-
tractrix suo munere funigitur, & plus succi attrahit,
quam vis alteratrix conficere queat, excremen-
ta copiosa gignit: ac interdum cacotrophiam cum
Atrophia, plerumque cachexiam, pro ratione excre-
menti redundantis inducit: ac etiam hydropem ma-
xime si excretrix facultas imbecillior sit. Nam ex-
cretrix infirma caro semper humidior magisque ex-
crementosa redditur.

Cacotrophia, seu depravata nutritio proprie *Cacotro-*
est alimenti conversio in alienam substantiam à qua *phia causa*
litate; sive naturali proprietate humani corporis, *et diffe-*
proveniens vitio facultatis alteratricis, aut ipsius *rentia.*
alimenti. Vitio autem facultatis alteratricis visce-
rum partiumque corporis ex intemperie cum sub-
stantiae corruptione in lepra, elephantiasi & simili-
bus facit, ut, cibi boni in pravam succum & substan-
tiam convetantur.

Verum præcipua causa pravae nutritionis est
vitium alimenti. Vocabula autem alimenti intel-
ligo hic non verè alimentum, quod partibus appo-
nitur & agglutinatur, sed primum quasi alimentum
scilicet sanguinem, deinde futurum alimentum, ci-
bum qui ab ore in ventriculum recipitur. Nā sanguis
vita-

CAP.
XII.

vitiatus pro sua natura varias corruptelas corporis-
que affectiones excitat. Deinde immutat quidem
corpus nostrum cibum & alimentum in suam natu-
ram ; verum ipsi cibi quandoque ob qualitatem a-
lienam, quæ à naturavinci nequit, magnam vim ha-
bent ad carnem immutandam, sæpeque, ut in brutis
videmus, mutatione locorum & pabuli, corpo-
ris imitatur colorem, aliaque accipientia ipsius
alimenti, unde cibi alii pituitosi, alii biliosi, alii
melancholici dicuntur, quia in talem sanguinem
facile permutantur, qui pro sua natura carnem im-
mutant.

Nam sanguis pituitosus carnem in album co-
lorem transmutat, ad similitudinem carnis testaceo-
rum, si levis error sit alteratricis, & humor cutem
tantum occupaverit, excitantur in ejus superficie
maculæ albae non continuæ ad squammarum simi-
litudinem, quæ ἀλφοὶ vocantur & λευκὴν præce-
dunt: Sin error magnus sit in toto corpore & pi-
tuita crassa lenta cutem & subjectam carnem occu-
paverit, oritur λευκὴ: in qua pili eodem colore tin-
guntur, caro ita transmutatur, ut acupuncta non
sentiat, nec sanguinem perfectum emittat, sed aut
aquosum, aut loco sanguinis lacteam humiditatem,
& tunc insanabilis est, & à nonnullis lepra alba vo-
catur.

Lepra al-
ba.

Sanguis melancholicus corpus in nigrum co-
lorem transformat; si levis error sit alteratricis, in
cute tantum maculas nigres excitat, quæ Græcis
μέλαι à nonnullis alphi nigri appellantur. Si ma-
gnus sit & humor adustus, acris evadat, cutemque
erodat, scabies simplex, si altius depascat ψωρὶς
ἀγρία & lepra à Græcis nominatur: sin major mul-
tò sit alteratricis error & humor adustus malignæ
qualitate affectus, in toto, elephantiasis; in parte,
cancer

μέλαι.

canceroritur. Biliōsus humor in cutem effusus
 ἑξ ἀνθήματι maculasque rubeas, purpureas efficit, &c.
 Humor acris, serōsus, tenuis, paucus pruritum, cum
 crassis permixtus λειχήνη seu impetiginem propriē
 dictam, verū sub impetigine communiter dicta
 comprehendunt nonnulli pruritum, scabiem, & le-
 pram, quæ inter se magnitudine, forma, & causis di-
 stinguuntur. Nam ut alphi viæ sunt ad leucen; ita pru-
 ritus, ad impetiginem; impetigo, ad scabiem; scabies,
 ad lepram; lepra interdum, ad elephantiasin.

Est autem pruritus propriē tristis sensatio de-
 siderium scalpendi excitans, sine cutis asperitate &
 exulceratione, ex tenui, falso, acri, paucō, immoto ex-
 cremento sub cute collecto. Deinde lichen seu impe-
 tigo est asperitas cum levi pruritu, ex tenuibus falsis
 acris succis cum crassis permixtis, impetigo ubi fa-
 ciem & mentum occupat foedatque, mentagra dici-
 tur.

Pruritus

Impetigo.

Tertiō scabies est, major cutis asperitas cum
 pruritu, in qua corpus colliquatur & consumitur ori-
 ginem trahens ab acri humore melancholico; ali-
 quando à sanguine biliōso falso crasso, corrupto, cu-
 tem variē depascente ut fursuracea remittat. IV. Le-
 pra est magna cutis asperitas, cum gravi pruritu ex
 multo crasso acri melancholico humore cutem or-
 biculatim altius depascente, sæpè exulcerante & in
 squammas resolvente.

Scabies.

Lepra.

Hujus duas species recenset Celsus, quarum
 une sicca est, cum majori pruritu, altera humida est
 cum pustulis multaque sanie: quidam quatuor po-
 nunt sola magnitudine differentes, quarum pessima
 est crassa, dura, subalbida recenti cicatriei similis al-
 tē depasens, &c.

Ab his omnibus specie & magnitudine differt Elephan-
 tiafis, quæ morbus est magnus contra-
 giōsus

Elephan-
tiafis.

XII.

Causa.

giōsus ab atra bile maligna qualitate inquinata, totius corporis substantiam immutante; seu est tumor totius corporis canerosus, valdē contagiosus, genitus ex atra bile venenata qualitate prædita à jecore & liene in totum corporis habitum effusa. Venenatam & contagiosam illam qualitatem contrahunt partes & humores, interdum ab utero malo hæreditario ex semine parentum eodem morbo laborantium, aut ut arbitrat̃ur Avicenna ex materno sanguine vitiatō, si concipiantur fluentibus aut instantibus mensibus. Deinde contagione ex concubitu, contactu aut conversatione cum elephantiacis, &c. Terriō proprio vitio ex suppressione consuetæ evacuationes per hæmorrhoides, uterum, &c. varicibus cohibitis, interdum ex lue gallica, usu alimentorum crassi succi ac etiam exiccantium, dum obstructo liene humores in atram bilem aduruntur, & per adustionem venenatam qualitatem asciscunt, ac primū viscera inquinant, deinde corporis habitum.

Nam cum totum affici nequeat, nisi viscus aliquod, initium mali hujus à viscere aliquo erit, præcipuē à labe contracta in jecore aut liene, ubi succus melancholicus naturaliter generatur, aut elaboratur, & expurgatur. Deinde quia sensim humidum radicale invadit, & occupat à corde quoque erit, cæteris que partibus. Quare viscera hac labe inquinata similis qualitat̃is succos gignunt.

*Differentia
Elephant.*

Atra bilis, ex qua Elephantiasis, duplex propriè est, quare Elephantiasis quoque duplex à Paulo statuitur, una minus maligna subrubicunda ex humore melancholico adusto, altera magis maligna ex bile flava adusta, in qua corpus pravis ulceribus fœdatur, extremæ parte decidunt, ut cutis digitorum, nasi, &c. membra ad ossa usque eroduntur. Additur tertia species subalbida ex adustione melan-

DE ELEPHANTIASI.

449

CAP.

XII.

melancholici humoris cum pituita salsa crassa com-
mixti.

An Elephantiasis sit lepra illa Arabum, quæ tan-
tum describitur tumor pedum cum varicibus, dubi-
tatur. Nam hæc in totum corpus spargitur, & quia
cutis hispida, crassa, dura & decolor redditur, facies
inforinis cum tuberculis, vt elephas, elephantiasis
vocatur; ob rugarum frontis similitudinem cum
leonibus, Leontiasis: ob libidinem & faciem satyris
similem, quos Poetæ fingunt nato limo, labris cras-
sis, auriculis extenuatis, ossibus juxta aures promi-
nentibus, satyriasis. In tio cutis decoloratior est;
hinc durior, asperior in facie, manibus, pedibusque
potissimum; torpet sensus. extrema frigent, maxime
pedes, capilli defluunt, tenuesque regenerantur, fœ-
rer corpus muscoli pollicis consumuntur adest cutis
spissitudo instar implumis anseris, extuberationes
rotundæ duræ sub lingua, circa aures & palpebras,
sanguis trombosus, niger, livens, alvi adstrictio re-
spiratio difficilis, vox rauca, ructus continui, vehe-
mens ad coitum alacritas, &c.

*Signa Ele-
phant.*

*Nomina ex
effectibus in-
dita.*

Elephantiasis cognatus est morbus contagiosus
veteribus aut ignotus, aut non sat accurate descri-
ptus, qui lues Venerea appellatur, quod in coitu cō-
tagium plerumque communicetur, & quia in Gal-
lorum exercitu Neapoli, Anno 1495. primum seuire
cœpit, ab Italis morbus Gallicus vocatur; à Gallis,
Neapolitanus; interdum Hispanicus, quod ex H spa-
nis ex America, ubi Endemius est, credatur in Euro-
pam primum delatus: unt tamen nonnulli, qui arbi-
trantur Gallos hac lue omnium primos correptos
fuisse ex porione vini ab Hispanis infecti, admixtio-
ne sanguinis Elephantiacorum.

*Lues Vene-
rea.*

Est autem lues venerea morbus contagiosus de-
fluvio capillorum, maculis, tuberculis, ulceribus,
& dolore sæviens, genitus ex putrido lento excre-

*Definitio
Luis.*

Ff

mento

Causa Luis. merito qualitate virulenta maligna & venenata prædito, aliunde suscepto, plerumque ex impuro concubitu. Causa prima labis hujus est putridum excrementum tota substantia nobis infensum qualitate virulenta maligna & venenata præditum, quod non modo spiritus & humores inquinat, sed etiam partes solidas invadit & corrumpit, ac primum partes, quibus infidet, contaminat, deinde sensim continuatione quadam etiam per arterias & venas in totum corpus spargitur. Materia autem hujus labis secundum speciem esse poterit quivis humor, aut excrementum lentum facile adhærens, sed putridum & in qualitate nostræ naturæ inimicam corruptum.

Subiectum.

Subiectum luis est totum corpus omnesque partes, omnes enim tandem afficiuntur: subiectum ubi fomes mali tanquam in domicilio residet, pars unica non videtur: attamen cum hoc malum ab usu veneris frequentius oriatur, & ex sanguine vitiatò ulcera, tubercula, maculæ, &c. oriuntur; credibile est ex omnibus visceribus jecur primum inquinari, & ex jecore affecto crudum aut corruptum vitiosum sanguinem in corpus spargi. Sæpius alias partes venenata qualitas petit, præcipue caput & artus, quia caput membrum pituitosum est, & in coram maxime afficitur. Contrahitur ista per vitiosa labes non ex proprio corporis affectu, sed aliunde per infectionem contagionem aut excrementi putridi & venenati communicationem, cujus merito ubi affectus alteri communicatur. Contrahitur labes interdum in utero, sæpius post ortum: in utero vel in conceptione ex semine parentum infectorum & imprimis eorum, qui gonorrhæa gallica laborant, ex qua lues maligna; vel in utero post conceptum, quando nutritur fœtus sanguine materno infecto. Extra uterum contagione oritur plerumque

ex

ex impuro concubitu, aut viri cum muliere infecta aut mulieris non infectæ cum viro infecto. Nam in concubitu dum partes incalescunt, porique & meatus aperiuntur, excrementum virulentum facilius in corpus spargitur. Communicatur etiam iis, qui cum infectis dormiunt per sudores; aliquibus per lintea sudore & sanie inquinata, pueris si ex nutrice infecta fugant, & nutrici non infectæ à puero infecto: aliquando per osculum effusus, si salivam inquinatæ ab ore exceperit. Nam hujus veneni vis hebetior est, & ægri solo halitu ut elephantiaci, non inficiunt: deinde virulenta labes, ut diximus, crassiori vehiculo indiget, & partes nisi nudatas, aut valde laxas, rarasque non pervadit.

Initio virus, spiritus, & ichores invadere solet, deinde humores, hinc carnosas partes, tandem solidas: Quare quatuor gradus, & species luis sunt, una levissima est ex veneno consistente in spiritibus aut ichoribus, quando pili capitis & barbæ defluunt tantum: Altera in sanguine tenuiori virus habet, qua cutis fere tota multis maculis non extuberantibus conspergitur, nunc parvis lentiginis instar, nunc latioribus & vtriusque flavis rubris, &c. Tertia multo deterior est ubi virtute jecoris debilitata, sanguis vitiosus praviq; humores generantur, & in corpus distribuuntur, ex quibus pustulæ rubræ flavæ & siccæ, circa frontem, tempora, in capite, pone aures, per totum corpus erumpunt, tubercula ulceraque oriuntur, tennellæ partes præcipue ad nares, & fauces exulcerantur, &c. Quarta omnium pessima in qua virulenta corruptio non solum carnes, sed etiam spermaticas partes invadit, membranas, nervos, tendines corodit, ingentesque dolores excitat, ossa divellit, exedit, carie consumit gummositates tophosque parit, &c.

Ex his signis dignoscitur etiam lues gallica. Præ-Symptomata hæc symptomata comitantur morbum hunc luis.

Ff 2

dolo-

dolores intensi, fixi noctu & interluniis, ingravescentes in capite, & in mediis articulorum partibus, ex materia collecta intra periostium, ardor urinæ, & si malum sit ex coitu, statim initio gonorrhæa, bubo in inguine, vlcus penis. In progressu ulcera & pustulæ per totum corpus extuberantes, coloris naturalis mutatio in lividum, &c. Hic morbus omnes non æque affligit, & initio cum oriretur gravior multo fuit, quare nonnulli eum indies inclinari & consenescere arbitrantur.

CAPUT XIII.

*DE CAUSIS SYMPTOMATVM,
quæ circa urinæ segregationem contingunt,
seu de morbis & symptomatibus Re-
num & vesicæ.*

*Munus renū
& vesicæ.*



Natura duo renes constituti sunt, ad latera venæ cavæ, & arteriæ magnæ, quorum munus est, ut sanguis ad alendum corpus aptior reddatur, per venas & arterias emulgentes se osum excrementum allicere, percolare, & à sanguinis massa segregare, & per ureteres in vesicam transfundere: vesicæ vero est, serosas humiditates paulatim collectas ad commodum tempus excretioni continere, aut ubi copia & acrimonia irritant, locus tempusque opportunum sit, in maribus per colem, in fœminis per uteri cervicem foras detrudere. Quare urinæ retentio & excretio, sive mictus, proprium vesicæ munus est, & in seri segregatione ac excretionem, concurrunt actiones, & naturales & voluntariæ: Nam seri attractio à renibus, & defluxus per ureteres in vesicam, ac
ipsum

ipsius vesicæ à sero influente dilatio; Deinde dum copia aut acrimonia ad expellendum irritater constritio, functiones naturales sunt. Quia vero ad libitum urinam sistere & excernere possumus, actio voluntaria erit, musculo exhibitio os vesicæ apertiente & caudante concurrentibus musculis abdominis.

Singulæ harum functionum, ut aliæ omnes tripliciter læduntur, & sub mictus læsione continentur. Mictus autem ut naturalis functio, *Symptomata Renum & Vesicæ* symptomata *sica.* sunt 1. abolita urinæ excretio, quæ accidit vesicæ vel vacua existente, & tum abolita est attractio feri, & defluxio per ureteres. oriturque Ischuria notha: vel plena, & tunc deperdita est functio excretrix vesicæ quæ Ischuria vera dicitur. 2. diminuta urinæ excretio sive mictus ratione assumptorum paucus rarusque accidit debilitatis functionibus renum aut vesicæ. 3. depravata excretio urinæ multiplex est: una ratione quantitatis, immodica urinæ excretio, quæ diabetes dicitur, Symptoma renum, consequens immodicam feri attractionem, & abolitam retentionem in renibus: altera ratione qualitatis non naturalis eorum, quæ excernuntur, ut mictus cruentus, purulentus, pilaris, &c. Tercio ratione modi non naturalis, qui vel est, quando gutta im exit, unde stranguria: aut cum dolore, ardore, multo conatu, ut in dysuria: Additur his unum symptoma, quatenus mictus est opus animale ratione musculi claudentis orificium vesicæ, nimirum involuntarius exitus urinæ.

Causæ præcipuæ horum symptomatum, sunt *Causæ symp.* morbi renum, verterum, & vesicæ. Morbi autem *Morbi re-* renum, sunt primum intemperies omnis generis *num.* nitæ à causis ejusdem generis internis aut externis *Intemperies.* temperiem naturalem alterantibus, præcipue calida intemperies, ex qua sensus ardoris in lumbis,
Ff 3 fitis,

Tumores.

fitis, urinæ copiosa, debet, &c. Deinde frigida, quæ vim attracticem seri debilitat, &c. Intemperies, si cum humore substantiæ renum impacto fuerit, tumorem præter naturam excitat. Tumores quibus renes potissimum infestantur, sunt inflammationes & scirrhi.

*Inflammatio renum.**Symptomata inflammationis.*

Inflammatio autem est tumor præter naturam calidus ex sanguine substantiæ renis impacto; sanguis ille vel biliosus, pituitosus, aut melancholicus esse poterit, sed plerumque tenuis, quod substantia renum densa & compacta sit, qua inflammatio e it phlegmone exquisita, vel notha, sæpius erysipelatis magis, quam cedematis aut scirrhi particeps. Causa est fluxus sanguinis in vacua renum spatia, eos distendens: influit à Venis emulgentibus præcipue ob calorem & dolorem renum attrahentem, pharmacorum calidorum potionem, contusionem à calculo, ab ictu, p[er]cussione, continua & vehementi equitatione, &c. ubi renes debiles sunt. Consequitur inflammationem febris continua, quæ in biliosa inflammatione major est, cum vehementi siti, ardore, &c. in pituitosa minor dolor circa primam lumborum vertebra[m], si substantia renis tantum inflammetur, gravans, si simul tunica renis, t[un]cus & tensivus: Dolor vero supra ad jecur vel lienem, infra ad vesicam, lumbos & coxendicem extenditur, & coxa quoque dolore, crus vero stupore afficitur, extrema frigent, maxime pedes, laboriose & assidue mingunt initio aquosa alba, in quibus nil subsidet: aucta inflammatione symptomata vehementiora redduntur, ventriculus, jecur, intestina, cerebrum in consensum contrahuntur, unde ructus, vomitus, primum pituitæ, deinde bilis, cardialgia, deliquia animi, alvi suppressio, ventris inflatio, delirium, &c. post primos dies si urina in colore substantia & hypostasi in melius mutetur, aut signum est

est inflammationem ad resolutionem vergere, si non mutetur & vires validæ sint in scirrhum aut abscessum tendere, si infirmæ ad mortem.

Abscessus autem dum fit, febres doloresq; augentur, quæ facta suppuratione se remittunt, manet tamen gravitas pondusq; sentitur ubi supra sanum latus inclinant, ubi pus jam erupturum est, rigores & accessiones inæquales fiunt, hinc pus copiosum erumpit, plerumq; cum urina; interdum per alvum, si eruptio sit versus emulgentia vasa, & renes obstructi sint: aliquando rupta tunica renum in ilia & lumborum spatia defluit. Post abscessus resolutionem relinquitur ulcus insanabile: si inflammatio in scirrhum convertatur, ardor febrilis & dolor mitigatur, sed manet gravitas.

Scirrhus sive tumor renum durus, indolens, oritur ut scirrhus jecoris, vel sponte & per se ex crassis, lentis succis, impactis, & condensatis in substantia renum, genitis ex alimentis crassis, viscidis succis, vel ex inflammatione oritur, tenuioribus partibus à calore exiccatis, aut expressis. Signa ejus sunt gravitas lumborum citra dolorem, ardorem & febrem, nisi inflammationis reliquiæ aliquæ supersint, stupor coxæ partis affectæ cum imbecillitate cruris, urinæ pauca redditur, aliquando supprimitur, corpus inflatur, ut in cachexia, unde hydrops. &c.

Ulcus sive exulceratio renum oritur, vel propter abscessum disruptum, ut jam dictum est, vel ob ruptionem vasis à plenitudine, & contusione ex ictu, plaga, vehemēti equitatione &c. me vel propter erosionem, ab acii mordaci humore, ut bilioso, falso, corrupto per renes delato: ut p'u imum ab aspero calculo ibidem genito exedente & continente. Symptoma ulceris est puris mictus. Pus autem cum urina augetur, non solum ex ulcere renum, sed etiam vesicæ ureterum ac etiam

ex abscessu in jecore, pulmonibus, &c. Verum in ulcere renum urina purulenta cruenta, aliquando foetida redditur, cum fibris & catunculis rubris ex substantia renum separatis, dolor in regione renum percipitur; præcessit vel abscessus renum, vel ruptio quæ ex causis præcedentibus dignoscitur & mictu copiosi sanguinis; vel erosio, & tum evidens erosionis dolor in renibus præcessit à calculo vel humore erodente, &c. Ulcus, si initio non curetur, sordidum & incurabile efficitur, unde pus modo album, modo mucosum per urinas defluit, & urina turbida sero lactis similis redditur quæ postea quiete sedimentum purulentum & mucosum deponit.

*Morbi con-
formationis
renum.*

*Vasorum di-
latio.*

*Angustia re-
num.*

Præterea accidunt renibus morbi in conformatione, nimirum vasorum, aut meatuum dilatatio & angustia. Ob nimiam etenim vasorum dilatationem sine ulla percolatione urina cum sanguine in vesicam descendit: contra, angustia, seri percolationem & descensum impedit. Dilata io autem & apertio vasorum oritur à facultate expultrice irritata copia aut acrimonia & tenuitate materiae, vel tunicis rarefactis, & relaxatis vel ruptione à copia humorum, aut flatuum distendentium a plagis, contusione ab acrimonia humore plerumque à calculo conterente, ut infra dicitur.

Angustia meatuum & vasorum renis, est interdum astrictio & compressio à causis aut externis, veluti sunt medicamenta astringentia, balnea aluminis, ferri. &c. cingulum arctius renes constringens: aut internæ, ut renum tumor præter naturam meatum comprimens, præcipue scirrhus & inflammatio: plerumque angustia est obstructio à materia cavitatibus renum impacta, quæ vel humor crassus, lentus, copiosus vitio concoctionis ex alimentis crassi, lenti succi difficilis concoctionis genitus; interdum pus crassum ex abscessu disrupto in renibus, aut aliis parti-

partibus, vel grumus sanguinis ex aptione, ruptione aut erosione vasis, vel lumbrici in renibus producti ex putredine humorum, sæpissime arena. aut calculus in renibus concretus, aut in meatu & cavitate renum expulsus.

Generantur calculi in aliis quoque partibus, ut in *Calculi re-*
in: estini, pulmonibus, &c. in abscessibus, sed nulli- *num.*
bi frequentius, quam in renibus & vesica, quorum
omnium eadem fere generationis ratio est. Calculus
autem renum *vesicæ* proprie dicitur, quod re- *vesicæ.*
nes gravissime exerceat. Sumitur, ut alibi dictum est,
aliquando pro morbi causa, quatenus renes ob-
struit, continuum solvit, unde dolores ingentes, &c.
è Galeno pro morbo in numero aucto toto genere,
præter naturam: est enim corpus tephaceum, aut la-
pideum præter naturam in renibus, ex materia cras-
sa, lenta, per exsiccationem à calore præcipue geni-
tum actones eorum impediens.

Causa materialis ex qua gignuntur calculi, est *Causa mate-*
humor crassus, glutinosus terrenæ substantiæ, *riale.*
qualis primario est pituita crassa, lenta in renibus,
plerumque cum sanguine commixta aliquando cum
alio humore, vel pure crasso lentoque. In hac ma-
teria, aut par ratio crassi & glutinosi est, aut major
copia crassi, quam glutinosi, aut contra: materia
autem quo glutinosior fuerit, & calore xiccans ve-
hementior, eo duriores calculi producuntur, co-
loris magis cinerei subruffi; alioquin renum colo-
rem succique exuperantis imitantur. Generatur
humor ille crassus lentus ex cruditatibus & alimen-
tis crassi succi, difficilisque concoctionis, ut caseus,
lac caseosum, oriza, panis, azymus non bene co-
ctus, carnes veterum animalium, pisces cartilaginei,
& testacei, anguilla, pisces, carnesque salæ fumo
induratae, aquæ crudæ stagnantes, &c. vina crassa,
rubra & cerevisia recens non defæcata cruda, &c.

Ff s con-

*Causa efficiens
calculi.*

confluunt humores crassi ex venis in renes concitati interdum à calidis diureticis intempestive exhibitis, & omnibus quæ dorum renesque calefaciunt. Opiatur angustia meatuum & vasorum. Nam in illis, qui latiores habent meatus, licet calidi sint, & in victu peccent, rarius nascuntur calculi, quod facilius effluat crassus humor, & non retinetur, donec siccescens concreseat. Causa efficiens immediata concretionis & generationis lapidum est, humidi redundantis exiccatio, siue consumptio, quæ duobus modis accidere putatur. uno à calore tennes humidæque partes resolvente, absumente & discutiente, alio, à frigore, vel per se quatenus calorem nativum mixti foras depulsi nam calor natus expressus humidum suum una educit: vel ex accidente. quando in liquidis id, quod à calore assatum est totique permixtum, post caloris & spiritus evaporationem refrigerescens, concrescit, hoc modo urina in matulis relicta crustam lapideam gignit, ac in vasis vinariis tartarus, quare Paracelsus generationem lapidum fieri arbitrat, ex materia tartarea à spiritu salis coagulata: verum cum præter rationem sit in humano corpore, si igitur tantam vim esse, ut per solam expressionem caloris nativi cum suo humido, humor in calculos concrecere queat, consentaneum magis videtur, generationem lapidum fieri, vel à calore renum humorem crassum, lentum exsiccantem & per exsiccationem incrassante & condensante, vel ex materia à calore in jecore, & venis perassata, quæ refrigerescens concrescit, & ob debilitatem expultricis & angustiam meatuum renibus adhærescit, non aliter fere, quam tartarus in vasis vinariis, aut crusta in matulis urinariis, ac ibi detenta progressu temporis à calore induratur. Igitur præcipua causa generationis lapidum, est calor vel intensus, & bre-

vi tempore calculos producit, vel debilis, qui longiori tempore ad generationem indiget, aut materiam magis dispositam, siue valde crassam lentam requirit.

Materia autem ubi in cavitate renum concret, si expultrix renum ita valida sit, ut priusquam à lento humore glutinetur, expellat, arena cum urina excernitur. Sin debilis sit citoque expellere nequeat, & materia viscida, crassa in eundem locum assidue confluat priori adhærescens, & quasi crusta obducens calculus unus, interdum plures nascuntur, ex materia crassa minus glutinosa calculi friabiles siue tophi, ex crassa valde glutinosa à valido calore, calculi duri magisque saxeï oriuntur, qui à nonnullis proprie lapides appellantur. Omnes figuram à situ, siue loco ubi generantur accipiunt, colorem à parte & materia potissimum mutuuntur quantitatem à copia materiæ & loci capacitate, unde calculi duri, vel friabiles sunt, magni vel parvi, rotundi oblongi, vel asperi, in renibus ut plurimum colore ruffi, raro albi, flavi aut nigri: in vesica subalbi cineritij. In renibus minores magisque asperi & friabiles gignuntur, quam in vesica. Oritur quidem & excernitur, ut diximus, arena antequam in calculum coalescere queat, non raro tamen ex ipsis calculis contritis fractis, aut comminutis in renibus, & vesica, arena & materia sabulosa expellitur, quæ tenuis & quasi pulvis apparet, si calculus durus sit, crassior, aut frusta lapidum, si friabilis.

In generatione calculi opitulantur siccitas angustia, & debilitas expultricis renum, quæ vel ascititia est, vel nativa & hæreditaria contracta à parentibus, nam nephritici nephriticos ut plurimum gignunt, maxime si in victu peccent.

Causa arena.

Calculi.

Differentia calculorum eorumque causa.

Calculus morbus hæreditarius.

Seni.

XIII.

*Cur senes cal-
culi renum,
pueri vesica
magis infe-
stentur.*

Senibus calculus renum familiarior, est pueris calculus vesicæ. Nam pueri licet ex voracitate multos crassos succos congerant eaq; de causa eorum urinæ crassiore & turbulentiore sunt, tamen quia eorum calor validus est, & meatus renum laxi & patentes, ac expultrix valida, ideo materia crassa in renibus non retinetur, sed liquata in vesicam effunditur, ubi ob crassitiem & visciditatem diutius detenta resolutis partibus tenuioribus in lapidem sensim con- crescit, & accessione novæ materiæ obducta nova crusta augetur. In senibus ob contrarias causas accidit, ut materia crassa cum urina ad renes delata non expellatur sed retenta in calculum induretur. Calculi in renibus magnitudine numero, colore forma, duritie & asperitate inter se differunt, ut ex supra dictis constat. Deinde aut in renis substantia, aut cavitatibus nascuntur.

Signa calculi

*Paroxysmus
nephritici.*

Calculi quiescentis signa, sunt sensus gravitatis seu ponderis in lumbis affecti renis sine tumore, dolor gravans, cum cibo replentur, stupor coxæ lateris affecti ob compressionem nervorum à lumbis, aut renum cum vena cava & arteria magna conjunctionem, spina difficulter flectitur, &c cum autem spinam vehementius flectunt intempestivis exercitiis, vehementi equitatione, prava victus ratione utuntur, calculi pondere & molestia sua, naturam ad expellendum stimulant paroxysmum nephriticum excitant. Nam in expellendo dum calculus, vel per membranas in cavitatem renum penetrans, vel in ureterem se inferens, deorsumque pro- cidens, partes sensiles conterit vulnerat aut diuellit, gravissimi & acutissimi dolores, qui nephritici dicuntur, oriuntur, meatus obturantur; calculi parvi, rotundi leves facilius excernuntur; magni, duri & asperi difficulter; circa initium paroxysmi & obturationis, urinæ paucæ, aquosæ minguntur, post-
ca

ca, si uterque ren afficiatur, plerumque supprimi-
tur lotium, aliquando ob violentiam calculorum
præcipue a superiorum urina cruenta excernitur, te-
stis affecti lateris contrahitur, & ex consensu ventri-
culi & intestinorum, ructus vomitusque oriuntur
primum pituitosi, post biliosi humoris, alvus sup-
primitur, venter inflatur, singultus, dyspnæa, coma
interdum oritur, &c. Tandem ubi calculus à reni-
bus in vesicam deferitur, sensus calculi transeuntis
percipitur, quo tempore urina multa exit, arenosam
substantiam habens, & alvus simul ut plurimum lar-
ge egeit. Si calculus in renum cavitate resideat fa-
cilis excutitur, & cum arenis nulla sanies per urinas
erumpit: si in ipsa substantia renis concretus sit,
antequam in cavum protrudatur, nullæ arenæ in
urinâ conspiciuntur, & præcessit suppuratio, fe-
brisque; dum è substan-^{ia} in cavitatem propellitur,
partem disrumpens pus elicit quod pariter cum uri-
nis excernitur. Dolores colici nephriticis valde simi-
les sunt, verum colici magis vagi sunt, & supra renum
regionem, faciliusque mitigantur, & in colica urina
non supprimitur, nec cruenta, aut arenosa reddi-
tur, vomitus tamen vehementior, alvusque magis astri-
cta, &c.

Morbi ureterum præcipui sunt angustia transi-
tum seu à renibus impediens, & continui solutio:
Angustia interdum est compressio à tumore par-
tium incumbentium, ut plurimum obturatio ex
calculo grandiori à renibus emoto, & cavitate ure-
terum impactu, qui ex sensu calculi transeuntis &
inhærentis dignoscitur, obstruuntur etiam, sed ra-
ro ex humore valde crasso, lento aut grumo san-
guinis. Continui solutio est vulnus aut exulceratio
plerumque à calculo asperiore conterente, divel-
lente, vulnerante, aut acriseroso humore abraden-
te. Notæ ulceris ureterum, sunt dolor inter renes &
pubem

*Morbi urete-
rum.*

Angustia.

Exulceratio.

Morbi Vesicae.

pubem initio subcruenta, deinde in urinis pus natat capillorum specie, &c.

Intemperies.

Tertio afficitur vesica urinaria aut per se, aut per consensum; per se omni fere genere morborum, præcipue intemperie, inflammatione, scirrho, abscessu angusta, calculo & exulceratione. Per consensum vero, quando à renibus serum, quantum & quale non oporteat, suscipit, item calculos, pus, sanguinem: Deinde cerebri, & spinæ, quando vis animalis in corpus vesicæ, aut musculum cervicem claudentem non distribuitur ob paralyfin, &c. interdum ex intemperie, dolore aut tumore partium vicinarum, nimirum uteri, recti intestini, &c. Intemperies vesicæ sunt simplices vel compositæ sine vel eum materia, quæ causas habent externas vel internas simili vi præditas, de quibus latius capite de causis morborum dictum est. Præcipuam autem vim in labefactandis actionibus vesicæ habet frigida intemperies (quod pars ipsa frigida & exanguis sit) interdum simplex contracta ex alimentis & medicamentis frigidis, & narcoticis assumptis aut admotis, ex aere frigido, longa mora in aqua gelida, &c. vel cum materia frigida in vesica coacervata. Cæteræ intemperies magis sunt cum materia, quæ partem alterat, & intemperiem tover. Materia autem illa vel alluit tantum & in cavitate vesicæ præcipue continetur, vel in vacua substantiæ spatia effusa & impacta est, eam distendens, tumoremque præter naturam excitans, nimirum inflammationem, &c.

Inflammatio autem vesicæ est, tumor calidus, dolorificus ex sanguine: corpus vesicæ, cum exangue & frigidum sit, rarius ea tentatur, sæpius cervix vesicæ & musculus cervicem claudens, plerumque in cervice incipit, deinde toti corpori vesicæ communicatur. Sanguis ex quo gignitur vel sincerus est,

est, vel biliosus, pituitosus, aut melancholicus, quare inflammatio, vel est phlegmone exquisita, vel notha erysipelatis, œdematis, aut scirrhi particeps. Effluit sanguis ille è vicinis venis in substantiæ spatia ob dolorem, aut calorem attrahentem, contusionem à plaga, ictu, calculo, vehementi equitatione, &c.

Symptomata inflammationis sunt dolor vehemens cum gravitate & pondere, ardore & rubore circa pubem & inguina; febris continua eo magis acuta quo inflammatio erysipelatis magis particeps est, cum ingenti siti, nigredine linguæ, &c. Si cervix magis afficiatur, urina supprimitur cum summo mejendi desiderio, & ubi redditur, guttatim, & paulatim exit cum dolore. Deinde quia vesica pars nervosa sensibilisq; est, aliæ partes nervosæ, ac ipsum etiam cerebrum in consensum trahitur. unde vomitus biliosorum, singultus, deliria, vigiliæ, &c. & ob compressionem recti intestini egerendi desiderio laborant, ut in tenesmo fieri solet, aliquando alvus astricta est, & inflationes sequuntur, &c.

Morbus iste gravissimus & periculosissimus est, ob magnitudinem symptomatum. Si inflammatio magna sit, non raro in gangrænam abit, ex qua vix ullus restituitur; rarius discutitur, nisi parva sit, aliquando remisso dolore & febre, manente gravitate, in scirrhum transit, licet etiam scirrhus vesicæ sponte oriri queat, ut renum: sæpius non sine periculo in abscessum abit: Nam dum suppuratio fit, febris, dolor, cæteraque symptomata augentur, ut in renum inflammatione, deinde rupto abscessu pus copiosum, cum multa urina excernitur, tandemque ulcus incurabile relinquitur.

Angustia orificij vesicæ varias causas habet, diversasque species, ut infra de causis Ischuriæ dicetur.

Signa & sympt. inflammationis.

Scirrhus Vesicæ.

Abscessus Vesicæ.

Angustia vesicæ.

Cal.

XIII.

Calculi Vesicae.

Opinio Fernellii de calculis vesicae.

Modus generationis calculi Vesicae.

Signa calculi vesicae.

Calculi vesicae puerili ætati imprimis accidunt, senibus non nisi prius affuerint. De causis & differentis calculi supra in renum affectibus dictum est. Fernellius in vesica calculum nullum generari arbitratur, sed à renibus radicem rudimentum aut nucleum trahere, aut vesicam calculos accipere, qui deinde in eà temporis progressu ex allatarum sortium adhæsu coagmentantur, & in perfectum lapidem confirmantur. Verum à renibus licet rudimentum quoddam calculi, vesica accipere interdum queat, ut in adultis potissimum; tamen cum calculi renum & vesicae, nec eadem figura, & substantia sint, nec eadem in ætate eveniant; Probabile non videtur eundem generationis locum, causamque semper esse. Nam calculi vesicae non solum majores ut plurimum sunt, calculis renum, sed etiam duriores minusque asperi & friabiles, coloris subalbi, aut cineritij: Deinde in pueris vesicae calculum raro præcedunt dolores nephritici, & eorum calculus si frangatur, nucleum diversi coloris à toto habere non videtur. Quare consentaneum potius est calculos vesicae generationis suæ initium & incrementum in ipsa vesica fere semper obtinere, ubi ob loci capacitatem & materiae affluentis copiam majores, quam in renibus gignuntur, interdum unus solum magnus, aliquando plures minores, qui vel fundo vesicae adhærescunt, & pondere suo premunt, ac cum ægri vehementius agitantur, saltant, equitant, ac dum sedentes alteram pedem vehementius concutiunt, circa anum imamque pudendi partem dolorem grauantem sentiunt, vel uni loco affixi non sunt, sed hinc inde moventur, motuque suo non solum sensum grauitatis, sed etiam vagam titillationem circa pubem & peritoneum efficiunt, variaque symptomata. Nam calculi notæ, sunt urina cruda, aquosa, in pueris sero lactis similis cum sedi-

sedimento arenoso, si calculus magnus sit, cum sedimento mucori simili, pruriunt laborantes sæpeque pudenda scalpunt, virga intenditur, dysuria & stranguria nonnunquam oritur, crebroque ad urinam reddendam irritantur, & subcruenta nonnunquam cum magno dolore excernunt, præcipue in fine mictionis, non raro lotium plane supprimitur. Facilis vero excretio urinæ redditur, remotione calculi à meatu urinario, immisso cathetere, vel corpore supino figurato, ut crura sublimiora sint, deinde sæpius concusso. In pueris imprimis tactu dignoscitur immisso per anum digito medio, &c. Mulieres minus calculis infestantur, quam viri, ob menstrua, & viarum laxitatem, rarissime vesicæ calculis, quia earum vesica ad pubem collocata est, & breviorrem latiorremque virili cervicem obtinet.

Tandem exulceratio vesicæ, vel ex abscessu rupto oritur, vel consequitur contusionem, rupturam: aut vulnus, casu, vel minus periti chirurgi opera inflictum in calculi sectione, catheteris immisione, &c. vel ex erosione provenit ex materia acuta, vel acri abradente, quæ vel interna, ut calculi asperiores potissimum, deinde urinæ acres ex permissione biliosorum salforum, aut corruptorum humorum, vel externa, ut usus alimentorum calidiorum, vini potentis, medicamentorum erodentium præcipue cantharidum, quæ specifica proprietate vesicam lædunt & exulcerant, adeo ut in tenellis corporibus pro vesicatoriis adnotæ dysuriam interdum pariant. Consistit exulceratio interdum in fundo vesicæ aliquando in ceruice, parteque maxime carnosâ intra capacitatem vesicæ vel extra ubi in maribus incipit meatus urinaris, in fœminis versus cervicem uteri. Notæ ulcerum vesicæ sunt *Signa.* urina crassa initio modico cum sanguine, aut pure. Hinc excernuntur squamulæ non carnosæ, quales

G g

les ulcus renum consequuntur. sed membranosa furfuris crassioris speciem referentes; si ulcus sordidum mucosa graveolentia, interdum suberuen a & saniosa potissimum quando late depascit; dolor acutus agros mictionis tempore maxime excruciat & si exulceratio intra capacitatem vesicae sit, citra mictionem omni tempore dolor sentitur, ob lotium ulcus mordicans, quare expultrix saepe irritatur, & agri urinam diu retine. nequeunt, assiduaque mendi cupiditate stranguria & dysuria infestantur, erecti diu consistere non possunt, penis multum erigitur, &c. si ulcus sit in cervice parte exteriori, dolor tantum mictionis tempore sentitur circa radicem penis, & maxime ubi mingere inceperint & desinunt; plus initio mictionis exit al. quando sine urina. Quia autem vesica pars nervosa est, & urina sua natura acris non sinit ulcera consolidari, ideo vesicae ulcera aut insanabilia sunt, aut curatu difficilima. Peccant autem agri assiduo dolore, vigiliis, &c. alij citius, alij tardius.

*Morbi fistula
urinae.*

Cervicem vesicae excipit in maribus fistula urinaria, seu meatus penis, lotio & semini communis, qui iisdem morbis infestatur, quibus cervix vesicae, praecipue inflammatione aliove tumore, deinde meatus angustia urinae excretionem impediens, ex humore crasso lento, aut calculo impacto, vel caruncula, aut tuberculo innato, &c. tertio exulceratione ex abscessu disrupto, calculo asperiore, vel acri corrupto humore abradente, saepe ex impuro concubitu cum muliere lue vener. infecta. Morbi penis exterius patent facileque dignoscuntur. In exulceratione dolor tempore mictionis sentitur, praecipue cum fluere incipit & desinit, non circa radicem penis, sed in ipsa pene pus initio mictionis exit, saepeque citra ullam mictionem.

His praemissis, superest ut de causis praecipuorum

rum symptomatum, quæ contingunt in mictione in specie agamus Correspondent symptomata quæ *Symptomata ta mictionis.* contingunt circa excretionem urinæ, symptomatibus dejectionum alvi. Nam suppressioni alvi ischuria; lenteria, diabetes; diarrhæa, incontinentia urinæ; dysenteria, dysuria, mictus cruentus & purulentus; tenesmo, stranguria respondent. Ischuria autem dicitur in veram, proprie dictam vitio vesicæ, & notham, vitio renum, ureterum. Mictio autem functio composita est ex expultrice naturali irritata copia, aut qualitate urinæ, corpus vesicæ contrahente, lotiumque exprimente & ex animali per musculum ad libitum orificium vesicæ aperiente, quare urinæ suppressio oritur, quando in vesica non coacervatur, vel coacervata non sentitur, nec stimulat, vel si sentiat & irriter non tamen vesica ad expellendum insurgere, & sese contrahere queat, vel licet ad expellendum insurgat, ob angustiam tamen vesicæ quia impeditur, nihil exprimat. Verum quando urina in vesica non coacervatur, Ischuria vera non appellatur, sed quando suppressio accedit vesica plena existente

Quare Ischuria proprie erit abolita mictio vesica plena existente, procedens ab expultrice labefactata ob sensus torporem, aut intemperiem corporis vesicæ, aut impedita ab angustia cervicis eiusdem. Pars affecta est vesica, interdum secundum corpus, aliquando secundum cervicem. Causa triplex est, prima quia vesica se gravari non sentit à copia urinæ ob torporem corporis vesicæ, seu paralyin nervorum, qui per substantiam vesicæ disseminantur; non autem ob paralyin musculi claudentis cervicem vesicæ. Nam ex paralyi illius musculi urinæ suppressio non excitatur, sed involuntarius exitus. Accedit quoque à gravi sopore, & quocunque affectu soporifero, ut vesica se gravari

*Ischuria**vera.**Causa Ischuria.*

Gg 2

non

non sentiat, & lotium supprimatur, ac etiam in iis affectibus, in quibus mens laborat, vt in phrenitide. Secunda causa est intemperies frigida substantiæ vesicæ expultricem debilitans, vt sese contrahere & lotium contentum, & facultatem stimulanse exprimere nequeat; contracta ex intemperie vesicæ frigida ab externis vel internis causis, de quibus supra dictum est.

*Angustia
Vesicæ.*

Tertia est angustia orificii aut ceruicis vesicæ excretionem vrinæ impediens, cuius variæ sunt species & causæ; vna obstructio ex materia crassa meatui infarcta, nimirum ex crasso lento humore, vel pure vel grumo sanguinis, vel calculo. II. Constipatio & obstructio a caruncula carnisue excrementia innata, ab ulcere ceruicis vesicæ, vel callo siue c. carrice dura ex ulcere relicta, aliquando à tuberculo. III. Nimia distentio vesicæ præcipue ceruicis eiusdem, vt inde meatus occludatur, à tumore, inflammatione, scirrho, abscessu, &c. IV. Compressio ceruicis à tumore partium vicinarum incumbens, nimirum vteri ex foetu grandiore, recti intestini, aliquando ani ob hæmorrhoides valde intumescens. V. Subsidentia & conuulsiua meatus ob conuulsionem musculi claudens ceruicem ex immodica siccitate & inanitione imprimis, qualis accidit interdum in febribus ardentibus & colliquantibus. His addi poterit vitium ratione subiecti ab errore externo, nimirum immodica tensio totius corporis vesicæ, à nimia vrinæ copia diutius, quam par est, retentæ, quod sanis accidit in conuiuiis, foro, &c. quando urgente necessitate ob loci temporisque importunitatem vrinam reddere volunt. Nam ob nimiam tensionem corpus vesicæ in expellendo sese contrahere nequit, ac etiam meatus contrahitur & obruitur. Hæc species angustiae ad secundam referri aliquo modo poterit.

gerit. Ab his omnibus causis vrinae excretio impeditur, aut supprimitur ipsa vesica plena existente.

Ischuria notha est vrinae suppressio, in qua nihil *Ischuria notha.* feri in vesicam defluit & descendit; non descendit, quia renes non alliciunt, deorsumque mittunt, aut vteretres non suscipiunt. Non attrahunt renes deorsumque mittunt, quia labefactantur à valida intemperie potissimum frigida, aut impediuntur à tumore, angustia renum, &c. A renibus per vteretres nihil defluit in vesicam propter vteretrum obstructionem à calculo impacto, à crasso lento humore, grumo sanguinis, &c. vel ob compressionem à tumore partium vicinarum, verum ab vno rene vel vterere affecto lotium in totum non supprimitur, per alterum enim defluit, sed utroque.

In vera Ischuria vesica plena est, & manifeste secundum circumscriptionem intenta cum gravitate in imo ventre & immisso cathetere, aut compresso pube vrina effluit. *Signa Ischuria.* In notha vesica inanis est, & immisso cathetere nihil exit. In vera Ischuria causae angustiae vesicae non solum ex praesentibus accidentibus, sed etiam ex iis omnibus, quae praeterierunt, iudicare oportet, & considerare an adsint, aut praecesserint certa indicia inflammationis vlceris, calculi, &c. ut docet Gal. lib. 5. de loc. Affect. capit. 1. & lib. 6. capit. 3. Peculiariter torporem sensus arguunt nullum mingendi desiderium: intemperiem frigidam, causae refrigerantes, praecedens, &c. obstructionem à grumo sanguinis, crasso humore, vel calculo si vrina repente supprimatur, & praecesserint excretio sanguinis, crassi humoris, vel calculi, &c. saepe immissa fistula, & educta secum aliquid peccantis materiae extrahit: Carunculae signa sunt, quae vlcus designant, & cathetere immisso nisi fracta carne, cum dolore vrina non exit, & mox sanguis consequitur. Galeulus, inflammatio, scir-

*Diabetis.**Causa dia-
betis.*

rius propriis signis, ut supra. dignoscuntur; sicut & compressio vesicæ à tumore uteri, intestini recti, cætera ex relatione ægri

Deinde diabetis communiter pro omni copioso urinæ profusio sumitur & dividitur à nonnullis in diabete proprie dictam, & notham. Diabetis proprie dicta est symptoma renum, henteriæ simile, quoad transitus velocitatem sed caninæ appetentiæ, quoad symptomatis modum, quia ob violentam renum attractionem, potus cupiditate perpetuo torquentur, quem non transmutatum renes statim motu attractricis depravato vehementer alliciunt, & ob copiam retentricem grauantem in vesicam defluere sinunt, unde excernitur. Quare erit diabetis celerrima, & copiosa mictio potus non transmutari, cum valida siti: orta ab attractrice renum deprauata, ab intemperie calida sicca, una cum retentricis debilitate. Pars affecta sunt renes. De causa discrepant medici, quidam volunt ab intemperie frigida fieri facultatem retentricem debilitante: verum cum diabete adjuncta sint sitis, æstus hypochondriorum, &c. magis probabile videtur causam esse depravatam seu immoderatam functionem attractricis aquosi serosi humoris ex venis, quem retentrix renum debilis ob copiam non retinet. Depravatur autem attractrix renum ab intemperie calida, vel sicca, utraque, quæ raro sine materia est, plerumque cum materia calida impacta, aut imbibita substantiæ renum, scilicet bilioso humore, aut pituita salsa, unde ob immodicum calorem renes aquosos & serosos humores ex venis violenter ad se alliciunt, quos ob copiam retentrix debilis gravata non sustinet, sed per ureteres in vesicam defluere permittit. Adjuvant hanc intemperiem renum immodica jecoris caliditas, & materia acris, maligna in venis; quod accidit in febribus pestilenti-

stentialibus: item retentio visus ventriculi debilitas: & qualitas eorum quæ assumuntur, ut vini calidioris & aromatici. Fit etiam teste Gal. 6. de Loc. aff. diabetes à morfu diptadidis serpentis Rara affectio & in ardoribus nascens, ubi urina aquosa redditur, &c.

Diabetis notha est profluvium urinæ syntecti *Diabetis notha*, id est, colliquativum, dum succi in venis, aut ipsa substantia corporis à vehemente calore, in serosam saniem transmutantur: hæc diarrhæa syntecti æ correspondet; sed differt modo colliquationis, & excretionis, unde alia plura symptomata: nam succi aliquando ex colliquatione in serosam saniem transmutantur, quæ à renibus, si sani sunt, attrahitur, & ad vesicam descendit, unde mictio *συνηχτική*: si vero à renibus non attrahatur, manet in corporis habitu, & oritur hydropis quarta species, de qua supra.

Tertio mictus involuntarius est excretio urinæ *Mictus involuntarius*, præter voluntatem, ex resolutione musculi claudentis cervicem vesicæ. Resolvitur autem musculus iste per se valida intemperie frigida, humida & solutione continui ut vulnere, ulcere, contusione &c. aut resolutis nervis, qui sensum & motum ei communicant, in paralyti vel uniuersali, vel particulari, affecta parte spiræ, unde exoriuntur nervi, qui musculo vesicæ implantantur: verum ubi resolvitur musculus, unica illa actio perit tantum, ubi nervi aut exortus nervorum, plures. Causæ iis signis dignoscuntur, quæ cuique affectui supra adscripta sunt.

Sub mictu involuntario continetur illa incontinentia urinæ, qua nonnulli noctu in somno sese permingunt, cuius causa est non paralyti, sed stupor alioquin, aut debilitas musculi claudentis orificium vesicæ ob nimiam laxitatem & mollitiem, ex intemperie frigida humida, sæpe cum humore pituitoso Hoc vitium pueris valde familiare est, ob corporis molli-

tiem & laxitatem, & in somnis accidit, quo tempore, quia vires animales sopitæ sunt, & musculus claudens ceruicem vesicæ obscuram actionem obtinet, ideo urinam copiosam minus, quam interdiu retinet.

*Stranguria
& dysuria.*

Quarto veteres stranguriam à dysuria sæpe non distinguunt, & pro eodem communiter sumunt. Proprie tamen stranguria ob assiduum conatum tenesmo magis correspondet, & quia ante tempus euacuat, lienteria: dysuria vero magis, dysenteria: Est autem stranguria assiduus mingendi conatus, sine aut cum vehementi dolore, in quo urina guttatim effluit, siue pauca & frequenter, proueniens ab expultrice vesicæ assidue stimulata ex affectu dolorifico & acrimonia urinæ, vel ob debilitatem retentricis, quæ minimo onere, seu copia urinæ grauatur.

*Causa stranguriae.
Differentia.*

Pars affecta est ipsa tota vesica, præcipue officium. Causa assiduum conatum mingendi excitans, est facultas expultrix stimulata: stimulat autem duobus modis: quare stranguria duplex est, vna simpliciter dicta excretio urinæ guttatim cum conatu sine dolore; Altera à nonnullis stranguriosa dysuria vocatur excretio urinæ guttatim cum conatu, vehementi dolore & ardore vesicam ad expulsionem assidue irritante. Illius causa præcipua est expultrix irritata ob debilitatem retentricis vesicæ, quæ minimo onere grauatur, vt vel exigua urinæ copiam non sustineat. Debilitatur autem retentrix vesicæ & musculi claudentis ceruicem eiusdem, à quacunque intemperie præcipue frigida, vt plurimum cum materia pituitosa; aliquando ob angustiam cauitatis vesicæ, veluti quando à tumore viciniarum partium comprimitur, quod grauidis interdum accidit, quæ hac stranguriæ specie potissimum infestantur. Ex paralyfi musculi claudentis ceruicem vesicæ urina guttatim sæpe effluit, sed sine conatu,

*Stranguria
simplicis causa.*

conatu, qualis affectio decrepitis interdum accidit, sed ea non ad stranguariam, sed mictum inuoluntarium proprie refertur.

Stranguriæ vero dolorificæ causa est expultrix vesicæ, præternaturam stimulata ab acrimonia urinæ. Stranguria dolorifica causa. stimulat autem, vel quia ipsa urina mordacior acriorque reddita est, quam ut vesica secundum naturam affecta eam ferre queat, vel quia vesica affecta urinam quamcunque non sustinet. Acrimoniam autem acquirit urina, aliquando ex permistione biliosorum, salforum, corruptorum, aut materiæ purulentæ, ab ulceribus non solum vesicæ, sed renum aliarumque partium, interdum ex usu alimentorum aut medicamentorum acrium & diureticorum, &c. Afficitur vero vesica per se, interdum ab intemperie inæquali, plerumque à continui solutione, ut exulceratione, vesicæ distentione à flatulento spiritu, item abscessu, inflammatione non solum vesicæ, sed etiam vicinarum partium, ut recti intestini, uteri, vasorum spermaticorum in gonorrhæa gallica inueterata, &c.

Dysuria vero est proprie mictio dolorifica, aut difficilis ex interuallis accidens sine assiduo conatu, in qua urina interdum affatim, interdum guttatim exit. Huius quoque duæ species sunt, una mictio dolorifica, in qua tempore mictionis dolor vehemens sentitur, & præcipue quando urina effluere incipit & desinit, ob tristem sensum ab urina excitatum non intra vesicam, sed extra in ceruice, aut fistula urinaria dum effluit. Quare hæc species dysuriæ non modo affectus & causa, sed parte affecta à stranguiosa dysuria distinguitur. Nam ab iisdem causis oritur rarius tamen ab urinæ magna acrimonia, plerumque proprio affectu, & ulcere in ceruice vesicæ, & fistula urinaria, aut vasis spermaticis & glandulis ad radicem penis, ut in gonorrhæa

Dysuria.

Species dysuria.

I.

Gg s gal-

gallica, interdum ex inflammatione, abscessu, & c.

I.

Altera species dysuriæ, est mictio difficilis & laboriosa, interdum cum dolore, ita ut agri, nisi diu magnoque conatu veniantur, urina libere perfluere nequeat, orta ob debilitatem expultricis vesicæ. Hæc affectio ab Iscuria sola magnitudine differre videtur, & a cæcis levioribus oritur nimirum intemperie, præcipue frigida vesicæ & plerumque cum materia crassa viscida ad hærente, atque infarctæ, vel urinæ permixta, deinde angustia officij vesicæ, ut in Ischuria sed imperfecta, &c. Causæ dysuriæ & stranguriæ eodem modo, ut Ischuriæ dignoscuntur, atque ex iis signis, quæ singulis affectibus renum & vesicæ ascripta sunt.

Mictio cruenta.

Præterea depravata mictio ratione ex toto, tum est cruenta, purulenta, & plaris. Mictio cruenta est, quando urina sanguine perfusa ex eruitur. Causa est venæ in vasis urinariis apertio, à copia & tenuitate sanguinis, &c. vel ruptio & erosio à calculo, acris humoribus, ictu, plaga, &c. Pars prima, id est affecta poterunt esse, tene, ureteres, vesica, cervix vesicæ, meatus penis: A renibus affectis maxime copiosus sanguis emanat, qui initio totius urinæ permiscetur, Deinde liquidus non concretus subsidet; minus copiosus ex cervice vesicæ, quæ urinæ accurate non miscetur, & in grumos facile in vesica concrevit, unde Ischuria, deliquia animi, &c. Paucus ex vesica; paucissimus ex ureteribus. Ex intimo penis meatu sæpe sine urina exit, & qui cum urina effluit, concretus statim subsidet. Accidit nonnullis, teste Aetio, ut per circuitu sanguinem ex apertione venæ in renibus excernant similimodo, ut ex hæmorrhoidibus, unde in principio quidem nihil periculi metuendum est, nisi diuturnior fuerit affectio, aut præter consuetudinem cohibeatur,

tur, ex quo illa mala, quæ ex suppressis hæmorrhoidibus contingunt.

Mictio purulenta fit, vbi urina pure permixta mingitur; pus autem prodit vel ex renibus cæterisque vasis diureticis, aut etiam spermaticis exulceratis in gonorrhæa gallica, &c. vel ex aliis partibus, ut pectore, jecore, &c. si pus per venas ad renes & vesicam transmittant. A renibus superioribusque partibus pus sæpe copiosum urinæ accurate permixtum mingitur. Ab ureteribus paucum capillorum specie innatans. A vesica minus permixtum cum squammulis furfuraceis. A meatu urinario vasisque spermaticis & parastatis exulceratis initio mictionis pus exit, aliquando citra mictionem. Cætera signa partis exulceratæ suo loco descripta sunt.

Præterea Hipp. Galen. & Aetius mictionis pilæ mentionem faciunt, ubi cum urina materia mucosa nunc tenuibus foliis, nunc pilis aut capillis similis excernitur longitudine quandoque unius aut duorum palmorum, quorum causa est crassus viscidus humor in venis à calore exiccatus & coactus qui in transitu per angustas renum venas in tantam longitudinem extenditur, &c.

CAPVT XIV.

DE PARTIVM GENITALIVM
affectibus.

D procreationem maris & foeminæ coniunctione necessario opus est. quod masculinum generandi in alio habeat & semen, unde principium motus, præbeat; foemina

vero

*Partes genita-
les in utroq;
sexu earum-
que officia.*

vero in seipsa gignat & agrum ac materiam potissi-
mu conferat. Instrumenta generationis alia in v-
troque sexu eadem sunt, vt testes vasaque sperma-
tica; alia diuersa, & proportionē sibi inuicem re-
spondentia, in maribus penis & scrotum; in fœmi-
nis ceruix vteri, & uterus: in maribus autem pro-
minent, aut ita conformata sunt, vt in muliebres
partes penetrantia, quasi sementem faciant; in fœ-
minis vero, vt semen aliundē recipiant, & quasi in
argo fœcundo foueant, fructumque producant.
Munus autem testium vtriusque sexus est sangui-
nem & spiritus à vasis præparantibus suscipere, &
in semen prolificum transmutare, deinde elabora-
tum & redundans in vasa eiacularia distribuere,
quæ tempore complexus veneri semen fœmineum
in vterum effundunt; virile in penem impellunt, ac
penis vicissim intenta rigidaq; partim ex spiritu fla-
tulentio per arterias concitato, desiderio rei vene-
reæ, partim vi copiosi seminis ad expellendum
stimulatus, ope quatuor musculorum, in ce. vicem
vteri detrudit. Vteri vero munus est naturali desi-
derio semen virile attrahere, cum proprio semine
miscere, latentemque vim plasticam in semine susci-
tare, siue concipere. Deinde conceptum fouere, &
vt nutriatur, augeatur, singulaque conformentur,
per vasa vmbilicalia sanguinem & spiritum com-
municare, tertio ad debitum tempus pariendi fœ-
tum continere, tandem commodē in lucem edere,
atque ita procreationem absolvere, sub qua conti-
netur conceptio, fœtus formatio, & partus legiti-
mus. Ex quibus apparet, quæ actiones requisitæ
sunt, primum ad actum venereum, deinde ad pro-
creationem, quarum vna læsa, impeditur actus ve-
nereus, aut sobolis procreatio.

*Modus pro-
creationis.*

Menstrua.

Præterea uterus non solum generationi desti-
natus est, sed etiam in fœminis toti corpori inser-
uit,

uit, quatenus menstruum sanguinem statutis temporibus expurgat. Nam in foemina iustæ ætatis ob defectum caloris natiui non digerentis alimentum, ut in maribus, redundant menstrua, excrementa, utilia, quæ in prægnantis retinentur, ut materia pro nutritione & foetus; in cæteris nisi impediatur peculiaris corporibus dispositio, defectus alimenti, ex magna euacuatione inedia, longo morbo, &c naturaliter singulis fere mensibus per uterum expurgantur. Tot sunt functiones partium genitalium, quarum singulæ tribus modis læduntur.

Initium autem sumemus à vitiis testium, vasorumque spermaticorum, ac penis, deinde de utero dicemus, quatenus, menstruorum expurgationi & procreationi inseruit.

Ad procreationem & complexum venereum tres functiones viriles requiruntur, ut diximus, quarum priores duæ etiam foeminis certo modo tribuuntur, nimirum seminis prolifici in testibus productio siue elaboratio, deinde eiectio, tertio gratia eiectio penis erectio, quæ se mutuo ita consequuntur, ut præcedat seminis elaboratio, sequatur in complexu venereo penis erectio, tandemque seminis in utero eiectio: ac primum seminis productio in testibus læditur, si nil omnino generetur, aut generetur, sed paucum, vel imperfectum crudumque, aut acre, corruptum, minusque prolificum, additur à nonnullis nimis copiosa seminis productio, quæ sæpe in iuuenibus plethoricis accidit, qui pollutiones nocturnas patiuntur, vel graviter offenduntur, si à venere prorsus abstineant. Causa læsionis, ut in aliis concoctionibus est frustratio facultatis alteratricis, seu concoctricis in testibus, ex affectu proprio, aut per consensum ac vitio obiecti, siue materiæ, ex qua semen elaboratur.

*Tres actiones
viriles earumque
læsiones.*

*Symptoma
facultatis ge-
neratricis se-
minis & cau-
sa.*

Affectus

XIV.

*Morbite-
stium.**Intemperies
testium.*

Affectus proprii testium sunt primum excessus primarum qualitarum, seu intemperies cujuscunque generis producta à causis externis, vel internis eandem vim habentibus, aliquando per consensum ob intemperiem præcipuorum viscerum. Signa intemperiei frigidaë, sunt antecedens victus frigidus, causa refrigerantes, coitus intempestivus & immodicus, ætate immatura, nulla fere libido, & si concumbant, semen tenue aquosum & infæcundum emittunt, cum exigua aut nulla voluptate, juvantur calidis, &c. Calide intemperiei signa contraria sunt, magna ad venerem propensio, semen acre, calidum, &c. Humida intemperies conjicitur ex laxitate & mollietate partium, & quod celerrime semen emittant, quamprimum penem intentum habent, in coitu non ita facile offendantur, &c. Sicca intemperiei contraria est ratio, &c. Morbi compositionis testium, sunt primum meatuum & vasorum nimia dilatatio retentionem vitians, de qua in gonorrhæa dicitur, ac angustia attractionem & distributionem impediens, quæ plerumque est obstructio à crasso lento humore in fæcto vasis aut testibus, aut à semine crasso retento & incrassato ob intermissum veneris usum; aliquando constipatio aut compressio à tumore præter naturam, validisque astringentibus.

*Tumores testium &
seroti.*

Deinde accidunt testibus morbi in magnitudine vel diminuta ex defectu uti is alimenti siccaque intemperie, &c. vel aucta veluti tumores præter naturam testium seroti, quorum alij pluribus partibus communes sunt, ut inflammationes ex calido sanguine influente, quæ sensibus patent, &c. scirrhi, &c. alij his partibus magis proprii sunt,

aut

aut paucis aliis qui herniæ & ramices appellantur.

Hernia autem Græcis κήλη est tumor scroti, inguinis, vel umbilici ex materia quadam illapsa, *Hernia.* quare ratione loci affecti hernia triplex est, una scroti ὀρχοκήλη; alia a inguinis βεβανοκήλη; tertia umbilici ὀμφαλοκήλη, additur his ob similitudinem tantum βεγγυχοκήλη tumor colli foras prominens ex crassa leta pituita ad colli exitus partes confluenta; hæc nonnullis populis Alpinis ex usu vitiosarum aquarum valde familiaris est: per similitudinem quoque tumor varicosus & aquosus circa pudendi muliebris alas consistens, ab Aetio lib. 10. cap. 100. & 102. hernia mulierum varicosa & aquosa appellatur. De hernia inguinis & umbilici supra de affectibus intestinorum dictum est. Oscheocèle pro diversitate materiæ, *Differentia hernia scroti.* quæ in scrotum dilabitur, varia est, dilabitur autem intestinum aliquod præcipue ileum aut cæcum, quæ valde laxa sunt, nec ita ligata ut cætera, oriturque ἐντεροκήλη; vel omentum, unde ἐπιπλοκήλη; vel aqua, plerumque ex superioribus *ἐντεροκήλη ἐπιπλοκήλη.* partibus defluens scrotum utrimodo implens, nasciturque ὕδρωκήλη, qualis affectio asciten plerumque consequitur, vel flatus ex debili concoctione, unde πνευματοκήλη. Præterea à carne dura *πνευματοκήλη.* testibus, vel scroto adnata, aut ut statuit Galen. λη. à tumore scirrhuso ex crassis lentis humoribus concreto, qui carnosus videtur fit σαρκικήλη. *σαρκικήλη.* Tandem cum venæ testiculum seu potius tunicas eius nutriendas crasso melancholico sanguine refertæ intumescunt, generatur σκίρροκήλη, id est, varicosus ramex.

Causa

XIV.

*Causa illa-
psus intesti-
ni, &c. in
scrotum.*

Causa illapsus intestini, aut omenti, ac aquæ in scrotum est relaxatio aut disruptio vnius aut vtriusque foraminis, seu potius productionis illius peritonei, per quam vasa spermatica, musculiq; cremasteres ad testes & à testibus feruntur. Fernelius in omni enterocoele ac epiplocele existimat internam peritonei tunicam disrumpi, externam vero duntaxat relaxari, sed si interior rumpatur, sine exterioris relaxatione, bubonocelen tantum nasci. Hæc ratio in fœminis locum habere non videtur, quæ non minus, quam viri, bubonocеле infestantur. Relaxant autem meatus & tunicas peritonei humectantia & emollientia, vt intempestiua balnea, potationes, destillationes, &c. Disrumpunt ictus, casus ex alto, saltus, vehemens anhelitus compressio. in vociferatione, tibiæ inflatione: tussi vehementi: item grauioris oneris gestatio. aut dimotio, immodicus coitus pleno ventre, flatuum copia, &c. Quando vterque meatus seu productio peritonei afficitur, in vtramq; scroti partem materia illabitur, altera tantum affecta alterius partis hernia oritur.

Signa.

In enterocoele tumor mollis est repente natus cum fluctuatione & murmure, qui ex satietate, crapula, flatulentis cibis facile augetur, iterumque minuitur, alius sæpe cum magno dolore supprimitur, vt in ileo dictum est. In epiplocele tumor minor, magisque inæqualis & lubricus est, quam in enterocoele, digitisque difficiliter cedens sine rugitu siue fluctuatione, sæpe in pube potius, quam in scroto. Aquosa ac flatulenta hernia opposito lumine perspicuæ apparent, sed aquosa obscurior grauiorque est, quam flatulenta. Sarcocoeles tumor durus grauis, sibi que similis, & pedetentim longior tempore creuit. In scirrhocoele sentitur magna tumoris diuersitas, vasaque quasi intorta ac agglomerata. Omnium periculosiss. est enterocoele, potissimum si intestinum

sinum reduci nequeat aut si violenter reponatur: à sinistra parte gravior semper est, quam à dextra.

Præterea ex defectu unius, aut utriusque testis, ut *Morbus in numero.* in Eunuchis, oritur morbus in numero, veneris usum prohibens, virilitatem tollens, qui accidit, si excisi fuerint, aut ex effluxu vitiosi humoris corrupti, aut contusi & contriti computruerint, vel contabuerint.

Evenit quoque interdum, ut testes situm mutant, & unus aut ambo sursum contractus sit, ob breviterem *Morbus testium in situ.* seu contractionem ligamentorum aut partium, quibus suspentuntur, vel ab ortu, vitio conformationis,

vel post ob inflammationem, exiccationem, repletionem seu distentionem &c. Adduntur his solutiones continui, ut vulnus, contritio testis, exulceratio *Solutio continui.* ex acii & erodente humore, sæpe prava qualitate inquinato, ex lue venerea, unde gonorrhæa gallica, &c.

Laduntur testium functiones per consensum errore objecti, quando per vasa spermatica deferentia à venis & arteriis sanguinem quantitate, aut qualitate minus idoneum ad nutritionem, & seminis prolifici generationem non suscipiunt: sed aut ita copiosum, ut testes conficere nequeant, viresque eorum obruat: aut ita paucum, ut ad semen generandum non sufficiat, & vix ad testes nutriendos: aut qualitate pravam & vitiosum: aut in ipsis vasis spermaticis non rite præparatum, quorum omnium causa, est vitium vel valorum spermaticorum, vel ipsius sanguinis. Vasorum autem læsa ipso um attractrice, retentrice, alteratrice aut expultrice, præcipue ab insigni intemperie, cavitatum nimia dilatatione, vel angustia, ac unitatis solutione, exulceratione, &c. Nam non solum in testibus, sed etiam in vasis spermaticis attractrice vasorum debilitata ab intemperie frigida præcipue, aut impedita ab angustia vasorum, testes defectu sanguinis & spiri-

Morbi per consensum.

Affectus vasorum præparantium.

H h tuum

tuum semen non generant. Deinde concoctrice vasorum debilitata aut retentrice exoluta ab intemperie, nimia dilatatione aut exulceratione sanguis crudus non preparatus ad testes confluit, quem conficere nequeunt, unde profluvium seminis crudi oritur, præcipue expultrice vasorum & testium irritata copia, aut acrimonia materia.

Vitia materia ex qua semen generatur.

Materia ex qua semen generatur, est residuum utilis alimenti sive sanguinis in corpore ultra nutritionem redundans, ut alibi dictum est. Vitia eius sunt aliena quantitas vel qualitas, quantitas autem aliena, est excessus aut defectus, verum ubi magna sanguinis copia in venis redundat, ut in plethoricis aut juvenibus qui liberaliori victu & otio, fructibus & alimentis copiosum semen gignentibus, utuntur, si testes vasaq; spermatica naturaliter disposita sint, viresq; robustæ plus non attrahunt, quam conficiunt, & copiosum semen generant, unde nocturnæ pollutiones, ut infra dicetur. Nam reliquum utilis excrementi in venis manens corpus alit. Sin præter naturam ad testes plus confluat, ut attrahatur, quam conficere, & ob retentricis debilitatem retinere queant, semen crudum aut pravum generatur, &c. Ob defectum sanguinis & spirituum in testibus seminis defectus oritur. Debet autem vel secundum naturam, ut in decrepitis ob siccitatem frigiditatemque, & pueris, ob corporis incrementum: vel præter naturam, primum ob inopiam utilis alimenti in venis, aut ob corporis exsiccationem & consumptionem ex inedia, vigiliis, laboribus, curis, atrophia, magnis evacuationibus, diuturno morbo medicamentis semen extinguentibus, corporis raritate, sicca intemperie cordis cerebri jeconisque, defectuque spirituum, sectione venarum post aures &c. Deinde quia in alias partes validius attrahitur & in corporis augmentum absimitur, ut in pinguibus, obesis

Defectus materia seminis.

magni-

magnisq; corporibus: tam viri, quam mulieres corpore obeso vastoque minus fœcundi sunt. Qualitas *Alienâ qualitate materia* aliena sanguinis est intemperat̃ia vel in primis qualitatibus, ut frigiditas, caliditas, &c. vel secundis ut *feminis.* crassities, visciditas, acrimonia, tenuitas, corruptio, &c. orta ex prava viscerum constitutione, vitiosis alimentis, & in corporibus cacochymicis, quæ vitiosis humoribus referta sunt, quæ omnia ex dispositione corporis & præcipuorum viscerum facile dignoscuntur. His modis læduntur functiones testium seminisque generatio.

Præterea læditur expultrix testium seminisq; ejaculatio per vasa & penem, affectis aut testibus, aut *De seminis* vasis ejaculatoriis, aut pene. Ejaculatio sive expul. *emissione seminis.* sio seminis, est actio propria testium vasorumque, *ejaculatio -* dum à copia aut acrimonia seminis turgescent, & *ne.* desiderio expellendi fervent, ad quem penis actio tantum concurrat, quatenus via est per quam semen in uterum detrudatur ob ejus attritionem in coitu factam expultrix testium vasorumque incalescens, majori vi ad expellendum incitatur, simulque adjuvatur a duobus musculis penis.

Morbi vasorum semen deferentium, ejaculationem lædentes, sunt intemperies omnis generis, quæ *Morbi vasorum semen* dignoscuntur ut testium: deinde inflammatio & affectus inflammatorij: Tertio nimia dilatio, aut angustia, ut obstructio à crassis lentis humoribus, aut semine crasso diu retento: aliquando constipatio aut compressio à tumore: coalescentia ab ulcere. Præterea continui solutio, præcipue exulceratio ab acris mordacibus humoribus, & corrupto semine, ex impuro concubitu, lueque venerea: plerumq; afficiuntur glandulae prostaticæ ad cervicem vesicæ & initium penis positæ, quæ semen asservant, unde tensio dolorque circa radicem penis, &c. De Affectibus penis præcedenti capite dictum est.

**Symptoma
ta accidentia
circa emissio-
nem seminis.** XIV. Læditur autem seminis ejaculatio tribus mo-
dis, quorum primus est abolita seminis emissio, ubi
ex vasis nihil expelli queat: alter diminuta emissio,
ubi paucum nec effatu dignum expellitur: tertius
depravata expulsio, quæ multiplex, una quando in
& circa actum venereum ex emissionem seminis cor-
pus præter naturam afficitur, sci icet convellitur,
vel cum semine feces, aliaque expelluntur, ut in
nonnullis prostrata mentis ac epilepticis, &c. alte-
ra quando citra actum venereum effunditur, vel in
somno tantum, quæ pollutio nocturna dicitur:
vel quocunque tempore & præter voluntatem ci-
traque imaginationem, quæ Gonorrhæa appella-
tur, Gonorrhæa vero alia simplex est sine penis ere-
ctione, alia cum priapismo conjuncta penisq; ten-
sione.

**Symptoma
circa penis
erectionem.**

Similiter penis tensio seu erectio tripliciter lædi-
tur. Nam aut prorsus tollitur, tendique nulla ra-
tione poterit, aut debilitatur, minusque prompte,
rarius quam oportet, & cum difficultate erigi ur:
aut depravatur, seu immodice ac præter volunta-
tem cit a Veneris desiderium & imaginationem
cum dolore tenditur, quod posterius symptoma, à
Priapo Satyro, quem ob lasciviam cum tali mem-
bro genitali veteres finxerunt, Priapismus & Saty-
riasis quoque à Galeno dicitur: Qui vero ob impo-
tentiam & ignaviam membrorum genitalium re ve-
nerea uti nequeunt, quamvis maxime cupiant, im-
potentes vocantur: sicut qui vitiosum semen, aut
non prolificum aut non debito modo emittunt, in-
fecundi.

**Impotentia
quid?**

Communiter impotentia est depravata fun-
ctio virilis facultatis, quæ consistit in seminis gene-
ratione & emissionem: primario tamen & proprie
illi impotentes dicuntur, quorum membrum ge-
nitale ad coitum insurgere nequit: deinde qui se-
men

men emittere non valent. Quare pars primario affecta est penis cujus proprium munus est desiderio libidinis, ad coitum insurgere, & semen ex testibus vasisque spermaticis attritione sua al'icere, & in uterum detrudere: secundario testes vasaque spermatica. Nam in coitu requiritur penis erectio & seminis ejaculatio ob utramque actionem absolute, aut ad tempus deperditam viros impotentes appellare solemus. Ad penis erectionem concurrunt tria, quorum primum non semper necessarium est feminis copia in vasis expultricem stimulans: alterum ex libidinis desiderio spiritus fistulorum penis nervum implens, tertium actio musculorum penem attollentium, quare penis non erigitur triplici de causa, nimirum defectu seminis in vasis, vel spiritus in fistuloso penis nervo, vel à paraly'si musculorum penis. De causis paraly'sis & defectus seminis supra dictum est. Deficit autem spiritus in fistuloso penis nervo, quia paucus in corpore procreatur, aut a pene avocatur, aut non recipitur. Non procreatur defectu caloris nativi utilisque alimenti in corpore, ut in senibus & valetudinariis, & ab omnibus, quæ spirituum robur dissolvunt. A pene spiritum avocant, venerisque stimulos coercent, vehementiores cogitationes, & curæ, labores, contemplationes, &c. (*Otia enim sitollas periere cupidinis arcus*) ac in ipso actu venereo, aut ante, nimia lætitia, timor, indignatio, &c. ut penem erigere, & voluntatem ex-
 plere nequeant. Præterea quia de re venerea cogitationem nullam admittunt, & venereis illecebris assueti non sunt. Verum quibus spiritus avocantur impotent: absolute censeari non debent. Tertio spiritus à veneris desiderio concitatus a pene non suscipitur, quia frigidus siccus, exanguis, brevis, exilis, ut in decrepitis & in i's, qui partibus genitalibus nunquam usi sunt. Nam ignavia vires exolvit: pro-

Causa.

Causa cur pe-
nis erigi ne-
quit.

propriij muneris exercitatio robur membrorum auget, vel quod alio gravi morbo affectus est, ut à tumore, ulcere, partis amputatione &c. Accidit interdum ob nimiam penis longitudinem aggravantem, ut ab exiguo spiritu impleri, extendi & attolli nequeat: & si erigatur pondere suo statim concidat. Advitium in spiritibus potissimum eorumque evocationem subtractionemq; referri poterit extincta virilitas ex maleficorum incantamentis. Nam qui proprie maleficiati vocantur, membra genitalia pro natura modo habere videntur illisq; citra ullum affectum repente virilitas exinguitur. Interdum cum alia coire possunt, sed non cum propria conjugē.

Qua requirantur ad seminis eiactationem.

Ad emissionem seu ejaculationem seminis in coitu tria concurrere debent, I semen naturaliter dispositum expultricem stimulos, non crassum, viscidum, tenuis, &c II. v. s expultrix testium, vasorumque deferentium satis robusta: III. viæ patentes & naturaliter ad hoc opus dispositæ exquisito sensu præditæ, penis rigidus, bene conformatus non nimis brevis aut longus indirectus aut tortuosus, &c. stimularur autem facultas expultrix seminis copia & acrimonia ac etiam in coitu ex nimia attritione, dum incalescens effervescit: expulsionem adjuvat motus duorum musculorum penis, qui tempore ejaculationis prostatas comprimunt, semenque exprimunt, & alliciunt.

Causa deperdita eiactationis seminis.

Igitur deperdita seminis ejaculatio oritur vitio vel seminis ex defectu potissimum, interdum si facultas expultrix valde debilis sit ex crassitie aut visciditate ejusdem, vel vitio expultricis testium, vasorumque deferentium, vel penis. De causis defectus seminis jam dictum est. Expultrix vero testium vasorumque labefactatur ab intemperie præcipue frigida sicca, qualis decrepitis accidit: impeditur ob angustiam quandam cavitatum scilicet obstru-

structionem constipationem, &c. Vitio penis seminis ejaculatio laeditur, quia erigi nequit, ut jam diximus, aut meatus semini & urinæ communis interceptus est, obstructione, constipatione aut coalescentia: vel à glande deorsum vehementer retracto tortuosus & obliquus redditur, ut semen in colli flexibus hæreat, & directe in cervicem uteri emitti nequeat. quos ita affectos Gal. *ἰστροσπυδιᾶς* vocat: distorquetur vero glans à ligamento duro tortuoso sæpe vitio conformationis, interdum post ortum ob tumorem ligamenti, qui pertractanti intra penem, glandulæ speciem refert, & penis nodus vocatur. His additur nimia penis brevitās, & longitudo, resolutio musculorum penis. Verum excepta meatus angustia cæteri affectus omnem seminis emissionem non impediunt, sed ejaculationem in uterum accoiturum. Nam ob brevitatem coitus imminuitur, & semen procul non propellitur: ob nimiam longitudinem cum tenuitate, spiritus, & vis seminis prolifici evanescit. Verum qui hoc modo afficiuntur, ac quicumque coire quidem possunt, sed paucum minusque prolificum semen emittunt, frigidum, aquosum, tenue, vel calidum, acre, corruptum, non proprie impotentes, sed infœcundi tantum appellantur, ut infra de sterilitate mulierum dicetur.

Priapismus & Satyriasis ab Aetio & Gal. pro eodem sumuntur: quidam sola palpitatione satyriasin à priapismo distinguunt. Paulus satyriasin mulieribus quoque accidere dicit, sed rarius, quam viris: & definit, palpitationem pudendi consequentem affectionem inflammatoriam vasorum spermaticorum, cum tensione: quare parte primario affecta, causa, modoque affectus à priapismo distinguitur. Nam pars primario affecta, ponuntur à Paulo vasa spermatica: causa, affectus inflammatorius, qualis

Depriapismo & Satyriasi.

Quid satyriasis.

Hh 4 etiam

etiam cervici uteri in mulieribus accidit teste Aetio, ex falsis acribus humoribus ingentem pruritum cum dolore excitantibus, unde satyriasis, ardensque coeundi desiderium. Palpitationem vero istam Trincavella arbitratur in viris, nil aliud esse, quam penis motum palpitationi similem, compositum ex erectione & residentia: Morbus hic acutus est, palpitatio vero nisi brevi finiatur, in paralyfin aut convulsionem terminari solet: deinde convulsio celesiter cum ventris inflatione & sudore frigido ad mortem.

*Priapismus
proprie dictus.*

Causa.

Priapismus proprie dictus est, tensio seu erectio pudendi præter naturam citra veneris desiderium, orta à flatulento spiritu, replente fistulosum penis nervum. Pars affecta est penis, primario nervus fistulosus, deinde muscoli penem attollentes plerumque duo, qui seminis expulsionem servant. Causa est distentio fistulosi illius nervi, & musculorum convulsio à repletionem ex spiritu: repletur interdum ob vaporosum spiritum in ipso nervo genitum, ab intemperie frigida, &c. plerumque ob orarum arteriarum immodice dilatata, & patentia, copiosum spiritum effundentia, vel quia calefactis lumbis renibusque multa equitatione, decubitu super dorsum, &c. arteriae penis calidiores redduntur, vel quia multo spiritu implentur, quod accidit iis, qui copioso semine abundant, liberaliori victu utuntur, & præter consuetudinem à coitu abstinere, & nulla exercitatione sanguinis copiam dissipant, ac etiam iis, qui sermonibus & spectaculis Venerem stimulantibus delectantur, cibisque acribus flatulentis semen generantibus utuntur. Impletur quoque fistulosus nervus à flatuloso spiritu in pene vel vasis genito, ex crasso crudo humore à calore non proportionato, ut voluit Gal. 4. Methodi. Qui priapismo corripiuntur non aliter, quam qui tetano ten.

tentantur, dolent, pudendum distentum habent, ac convulsionis modo interdum pereunt cum ventris inflatione sudoreque frigido.

Gonorrhæa, ut supra diximus, alia simplex est, alia cum penis tensione conjuncta. Illa mihiioni involuntariæ correspondet, & mulieribus quoque accidit, sed rarius, quam viris: hæc tantum viris. Gonorrhæa autem vera est involuntaria seminis emissio sine tensione pudendi venerisque desiderio, orta à debilitate retentricis vasorum spermaticorum. Dico sine veneris desiderio. Nam ubi ex attenta rei veneræ cogitatione semen copiose excernitur, gonorrhæa non est, sed opus quoddam naturæ. *Causa.* proxima est imbecillitas functionis retentricis testium, vasorumque seminalium, ut semen debito tempore non retineant aut tamdiu, donec concoquatur. Contrahitur ista debilitas ex affectu proprio testium vasorumque spermaticorum, præcipue ex intemperie frigida humida, vasa relaxante & patientiora reddente, producta ex intempestivo coitu ætate adhuc immatura, crebro usu alimentorum frigidorum humidorum, balneorum, affluxu humorum pituitosorum, &c. Læditur etiam retentrix exulceratione vasorum, ac etiam vitio objecti, ob redundantiam seminis præcipue frigidi, tenuis, aquosi, crudi, aliquando corrupti, quod Cacochymicis sæpe accidit, unde semen diversorum colorum exit, nunc viride puri fere simile, nunc loturam carnis referens, aliquando cum dolore, urina ardore, si viæ exulceratæ sint. Verum ubi semen nimia copia, aut acrimonia expultricem stimulans tensionem pudendi efficit, tum non oritur vera gonorrhæa, sed si tensio perpetua sit, priapismus, affecto rara & acuta, sin tempore tantum emissionis seminis, Notha quædam Gonorrhæa, quæ à pollutione nocturna non distinguitur, nisi quod interdum quo-

Hh 5 que

que accidat, & pollutionem nocturnam inveteratam consequatur, ob expultricem testium, vasorumque spermaticorum stimulatam acrimonia seminis, ut infra in causis pollutionis diceretur.

*Gonorrhæa
gallica.*

*Gonorrhæa
ex convulsio-
ne.*

*Gonorrhæa
ex colliqua-
tione renum.*

*Gonorrhæa
in tabe dor-
sali.*

Adduntur his species aliæ nonnullæ, & primum gonorrhæa gallica contracta à lue venerea, ex acrimonia corrupto virulento semine vasa spermatica plerumque exulcerante: Deinde juxta Avicennam duæ species, quarum prima est seminis emissio, ex convulsione musculorum genitalium, qualis Epilepticis accidit, & in aliis corporis convulsionibus, &c. altera est frequens excretio non seminis, sed pinguedinis cujusdam post mictionem & urinas ex phthisi sive colliquatione renum, ob nimis frequentem & immodicum coitum in juvenibus potissimum. Huc refertur profluvium seminis in tabe dorsali, quæ ut ut ab Hipp. lib. 2. de morbis describitur, novos maritos & libidinosos corripit ex nimia venere, & cum sterco aut urinam reddunt semen genitale copiosum & liquidum emittunt, noctuque veneris ludibria patiuntur, colliquantur anhelosi & imbecilli evadunt, &c.

*Pollutio no-
cturna.*

Tandem pollutio nocturna est, seminis in somno emissio, plerumque cum tensione pudendi, & veneris insomniis. Dico plerumque, nam aliquibus, teste Aetio, nulla fere præcedente imaginatione, ac etiam citra sensum, profluit semen, ob re-
tentricis debilitatem, non aliter fere, quam in vera gonorrhæa, hæc nonnullis ob mastitiam aut inediam etiam accidit. Plerumque seminis emissio est cum veneris insomniis & tensione pudendi ob expultricem irritatam copia aut acrimonia seminis. Nam duæ hujus species sunt, una orta ob robur partium genitalium, & seminis copiam expultricem irritantem, quæ nisi modum excedat, opus naturæ

naturæ est potius, quam symptoma: altera fit ob a-
crimoniam seminis expultricem vasorum stimulan-
tem vitio vasorum aut seminis. Nam interdum i-
psa vasa præter naturam affecta (nimirum calida in-
temperie, inflammatione, exulceratione, &c.) co-
piam ac etiam qualitatem naturalem seminis non
sustinent: non raro ipsum semen vitiosum est magis
calidum acre & mordax, quam ut vasa naturaliter
disposita ferre queant. Cuius ratione semen cum
dolore sæpe effluit, si adsit lues gallica, in transi-
tu vias statim exuleerat. Hoc profluvium iis ple-
rumque accidit, qui vitioso sanguine abundant, il-
losque gravissime affligit, qui semen multum acre
calidum gignunt, ad excretionem vehementer ur-
gens. Nam hi per coitum exolutionem oris ventri-
culi totiusque corporis patiuntur, squallidi pallidi-
que redduntur, oculosque cavos habent, nec tamen
ex continentia, aut absentia coitus magnopere ju-
vantur, sed gravedine capitis, æstu & fastidio ventri-
culi anguntur, & in somno etiam semen copiosum
profundunt.

Viris & mulieribus affectus nonnulli commu-
nes sunt: in quibus vero à mulieribus viri diffi-
dent, & mulieres à viris, sua propria & pecu-
liaria patiuntur vitia. Mulieres utero donatæ
sunt, ad procreationem & menstrui sanguinis sta-
tutis temporibus expurgationem, sub utero hic
intelligimus cervicem uteri, & vulvam: ad quo-
rum inculpatas actiones perficiendas requiritur a-
pta constitutio tam per consensum, cum aliis par-
tibus, quam per essentiam: quæ consistit in tem-
perie primarum qualitatum, debita compositio-
ne, & utriusque unitate: quorum uno vitiato læ-
duntur functiones uteri. Læduntur autem singu-
læ functiones, tam privatæ, quæ nutritioni servi-
unt,

*De morbis
mulierum.*

unt, quam publice, nimirum procreatio (sub qua continetur conceptio, foetus gestatio & partus) deinde menstrui sanguinis statutis temporibus expurgatio tribus modis, ut infra latius dicetur.

*Affectus
uteri.*

Causæ læsionis, affectus sunt uteri proprii, aut per consensum. Morbi autem, qui mulieribus ratione uteri accidunt, acuti, magni, periculosi & intellectu difficiles sunt, quod se ægrotare nesciant priusquam morbus invalescat, aut narrare præ pudore vereantur, nisi vi morbi cogantur, quo tempore sæpe incurabiles sunt. Laborare autem uterus solet omni fere genere morborum, quorum primum est intemperies, quæ nativam temperiem evertit, & functiones omnes uteri in sua substantia labefactat, ex qua uteri debilitas. Intemperies est, vel simplex, vel composita, sine, vel cum materia, orta à causis eandem vim habentibus, ut supra capite *de morborum causis*: & plerumque cum simili intemperie præcipuorum viscerum.

Intemperies. Peculiariter intemperies frigida vel à causis refrigerantibus, vel ob spiritus & caloris nativi resolutionem, à laborioso partu frequenti abortu, gravi morbo, &c. Propter frigidam intemperiem, quia uterus alimentum non conficit, nec supervacanea expellit, ideo crudis frigidisque humoribus abundat, unde obstetrix contactu oris uteri, pudenda multo mucore repleta percipit, os uteri quasi solidum est sine sensu, torpent inguina, difficulter moventur, flatibus abundant, & quia spissior frigidiorque uterus est, non concipiunt, & menstrua supprimuntur, aut aquosa fluunt, venerem fastidiunt, omnesque actiones debiles, aut deperditas obtinent.

Calidæ intemperiei contraria ratio est. Nam partes pudendi calidæ sunt, menstrua pauca exeunt, aut acrida, rubicunda, nigra, cum dolore, ut viæ interdum

dum exulcerentur, & ob acrimoniam nullum ordinem quoq; servant, magna ad coitum appetentia est, &c. Quæ humida uteri intemperie laborant, laxas madidasq; uteri partes habent, menses copiosos, aquosos aut decolores, coitum non appetunt, nec eo delectantur, neq; semen retinent: ob id non concipiunt, & si concipiant, cito abortiunt, ad motum impotentes sunt, & desides. In sicca intemperie contraria omnia sunt, pudendum contractu squalidum, siccum sentitur, l gamenta contrahuntur, menses paucissimi crassiq; sunt initio coitu non delectantur, nisi calida intemperies conjuncta sit, deinde non facile satiantur, juvantur humidis, læduntur siccis, &c. Compositæ intemperies ex his notis inter se complicatis dignoscuntur. si materia accesserit, intemperiem fovens, cognoscitur partim ex causis præcedentibus, partim ex effectis, ut excrementis, colore corporis, & imprimis papillarum, quæ utero maxime consentiunt. Debilitantur functiones uteri nimis, ab intemperie calida humida: maxime à frigida sicca. Deinde ex ea, quæ à frigido humido succo ortum habet, ubi acetabula uteri mucos replentur, cujus ratione semen viri injectum non detinetur, sed vel à concubitu, vel aliquandiu post effluit, menses exuberant, & inordinate interdum bis aut ter in mense defluunt, aquosi, decolores, tempore menstruorum sæpe pectinis, lumborum, crurumq; gravitas adest, stomachus afficitur, & à vaporibus sursum elevatis dolores, suffocationes uteri, &c consequuntur.

Secundo morbi conformationis uteri in superficie interna sunt, nimia asperitas, attractionem seminis impediens, ab exulceratione, exsiccatione, aut defluxu acrium humorum, vel immodica levitas retentionem semine & conceptus prohibens, cujus causæ sunt humor puitosus: crassus, visci-

Morbi conformationis.

viscidus tunicis tenaciter adhærens, easque obli-
uens, &c.

*Immodica
dilatatio ca-
vitatū
uteri.*

Deinde morbi in meatibus & cavitatibus mem-
bri genitalis, sunt immodica dilatatio & angustia.
Nam hæc vim attractricem seminis in uterum, ac
expultricem menstruum & partum prohibet, illa
retentionem seminis, conceptus & menstruum
impedit. Immodica autem dilatatio cavitatum &
meatum fit, plerumque à relaxantibus, ut de-
fluxu pituitosorum humorum ex venis, aut semi-
nis crudi, aquosi ex vasis spermaticis, aut à bal-
neis humectantibus, &c. aliquando à copia tenui-
um acrium humorum ex apertione venarum ute-
ri, &c. ut in profluvio menstruum latius dice-
tur.

*Angustia
uteri.
Φίμωσις.*

Angustia vero seu contractio, & obturatio par-
tium genitalis mulieris communiter *Φίμωσις* & *Φί-
μωσις* appellatur. Angustia vel est in pudendo a-
liisque vulvæ, vel in ipso orificio uteri, vel in inter-
medio loco scilicet ceruice uteri proprie dicta. Ori-
tur vel in utero vitio facultatis formatricis ex mem-
brana aut carne innata, foramen intercludente, ac
etiam ut scribit Avicenna & Aristot. 4 de gener. A-
nim. capit. 1. ex coalescentia & coniunctione labio-
rum oris uteri, vel post ortum, primo ex crasso vi-
scido humore coacervato intra uterum, qui inter-
dum acetabula, sive orificia vasorum uteri oblini-
t, clauditque, aliquando os uteri & cervicem occu-
pat obstruitque, ut semen recipere nequeat. Dein-
de usu medicamentorum valide astringentium intra
os pubis, quod interdum ab imperitis obstetricibus
fit à partu, ut fluxum immoderatum suppressant, a-
liquando à meretricibus, ut strictiores reddantur,
virginesque habeantur. Tertio à corpore cavitati
&

& foramini membri genitalis inuato viam interclu-
dente seu constipante, quale est tumor aliquis præ-
ter naturam, ut inflammatio, scirrhus, &c. carnis
excreſcentia ex ulcere pudendi, cicatrix calloſa, aut
membrana innata, quæ interdum meatum plane
obturat, aliquando propendet, qualis affectus eſt,
qui nympha & cauda vocantur. Præterea coaleſcen-
tia oris uteri ex ulcere tunicas conglutinante, item
compreſſio à multa omenti pinguedine, ut in obe-
ſis, quæ raro concipiunt, aut à tumore partium vi-
cinarum & inteſtini recti, veſicæ, &c. Tandem
conniventia oris uteri à multitudine materiæ ſub-
ſtantiam uteri ita diſtendente, ut os ejus concluda-
tur, quod in uteri hydropè & inflatione accidit. Pro-
prie autem *ſtipſio oris* à Paulo & Celſo vocatur obtura-
tio ſeu intercluſio foraminis membri genitalis à
membrana aut carne innata, additur à nonnullis in-
flammatio indurata ſeu tumor, ſcirrhus, coaleſcen-
tia ab ulcere glutinante tunicas meatuum, & calloſa
durities.

Quæ vero vitio formatricis ex nativitate obtu-
rantur, ab Aetio non perforatæ proprie appellan-
tur. Dignoſcitur affectus ex relatione agræ & con-
tactu aut viſu, adhibito ſpeculo matricis. Quibus
pudendi labia obturantur, nec coire nec menſtrua
emittere poſſunt. Si in cervice ſit obturatio coire
quidem ſolent, ſed ſemen a viro ejaculatum cito de-
cidit, menſtruaque non habent. Sin in uteri oriſi-
cio vitium ſit, menſtruis non carent, viroq; uti poſ-
ſunt, ſed non concipiunt, accidit tamen ut ſemen
intra uteri anguſtum oriſicium admiſſum, conce-
ptus cauſa ſit, verum ob anguſtiam loci fœtus præ-
gnanti mortem accerſit.

*Signa loci
affecti.*

Accidunt

XIV.

*Morbi uteri
in magnitu-
dine.*

*Tumores
uteri.*

*Species tumo-
rum uteri.*

*Causa in-
flammatio-
nis uteri.*

Accidunt utero morbi in magnitudine diminu-
ta, vel aucta. Diminuta autem magnitudo, seu
parvitas uteri; ut plurimum ab ortu is evenit, quæ
concipere quidem solent, sed fœtum a ere, & ad
perfectionem deducere nequeunt. Sub aucta ma-
gnitudine continentur tumores omnes uteri præ-
ternaturam. Intumescit autem uterus duobus mo-
dis, uno à materia substantiæ uteri impacta, vnde
tumor proprie dictus: alio ex materia præterna-
ram in cavitate collecta, quæ replet, & non raro ad
similitudinem prægnantium uterum extendit: sub
hac specie continentur, mola, hydrops uteri, falsa
ingravidatio &c. Tumor autem uteri proprie di-
ctus, est magnitudo aucta cum intemperie orta ex
materia impacta substantiæ uteri. Materia illa est
humor aliquis, aut vapor flatulentus. Humor au-
tem cujuscunque generis esse poterit simplex, aut
ex pluribus permixtus, aut non naturalis. Ex sangui-
ne enim substantiæ uteri impactato oritur phlegmo-
ne exquisita, ex bile naturali, erysipelas: ex crassa
acri, herpes: ex pituita naturali œdema: ex crassa
lenta, scirrhus non exquisitus: huc referri poterit
scirrhus ex inflammatione indurata, ex melanco-
lia naturali impacta & indurata, scirrhus exquisitus:
ex adusta minus fervida, cancer: ex fervida carbun-
culus: ex flatulento humore impactato inflatio ori-
tur. Adduntur his in cervice uteri & pudendo con-
dylomata, thymi, hæmorrhoides cæcæ &c. ut in
ano. Quare omni fere genere tumorum uterus af-
fici solet, frequentissime inflammatione à sangui-
ne ex venis in substantiam uteri effuso, ibique pu-
trescente: effunditur autem ob plagam & contri-
tionem uteri, nimium coitum, abortum, exulcera-
tionem, menstruorum suppressionem, longam &
molestam ambulationem, flatus, immodicum fri-
gus, &c. Tumor autem vel totum occupat, vel par-
tem

rem nimirum anteriorem aut posteriorem, dextram vel sinistram, superiorem seu fundum, aut partem inferiorem sive os: non raro cervix uteri tantum afficitur, quod facile contactu, ac per dioptram dignoscitur.

Ubi intumescit uterus ex conclusa materia intra *Signa tumorum;* cavitatem, dum ægra ab uno latere in aliud se movet, fluctuationem & fragorem percipit, tumor ut plurimum maior est, magisq; æqualis, sed minus dolorificus, quam in tumoribus substantiæ uteri. Tumor vero uteri contactu deprehenditur, & ex tensione aliqua in media abdominis parte cum læsis functionibus uteri: si magnus sit, & in anteriori parte, urina supprimitur, aut cum difficultate exit, dolor major in pube percipitur: si in posteriore parte, feces alvi cum difficultate egeruntur, dolor lumbos infestat: si fundus afficiatur, dolor & tumor ad umbilicum pertingunt: sin latera, inguina tenduntur, ac crura gravantur.

Tumor autem mollis cum dolore pungente & *Signa tumorum;* distendente sine gravitate & febre, est à flatibus: *vis flatulenti.* tumor cum gravitate ab humore: humor si pituitatus, tenuis sit, tumor mollis erit, tactui cedens, seseque *Oedematia.* rursus paulatim attollens sine evidente dolore aut *Scirrhi.* febre. In scirrho vero, tumor durus gravis percipitur sine dolore, nisi spurius sit, difficulter movetur, & in progressu color corporis mutatur: quod in cancro uteri non exulcerato quoque evenit, sed *Signa canceri.* cancer vehementi dolore pungente non sine calore affligit, præsertim circa summum ventrem, inguina & lumbos, & medicamentis facile exacerbatur, ipseque tumor durus inæqualis colore sæculentus, aut sublividus reperitur, &c si cancer exulceratus sit, excernitur sanies tenuis aquosa, nigra graveolens, aliquando sanguis, prædicta symptomata sæviora redduntur, &c si materia calida sit, &

XIV.
Signa inflā-
mationis.

Abscessus u-
teri.

Hydrops
uteri.

tumor sub genere, inflammationis ex dolore febreq; deprehenditur. Nam omni inflammationi uteri conjuncta est febris continua, dolor acris pulsatis, tensio gravitasque imi ventris, oris uteri conniventia, &c. Dolor autem eo vehementior est, & febris ardentior, quo materia calidior fuerit, & inflammatio major. Nam ubi inflammatio erysipelatis particeps est, tumor minor quidem percipitur, sed dolor & febris ardentior, sitis & vigiliæ pertrinitiores, symptomata omnia vehementiora: inflammatio enim magna uterum stomachum cerebrum & cor in consensum trahit, unde vomitus, anxietas, dolor capitis præcipue sincipitis, deorsum retractio tendinum colli, basis oculorum: pulsus parvi crebri, deliquia animi, &c. quæ iam uteri carbunculum potissimum comitantur, qui maxime lethalis est, ac ingenti ardore vehementissimisque symptomatibus favit. Omnis autem uteri inflammatio periculosa est. Terminatur interdum in abscessum, ut inflammationes aliarum partium, ut dum pus fit, dolores & febres nullo ordine augentur, quæ confecto pure mitescunt, rursumque dum rumpitur abscessus redeunt. Post abscessum diruptum, ulcus relinquatur.

Hydrops uteri sæpe sumitur pro intumescencia præter naturam inferioris ventris, à tumore uteri ex aquoso humore, aut flatibus conclusis: proprie vero tumor, qui ex humore aquoso, seroso, tenui oritur, hydrops uteri proprie appellatur, qui à flatibus inclusis inflatio ac tympanites uteri. In hydrope colligitur tenuis serosus, aut aqueus humor, præcipue in spatio seu cavitate uteri, non raro in ipsius substantia videlicet erumpunt, seu vesiculæ aqua plenæ. Humor inclusus sæpe frigidus aquosusque est, interdum acris, qui cum expurga-

purgatur subcruentus saniosus effluit, quasi muria pudenda mordens & erodens. Causa est debilitas caloris nativi uteri, contracta ex frequenti abortu, difficili partu, suppressione menstruum, usu refrigerantium, una cum angustia aliqua orificij ipsius uteri. Colligitur autem humor intra uterum, rarius per solam congestionem ob debilitatem facultatis alteratricis & expultricis, sæpissime per transmissionem aliunde, veluti ex vero hydrope abdominis, materia per cœcas vias in uterum prolabente: aliquando à vena cava serosum sanguinem in uterum instillante principium sumit: aut ex jecore & liene, ut verus hydrops, post longam menstruum suppressionem & conceptum impeditum. Concluditur & detinetur humor intra cavitatem uteri ob angustiam aliquam cervicis ejusdem, ut obstructionem à crasso lento humore, grumo sanguinis, &c. constipationem à tumore, plerumque ob conniventiam oris à copia humoris replentis & distendentis corpus uteri.

Mulieres quæ hydrope uteri laborant, sæpissime prægnantes existimantur. Consequitur hydropem uteri tumor, circa imum ventrem amplius laxus, & dum de latere in latus se convertunt, strepitus aut murmur aliquis auditur, in ambulando gravitas, & respirandi difficultas, conceptus mensesque impediuntur, aut pauci pravi cruenti foetidi nullo ordine exeunt, & uteri ad contactum gracile & humidum sentitur, excrementa alvi grave olent, mammae turgidæ laxæque fiunt, & si lac in mammis sit, vitiatur & aqueum evadit, &c.

Inflatio seu tympanites uteri, est tumor ex flatulento vapore in utero collecto & incluso. Concluditur flatus præcipue intra cavitatem uteri, aliquando poros uteri & vasa subit & distendit,

*Signa hydro-
pæ.*

*Inflatio seu
tympanites
uteri.*

II 2

Causa

Causa est debilitas caloris nativi uteri cum angustia aliqua orificij ejusdem, ut in hydrope uteri: flatus autem interdum in ipso utero gignuntur ob debilitatem caloris, vitiumque sanguinis affluentis, sæpius ab aliis partibus ad uterum transmittuntur, nimirum à capacitate abdominis in vera tympanitide, ab intestinis, &c. Concluduntur & detinentur in utero propter angustiam aliquam orificij, ut supra in hydrope uteri.

Signa.

Comitantur inflationem uteri imi ventris tumor, qualis in vera tympanitide, qui ad digitorum pulsationem sonum tympani æmulatur, dolor pungens, plerumque ad ventriculum & septum transversum ascendens, respirationis difficultas, dolor capitis, ciborum fastidium, & quando bibunt, affliguntur, menses supprimuntur, conceptus impeditur, pedes & cavæ partes faciei intumescunt. Dolores autem vehementiores sunt, & curatu difficiliore, ubi flatus in substantia uteri & vasis continetur: leviores si in sola cavitate conclusus sit, & tum sonus præcipue auditur, qualis in intestinis, quæ torminibus vexantur, &c. De falsa gravitatione & mola suo loco dicetur.

*Tubercula
uteri.*

Præterea in orificio, aut cervice uteri, vel pudendo innascuntur varia tubercula co tum & conceptum impediencia: quæ contactu, aut per dioptram deprehenduntur, ut condylomata, verrucæ, thymi, cœcæ hemorrhoides, &c. quemadmodum in ano: deinde eminentiæ quædam miliares: præterea scabra pruriginosæ quædam pustulæ, furfuraceas squamas reicientes, productæ ab acribus salsis corruptis succis, in iis plerumque, quæ luc venerea inquinantur ex virorum infectorum consortio, ejusmodi pustulæ pruriginosæ maligna sordida & depascentia ulcera præcedere solent.

Sub

Sub morbis in magnitudine aucta comprehen-
ditur affectus, qui à Paulo & Aetio nympha appella-
tur, cui similis est morbus ille, qui *νεγκωσις*. Lati-
nis cauda vocatur. Verum cauda morbus est non
in magnitudine, sed numero aucto, ac etiam in via.
Nympha autem est substantia quædam carnosâ su-
pra alarum pudendi commissuram sita, quæ inter-
dum ad tantam magnitudinem excrescit, ut defor-
mitatem & pudorem pariat, notaque sit insignis
impudicitia. Nam vestimentorum attritu arrigi-
tur, & similiter ut in viris ad venerem & coitum in-
citat.

Nympha.

Cauda vero est carnosâ quædam substantia, quæ
ab orificio uteri exoritur, & pudendum muliebre
implet, coitumque impedit, aliquando extra pro-
greditur instar caudæ, unde nomen habet. Hi affe-
ctus oriuntur ex redundantia sanguinis à natura ni-
miam carnem generante, quare æstate maxime au-
gentur, quo tempore à calore partes dilatantur, hye-
me minuantur.

Cauda.

Afficitur uterus quandoque morbis in numero
præter naturam aucto, cum in eo substantia aliqua
contineatur, quæ ex usu non sit, & functiones impe-
diat: sub hoc genere continentur mola, falsa gravi-
datio, monstrum, quæ proprie symptomata sunt fa-
cultatis generatricis: deinde Nympha, ut diximus,
lapides & vermes uteri foetus mortui, secundina post
partum diu retenta: adduntur à nonnullis semen in
utero concretum sanguinis grumus, pus exiccatum,
&c. De mola, falsa ingrauidatione, monstro, se-
cundina retenta, &c. infra de vitiis procreationis di-
cetur.

Morbi in nu-
mero.

In utero calculos generari, præter Aetium testis
est Hipp. 5. Epid. Sect. 7. qui soluti non sunt, sed
tunicis uteri aut collo ipsius affixi. Deinde topa-
li 3. cei,

Calculi ut-
teri.

li 3. cei,

cei, concreti ex crasso lento humore, & ab excrementis augmentum suscipiunt, ac mole sua partes premunt, conceptum prohibent, plerumque fluxum menstruorum.

Vermes uteri

Vermes ex utero excretos se vi lisse grauiissimi aucthores scribunt, verum an ibi generentur, aut aliunde in uterum permeent, dubitatur? credibile est, ut in aliis compleribus partibus, ita in utero generari, maxime in cervicæ ob copiam excrementitiæ pituitæ rugis adhaerentem, sed parvos ut in recto intestino: majores fortasse ex intestinis in uterum migrare, ut voluit Priscianus & Cleopatra. Dignoscuntur ex pruritu partis, cum dolore, ac redundantia pituitæ in pudendo, tumultuoso somno, &c. aliquando cum menstruo exeunt.

Morbi in situ.

Præterea uterus à sua sede variis modis dimovetur, morbosque in situ patitur. Si uteri est in hypogastrio intra vesicam & rectum intestinum, & undiquaque vinculis quibusdam laxioribus, alligatur. Nam per fibras complures recto intestino, & vesicæ connectitur, per ligamenta propria ossi sacro & pubis: per tunica peritonæi cæteris: hepatis, per vasa spermatica & venas hypogastricas: cordi, per vasa spermatica & arterias: crebro & spinali medullæ, per nervos: quare maximus est consensus uteri cum universo corpore, ut mox diceretur.

Movetur autem uterus præter naturam à sua sede in omnem dimensionem, deorsum quidem in uteri procidentia, quando extra prominet: sursum ut in ascensu uteri, antrosum retrorsum aut ad latera in contortione, seu reclamatione, aversione & recursum ad alias partes. Plato uterum arbitratur esse quasi animal vorax, gignendi cupidum, si eo privetur, ægre moram ferre, passimque per corpus oberrare.

errare, & ad semen excipiendum deorsum ferri, sursum deorsumque desiderio fugaque bene maleque olentium. Medici plerique uterum in coitu ad semen amplexandum hiare, & quodammodo distendi, deinde constringi volunt, sed à sua sede non prolabi nisi vincula relaxentur aut rumpuntur, nec sursum moveri aut contorqueri nisi à vinculis & vasis contractis attrahatur, aut inflectur.

Procidentia autem uteri est dimotio ipsius ex suo naturali loco à proprio pondere decumbente ob relaxationem aut disruptionem vinculorum, quibus sustinetur & continetur: Vincula illa sunt, quibus ossi sacro & pubis alligatur, item vasa & tunica peritonæi. Causa præcipua cur pondere suo deorsum delabatur, est solutio aliqua illorum ligamentorum, nimirum relaxatio proprie dicta, quando longiora redduntur, aut disruptio: relaxant autem & resolvunt humectantia, refrigerantia, emollientia, ut intemperies frigida humida, defluxus pituitosorum humorum, victus balneaque humida, frigiditas pedum lumborum, animi consternatio, iesio in loco frigido, &cæt. Disrumpunt casus ab alto, plaga, oneris gravioris elevatio: partus difficili ubi uterus vehementi conatu foetum, aut secundinas expellens consequitur, aut una cum foetu mortuo vel secundinis, ab imperita obstetrice extrahitur & invertitur: item vehemens sternutatio & vociferatio, cursus ad acclivem aut declivem locum, saltatio, &c. Fernelius uteri descensum à prolapsu distinguit, & descensum appellat, ubi ad inferiores partes uterus provolvitur: prolapsum vero affectum longe graviolem, quod eversus uterus procedat, fundusq; ejus ovi anserini magnitudine promineat.

*Procidentia
uteri.*

XIV.

*Differentia
procidentia
uteri.*

Mercatus alique nonnulli tres procidentia species ponunt, quarum una est, quando uteri cervix in vulvam procidit, altera ubi fundus totumque corpus in cervicem excidit, & videtur quasi glans viri: rubens in ore pudendi cum conspicuo foramine: tertia cum membrana ejus interna procidit, & rugosa extra prominet. In omnibus prominet tumor mollis, quasi virile scrotum, maior aut minor pro magnitudine affectus, cum sensu ponderi pudendo incumbentis, quando erecta consistunt: aut recto intestino quando sedent alvumque exonerant: si extra multum promineat, magnus dolor ardorque in imo ventre & pudendo percipitur, urina paulatim exit, & pudendum mordet, &c. Signa causarum ex causis precedentibus & effectis suis dignoscuntur.

Ascensus uteri & reclinatio.

Dimotio uteri à suo loco directe sursum, ut in Ascensu uteri, vel ad latera, ut in contorsione reclamatione sive aversione, oritur præcipue à contractione, sive brevitate vasorum & vinculorum uteri, perinde fere ut in convulsione. Nam contractis vasis & ligamentis uterus è suo loco necessario dimovetur & detrahitur, & ad patrem vehementius trahentem inclinat. Quare ubi undiquaque uterus à vinculis æqualiter trahitur recta sursum ascendere videtur, sine inclinatione: sin contractio inæqualis sit ad unam partem magis, quam aliam, ad eam, quæ vehementius trahit, declinabit. Causa istius contractionis præcipua, est repletio vasorum & ligamentorum, plerumque ex menstribus retentis & suppressis, quando sanguis per venas ad interna uteri non descendit, vel quia officia vasorum obstructa sunt, vel sanguis ita crassus, ut permeare nequeat, ac proinde in vasis retentus ea distendit, ac etiam vicinas uteri appendices replet & extendit. Deinde replentur & tenduntur vincula & appendices uteri

ob tumorem aliquem, ut inflammationem, scirrhum abscessum, &c. item ob spiritum flatulentum utero conclusum, quod in suffocatione uteri præcipue accidit, quæ à plerisque sub ascensu uteri comprehenditur, licet simplex ascensus non sit, sed symptoma potius, ut suo loco dicetur. Præterea accidit brevis & contractio quædam vinculorum uteri ex vehementi siccitate ipsorum, humidum nativum depascente, ac ex frigidityte substantiam densante & coe gente, sed rarius.

Fernelius his causis commotionis uteri, addit ingentiam quandam uteri proprietatem, quia ut id quod noxium est & injucundum fugiat, jucundum & amicum amplexetur & fruatur, sursum deorsum ac quoquo verum excitulatur & movetur. Nam uterus odoribus non minus, quam cerebrum & cor afficitur, gratos enim & jucundos odores sectatur, & ut tetros refugiat in contrarium movetur sive nari- bus, sive orificio pudendi admoveantur. Verum consentaneum non est hoc qualicumque motu uterum ulterius tendere, quam à ligamentis aut propria cer- vice permittatur, nec à suo loco proprio recedere, ut commotione uteri à relaxatione & contraxione li- gamentorum.

In quam partem uterus inclinatur ab obstetrice di- gitorum admotione deprehenditur, ac etiam par- tis illius tumore, tensione & dolore: Nam parti in quam inclinatur, dolores incumbunt, & uterus du- rus veluti pila insidet. Quare ubi ad superiora recta trahitur sive ascendit, venter, & organa respi- rationis læduntur, dolor in præcordiis affligit, dif- ficultas respirationis, animi deliquia, aliaque com- plura symptomata. præcipue si adsit vera suffocatio: si ad latus inclinet, propinqui scemoris distentio, dolor, stupor, & refrigeratio, motusque ejus diffi- cilis inditio erit: si retro, utriusque coxæ & cruris do-

li 5 lor,

*Opinio Fernelii de com-
motione ute-
ri.*

*Signa com-
motionis
uteri.*

lor stupor, difficultas motus, alvi suppressio: sin ad pubem pervertatur, ibidem dolores percipiuntur & lotium suppressitur. Retractio vero uteri sursum, si ad latus dextrum denotat venas hepaticas, ad sinistrum spleneticas copia sanguinis distentas à sua parte uterum retrahere.

Solutio continui.

Tandem accidunt utero morbi in solutione continui, ut vulnus, deinde dilaceratio & disruptio variorum & membranarum ex difficili partu, foetus aut secundinae violenta extractione, effreni concubitu, casu ab alto, &c. Tertio exulceratio sive

Ulceri uteri.

ulcus uteri. Oriuntur autem ulcera multiplici de causa. 1. ex vulnere. 2. ex disruptione ac dilaceratione uteri. 3. ex inflammatione in abscessum suppurata ruptaque ex cancro eroso, alioque tumore. 4. ex putrefactione foetus mortui aut secundinae retentae, vel menstrui sanguinis suppressi & retenti in utero. 5. ab acribilioto aut falso humore erodente & defluxu vias abradente, quod accidit vitio proprio uteri, vel ab expultrice partium irritata, per hanc partem purgante vitioso excremento, ut in muliebri profluvio latius dicitur. Praeterea ulcera pudendi cervicis ac ipsius etiam uteri frequentissime ortum habent à lue gallica, ex excrementis inquinatis & putrefactis circa locellos & rugas. His additur erosio uteri ab acribus medicamentis

Differentia & signa ulceris.

Ulceris variae differentiae sunt, nam vel simplex purumque est vel inflammatum, vel sordidum, vel depascens, vel fistulosum & callosum, item cancrum, vel carbunculolum. Deinde obsidet ulcus interdum uterum, aut ejus orificium; nonnunquam cervicem, non raro pudendum. Exulceratio ipsius uteri, ut abscessus est in sinu seu cavitate, est quandoque in superficie parteque convexa.

Nam

Nam nonnunquam abscessus uteri erumpit inter peritonæum & intestina, ita ut in imo ventris tumor appareat, qui iudex est abscessum in eam partem dum suppuratur inclinare: interdum intestinum rectum aut vesica ulceris quoque particeps est, unde alvus urina cum difficultate evacuatur. Facti ulceris inditia sunt pus per genitalia destillans, vellicatio & punctio uteri, dolor punctorius in parte affecta, præcipue dum contrectatur, qui ad coxas imumque ventrem, quandoque ad jugulum sursum pertingit, unde febris lenta, dolor incipitis & radicum oculorum ad manuum digitos se extendens, ut in inflammatione uteri. Ulcus in pudendo, aut cervice, contactu, aut per usum dioptræ deprehenditur: altum & reconditum intra sinum uteri, per substantiam & colorem eorum, quæ excernuntur. Ulcus purum conjectabis, cum humor paucus albus æqualis crassus minimeque foetidus exierit: inflammatum ubi saniosa pauca cruenta cum magno dolore: sordidum si copiosa minus cruenta cum minore dolore: sin depascens fuerit, evacuabuntur saniosa magis foetida nigra corrupta, acri interdum cruenta, & grumosa, cum ingenti dolore ad coxas & jugulum sæpe pertingente. Fistulosum ulcus dignosces ex callo forma fistulari obducto, ex tenui virulenta sanie cum exiguo dolore.

Ulceris cancrofi signa supra enumerata sunt. Inveterata ulcera uteri maligna depascentia & periculosa redduntur: si sanentur, cicatricem relinquunt ægrasque steriles reddere solent. Sub genere ulcerum continentur Rhagades uteri, quæ eodem modo oriuntur, ut in ano.

Hactenus de morbis, qui utero proprie & per essentiam accidunt, læduntur functiones, quæ

XIV.

*Lesiones vi-
tio obiecti.*

quæ ope uteri perficiuntur, ab errore externo vitio obiecti sive seminis & sanguinis menstrui ac per consensum aliarum partium. Nam primum ubi semen & sanguis menstruus à naturæ modo recedunt, & in quantitate & qualitate peccant, functiones uteri læduntur, ac aliæ partes in consensum sæpe trahuntur. De vitiis seminis. quæ viris & mulieribus communia sunt, supra dictum est. Vitia sanguinis penes quantitatem sunt sanguis ex venis affluens, nimis copiosus, aut paucus, nullusque. Deinde ratione qualitatis, calidus vel frigidus, acris tenuis, vel crassus lentus, corruptus, aut ita vitiat, ut non modo ad fetus procreationem & nutritionem ineptus sit, sed etiam ipsi utero infestus, unde varii morbi & symptomata. Menstruum sanguinem uterus non attrahit & expellit, sed natura totius corporis id quod redundat in venis, & superest ultra nutritionem, per uterum expurgat, & parsimonia affecta id totum sui gratia asseruat: ac proinde uterus usum tantum commodum susceptioni menstruum præstat, sicut & generationi. Nimis copiosum sanguinem natura irritata immodica copia & acrimonia ad uterum transmittit, ut in profluvio menstruum dicetur. Paucum aut nullum suscipit ob defectum sanguinis superflui in corpore, aut quia per alias partes expellitur, ut per nares, os, hæmorrhoides, &c. præterea seu vitiosus sanguis in venis coarctatur læsa concoctrice jecoris ventriculi ac affectis præcipuis visceribus: ad uterum vero partem debilem, maximeq; opportunam robore facultatis cæterarum partium relegatur, ut in profluvio muliebri mox dicetur.

*Affectus uteri
per consensum.*

Trahitur uterus in consensum à vicinis partibus affectis, ut à recto intestino, vesica, &c. Deinde à ventriculo pravis succis referto, ac ab aliis nervosis partibus affectis, item à capite ex catarrho, ac ab omni

omnibus partibus, quæ à natura mutuū consensum cum utero adeptæ sunt, ita ut suos proprios affectus utero facile communicent, & uterus illis vicissim suos: ex quo consensu in hysteriis tanta symptomatum diversitas.

Restat ut de symptomatibus in specie dicamus, quæ fœminis accidunt circa menstrui sanguinis expurgationem & procreationem.

Purgatio autem menstruum tripliciter læditur: *Symptomata quæ contingunt circa evacuationē menstruum.*
I. quando plane tollitur, & menstruum suppressio vocatur, II. quando imminuitur seu non iusta quantitate, aut rarius, quam oportet menstrua expurgantur. III. ubi depravati exeunt. Depravata vero expulsio intelligitur, vel ratione quantitatis immodica sanguinis, quæ profluvium menstruum vocatur: vel qualitatis, quando menses decolorati, vel humor alius à sanguine excernitur, ut in profluvio muliebri seu uterino: vel ratione modi, si cum dolore guttatim exeant, quæ affectio stillicidium uteri proprie appellatur. Nam ubi sine dolore menstrua guttatim, sive parce & difficulter egrediuntur, certisque temporibus, sub diminuto profluvio menstruum potius, quam depravato continetur.

Carere menstrua purgatione aliquibus mulieribus naturale est, aliquibus præter naturam: naturale tantum iis est, quæ nulla molestia totius corporis & uteri afficiuntur. *Ætas idonea purgationi menstruum, debita quantitas, & tempus unum certum determinatumque non est, sed evariant hæc omnia pro dispositione & temperamento corporum, victusque ratione, ut plurimum ante 14. ætatis annum incipiunt, & post 50. desinunt.* In temperatis, beneq; constitutis corporibus non pregnantibus, nec lactantibus singulis fere mensibus duobus aut tribus diebus, à natura sanguis rubens, animalis recenter mactati similis per venas in sinum
aut

aut cervicem uteri terminantes expurgatur, mensura duarum heminarum Atticarum aut paulo plus, ut voluit Hipp. Aliquæ tamen parum purgantur, & nonnullæ citra omnem menstruorum purgationem innoxie vivunt.

*De suppressio-
ne menstruorum.*

Uterus, ut supra diximus, menstruum sanguinem non attrahit & evacuat, sed natura corporis seu expultrix præcipuorum viscerum & venosi generis, id quod redundat ultra nutritionem, & molestum est per venas uteri statis temporibus expurgat. Quare suppressio menstruorum est abolita menstrui purgatio in foeminis justæ ætatis, orta ex frustratione facultatis expultricis. Frustratur vel ob debilitatem ipsius facultatis, vel vitium sanguinis, qui expelli debet, vel angustiam vasorum uteri & cervicis per quæ expurgatur. Sub debilitate expultricis facultatis comprehendimus sensus habitudinem seu torporem, ut causam sine qua non. Nam expultrix ut irriteretur & expellat, pondus aut acrimoniam sanguinis præsentiscere debet: igitur quanto minus senserit ea, quæ noxia sunt, eo minus aut tardius ad expellendum insurgit. Debilitatur expultrix viscerum venosique generis & totius corporis, ac sensus quoque obrunditur ob intemperiem frigidam deinde ob prævum quemcunque affectum calorem nativum debilitantem, ut validas obstructions sicut in jecoris, lienis, ventriculi, in cachexia, hydrope, &c. cerebri in lethargo, epilepsia, &c. pulmonum in asthma. Vitia autem sanguinis sunt defectus, crassities & visciditas ac pravus motus, quando ab utero avocatur, & ad alias partes decumbit & evacuatur.

*Suppressio ex
defectu super-
flui sangui-
nis.*

Deficit autem sanguis superfluous in foeminis nonnullis justæ ætatis a natura, quæ suum alimendum perfecte digerunt, nihilque superflui relinquunt, cuiusmodi sunt viragines, quæ coloris fusci sunt & cor;

& corpora nervosa, compacta, robusta, hirsuta ob-
 tinent, pectus & humeros latos, lumbos amplos,
 mammas solidas, vocem gravem, &c. Deinde
 quæ validis exercitiis, quicquid in ipsis superfluum
 est, consumunt, ut saltatrices, aliæque fortibus ex-
 exercitiis utentes. Tertio in gravidis & in lactanti-
 bus. Nam sanguis superfluus in gravidis, in fœtus
 nutritionem convertitur: in lactantibus vero ad
 mammas transfertur pro lactis generatione. Hæ o-
 mnes citra ullum affectum totius corporis, aut ute-
 ri menstrua purgatione carere solent. His addun-
 tur ab Aetio fœminæ obesæ, quæ præ cæteris exan-
 gues sunt, angustasque venas obtinent, & sanguis
 qui in illis est fere in piguedinem transit, cujus in-
 ditium est, quod rarissime concipiant. Deinde
 graciles ob d uturnum morbum attenuatæ, quæ ni-
 hil penitus superflui sanguinis habent. Verum ista
 gracilitas nisi connaturalis sit, & foveatur à debili-
 tate viscerum, ac atrophia, non semper, sed ad tem-
 pus defectum menstruorum efficit. Deficit quoque
 sanguis ex medio tenui victu defectu utilis alimen-
 ti, vigiliis, curis. Deinde deficit fluxus menstru-
 rum, ab immodica sanguinis copia, ac nimia cras-
 sitie & viscositate, quæ plerumque vias quoque in-
 tercipiunt, suppressionem gignunt. Tertio aver-
 tunt sanguinem superfluum ab utero, & ad alias
 partes transmittunt immodicæ evacuationes per
 alias vias, ut fluxus sanguinis per nares, os, hæ-
 morrhoides, vulnèra, phlebotomia per superiores
 venas, dysenteria, cæterique alvi fluxus, vomitus,
 immodici sudores, &c. præterea ingens timor &
 mœror non solum sanguinem ab utero avocant, sed
 etiam refrigerant: connatum calorem exstinguunt,
 &c. His modis citra affectum uteri deficiunt men-
 strua.

Defectus

*Suppressio
menstruorum
ob angustiam
uteri.*

Defectus autem menstruum, qui citra affectum uteri oritur, à nonnullis suppressio notha improprieque dicta vocatur: quæ ex affectu uteri, vera suppressio menstruum. Affectus omnes uteri menstruum purgationem impediētes ad angustiam vasorum & cavitatum reduci poterunt. Causa angustiae vel ab ortu accidit vitio conformationis, vel post nativitatem, & adventitia est. Nam supra dictum est, angustia varias species causasque habet, quarum una est subsidencia ex substantiae uteri condensatione, diuritie & siccitate, ac ipsorum vasorum contractione & astrictione ab intemperie frigida vel sicca, vel utraque aliquando sicca calida, item ex usu medicamentorum immodice astringentium, & exsiccantium: fit etiam subsidencia oris & cervicis uteri ex perversione seu distortionem ejusdem. Secundo obstructio vasorum & viarum à copioso sanguine crassoque infarcto, & à quocunque crasso lento humore. Tertio constipatio & obturatio meatus ab innata membrana seu pellicula, ut in non perforatis, vel carne aut callo ex ulcere, vel cicatrice oscula vasorum exsiccante, vel tumore aliquo, ut inflammatione, scirrho, &c. Compressio vasorum & cavitatum à tumore partium incumben- tium, ut in obesibus & hydropicis, ut supra dictum est. His additur coalescentia & conglutinatio ex ulcere, &c.

*Diminuta
evacuationis
causa.*

Hæ omnes causæ si leviores fuerint, pro suppressione diminutam menstruum evacuationem & tardam, interdum ad formam stillicidij paucam sine dolore efficiunt. Nam tardæ evacuationis, quæ debitum tempus remoratur, & diminutæ, causæ præcipue sunt expultricis debilitas, sensusque hebetudo & materiæ defectus vel crassities, visciditas, &c. ac semian- gustia vasorum, uteri.

Uterum

Utrum menses plane suppressi aut diminuti sunt, cognoscemus ex relatione patientis. Si mulier quæ non concepit aut peperit, lac in mammis habeat, menstrua ei defecerunt. Prægnantes vero propriis signis distinguuntur ab illis, quæ menstrua suppressione laborant, nimirum contactu orificij uteri, si citra duritiem clausum inveniatur, &c. Nam quæ suppressione laborant, oclusio semper est cum duritie. Suppressionis, quæ ex defectu sanguinis non oritur, symptomata sunt cibi fastidium, nausea, horrores inæquales, totius corporis gravitas, præcipue lumborum & scapularum, dolor lumborum, colli & syncipitis ad radices oculorum pertingens, lassitudo tensiva: in progressu febris lenta, urinæ crassæ turbidæ rubicundæ sæpe nigræ cum quodam sanioso humore, dysuria, stranguria, tandemque alia grauissima symptomata & morbi. Causarum diversitas partim ex victus ratione, habitu corporis & excrementis partim ex relatione patientis deprehenditur: si vitium naturale sit, mensium beneficio à primis annis destituuntur, sin aduentitium ex iis, quæ supra cuique affectui ascripta sunt, dignoscitur.

Purgatio menstruorum statis temporibus moderata mulieres à variis morbis defendit. Moderata æstimatur non ex multitudine, sed ex tolerantia & conferentia. Nam copiosa evacuatio citra omnem virium jacturam immodica non est, nec profluvium menstruorum. Sed profluvio menstruorum continetur omnis purgatio sanguinis per uterum, supra naturæ vires & modum, quando menses aut copiosius profluunt, aut diutius, quam pro sanguinis multitudine, aut frequentius, & non statis temporibus. Menstruorum profluvium est immodica sanguinis per uterum evacuatio, orta ab expultrice totius corporis, vel præcipuorum viscerum.

stimulata à copia, vel qualitate sanguinis, aut retentrice uteri & cervicis ejusdem debilitata ob apertionem, ruptionem, aut erosionem vasorum. Causa hujus mali vel extra uterum est facultas expultrix totius corporis, viscerum aut venosi generis stimulata, vel in utero retentricis vasorum debilitas. Expultricem autem stimulat primum sanguinis nimia copia supra vasa aut vires, ut in plethoris, quæ tanta interdum est, ut non solum expultricem irriter, & orificia vasorum aperiat, sed etiam ipsas venas uteri disrumpat. Deinde sanguinis vitiosa qualitas, quando calidus, acris, tenuis, seu biliosus, serosus aquosus salsus melancholicus, corruptus, ratione cacochymia, contractæ ex prava victus ratione. & vitiosa viscerum constitutione, &c. unde menses decolorati. Nam cum sanguis vitiosus in toto aut jecore venosoque genere ob retentricis debilitatem contineri nequeat, à natura vi expultricis ad vasa uteri protruditur, tanquam ad partem debilem, maximeque opportunam: & eo magis, quo partes ipseque uterus magis exquisito sensu præditus est. In cæsisibus accidit quoque ut natura sanguinem vitiosum ad uterum transmittat, hæc evacuatio est plerumque cum tolerantia & conferentia.

Retentrix uteri debilitatur proprie ob apertionem, ruptionem aut erosionem vasorum, per accidens robore expultricis stimulata. *Αναστροφὴ* seu apertio orificiorum vasorum uteri aut cervicis ejusdem fit à copioso sanguine facultatem expultricem exist mulante, item ab intemperie frigida humida, & balneis, fomentis orificia relaxantibus, emollientibus, &c. Ruptio quoque oritur ex sanguinis copia irruente, ut iam dictum est, à causis quibuscunque disrumpentibus & vulnerantibus, quales sunt laboriosus partus, cum fœtus vel grandior est, vel

vel vitiose situs, vel violento conatu excluditur, item fœtus, & secundinæ violenta extractio, effrenis coitus, casus ab alto, plaga, &c. Erosio fit ex acribus falsis corruptis humoribus, ab ulcere vicinarum partium, ac à medicamentis acribus extrinsecus admotis quæ menses provocant.

Ab his causis menses immodica quantitate profluunt: debitum vero tempus anteverrunt ob easdem causas, & proprie ob expultricem ante tempus irritatam, & retentricem debilitatam, quibus additur sensus acrimonia: nam quanto partes exquisitiori sensu præditæ sunt, eo citius afficiuntur & irritantur, ut noxia expellant.

*Anticipatio
menstruorum.*

Immodica menstrui sanguinis evacuatio æstimator, ex virium debilitate, malaque tolerantia, eamque comitantur symptomata, quæ ex virium calorisque nativi debilitate consequi solent, ut inappetentia cruditates, tædus corporis color, sæpe tumor pedum & totius corporis œdematosus. Deinde ex viscerum totiusque affectu fluor copiosior est: ex folliculi uteri, parcius: si causa sit sanguinis copia, adsunt signa plethoræ ad vasa vel vires: si à qualitate sanguinis: ejusdem generis egreditur acris biliosus, leucosus corruptus, &c. mensesque magis decolores sunt. Menses decolores hic voco, ubi excernitur sanguis cum aliis humoribus permixtus, ita tamen, ut sanguis prædominetur. Nam ubi alius humor prædominatur, & serosa, alba, pallida viridia nigra, saniosa, nullo ordine & circuitu prodeunt, Fluor uterinus peculiariter vocatur.

Signa.

Menses decolores.

Præterea consideranda est sanguinis erumpentis multitudo, & delationis modus. Nam ex amplioribus venis apertis aut ruptis, magna sanguinis copia confertim profluit, à minoribus vero vice versa. Verum ob vasorum apertionem sanguis non statim sed in progressu copiosus sine dolore profunditur:

ob disruptionem statim initio copiosus cum dolore, & præcesseunt causæ rumpentes: ob erosionem initio paulatim, aut in forma stillicidii sensim cum dolore erumpit, interdum sanguis purus, interdum serosus, sanici specie, assidue aut ex brevibus intervallis.

*Stillicidium
uteri.*

Ubi sanguis paucus ex brevibus intervallis, aut guttatim forma stillicidij exit, stillicidium uteri nominatur, & stillicidio vesicæ seu urinæ correspondet, ut Ischuria menstruum suppressioni. Verum ubi sanguis guttatim ex rarioribus intervallis non multus sine dolore prodit, ad diminutum fluxum menstruum refertur, ut jam diximus: si brevioribus intervallis & cum dolore, ab Actio stillicidium uteri proprie appellatur. Hujus causæ sunt meatus angustia non perfecta. diversimode contingens, & retentricis debilitas, ac distentio à sanguine copioso, aut humore crasso ad uterum detruso, qui non facile nec cito foras evacuatur, interdum erosio, &c.

*Profluvium
muliebri &
uterinum.*

Fluxus muliebris & uterinus sumuntur indifferenter pro omni humiditatum evacuatione ab utero, quæ nec seminis est, nec sanguinis menstrui: aliqui tamen uterinum fluxum à muliebri distinguunt eumque esse volunt, evacuationem humoris non à toto, sed solum ab utero, seu illius solum, qui in utero generatur, & per congestionem colligitur ex affectu proprio. Profluvium muliebri proprie est vitiosorum humorum, ex toto corpore per uterum expurgatio, ab expultrice viscerum irritata plerumque cum debilitate vasorum uteri. In fluxu considerantur pars mandans & recipiens & materia. Pars mandans, quæ per uterum expellit, sunt præcipua viscera, aut totum corpus, venosumque genus præter naturam affecta à vitiosis humoribus. Pars recipiens est uterus, ob debilitatem retentricis vena-

venarum, aut quia ad fluxiones recipiendas maxime oportunus est. Materia quæ ab expultrice evacuat, tenuis & ichorosa magis quam crassa, est interdum corrupta, putrida, fœtidaq; aliquando non: sæpissime alba, ex tenuis pituitæ defluxu; non raro serosa à feri superfluitate, nonnunquam pallida aut citrina ex affluxu bilis, quandoque rubra quasi sanies, aut ichor sanguinis, rarissime nigra ex melancholia, sæpe varia ex variis humoribus. Purus sanguis non est, nisi in utero erosio, aut disruptio excitata sit.

Causa vitiosum humorum gignens in profluvio muliebri proprie dicto in visceribus consistit, aut à prava victus ratione oritur, sicut in uterino fluxu in ipso utero. Viscera autem affecta aut inquinata vitiosos humores assidue gignunt: ut materiam pituitosam ventriculi, jecorisque refrigeratio, in iis, quæ laxiore humidior corpore sunt, & in otio vivunt, & frigido humido victu utuntur: serosa & aquosa humiditas fit à læsa sanguificatione, seriq; segregatione: biliosa ob intemperiem viscerum calidam, &c. Corruptio humorum ex putredine in vasis pravisque alimentis, &c. Profluvium uterî ex solo utero affecto rarissime oritur imprimis ob debilitatem caloris nativi ab intemperie frigida, scirrho, frequenti abortu, difficili partu, contusione, interdum ob erosionem, &c.

Causa profluvii muliebris.

Signa fluxus muliebris sunt, pudenda assidue madent humoribus varij coloris, facies, totumque corpus decolor est, oculi prætumidi, difficulter spirant, pedes tument, inferiora torpent, si ex utero sit fluxus parcius est, colorque corporis non ita subito mutatur, &c. Causarum diversitas ex colore & consistentia excretorum dignoscitur, color vero in pannis, quibus detergantur hæ sordes excipiat.

XIV.

Gonorrhæa. Albo fluxui uterino similis est in mulieribus gonorrhæa, involuntaria seminis evacuatio ex vasis spermaticis per cervicem uteri & pudendum ob debilitatem facultatis retentricis non aliter, quam in viris supra dictum est. Discernitur hæc ab albo profluvio, quod materia alba, pauca, crassa ex longioribus intervallis, ac etiam tempore menstruum exeat, quod in fluore uterino non fit.

*Præfocatio
uteri.*

Præterea uterus affectus ex semine & menstruo retento & corrupto, principes partes in consensum trahere solet: unde varia symptomata hysterica, quæ sub nomine minus præcipue & gravissimi symptomatis, nimirum suffocationis seu præfocationis ab utero continentur, quæ à Græcis *πυξ ὑστερικῇ*, & si gravissima sit cum respiratione & pulsu insensibili *ἀπνοία ὑστερικῇ* nuncupatur. Nam hujus mali unum maxime commune symptoma est respirationis debilitas, quæ omnium primo & gravissime afficitur, adeo ut prorsus cohibita & sublata videatur. Quare strangulatio symptoma proprium uteri non est, sed organorum respirationis, deinde cordis, cerebri, ventriculi, aliarumque principalium supernarumque partium, quæ ab utero læduntur, quarum læsionum causa in utero consistit. Hæc passio quia cito fit, cito desinit, & per intervalla subito recurrit, atque interdum intra paucas horas interimit, à sola intemperie frigida ortum habere non videtur, sed à vapore tetto, maligno & venenato ex semine, aut sanguine in utero retento & corrupto. Nam constat mulieres salaces viduasque, quæ à complexu venereo abstinent, aut quibus menstrua suppressa sunt, hoc malo maxime infestari. Deinde in paroxismo uterum ut plurimum se commovere sursum, quæ recurrere,

Itaque

Itaque præfocatio ab utero est magna respiratio-
 nis debilitas repente ex intervallis fere repetens, u-
 na cum læsione functionum cordis, cerebri, aliarum. *Definitio*
 que principalium supernarumque partium: orta ex *suffocationis*
 retro maligno vapore, ex semine, aut sanguine men-
 struo retento & corrupto in utero, qui ipsum ute-
 rum inflat, irritat & commovet, & ex utero sursum
 sublatus supernas principesque partes afficit. Cor-
 ruptio autem seminis & menstrui sanguinis præci-
 pue est intra sinum seu cavitatem uteri, licet semen
 intra vasa spermatica, & sanguis in venis uteri reten-
 tus computrescere queat, non aliter quam in febri-
 bus putridis, verum ea putredo non ita maligna est,
 ac febres diuturnas & hystericas virginum passiones
 magis excitat. Vapor malignus ex corruptione in
 utero genitus, uterum inflat, & ad expellendum sti-
 mulat, ut sursum recurrere & contorqueri plerum-
 que percipiatur: unde primum intestina, hinc dia-
 phragma & ventriculus comprimitur: ac ipse vapor
 ex utero sublatus in diaphragma thoracisque par-
 tes, respirationem tam exiguam efficit, ut insensi-
 lis sæpe appareat: ac per arterias in cor irruens spi-
 ritus caloremque nativum debilitat, leves animi de-
 fectiones, totius corporis refrigerationem, pulsus
 interdum validiores, interdum adeo parvos facit, ut
 non percipiantur: ad ventriculum delatus, eructa-
 tiones, ciborum fastidium, nauseam, &c. In cere-
 brum alias stuporem gravem omnium sensum exce-
 pro auditu, altum soporem, alias desipientiam, fu-
 rorem, interdum convulsionem, &c. Quare hæc af-
 fectio omnes eadem forma non invadit: Deinde ut
 epilepsia, diuturna est, & per circuitus crebriores aut
 rariores repetit, singulisque accessionibus præceps
 periculum affert.

Causa varietatis & diversitatis symptomatum *Causa vario-*
 consistit in putredinis qualitate, deinde copia, ac *tatu,*

Kk 4

etiam

etiam in debilitate membrorum, quæ utero consentiunt & compatiuntur. Nam quo substantia præstantior est, eo deteriori putredine corrumpitur magisque perniciosam qualitatem contrahit, quare ex corruptione seminis putredo omnium perniciosissima oritur, ex sanguine magis perniciofa, quam ex aliis humoribus Unde Stephanus Atheniensis teste Gal. apnæam hysterica fieri tantum putavit, ex tetrīs vaporibus in cor sublatīs ex semine corrupto. Quævis putredo pro majoris minorisque ratione, majora aut minora producit symptomata. Nec mirum videri debet, vel ex minima seminis mole in venenatam naturam corrupta, tanta accidentia consequi: nam exiguum virus scorpij per angustissimum foramen injectum, longe sæviora producit, & salvia canis rabidi si corpus tetigerit confestim, interdum ex longiori temporis intervallo rabiem excitat.

Differentia præfocationis uteri.

Hujus affectus tres gradus, aut species à nonnullis statuuntur, quarum una vehementissima est, apnæa hysterica, ubi pulsus & respiratio non percipitur, totumque corpus refrigeratur: altera in qua ægre spirant pulsumque debilem habent, sensu non omnino privantur: tertia quando brachia & crura convelluntur, &c.

Signa.

Ubi paroxysmus in propinquo est, præcedunt hæc signa torpor mentis, pigritia corporis, crurum debilitas, aspectus mœstus, &c. cum jam incipit repente oritur respirationis debilitas, obmutescencia, altus sopor, stupor mentis & sensuum, crurum retractio, aliaque supra proposita: & ubi accessio remittit, humiditas quædam ex locis muliebribus tactu excurrere percipitur, uterus paulatim laxatur, intestina murmurant, malæ rubescere incipiunt, sensus motusque redeunt, &c. Supervenit hoc malignus, præcipue autumnō & hyeme, & juniores

ad

ad Venerem proclives, steriles : & viduas maxime corripit. Distinguitur à cognatis affectibus uteri commotione, & quod præcesserit suppressio menstruum aut seminis, & affectus uteri : à syncope, quod pulsus aliquis ut plurimum sentiatur, sudor frigidus non erumpat, nec facies pallida sit, neque odoris juventur, nisi inferioribus admoveantur. Ab apoplexia, quod sentiant si pungentur : ab epilepsia, quod vocata audiant, & post paroxysmum plerumque recordentur, ac facies tumida magisque rubicunda sit, &c. In apnæa hysterica, an vivæ sint sternutatoriis cognoscendum : experiri floccis naribus admotis, aut vase aqua pleno imposito regioni stomachi, judicium fallax est.

Superest, ut de symptomatibus ad procreationem pertinentibus, dicamus. Procreatio autem quantum ad uterum absolvitur conceptu formatione & gestatione, usque dum foetus absolvatur, tandem partu legitimo. Ad has actiones perficiendas necessaria sunt, primo ager fertilis sive uterus bene temperatus & conformatus, qui vires omnes quatuor naturales robustas obtinet, licet omnibus pariter non agat, sed peculiariter attractrice, ut semen genitale suscipiat, retentrice & alteratrice, ut ex suscepto semine concipiat, foetumque absolvat : expultrice in partu, ut legitimo tempore foetum perfectum in lucem edat : una cum secundinis : Deinde requiritur semen foecundum utriusque sexus permixtum & in uterum attractum, ex quo fit primum conceptio, deinde foetus adumbratio : ac etiam sanguis menstrualis per uteri acetabula, quo foetus nutriatur & augeatur, & partes nonnullæ generentur. Quare uniuscujusque horum defectu operationes facultatis generatricis vitiantur & impediuntur.

*De vitis pro
creationis.*

*Symptomata
procreatio-
nis.*

Laesio autem cujusque actionis tribus modis accidit. Nam primum mulier ex viro aut omnino non concipit & generat, quæ laesio sterilitas proprie dicitur: aut concipit quidem, sed raro ut semel tantum, &c. & hæc quoque sterilitas vocatur: vel depravate & perperam, sub qua contineri poterit inanis conceptus, ac etiam numerosus, quando uno tempore plures concipiunt, quam alere & ad perfectionem perducere queant. Secundo vitia formatricis facultatis in utero sunt mola, falsa gravidatio, deinde debiles & morbofi foetus, tertio monstrum, ac etiam foetus immodica magnitudo, quæ gestationem, partumque difficilem reddit. Gestatio læsa consideratur, vel ratione temporis, si foetus immaturus & ante tempus in lucem edatur, & abortus proprie nuncupatur: vel ratione modi, ubi gestatio molesta & gravis est cum variis symptomatibus, ut nausea, fastidio ciborum, pica, ventris gravitate, strangulatione uteri, &c. Tandem partus læditur cum citius fit, seu ante tempus legitimum foetus exit, & dum abortus est, ut diximus: vel tardius fit, quam oporteat, ut cum foetus in utero debiles aut mortui non egrediuntur: vel cum magno dolore aut labore exeunt, aut modo non naturali, ut primo pedibus aut brachiis: aut secundina relictæ, &c. & tum partus difficilis appellatur.

*Conceptus
quid?*

Initium procreationis est à conceptu. Conceptus autem est fecundi seminis utriusque sexus in uterum attracti in perfectum actum traductio, ab insita facultate residente in semine maris, ut in physiologicis demonstratum est. Nam ad conceptionem requisita sunt, primo ut per coitum semen viri proliticum in interiorem uteri cervicem ejaculetur: Deinde ut mulier cum voluptate rite suscipiat, & pariter suum semen in uteri orificium emittat. Præterea ut uterus bene temperatus semen in interio-

rem

rem sinum attrahat, postea clauso orificio arcte contineat, foveat, & in actum deducat: cuiusque horum defectu conceptio impeditur, sterilitasque oritur.

In seminis generatione & emissione eadem fere symptomata mulieribus, quæ viris accidunt. Deinde appetentia Veneris vel extincta vel ignava est, vel immodica: sub immodica continetur Satyriasis, furor uterinus, ac etiam nympha, de qua supra. Satyriasis & tentigo mulieribus evenit, qualem in viris fere supra retulimus, quæ nihil aliud est, quam ardens coeundi desiderium, cum ingenti pruritu & dolore pudendi, ab inflammatoria affectione ex falsis acribus humoribus impactis: In hoc malo femina intollerabili Veneris desiderio contabescunt, ipsumque desiderium sæviorem affectionem reddit, quod partes inflammatae seminis excretionem impediant. Deinde ob falsos humores impactos vehementem pruritus pudendi cum dolore, tensione, & palpitatione sentiunt, ita ut manus assidue admoveant.

Furor uterinus est vesana coeundi cupiditas cum pruritu pudendi, orta ab ingenti fervore uteri cerebri in consensum trahente, seu tetros halitus in cerebrum mittente. Accidit hæc affectio præcipue naturis calidis, & libidinosis, ætate vigente, quæ in deliciis vivunt, & præter consuetudinem à Venere abstinere. Desipientia tota in Venere versatur, nihilque aliud cogitant & loquuntur quam de coitu, deinde pruriens pudendum habent, eiusque contactu mire delectantur. Satyriasis & furor uterinus tales affectus sunt pudendorum, qualis immodica sitis est orificij ventriculi: verum in furore uteri adjungitur error principis facultatis, à vaporibus in cerebrum ascendentibus ex semine aut sanguine adusto.

Steri-

Sterilitas.

Sterilitas mulieribus primario tribuitur, quatenus viris utuntur, licet causa sterilitatis non semper accidat vitio mulieris, sed interdum viri, & sæpe utriusque. Est autem sterilitas impotentia mulieris iustæ ætatis viro utentis, ad concipiendum, proveniens primario vitio uteri aut seminis. Dico viro utentis, nam quæ coire seu pudendum virile moderatum intra cervicem uteri admittere non valent, nec semen virile in uterum recipere, minus proprie steriles, sed ad coeundum impotentes tantum dicendæ sunt. Nam terra priusquam semen in eam projiciatur, nec sterilis, nec fetax proprie vocatur, atamen quæ nec coire, nec semen virile admittere possint, sterilibus annumerantur, quia non concipiunt.

Causa impotentia in mulieribus.

Mulieres ad coeundum impotentes redduntur ob angustiam aliquam vulvæ & cervicis uteri, ut obturationem à membrana innata in non perforatis, aut caruncula aut tumore innato, compressione, obstructione: astrictione: labiorum vulvæ & laterum cervicis conglutinatione &c. Item ulcere aut affecto dolorifico.

Quatuor species sterilitatis.

Sterilitatis quatuor sunt differentię, una nativa & absoluta ex ingenito vitio: altera adventitia ex morbo post ortum, qui industria medici aut decursu ætatis sæpe curatur: tertia earum quæ pepererunt, sed à primo aut secundo partu non concipiunt, quarta est per collationem foeminæ ad virum proprium seu unicum. Hæc mulieribus accidit vel ratione viri aut utriusque ex defectu & prava qualitate seminis: ceteræ species propria ratione, vitio uteri vel seminis.

Sterilitas ratione uteri.

Ratione uteri causa sterilitatis, est omnis affectus attractionem, retentionem & vivificationem seminis in utero labefactans, & debilitans ac generationem extinguens vel corrumpens, ut quævis insignis intemperies; vel impediens, ut mala conformatio,

inatio, constructioque uteri, unitatisque solutio. Hæc vitia velingenita sunt ex nativo defectu à prima constitutione, vel adventitia. Nam nonnullæ natura steriles sunt, ex nativa intemperie pravaque uteri vasorumque spermaticorum conformatione, præcipue frigida, quæ uteros frigidos densos habent, ventrem strictum coxarum ossa multum contracta, & non pubescunt. Nam natura fecundæ existimantur, quæ proceritatem corporis mediocrem obtinēt, bonamque temperiem præcipuarum partium, superiorem ventrem, & lumbos latos, nates eminentes, pectus angustum, mammas amplas, quæ his maxime oppositæ sunt, steriles præcipue judicantur. Deinde steriles plerumque sunt viragines, & quæ nihil superflui sanguinis gignunt, aut in corpore relinquunt, item obesæ, nimisque graciles, quæ menstruis carent. Præterea sterilibus annumerantur impuberes, & senio confectæ, ac quæ acuto aut diuturno morbo consumuntur, verum non absolute, sed ad tempus. Quemadmodum in terra cui semina cerealia committuntur, ita in utero quævis intemperies simplex aut composita sterilitatem inducere poterit. Maximas vires obtinēt frigida. Nam ut Hipp. ait 5. aph. 62. quæ frigidos densos uteros habent, non concipiunt, extinguuntur enim in illis genitura. Deinde in nimis humidis uterus suffocatur & obruitur, non aliter quam semina cerealia in terra palustri. Præterea ignei vel aridi & squallentes uteri genituram ob defectum alimenti corrumpunt, taleque quid accidit, quale ubi arenis & petris mandantur semina.

Morbi compositionis uteri sunt nimia amplitudo seu dilatatio orificij, aut cervicis uteri, ut semen genitale non retineat, vel vasorum, ut sanguis præter naturam effluat, deinde angustia orificij uteri, ut semen intra suum non recipiat, aut vasorum

*Natura steri-
les & fecun-
da.*

*Intemperies
uteri.*

*Morbi com-
positionis ste-
rilitatem in-
ducentes.*

san-

sanguinis & seminis defluxum in uterum prohibens. Angustia autem vasorum easdem causas habet, quas vera menstruorum suppressio: nimirum obturationem à cicatrice orificia vasorum excæcante, obstructionem ab humore crasso infarcto, compressionem, &c. Angustia vero orificii uteri est obstructio, astrictio, constipatio, aut obturatio à membrana, carne, aut tumore innato, compressio à tumore abdominis vel omenti ut in obesitas: coalescentia ab ulcere: subsidentia ex contorsione & perversione colli uteri, situsque mutatione. His adduntur vermes & calculi uteri, scirrhus, inflammatio, inflatio, alii tumores. Tandem solutio continui, ut vulnus exulceratio, vasorum disruptio & erosio, unde sanguinis profluvium. Nam durante profluvio menstruorum aut muliebri vel suppressione mulieres non concipiunt.

*Sterilitas vi-
tio seminis.*

Ratione seminis tam virilis, quam muliebris sterilitas oritur. In semine quatenus proximum generationis instrumentum, consideratur generatio, in testibus, vasisque spermaticis: deinde ejaculatio seu emissio ex vasis in uterum: Nam sterilitas fit primum, quia semen in testibus vasisque spermaticis non generatur, ob defectum aut debilitatem testium vasorumque, aut vitio materiæ. Deinde quia semen genitum prolificum non est, scilicet nimis frigidum, aquosum, tenue aut crassum, aut corruptum, ut in iis, qui gonorrhæa gallica laborant: aut minus fecundum & torrefactum, ac ad generationem inefficax & languidum. Tertio quia non ejaculatur & emittitur, aut non debito modo & tempore. Non ejaculatur, nec in uterum recipitur ob expultricem testium vasorumque debilitatem ex intemperie: aut impeditam ex angustia vasorum, ut supra dictum est. Non iusto modo ejaculatur in viris & mulieribus ob gonorrhæam: in viris ob nimiam gravitatem,

ritatem, aut immodicam longitudinem penis, aut quia non erigitur. De causis vitiorum seminis utriusque sexus & impotentiae ac infœcunditatis in viris atius supra dictum est.

Quare mulieres non concipiunt, defectu aut prava qualitate seminis, vel proprii tantum, & tum steriles per se sunt: aut unius solius viri: aut utriusque, & tum steriles in comparatione ad virum proprium dicuntur. Utriusque enim ratione sterilitas accidit, quando unius semen alterius corrumpit, aut fœminæ calidius, vel minime proportionatum, ut cum maris semine commisceatur & consocietur: nec sese mutuo contemperent, aut quia utriusque seminis emissio uno tempore non perficitur, sed virile mulier ante, aut post, ut cum muliebri coire simulque in anteriorem uteri sinum attrahi & recipi nequeat. Adduntur his causis errores externi, primo concubitus in viti: amor enim genituram conciliat, & fœminæ amantes creberrime pariunt, ideo in viti concubitus steriles magna ex parte sunt: deinde motus importunus, saltatio sternutationes frequentes statim à coitu, &c.

*Sterilitas in
comparatio
ne ad virum.*

Sterilitas ex morbo uteri dignoscitur iis sæpius, quæ cuique affectui uteri ascripta sunt: sterilitas vitio seminis, ut supra in viris dictum est: cætera ex iis effectis & causis, quæ sensibus obviæ sunt. Mulierum fœcunditatis probatio, ut docet *Arist. 2. de gener. ani. cap. 5* fit suffitu; ut odores subeuntes uterum afferantur ad vias resp rationis & afficiant anhelitum. Deinde illitu, si colores ut crocus, &c. oculis, eorumque angulis illiti salivam oris inficiant: unde *Hipp. 5. Aph. 59.* si mulier non concipit veste obvolutam subtus suffito thure, styrace, &cæt. & si odor corpus ad os & nares pervadere videatur, non sua culpa sterilem esse scito; sua vero culpa si non pervadat. Deinde *libr. de steril. caput* alii

Signa sterilitatis.

alii derafum & purgatum subiiciatur, si per os post
stridie odorem ejus senserit, concipere poterit, &c.
Nonnulli hordeum in urina maceratum sepeliunt,
si decimo die germinat. fecunditatem, si minus
sterilitatem arguere putant, alii aliis probationibus
utuntur.

*Signa conce-
ptu*

Mulieres concepisse, seu gravidas aut prægnan-
tes esse conjiciendum, si mulier eodem tempore fe-
re, quo vir in coitu semen emisit, & pudendum
ac glans à coitu non humectetur, item si os uteri ex-
quisite clausum, sursumque progressum citra duri-
tiem sit, in actu venereo, aut paulo post horrorem
senserit. His adduntur signa, quæ primis mensi-
bus contingunt, ut modicus dolor circa pudendum
& umbilicum, venus languida, menses nulla mor-
bosa præcedente causa supprimuntur, aut magna
ex parte: venæ pectoris ipsæque mammæ sensim in-
tumescent, & in progressu lac habent, papillarum
color mutatur: aqua multa dormituræ data tormi-
na facit: oculorum ambitus livescit, ipsique oculi ca-
vi fiunt, aliquibus in facie maculæ erumpunt, qui-
busdam os nimio humore madescit, aspectus languia-
dus, color faciei mutatur, torpor & segnities inlue-
ta oritur.

*Causa diffici-
lis gestationis
in quibus sym-
mata*

Circa secundum mensem valetudinariæ caco-
chymicæ potissimum, ob redundantiam superflui
sanguinis ex suppressis mensibus, quam foetus non
conficit præter consuetudinem acida salsa & alie-
na appetunt, quæ depravata appetentia pica voca-
tur, ut in affectibus ventriculi dictum est, item nau-
seam, vomitus, fastidium ciborum, dolores capi-
tis, anxietatem, vertigines, animi deliquia, sopores
graves tumores pedum, aliaque similia symptoma-
patiuntur, quæ ubi foetus grandior plus sanguinis
sumit, paulatim ut plurimum desinunt, attamen
circa consueta menstruum purgationum tempora
gra-

grauantur, mammaeque magis tument, dolentque, lumbi difficulter moventur, vesica rubens calidum lotium cum dolore excernit. Urinae non satis certum praebent indicium. Nam progressu temporis mutantur, & pro varia dispositione corporum, ut plurimum in urina subsidet quid carminatae lanæ simile, & cōcussa varios atomos, parvasque bullas à summo dimittit, & corona roris, nebulosi aut lapidis stellati colorem praeseferit. Mense tertio aut quarto, ubi foetus movere inceperit, à mola distinguitur impossita manu, ex levi, blando, moderato impulsu, aut quasi muscæ volatu, &c.

An mas an foemella gestetur Hipp. 5. Aph. 42. ex Nota masculini colore praegnantis colligit: Mulier enim si marem li & foemella concipit, bene colorata est, si foemellam, male colorata. Deinde ut idem Hipp. 5. aph. 48. quia mares in dextra, foeminae in sinistra parte magis gestantur: ideo si marem gestet, tumor dextrae partis major est, mamma dextra magis tumet, oculus dexter amplior, & dextro crure & brachio frequentius, quam sinistro nitantur. pulsusque dexter major, pleniorque sinistro, papillae & venae rubicundioris coloris sunt, lac crassius magisque lucens & supra vitrum mulctum coit, ut margarita, &c. In foemellae conceptu contraria apparent.

Absolvitur conceptus seminisque ebullitio intra septimum diem, deinde incipit partium singularum adumbratio, seu formatio. In formatione totaque procreatione scopus naturae est, quod in ea specie absolutissimum & perfectissimum producere: si aberraret, ut in monstro, mola, &c. naturae culpa non est, sed potius monstrorum scilicet caloris & spiritus plastici, in quo residet facultas: aut materiae, seminis & sanguinis: aut uteri loci, in quo fit generatio. Nam facultas formatrix spiritum caloremque vivificum satis robustum si nacta

Modus pro-
creationis &
errores.

Ll

fuc-

fuerit, materiam competentem utrumque bene dispositum sine externo errore perfectum foetus in suo genere efformat. Ex aduerso si in his defectus accedat, necesse est procreationem eatenus mancā aut vitiosā esse, quatenus defectus vitiosus est: Hinc evenit, ut nunc aliquid vita praeditum gignatur, veluti foetus morbosus aut monstrum: nunc vitæ expers, vel propius ad foetus naturam accedens, ut caro informis, quæ mola proprie dicitur, vel longius recedens, ut in falsa ingravidatione. Nam naturæ, quæ in continua individui successione continuatur, melius est, aliquid novi producere quam nihil.

Monstrum.

Monstri nomen late sumitur, & monstruosus foetus omnis nuncupatur, qui a naturali plurimum recedit, vel in magnitudine numero, vel figura & specie. Nam primum monstrofi dicuntur, qui a naturali mediocritate in humana specie multum deficiunt, ut pigmei, aut eam longe excedunt, ut gigantes. Deinde quibus pars aliqua deficit, ut mancis &c. vel redundat, veluti digitus, manus, membra

*Differentia
monstrorum.*

genitalia utriusque sexus, ut in hermaphroditis. Tercio in quibus aliquid continetur, quod diversæ speciei est, ut pars alterius animalis. Quarta cum partus alterius speciei est, ut serpentis, ranarum: aut ex diversorum animalium partibus, cuiusmodi foetus monstrum propriissime appellatur. Superfluae autem partes in foetu, ac foetus justo maior generatur ex immodica utilis materiae redundantia, vicioris plastici: quæ tanta interdum est, ut distincta ad plures foetus sufficiat, non distincta, nec rite in utero disposita, monstruosos foetus aut connexos proferat. Ex aduerso ob defectum utilis materiae pars aliqua deficit: aut partes præter naturam minores procreantur. Accidunt etiam hæc vitio parentis. Nam manci mancos interdum procreant, &c. Ali-

na forma ab humana specie oriri poterit ob abominabiles coitus, & seminis diversorum animalium commixtionem, vel errore formatricis ob inordinatum motum, cōcitatū ex fortissima imaginatione mulieris in coitu, conceptu, aut toto formationis tempore, quæ spiritum & sanguinem signat, similemque effigiem fœtui imprimit, aut ob iram divinam, &c. His causis adduntur concubitus tempore menstruorum, vitiosa materiæ qualitas & virtutis formatricis debilitas. Monstruosi conceptus pauca nota sunt, *Nota monstruosi fœtus.* præcipua matrem novo aliquo symptomate affici, quæ vel admirat onem inferat, aut causam occultam habeat.

Ad molam nonnulli falsam gravidationem seu conceptum referunt: licet mola potius sub falsa gravidatione comprehendiqueat. Est autem inanis conceptus, falsaq; gravidatio late sumpta omnis affectus imprægnationi similis, seu ventris tumor in mulieribus, quæ viris utuntur cum menstruum defectu ad similitudinem prægnantium, ex materia sensim collecta intra cavitatem uteri. Materia illa vel flatus est, vel humor, vel carnosus substantia. *Mola.* Proprie per molam intelligimus hic tumorem uteri ab humore, aut flatibus, non carnosum tumorem seu carnis excrecentiam ab ulcere uteri, ut Aetius statuere videtur, sed cum Galeno carnem quandam informem in cavitate uteri genitam, quæ nomen inde sortitur, quod mole & pondere uterum premat. Hoc symptoma est facultatis procreatricis, licet ratione uteri morbus sit in numero aucto, non toto genere præter naturam: Est enim mola caro inutilis & informis pluribus venis plerumque referta, in cavitate uteri genita instar veri conceptus ob frustrationem facultatis formatricis.

Avicenna alique nonnulli molam fieri putant *Causa mola.* ex solo mulieris semine, cum menstruo sanguine:

*Differentia
molarum.*

vel ex immodico menstrui colore decenti in utero:
ac proinde virginibus quoque accidere, perinde fere
ut gallinis sine maribus ova subventanea. Verum ut
Galenus *lib. 14. de usu part. cap. 17. scribit*, non ut galli-
næ sine maribus ova pariunt, ita mulieres sine viris
molam, aut quod aliud concipiunt. Deinde nusquam
visa est foemina molam sine mare concepisse. Cau-
sa molæ est frustratio facultatis formatricis, quan-
do (ut ait Hipp.) menstrua multa exiguum vitiosum
semen accipiunt, aut post primam concoctionem
sanguis nimis copiosus, aut non competens affluit,
ita tamen ut facultas procreatrix, licet debilitata
suo munere aliquo modo fungatur, sed cum neque-
at perfectum animal efformare, carnem tantum in-
formem producat: Vitiosum sive languidum semen
dicitur propter debilitatem caloris & defectum spi-
rituum, in quibus residet vis generatrix. Uterus ve-
ro semen vitiosum vel à testibus vasisque suscipit,
vel sua intemperie alterat & vitiat. Quare in ge-
neratione mole opificis vires gerit spiritus ille ge-
natrix: materia est semen languidum cum copioso
crasso sanguine menstruo: nutritur per uteri venas,
& more plantarum augmentum suscipit, quibus ad-
hærescit, nunc levius, ut facile excidat, nunc firmis-
sime, ut tarde aut nunquam avellatur, & ad immo-
dicam quantitatem perducatur. Deinde modo u-
na sola est, modo plures, sine aut cum foetu vitali.
Præterea interdum rudimentum formæ cujusdam
foetus obtinet, sæpe mola prorsus informis est, vel
proprie carnosam multis venis referta, variique colo-
ris: vel membranea multis bullis aquosis & foetida
sanie plena.

Falsa gravidatio proprie dicta est cum foemi-
nis, quæ viris utuntur ex concepto semine venter
intumescit, & accidentia gravitationis similia ac-
cidunt, ita ut se concepisse putent; cum tamen ni-
hil

hil in utero contineatur, nisi flatus humor aquosus, pituitosus, &c. Causa hujus mali non est ulla actio spiritus generatricis, seu facultatis procreatricis, ut in mola, sed ante absolutam conceptionem spirituum seminis morborum intra uterum conclusio extinctio, seminisque in utero corruptio, ob intemperiem uteri accedente affluxu vitiosi humoris, præcipue aquosi aut pituitosi, qui una cum semine vel in flatus dissolvitur, vel concrefcit, vel in pus corrumpitur, &c. Hæc passio sæpe iis accidit, quæ decolores menses habent.

In mola falsa que gravidatione uterus sensim in- *Signa mola*
tumescit, menstrua deficiunt, aliaque accidentia *& gravida-*
veræ gravidationis accidunt. Verum in mola mo- *tionis.*
tus non percipitur blandus tertio aut quarto mem-
se, quo tempore fœtus moveri solet, sed instar lapi-
dis dum à latere in latus se convertunt, ventris tu-
mor, tensio & gravitas plerumque major est, color
corporis fœdior, appetentia magis dejecta, &cæt.
Certius his signum est, si mammae tumeant sine la-
cte, & si tempus legitimi partus excesserit. In falsa
gravidatione venter celerius intumescit, quam in
vera mola, & ita durus non est, si tumor sit à flatibus,
venter percussus tympani sonum imitatur, si ab a-
quoso humore gravitas & fluctuatio in ventre senti-
tur, pedes sæpe intumescunt, & cætera, ut in hydro-
pe uteri.

Ob debilitatem retentricis uteri procreatio duo- *Abortus.*
bus modis vitatur, primo effusione seu effluxu se-
minis ante absolutam conceptionem, quod intra se-
ptimum diem evenit. Deinde emissionem embryonis
seu fœtus post conceptionem, quæ abortus proprie
dicitur. Est autem abortus symptoma facultatis re-
tentricis uteri, quæ fœtum ad tempus legitimum
continere debet: & proprie fœtus imperfecti emis-
sio ob retentricem uteri debilitatam. Læditur au-

Causa abortus.

tem retentrix ab omnibus causis, quæ eam ab officio proprio desistere, & expultricem ad expellendum insurgere cogunt. Uterus autem ut clauso orificio ad legitimum tempus foetum contineat, requiruntur primum bona ipsius uteri constitutio, deinde ut foetus se recte habeant in magnitudine & numero sanique sint, & membranis debite contineantur, tertio ut per acervula seu venas & arterias uteri sanguinem justæ quantitatis & bonæ qualitaris suscipiant cujusque horum defectu seu vitio retentrix uteri debilitatur, aut expultrix ante tempus ad foetum expellendum insurgere cogitur. Proinde ostenditur abortus vitio vel uteri, vel foetus, vel sanguinis materni. Nam omnes fere morbi uteri proprii aut per consensum separatim vel conjunctim vim retentricem uteri offendere, aut expultricem extimulare possunt, de quibus supra dictum est. Deinde vitia foetus sunt immodica magnitudo uterum distendens, numerus major, quam ad perfectionem perducere queant: foetus mortuus aut languidus: item membranarum quibus involvitur & continetur foetus disruptio, ab inordinato motu ipsius foetus, & affluxu humorum, casu ab alto, ictu, vehementi motu animi vel corporis, saltu, gravioris ponderis elevatione, usu medicamentorum, quæ abortum provocant & foetus expellendi aut corrumpendi vim habent. Vitia sanguinis menstrui sunt, primo immodica quantitas foetum suffocans & extinguens, proveniens ex plethora & redundantia sanguinis in vas, vel concitatione ad va autem ob usum medicamentorum, quæ menses vehementer movent, simulque foetum expellunt, &c. Deinde sanguinis necessarii ad foetus nutritionem & perfectionem defectus ex inedia immodicis evacuationibus præcipue sanguis per nares, hæmorrhoides, cer-

cervicem uteri, vulnus, venam sectam, &c. item ex alvi profluvio, extenuatione corporis ab acuto vel diuturno morbo, &c. Præerea deficit sanguis obstructis uteri acetabulis, per quæ fœtus alimentum attrahit, ex multo crasso mucoso humore, aut disruptis à casu, saltu, motu importuno, &c. Tandem sanguis qualitate interdum vitiosus est fœtui inutilis, ortus ex cacochymia, cruditatibus, corruptione humorum, ex prava viscerum constitutione, victusque ratione, &c.

Ab his causis retentrix uteri debilitatur & expul- *Causa irri-*
trix ante tempus ad fœtus expulsionem insurgere *antes expul-*
cogitur. Insurgit expultrix ob tristem sensum seu do- *tricem uteri.*
lorem, qui tripliciter concitatur à mole uterum de-
stendente, pondere gravante, & morfu. Mole &
magnitudine uterum distendunt fœtus justo majores aut numerosiores: Deinde cum fœtu mola, flatus aut humor præter naturam retentus in utero: præterea tumores substantiæ uteri ut inflammationes scirrhii, &c. Pondere retentricem uteri gravant, ac proinde expultricem stimulant fœtus grandiores debiles, præcipue membranæ, aut acetabulis uteri latis à multo mucore, aut ruptis importuno fœtus motu, casu, &c. item copia humorum in cavitate uteri, mola. Morfu expultricem uteri irritant fœtus mortui & corrupti, humor vitiosus effusus in cavitatem uteri ex membranæ disruptis, quibus involvitur fœtus: aut ex vasis uteri apertis, ruptis, eros: interdum usu medicamentorum, quæ menses movent, fœtusque excutiunt. Præterea omnes affectus dolorifici uteri, partiumque vicinarum scilicet vesicæ recti intestini, ut intemperies inæquales, inflammationes, ulcera, &c. Nam in tenebris ob conatum egerendi, sæpe

Ll 4 fœtus

fœtus excutitur, &cæt. facile abortiunt valetudina-
riæ, & quæ cito extenuantur, aut obesæ sunt; &
quibus uterus non bene clauditur, & acetabula mul-
to mucore referta sunt, aut quæ immodico coi-
tu utuntur. Maximum vero abortus periculum
est à mense primo ad quartum & à septimo ad no-
vum.

*Signa abor-
tus.*

Signa autem futuri abortus sunt, lac sponte ex
mammillis fluens, fœdus papillarum color, repen-
tina mammarum extenuatio: nam quæ gemellos
parit si altera mamma extenuetur, alterum eorum
abortu edit, marem si dextra: fœmellam si sinistra:
addūtur immodicus menstruorum fluxus, post prio-
res menses, fœmorum & lumborum gravitas, &c. In-
stante abortu præcedit euacuatio aquosa, deinde
saniosa aut cruenta quasi lotura carniū, hinc san-
guis purus exit, post grumus, tandem ipse fœtus for-
matus, aut informis. Compluribus accidunt lum-
borum & coxarum gravitas, ventriculi, capitis & o-
culorum dolor aliquando deliquium animi aut cō-
vulsiones præcipue, quæ per medicamenta abortum
procurant.

*Signa fœtus
mortui.*

Fœtus mortui indicia sunt, fœmorum lumborum
& ventris gravitas & frigiditas, cervix uteri con-
tactu frigida sentitur, dum à latere in latus se con-
vertit, motus quasi lapidis decumbentis percipitur,
venter concidit exspiratio fœtida est, ac infestatur
sæpe cardialgia horrore febrili & animi deliquiis,
capitis & oculorum dolore, interdum convulsio-
ne: Instante partu oculos cavos habet, pedes & fa-
ciem tumidam, nares & auriculæ albicant, labia li-
vent, &c.

*Conditiones
partus natu-
ralis.*

Tandem partus naturalis conditiones sunt, ut
debito tempore convenienti modo, citoque fiat,
cum non magno dolore, levibusque accidentibus
citra offensionem matricis aut fœtus. Deinde ut sta-
tim

tim aut paulo post membranæ, quæ secundæ aut secundus partus vocantur, expellantur, tertio ut sanguis vitiosus toto gestationis tempore in utero vicinisq; venis collectus, cum in partu, tum etiam multis sequentibus diebus sufficienter evacuetur. Cuiusque horum defectu partus non naturalis dici poterit: proprie tamen partus difficultas est ipsius fœtus vitiosa exclusio, nimirum quando cum maximis doloribus fit, longo tempore, non debito modo, aut cum gravitate offensionis matricis, vel fœtus. Ubi fœtus involucria non expelluntur, secundæ relictæ, & ubi sanguis menstruus non evacuatur, suppressa puerperia vocantur. Partus autem difficultas est, fœtus maturi vitiosa exclusio, ob læsionem facultatis uteri. Nam partus difficultas primario est symptoma expultricis uteri, aut functio expultricis debilis aut diminuta, seu aliquo modo impedita, cū tactu depravato, aliisque symptomatibus. Ad fœtum naturalem edendum concurrunt, primum vires animi, corporisque ipsius matris satis robustæ, & primario expultrix uteri valida adjuncta motu septi transversi & musculorum abdominis, impulsu spirituum calorisque nativi. Deinde locus seu viæ, per quas fœtus permeare debet, patentes lubricæ beneque affectæ: tertio ut fœtus se recte habeat, robustus sit, & membranæ disrumpat, ac parturienti aliquid opis afferat.

Quare causæ difficultatis partus primario erunt vel vitium in facultate expultrice, vel in fœtu qui excluditur, vel in viis (ut orificio & cervice uteri, ac pudendo) per quas fit exclusio. Expellit fœtum naturaliter uterus adjunctus motu septi & musculorum abdominis concurrente facultate & naturali & animali vi, & adminiculo spirituum sanguinis & caloris nativi. Læditur ergo expultrix uteri, & musculorum inopia spirituum & caloris nativi, se laesa.

LI § quia

Partus difficultas.

Secunda relictæ.

Suppressa puerperia.

Definitio difficultatis

Causæ difficultatis partus tres.

Facultas

expultrix per

se laesa.

quia vel in toto corpore deficiunt, vel ad partes foetus expellentes sufficienti quantitate non transmittuntur, sed alio revocantur aut impelluntur. Deficiunt autem spiritus calorque natus in toto corpore, a diuturno aut acuto morbo, raritate aut laxitate corporis, magnis evacuationibus, inedia, vigiliis, immodico aeris calore, & ab omnibus, quae vires dissolvunt. Spiritus vero & ab utero & musculis avocant vehementes animi perturbationes, praecipue metus & pusillanimitas, qualis puellis, & aetate provectionibus accidit. Deinde maestitia, ira, verecundia, item dolores ingentes, &c. His adduntur uteri intemperies frigidae, quae vim expultricem debilitant, &c.

2. *Vitia in
vis.*

Deinde in viis per quas foetus excludi debet, vitia, foetus emissionem impediunt, sunt potissimum angustia & viarum siccitas & asperitas, quae lubricae esse debent, ut facilius transitum foetui exhibeant. Angustia autem interdum naturalis est ex membrana innata, aut ob ossa pubis, vel coxigis male conformata, aut auctis vinculis ita compacta, ut in partu dilatari aut retrahi nequeant. Plerumque adventitia est, ut obturatio aut constipatio a carne, callo, aut tuberculo innato, a rhagidibus, item inflammatione, abscessu, &c. Deinde compressio ob tumorem vicinarum partium, ut vesicae inflammationem, aut calculum: recte intestini tumores, caecae haemorrhoides, feces duriores, nimiam pinguedinem omenti, ut in obesibus: item magnam lumborum cavitatem, aut laxationem uterum comprimentem, &c. Praeterea praesidentia, ob cervicis uteri obliquitatem & distortionem: item contractio & nimia densitas ori & cervicis uteri, ut dilatari nequeat, ab exsiccantibus, usu immodice astingentium, a frigore immodico: unde hyeme & flante borea partus difficiliore ut plurimum sunt. Viae in parte

tu lubricæ non sunt, quod rupta ante tempus membrana citius, quam par est humor aquosus descendit, & in partu loci sicci manent quo tempore maxime opus est humore ut humectentur, & facilem transitum foetui præbeant.

Tandem accidit etiam difficultas partus, vitio foetus, primum si vel mortuus est, aut ita debilis, ^{3. Vitiis foetus} ut nihil opus parturienti præster, nec membranas distumpere valeat: mas autem cum robustior sit foemella, ideo foemellæ partus difficiliore ut plurimum sunt, difficultatem quoque afferunt foetus nimis parvi, quia facultatem parum stimulant: ac inusitatae magnitudinis vel magni capitis ventris, & cæter. vel monstrosi & ut bicipites. Deinde si gemelli aut plures sint, & repente omnes simul in cervicem uteri decumbant, vel uno mortuo, alter in utero supersit, qui vivus in lucem editus vopiscus inde vocatur, vel in utero mola contineatur exclusionem impediens. Præterea difficultas partus oritur, si foetus forma aut figura naturali ex utero non procedat. Maxime naturalis figura est, cum in caput recta ad os uteri fertur manibus secundum latera adductis: proxima, in pedes directo manibus super foemoribus porrectis. Cæteræ figuræ præternaturales semper sunt, ut cum caput in dextrum aut sinistrum inclinatur, aut manibus extensis, in pedes fertur, qui partus à veteribus Agrippæ dicebantur, quod ægre pariantur: aut altero pede prodit, altero intus retento, aut intus reductis à se invicem cruribus manum alteram aut utranque exerit, aut obliquus prodit in alterum latus, vel ventrem: aut duplicatus exit, ut quando capite & cruribus orificio uteri incumbit: vel vètr, vel coxarum vertebis. Ob secundas seu membranas, quibus continetur foetus,

CAP. 540
XIV.

LIBER TERTIUS

foetus, partus difficilis interdum redditur, si non avellantur ob crassitiem, aut citius, quam opus sit, abrumpantur, ut humor vias lubricans ante tempus partus excernatur.

Signa instantis partus facili & difficili.

Signa instantis partus sunt frequens respiratio, dolor lumborum, qui si ad anteriores partes vergat partum facilem arguit, si ad dorsum difficilem, difficilem quoque prænunciant, consuetudo difficilem pariendo, ætas immatura aut senilis fere, virium debilitas: dolores languidiores ex longioribus intervallis recurrentes: humor aquosus diu ante tempus effluens, aut sanguis copiosus, fortiter incallescere sine manifesta causa, &c. Simul et quatuor diebus in partu laboret, ut ait Avicenna necessario foetus moritur. Causæ difficultatis partus externæ ex patientis & affidentium sermonibus cognoscuntur: Morbi uteri propriis signis, ut supra: Virium patientis debilitas ex habitu corporis & morbis, causisque præcedentibus: foetus magnitudo ex ventris mole: debilitas ex debili tarda que motione, &c.

FINIS LIBRI TERTII.

DE SI-

DE SIGNORUM
DOCTRINA, QUÆ*σημειωλκην* dicitur;

LIBER QVARTVS.

DE SIGNIS ET DIF-
FERENTIIS SIGNO-
rum.

CAPVT PRIMVM.



UM nil arte tractari, nec recta ratione curari queat, nisi prius cognoscatur, aut si occultum sit, & intra corpus reconditum certis inditiis, & evidentibus signis manifestetur, & in lucem proferatur: instituti nostri ratio exigere videtur, ut *σημειωλκην* proponamus, ac fundamenta doctrinæ signorum seorsim explicemus. Scopus autem doctrinæ signorum *Signorum dñ* est ex infallibilibus notis & evidentib. signis, omnem *gnitas.* corporis constitutionem, omnesque affectus, affectuum sedes & causas patefacere & manifestare. Hæc pars Medicinæ omnium propemodum dignissima & Medico maxime necessaria est: Dum enim latentes morbos præsentis per signa dignoscimus, & quæ præterita sunt, tanquam præsentia commemoramus, quæque ventura sunt prædicimus: & non solum quid in curatione faciendum, quidve omitendum sit cognoscimus: sed etiam auctoritatem nostram apud ægros conservamus, ac præterea divinam quandam artem profiteri putamur.

Nam artis medicæ proprium est omnem par- *Medici offi-*
tam affectam, omnemque affectum & affectus cau- *cium.*
sam

sam in humano corpore dignoscere: deinde, quæ vè-
tura sunt prævidere & prædicere: tandem, si affectus
sit sanabilis, curare. Quare dignotio & prænotio à
medicis curationis causa instituitur.

*Simpliciter
signū quid?*

Est autem σημεῖον, ut vox ipsa sonat, nihil aliud
quam doctrina signorum: Signum, alias nota, siue
indiciū, est alicujus rei significativum & ad rem si-
gnificatam, siue ad signatum proprie refertur. Nam
rem aliquam ignotam semper signat, id est, declarat
& demonstrat. Proinde signum omnium Philoso-
phorum consensu, est quod ex sensuum notis ducit
ad ignoti cognitionem: & signare aut significare ni-
hil aliud est, quam unum ex alio manifestare. Verum
hoc modo signū generaliter sumimus, sub quo com-
prehendimus signa necessaria, quæ τὴν φύσιν, & non
necessaria, quæ simpliciter signa ab Aristotele a pri-
orum dicuntur.

*Signum me-
dicum.*

Medicus vero signum est propositio in mente pro-
ducta à certis sensuum objectis, vel ex rebus manife-
stis demonstrans ignotum aliquod in arte medica.
Cognoscitur enim signatum ex ignota demonstratione
ab effectu, vel à causa remota. Quare omne
signum nobis notum erit, & semper petendum vel
ab effectu, qui consequitur signatum: Vel à cau-
sa evidenti, quæ præcedit. Nam cum notum sit,
effectus à suis causis oriri, non mirum videbitur,
si ex uno noto alterum protinus mens concipiat &
concludat, licet expressa aliqua ratiocinatio non
sit. Sub causis comprehendimus plerumque cau-
sas externas, scilicet aerem, victus rationem, con-
suetudinem &c. Interdum causas internas, scilicet,
humores, sexum ætatem, temperamentum, &c. præ-
terea quæ essentiam cujusque causæ & effectus con-
sequuntur, ac quoque juvant a & laedentia. Sub ef-
fectis vero continentur accidentia sanorum & sym-
ptomata

*Fontes signo-
rum.*

promata agrorum : Item, memoria prateritorum affectuum, & consideratio morborum publice grassantium : unde ex similitudine de aliis morbis iudicamus.

Signatum, quod signo cognoscitur & manifestatur, est corporis constitutio, & quæ in ea constitutione eveniunt. *Divisio signorum.* Constitutio autem triplex est: Sana, ægra, & neutra. Proinde omnia signa, aut salubria, aut insalubria, aut neutra erunt. Salubria autem quæ sanam : insalubria quæ morbidam : neutra quæ mediam constitutionem corporisque conditionem ostendunt & manifestant. *1.*

Deinde omnis conditio corporis, vel præsens est, vel futura, vel præterita. *Divisio signorum.* Quare signa omnia triplicia erunt: 1. *1.* *αἰσθητὰ* quibus præsentem constitutionem intelligimus: 2. *πρὸς ἡν ἔσται* quib. futurum corporis statum, & ea quæ post eveniunt sunt præcognoscimus: 3. *ἀναμνηστικά* quib. præterita præcipimus & commemoramus. Signorum diagnosticorum & prognosticorum maximus planeq; necessarius in medicina usus est. Commemorative non item. His præmissis, de signis insalubribus nunc tantum agemus. *2.*

Omnia signa insalubria, vel communia sunt vel propria: Deinde vel separabilia vel inseparabilia. *Signa insalubria duplicia.* Propria & inseparabilia signa *παθολογικὰ* dicuntur: Communia & separabilia signa in morbis, communi nomine *συμπεριλαμβανόμενα* dici poterunt. Sunt autem *Signa παθολογικὰ* *παθολογικὰ* signa, quæ cum morbo incipiunt & desinunt, & promagnitudine morbi augentur & minuantur, propriamque morbi essentiam declarant. Talis in pleuritide est dolor in latere pungens extensus cum tussi, difficultate anhelitus, febri acuta & pulsu duro ferratili.

Συμπεριλαμβανόμενα sive assidentia signa sunt, quæ necessario morbis non coherent, nec ex morbi essentia imine-

Signa
ἐπιφανό-
μια.

ἐπιγνώμια.

Signa.
ἀγνωστοί
triplicia.

immediate procedunt, sed vel magnitudinem, vel durationem & motum, vel morem, aut eventum morbi declarant. Proinde sub assidentibus comprehendimus signa critica: deinde signa lethalia & non lethalia, quæ eventum morbi demonstrant: tertio signa cruditaris & concoctionis, quæ diuturnitatem morbi: in summa, omnia signa ἐπιγνώμια & ἐπιφανόμια. Sunt autem ἐπιφανόμια signa quæ morem, motum & eventum morbi declarant, proinde triplicia erunt: 1. quæ concoctionem & cruditatem: 2. quæ salutem & mortem: 3. quæ modum salutis vel mortis declarant. Hæc eadem signa communiter ἐπιγνώμια dicuntur: Verum proprie ἐπιγνώμια vocantur signa maligna in morbis, ut delirium in pleuritide, aut quando morbus in deteriorem degenerat. Pathognomonica signa proprie diagnostica dicuntur: assidentia vero magna ex parte, præcipue vero ἐπιφανόμια, prognostica. Quare de signis diagnosticis primum dicemus, deinde de prognosticis.

Demonstrant signa ἀγνωστοί præsentem statum ægri. Considerantur in ægro quatuor: 1. ipse affectus aut morbi species 2. pars affecta: 3. ipse affectus: 4. actio læsa, cæteraque symptomata. Verum symptomata quia sensibus manifesta sunt, signis non indigent, sed ex symptomatibus cætera tria quando ignota sunt manifestantur. Quare signa omnia aut affectum, aut partem affectam in corpore aut causam affectus ostendunt: licet plerumque communia quædam signa sunt, quibus semel affectum aut partem affectam & causam deprehendimus: imo pauca sunt signa affectuum, quæ non simul locum & causam demonstrant, ut Gale-

nus 1. de Locis ad-
monit.

DE

De signis quibus investigatur pars affecta.

Pars affecta si in superficie sita sit, una cum affectu specie sensibus facile deprehenditur. Sin in imo corpore lateat, exercitatione opuserit, tam in partium singularum actionibus & usibus, quam in corporum dissectionibus: Unde partis ejusque substantia, situs & formatio aestimatur. Requiritur, auctore Gal. de Loc. affect. ut læsæ actionis instrumentum primò cognoscamus: deinde ut à parte læsa incipientes, quis noxæ modus sit quæramus, & an dispositio sit in facto aut in habitu, aut habitudine, deinde an per se laboret, an ex consensu tantum afficiatur: præterea si laboret, an primario vel secundario. Affici autem dico ex consensu partem, quando motum ab alio præter naturam tantum suscipit: Laborare verò sive agrotare, quando propriam dispositionem præter naturam sustinet. Nulla autem actio in corpore humano læditur, nisi pars actionis afficiatur aut laboret. Symptomata sua natura affectus, & affectuum sedes demonstrant.

Sunt autem tria genera symptomatum, ut alibi dictum est: & in quolibet genere plura reperiuntur, quæ signi rationem habent: nihilominus Galenus præcipua signa, quibus sedes affecta dignoscitur ad quinque capita reducit. Nam dignoscimus partem affectam, 1. ab actione læsa: 2. ab Excretis: 3. à situ: 4. à doloris proprietate: 5. à propriis accidentibus. quibus addi poterit colligantia sive consensus partium.

M m

Ac

II.

I.

*Ex actione
in læsa.*

Ac primum cum nulla actio lædatur, nisi pars actionis causa afficiatur aut laboret, ex actione læsa pars affecta præcipuè deprehenditur. Nam læsa parte, actio illius propria necessario læditur. Deinde, teste Gal 3. de loc. cum nulla alia signa apparent, actio læsa sufficit ad affectarum partium inventionem. Sub actione læsa hic ulum comprehendimus: (licet actio propriè sit motus partium factivus; usus verò partibus vel nihil agentibus tribuatur) Nam usus ad affectorum locorum indagationem plurimum conducit. Actio autem læsa est partis vel similis vel instrumentalis. Similis actio læditur læso temperamento: organica, vitiata instrumenti structurâ, vel parte similari principali à qua fit actio, vel similibus ei commodantibus: Item, partibus annexis. Nam non semper una actione læsa, una aliqua pars peculiaris tantum afficitur, sed sæpè plures & diversæ, ut in voce & respiratione læsa apparet, quæ plurimum partium adminiculo indigent; neque pluribus actionibus læsis statim plures partes læduntur, ut in tactu & motu abolito: Quare in his omnibus artificios conjectura aut edū est. Peculiariter vitales functiones ex pulsu dignoscuntur: naturales ex concoctione & cruditate; animales ex sensu & motu. Ubi actionem læsam perspexeris partemque affectam, ad modum actionis accedendum est, an abolita, an debilis, ad depravata sit. Item an pars proprio affectu laboret, an per consensum afficiatur, quæ suis signis dignoscuntur. Nam modus læsæ actionis ipsum morbum, aliquando morbi causam nobis aperit

2.

Ab excrementu.

Secundo partem affectam demonstrant excreta. Considerantur autem in excretis, primò substantia sive species excernenti: secundò magnitudo: tertio modus excernendi. Substantia excrementi triplex esse potest: vel de essentia partis alicujus, sive par-

particulæ solutæ à membris: vel ex rebus naturali-
 ter contentis in partibus, ut sunt feces in intestinis,
 urina in vesica, &c. Vel ex rebus præter naturam
 contentis, siue quæ morbificas dispositiones conse-
 quuntur, ut sunt calculi in renibus & vesicâ, lum-
 brici in alvo, &c. Sub substantiâ continetur quali-
 tas excreti; nam sanguis arteriarum flavior, tenui-
 or, calidiorque est; quàm venarum, & qui ex pul-
 moni tussi eiicitur spumosus est, &c. Hæc omnia
 adiuncto semper positu & regione, unde excernun-
 tur, locum affectum demonstrant. Nam ubi tussi-
 endo caro spongiosa exspuitur, in pulmone ulcus
 dignoscitur: si cum torminibus deliciatur tunica
 vel ramenta tunicæ, ulcus in intestinis, &c. Deinde
 ex rebus naturaliter contentis: si per vulnus urina
 exeat; vesicam aut ureteres; si sterqus, intestinum
 aliquod; si cibus ventriculum vulneratum osten-
 dunt. Terriò ex rebus præter naturam contentis, ve-
 luti si cum urina lapis excernatur, renas aut vesicam;
 si tussi pus, thoracem; si grando, pulmones; si alvi de-
 iectione lumbrici, alvum demonstrant, præterea ex
 magnitudine illius quod eiicitur: si cum torminibus
 deliciatur crassa tunica, ulcus in crassis intestinis si-
 gnificatur; si tenuis, in tenuibus intestinis. Si siue
 torminibus deliciantur ad formam loturæ carnis,
 recens macerata, iecur affectum esse: Similiter ubi
 cum urinâ excernuntur frusta carunculis similia, re-
 nes affectos esse demonstrant: ubi lamularum spe-
 ciem referunt, vesicam. Insuper à modo excernendi:
 si sanguis saliendo exierit, indicat arteriam læsam
 esse; si aliter exeat, venam. Tandem ab iis, quæ par-
 ti alicui peculiariter adnascuntur, veluti si capiti
 fracto fungus adnascatur, indicat membranâ affectâ
 esse, si crustulæ exeant, quæ pars ulceris sunt ulcus in
 ea parte, unde excrauntur, ostendunt, his adduntur
 locus & via per quam. Nam si cum urinâ crustulæ
 exeant,

M m 2

exeant,

II.

excant, ulcus in instrumentis vesicæ, si rufi, in instrumentis spiritualibus, si vomitu, in gulâ aut ventriculo. Deinde ordo tempusque excretionis: Nam ubi ramenta cum sanguine statim per anum emittuntur, in infimis intestinis ulcus esse videtur, si postea, in superioribus intestinis, & si pus mingatur ante urinam, in ipso pene ulcus esse, si post, in vesicâ, aut superioribus partibus.

3.
A situ.

Tertiò positus & situs affectam partem sufficienter demonstrare potest, vel adiunctis aliis signis scilicet, dolore, excretis propriis accidentibus, vel sine his ex duritie, tumore & tensione partis. Nam durus in dextro hypochondrio tumor non sublimis & lunari figura jecoris affecti nota est: in sinistro hypochondrio, lienis: at si sublimior fuerit, musculorum abdominis. Ubi vero similia sunt excreta, positus & regio unde excernuntur, affectam partem commonstrant, ut ex supra dictis constat. Eadem ratio in dolore est veluti ubi per vomitum ulceris notæ apparent, si dolor sit in anteriore parte magis, & circa hypochondria, ventriculum affectum esse demonstrat: si in posteriori parte circa dorsum, gulam. Ita dolor in imo ventre & perinæ cum urinæ difficultate, vesicam demonstrat.

4.
*Ex doloris
proprieta-
te.
Distinctio
doloris.*

Quartò non solum ex doloris situ, sed etiam ex dolorum specie sive proprietate dignotio partis affectæ sumitur. Cum autem dolor sit tristis sensatio partium sensibilium, à subita mutatione, distinctio necessaria doloris sumi debet vel à subjecto, vel à causa efficiente, vel ab utroque. Subjectum est pars sensu exquisito, vel minus exquisito prædita, in superficie vel profundo corporis. Quo autem magis exquisito sensu prædita est, facilius & vehementius dolet. Causa doloris est intemperies subito alterans, & humor, vapor & similia, quatenus continuum solvant: quorum singula in subjecto
pro

pro sua qualitate, quantitate, motu & quiete varias dolorum species excitant. Nam ab intemperie calida fit dolor mordens, cum sensu caloris: ab intemperie frigida, ubi pars resistit, dolor quoque mordicans, sed cum sensu frigoris; ubi pars non resistit, porius stupor, qui improprie stupidus dolor vocatur: ab intemperie sicca dolor exasperans & tendens: ab humiditate per se sola dolor proprie non fit. Deinde materia pro sua qualitate, quantitate & motu agit. Nam ab acri & mordaci materia, fit dolor mordax & stimulans: à mordaci tenui immota materia, dolor ulcerosus: à salsa tenui immota pruriginosus: à re acutâ, infixâ & penetrante, dolor punctorius. Eadem in cæteris ratio est; si materia quiescat, dolor fixus oritur: si moveatur, errans & turgidus, qui celeriter in vicinas partes defertur: à materia copia partem distendente, dolor distendens. Ea materia si pondere suo partem premat, aut aliquid sit, quod partem deprimat vel incumbat, dolor gravans excitatur.

Deinde ratione subjecti, partibus nervosis & exquisiti sensus dolor magis acutus accedit: minus sensibilibus dolor stupidus: membranis dolor punctorius, ut in phrenitide & pleuritide: arteriis, quatenus afficiuntur, vel ab inflammatione comprimuntur, dolor pulsatorius: venis ex repletionem dolor extensivus, stupidus: nervis & tendinibus, dolor convulsivus: carni laxativus & divulsivus: visceribus minus exquisiti sensus dolor gravans obtusus: Perioftio dolor contundens, profundus: partibus superficiei sitis, dolor sublimis; in alio positus, dolor profundus.

Postremò sedes affecta ex propriis accidentibus deprehenditur, veluti dejectio similis loturæ ex propriis carnium animalis recens mactati, hepatis debilitatem denotat: citrinus color totius corporis obstru-

Mm ;

tionem

II.

ctionem jecoris aut vesicæ fellis, niger color, obstructio-
 ctionem lienis: maxillæ rubræ, inflammationem pul-
 monis: fastidium cibi, os ventriculi. Eadem in cæteris
 ratio est. Verum non unius symptomatis, sed plurimum
 aut omnium si fieri poterit, habenda ratio est, ut in
 pleuritide r. de Loc. Galenus fecit.

*Signa sum-
 pra ex con-
 sensu par-
 tium.*

*Signa mi-
 nus prin-
 cipalia.*

His addi poterit colligantia sive consensus par-
 tium quarundam, qui ad affectorum locorum noti-
 tiam non parum conducit. Nam læsis mentogibus,
 biliosi vomitus sublequantur: & læso ventriculo ex
 consensu cerebri deliria, vertigines, & similia. His ad-
 duntur signa nonnulla, quæ minus principalia dici
 merentur, quia conjecturam tantum confirmant,
 sumpta à sexu, ætate, parentum constitutione; con-
 suetudine, juvantibus & lædentibus, & similibus.
 Nam in foemina, ubi sedes affecta latet, sæpe fomes
 mali in utero residet, proinde uterus considerandus
 est: deinde in omnibus ratio ætatis habenda: Nam
 alii morbi, aliis ætatibus magis, minusque familiares
 sunt, & pueri calculo vesicæ senes magis calculo re-
 num afficiuntur, &c. Præterea conjecturam non pa-
 rum confirmat parentum constitutio, potissimum in
 morbis hæreditariis, nam ex Nephriticis aut Phthi-
 sicis sæpe Nephritici & Phthisici nascuntur: Deinde
 consuetudo agrotandi ex aliqua parte: juvantia ac
 lædencia; nam si parti alicui adhibeantur, quæ mor-
 bum augment, vel minuunt, id est offendunt, vel juvant
 illum, non levis suspicio erit, partem illam
 propterea affectam esse. adduntur à nonnullis si-
 gna sumpta à similitudine, & proportionem, veluti si
 hominem mortuo dissecto, noveris quænam fuerit se-
 des affecta, colligere licet, ubi consistat affectus
 in aliis, qui simili modo la-

borant.

DE

*De signis morborum & causarum inter-
narum.*

Cognita parte affecta plerumque unà morbus & causa interna morbi manifesta erit. Nam pauca sunt signa, quæ non simul affectum unà cum parte affecta ostendunt: nihilominus accidit, ut cognita parte affecta, ignoretur, quomodo lædatur, an proprio affectu an ex consensu: Deinde qua specie morbi laboret, & an morbus in fieri sit, an factus: præterea si plures morbi, an unus alterius sit causa, sive an unus sit primarius, alius secundarius: Quæ omnia in curatione planè necessaria sunt.

Ac primum proprio affectu pars semper laborare judicatur, quando in parte aliquis permanens affectus conspicitur: Ex consensu tantum afficitur, quando alia parte irritata, ipsa vehementius molestat, remissa omni irritatione, quiescit. Quare sublato omni proprio affectu, tollitur per consensum. Afficiuntur autem per consensum peculiariter instrumenta motus & sensus, quæ vim à cerebro per nervos suscipiunt: unde accidit, ut ipsis haud quaquam affectis, actio eorum lædatur ob defectum tantum alicujus quod secundum naturam ad actionem iis adesse debet, primogenio affectu pars aliqua laborare putatur, cum ipsa primo affecta sit sine alterius consensu: secundario verò, quando ante eam alia pars laboret, cum qua & à qua afficiatur, per materiæ aut qualitatis communicationem.

Affectus sive morbi species, auctore Galeno 3. *Morborum*
de Crisib. cap. 4. ex propriis symptomatibus sive *note. 4.*

Mm 4

Patho-

Pathognomonicis signis, quæ unâ cum morbo invadunt, accuratissimè dignoscitur: Nihilominus 1. de *Loc. affect. cap. 5.* præcipua affectuum signa ad quatuor genera reducit Gal. quorum. 1. sumitur ab excretis: 2. à loci natura: 3. à doloribus proprietate: 4. ex propriis accidentibus.

I.

Ab Excretis

Primò quidem ab excretis affectus species dignoscitur, ut insignis locorum affectuū diximus. nā ramentum excretum, signum est ulceris: fabulosa urina, lapidis: dejectio alvi similis seminibus cucurbitæ, latorum vermium: cibi non mutati dejectio, lienterix; potus non mutati mictus, diabetis nota est. Præterea ex consideratione unnx non solum concoctio & cruditas, sed etiam multi affectus dignoscuntur.

2.

À loci natura.

Secundò à loci naturâ dignoscuntur affectus quia aliqui morbi quibusdam partibus proprii sunt, aut certè non alieni; alii, alienissimi. Nam suffusio solis oculis tribuitur; lumbrici in alvo præcipuè gignuntur, &c. Contra cor abscessum non patitur: pulmo & partes expertes sensus non propriè dolent. Sub partis natura comprehendimus actionem propriam, situm & consensum. Nam actio læsa partem affectam proprie demonstrat: modus verò læsionis, ut supra dictum est, morbum, aliquando morbi causam. Veluti læsa concoquendi actio ventriculum affectum significat, at modus læsionis, scilicet corruptela ad nidorem, calidam intemperiem ventriculi arguit, ad aëorem frigidam, deinde ex situ, tumor in pube circumscriptus per ischuriam, obstructionem meatus urinarii.

3.

Ex doloris proprietate.

Tertiò ex doloris proprietate sumuntur signa affectuum & causarum, ut ex supra dictis abundè cōstat. Nam inflammatio partis carnosæ, ex dolore pulsatorio: inflammatio membranarum, expungente dolore dignoscitur; plenitudo extensivo dolore, &c. ut supra demonstratum est.

Quar

DE SIGNIS MORBOR.

153

CAP.
III.

4.

Ex morbi
accidenti-
bus.

Quartò ex propriis morbi accidentibus mor-
bus dignoscitur, veluti ex colore corporis flavo, iete-
us: ex ligna nigricante cum ingenti calore, febris
ardens: ex unguibus aduncis cum sputu purulento
graveolenti, tabes: ex horrore intempestivo cum fe-
bre, phlegmonis suppuratio, &c. Sub propriis acci-
dentibus comprehendimus etiam tempora morbo-
rum uniuersalia & particularia, periodos, & typos:
Nam morbus omnis, vel continenter affligit, vel
certas intermissiones, vel remissiones habet, quoti-
diè, alternis diebus, &c. quorum omnium considera-
tio utilis est in dignotione morborum, ut in febribus
apparet.

His addi poterunt alia signa, quæ minus prin-
cipalia dici merentur, quia conjecturam confirmant, *Signa mi-
nus princi-
palia.*
sumpta à promptitudine ægotandi, seu ab habilitate
ac inclinatione ad morbum aliquem. Nam aliqui in
morbum, aut aliquam morbi speciem facillè incidunt,
aliqui non facile: promptitudo & inclinatio illa æsti-
matur ex causis, primùm internis ut intemperie to-
tius corporis, aut præcipuorum viscerum, ætate, se-
xu, parentum constitutione, ac etiam recordatione
præteritorum morborum, quibus confictari æger
solitus fuit. Secundò ex causis procatarticiis, ut aere
ambiente (sub quo cõtinetur tempus anni, cœli con-
stitutio, regio &c.) item consuetudine in cibo, potu,
motu, & quiete, somno, vigiliis, &c. Tertio ex effe-
ctis & accidentibus inclinationem consequentibus:
Ut sunt functiones animi & corporis, veluti mores,
animique pathemata, pulsus, concoctiones insom-
nia, &c. Deinde excreta ut urinæ, dejectiones, ludo-
res, sputa, suppressio consuetæ evacuationis, item fi-
gura colorque corporis & faciei, habitus corporis,
cæteraque accidentia. His adduntur signa sumpta
à iuvantibus & lædentibus, & morbis publicè gra-
uantibus.

Mm 5

Nam

Nam primum inclinationem & habilitatem ad morbum al quem demonstrat similis temperatura totius corporis aut præcipuorum viscerum, ætas & sexus ei congruens, maximè si eodem affectu con-
fictari soliti sint, aut ipsorum parentes, quo tempore eos genuerunt; Inhabilitatem contraria signa. Quare juvenis, aut vir temperamento calidus, assuetus laborare calidis morbis, facile iis corripitur; difficultem frigidis; contra senex aut temperamento frigidus assuetus frigidis morbis, &c. In causis externis eadem ratio est.

Nam naturarum quædam ad æstatem, quædam ad hyemem benè aut malè habent, & diversæ temporis constitutio diversos morbos portendit; unde alii morbi vernaes, æstivales, autumnales & hyemales sunt, & alios hyems sicca & Ver pluviosum, quam hyems australis, pluviosa, ver siccum aquilonium affert. Præterea quibusdam regionibus nonnulli morbi sunt familiares (ut scorbutus ad mare balticum) qui in aliis regionibus raro, aut nunquam reperiuntur; proinde cujusque regionis proprietas observanda erit, morbi que inquilini. Non parum conjecturam confirmat consideratio victus, vitæ quæ antea actæ, cæterarumque rerum non naturalium, quarum effectus in corpore ex his intelliguntur, quæ in præcedente libro cap. 3. dicta sunt, deinde morborum publice grassantium, ut pestis, variolæ, morbilli, interdum dysenteria, &c. In accidentibus & effectis inclinationem consequentibus, similis ferè ratio est, ut in causis. Nam iracundi, macilenti cum latis venis, vigiles, coloris citrini, qui multos humores calidos gignunt, pulsus veloces urinas aureas habent: calidis morbis maximè opportuni sunt, contra pusillanimes, somnolenti, pigri, obesi, qui angustas venas habent, pulsus tardos, urinas albas, &c. mor-
bis

ois frigidis: Adduntur his signa sumpta à iuvantibus & lædentibus. Nam quicquid iuvat & nocet signum est, quia includit commodum & incommodum, & hoc illud est, quod dixit Hipp. 1. 7 Aph. 2. manifestat sanatio, homo enim sanus gaudet similibus, læditur contrariis, æger gaudet iis, quæ morbo contraria sunt, læditur similibus.

Quare signa morborum, quædam tantum si
 gna sunt, ut symptomata consequentia morbos: *Differentia signorum*
 quædam signa simul & causæ, quæ morbos præcedunt *morborum.*
 seu producant, de quibus in cap. 3. libri præcedentis
 dictum est. Horum omnium signorum eadem ratio *Delectus si-*
 non est, nam aliquando unum signum pathogno *gnorum.*
 monicum sufficit, ut in apoplexia, repentina privatio
 motus & sensus; plerumque plurimum signorum con- *Syndrome*
 cursus requiritur: ubi enim morbus, aut pars affecta *signorum.*
 nequit uno proprio signo dignosci, utendum multo-
 rum concursu, quæ, si singula fidem non faciunt, uni-
 ta tamen testimonia firma sunt: ad hunc modum di-
 gnoscimus plenitudinem, ut dictum est, & alios pleros-
 que affectus.

Deinde observandum est, signa aliquando sibi
 mutuo contraria esse, aut minus manifesta: aliquan-
 do morbos eorumque symptomata ita similia, ut, ni-
 si à medico exercitatissimo, facile discerni nequeant
 ut in colica & Nephritide apparet. Præterea morbos
 non raro complicari, ac singulos seorsim propter al-
 terius admisionem non facile deprehendi. Insuper
 quemadmodum plantæ erumpentes, ita morbos sta-
 tum ut incipiunt, difficilime dignosci ob signorum
 paucitatem, aut quia causæ satis firmatæ non sunt.
 Quare in dignoscendis affectibus accurato iudicio
 utendum erit, & in initio, ubi omnia minus mani-
 festa sunt, de specie morbi non temere pronuncian-
 dum.

Ex

Signa singulorum morborum.

Signa propria morbi calidi.

Signa frigida intemperiei.

Signa humida & sicca intemperiei.

Ex his omnibus in parte affecta dignoscere licet morbi speciem, nimirum an intemperies aliqua sit, aut morbus compositionis; aut solutio unitatis. Verum ut diximus pauca sunt signa, quæ non simul affectum cum parte affecta demonstrant. Intemperies nuda subito non gignuntur, nec repente & confestim actiones tollunt; ut morbi ex affluxu humorum deinde sine tensione, tumore & gravitate partis affectæ accidunt; celerius tamen corpus calefit, quam refrigeratur; & refrigeratur quam humectatur, aut exsiccat. Calidum morbum demonstrant causæ prægressæ corpus calefacientes; ut aeris ambientis intensior caliditas, alimentorum & medicamentorum calefacientium usus, motus importuni, vigiliæ, iræ, affluxus biliosorum humorum, &c.

Deinde effecta ut sensus caliditatis, rubor in parte affecta, sensus mordicans; si viscera affecta sint, pulsus magis veloces, urina ruffa, sitis, inappetentia ciborum, vigiliæ, irritationes sensuum, &c. Iuvantur frigidis, læduntur calidis. Frigidæ intemperiei opposita sunt inditia, nimirum pars contactu frigida sentitur, & pallida est, pulsus parvi, tardi, urinae albæ, concoctiones debilitantur, stupet mens & sensus; sitis nulla, juvantur & calidis, &c. Humidam intemperiem demonstrant causæ præcedentes humectantes, corporis nimia mollities & laxitas, somnolentia, functiones languent, sensus habitantur, dolor non sentitur, nec sitis, pulsus molles sunt, excrementa multa gignuntur & coacervantur, juvantur siccis, læduntur humidis. In sicca intemperie contraria omnia sunt, nimirum causæ prægressæ exiccantes, pars affecta squallida dura contracta, pulsus duri, dolor asper, mentis sensuumque acrimonia & irritatio, sitis, vigiliæ, excrementa pauca. Iuvantur humidis, &c. Si intemperies composita sit complicata habebit inditia: si cum materia, in parte affecta

DE SIGNIS MORBOR.

557 C A P.

III.

Effecta sentitur sensus gravitatis, tensio aut tumor. Materia quibus signis dignosci debeat infra dic-
ua.

Ut temperies ita morbos compositionis de-
monstrant causæ prægressæ, deinde effecta & sym-
ptomata quæ simpliciter signa sunt non causæ, & va-
riant pro varietate partis affectæ. Causæ cujusque
morbi in specie in capite tertio præcedentis libri
propositæ sunt. In genere effecta signaque nimie a-
peritionis meatuum & vasorum, sunt retentrix debili-
tata, & expultrix proritata, ac contentorum præer-
naturam evacuatione luvantur obstruentibus, astringen-
tibus, læduntur aperientibus. Angustia vasorum
contraria signa aut symptomata sunt. Nam angus-
tia functiones facultates attractricis & expultrici-
partium impedit, consuetas evacuationes excremen-
torum suppressit, ut angustia renum & vesicæ, urinæ
excretionem, intestinorum, dejectiones, menstrua,
etiam distributiones alimenti & spirituum in corpus
prohibet, ut angustia venarum & jecoris, sanguinis,
arteriarum, spiritus vitalis, nervorum, spiritus ani-
malis, &c. tandem levamen sentiunt ab aperientibus,
læduntur obstruentibus, &c. Superficiæ asperitatem
demonstrant, sensus inæqualitatis in parte affecta,
& quæ per eam expelli solent, si diutius retinentur,
ut cum difficultate expelluntur, juvantur lenienti-
bus, læduntur ab exasperantibus. Levitatis (superfici-
i) contraria signa sunt. Figura vitiata partis externæ
sensibus patet, internæ ut uteri, &c. recordatione
causarum præteritarum, & ex actione læsa partis
nale figuratæ, & mutatione naturalis figuræ cutis
in eo loco ubi sita est.

Secundò morbus in magnitudine aucta par-
tis externæ visu tactuque dignoscitur, internæ ex do-
lore gravante, aut distendente, situ tumoris sub cu-
e mollis aut duri cum calore, frigore, coloris mu-
tatione

*Signa mor-
borum in
numero.*

*Signa mor-
borum in
situ.*

*Signa solu-
tionis con-
tinui.*

*Signa cau-
arum.*

tatione juxta naturam materiæ magnitudinem au-
gentis. Iuvantur medicamentis, quæ magnitudinem
minuunt, &c. Diminuta magis opposita signa sunt.
Tertio morbus in numero aucto aut diminuto patet
tium externarum, sensibus evidens est; internarum
multa exercitatione indiget, præcipue redundantia
partis aut defectus vitio conformationis in utero
quæ non alia ratione dignoscuntur, quam ex actio-
ne læsa partis, & figura non naturali cutis in eo lo-
co ubi residet; si vitium adventitium sit, colligitur
fere ut magnitudo aucta & diminuta. Quarto situs
partis internæ mutatio à naturali sede, ut uteri sur-
sum aut deorsum, intestini, &c. deprehenditur non
solum ex causis prægressis, quæ partem à sua sede di-
movent, sed etiam ex gravitate dolore distendente,
tumore, in eo loco ad quem pars decumbit, ac etiam
extumoris forma, duritie, mollitie, æqualitate aut
inæqualitate, &c. Tandem continui solutio partis
externæ, aut ab externa causa, ut vulnus, contusio,
collisio, fractura ita manifesta est, ut nullis inditiis
opus habeat.

Ulcus internum demonstrant sæpè causæ præ-
gressæ & dolor, sed maximè excrera nimirum san-
guis sanies, pus, crusta, portio partis, &c. Nam sub-
stantia eorum, quæ excernuntur, locus & modus ex-
cretionis partem affectam una cum affectu indi-
cant. Compositi morbi complicata habent inditia.
In his omnibus dignoscendis requiritur diligens ex-
ercitatio in corporum dissectionibus, & in singula-
rum partium usu & actionibus.

Hactenus de dignotione præsentium in mor-
bis, quæ affectus & affecta pars invenitur, dictum
est: superest ut de dignotione præteritorum aga-
mus, scilicet de inventione causarum latentium;
quæ affectiones faciunt aut præcedunt. Cogno-
scun-

Intur quidem uno interdum indicio morbus & morbi causa proxima: aliqua modo locus affectus una causa: Verum accidit non raro, ut cognito affectu & parte affecta causa affectus ignoretur cuius cognitio medico planè necessaria est. Nam in curatione requiritur, ut sciamus, an causa adhuc agat, an desit agere: si agit, an per partem duntaxat transeat, an in parte contineatur, quæ omnia ex suis dictis facile intelliguntur. Nam si per partem tantum transeat, permanens dispositio non oritur, sed velut affectionis umbra, quæ sublata actione tollitur: at si in parte contineatur & firmetur, permanentem dispositionem gignit & confirmat: quæ post actionem relinquitur, & ex effectis, scilicet, ex symptomatum magnitudine æstimatur. Continetur autem causa, si morbus similis sit in propria partis substantia temperamentum immutans; si morbus compositionis, in parte affecta tanquam in organo, magis structuram lædens. Omnis causa vel externa & evidens est, vel interna & occulta, ut alibi dictum est. Externa cum evidens sit, signis non indiget, sed signi rationem potius habet. Internæ & occultæ causæ, scilicet contenta præter naturam in corpore & contentorum dispositiones, Plethora & Cacoehymia, ac quæ repletioni opponitur inanitio, certis signis dignoscuntur & manifestantur. Signa illa vel tantum signa sunt & consequuntur causas, vel pariter signa & causæ, quæ suâ naturâ præcedunt affectus.

Signa quæ causæ simul rationem habent, sunt temperamentum totius corporis, ac potissimum spatium principalium: deinde ætas, sexus, consuetudo, parentum vitia: Item, morbi præteriti: præterea ex sex rebus non naturalibus exercitatio, vitæ studium, evacuatio naturalis suppressa, aer & quæ

*Signa si.
mul &
causa.*

quæ sub ære continentur, regio, status cœli, tempus anni, balnea & similia, de quibus omnibus in genere & specie dictum est in capite secundo libri præcedentis: ab his causis humores redundantes gignuntur & geniti ac redundantes in corpore dignoscuntur.

*Simpliciter
signa.*

Simpliciter signa sunt, corporis habitus scilicet obesus, crassus, carnosus, hirsutus: deinde color & quæcunque in corpore erumpunt, tactiles qualitates scilicet durities, mollities, &c.

Item, functiones, omnes præcipue pulsus, somnus, vigiliæ, insomnia, mores, &c. præterea contenta, scilicet urina, feces, sudores, &c. quibus omnibus addi poterunt iuvantia, lædencia & similia. Hi sunt fontes signorum sunt unde omnis redundancia humorum dignoscitur.

πλεθωρα.

Redundantium humorum in corpore duplex est dispositio, Plethora & Cacochymia. Plethora, redundantia sanguinis vel omnium humorum æqualiter se habentium, duplex vicissim est, quoad vasa, vel quoad vires, ut alibi dictum est.

*Plethora
signa.]*

Ac primum Plethoræ quoad vasa, signa, quæ causæ rationem habent, sunt corporis temperatura calida humida, præcipue verò jecoris & cordis: adolescentia; tempus verum: victus plenior & liberalior: vita jucunda: exercitatio solita ommissa: balneatio à cibo: suppressa aliqua evacuatio sanguinis, &c. Simpliciter signa quibus sanguinis redundantia dignoscitur, sunt color totius corporis & faciei potissimum, roseus & floribus ex albo & rubro mixtus: habitus carnosus cum halituoso calore: urina copiosa substantia & contentis mediocri: mores animi jucundi & sedati: somnus placidus, cum insomniis jucundis: pulsus validi magni: sudor copiosus dulcis, maximè si habitum corporis occupavit: inflammationes & morbi consueti à sanguine:

guine: facile evacuationes sanguinis sustinere & læ-
di a calidis humidis, &c. Ubi verò Plethora aut re-
dundantia aliqua humorum vires premit: aderunt
gravitas corporis, pulsus imbecillis inæqualis, putre-
dines, cruditates & similia.

Cacochymia propriè est, cujuscunque alteri-
us humoris, à sanguine redundantia: ac proinde tri-
plex potissimum, biliosa, melancholica, vel pituito-
sa, alibi dictum est. κακοχυσία
μια.

Bilem redundare ostendunt. primum causæ
antecedentes bilem gignentes, scilicet constitutio Bilire-
dund. ||
signa.
corporis calida & sicca, præcipuè verò jecoris &
cordis: ætas juvenilis: tempus æstivum, victus re-
nuis: alimenta calida, sicca, acrida, inedia, nimia exer-
citatio: suppressa bilis evacuatio, &c. His aliisque
causis ubi redundaverit bilis flava, hæc signa appa-
rebunt: nimirum color corporis, præcipuè faciei &
oculorum citrinus & flavus, qualis in Ictericis. ha-
bitus corporis ficcus, macer: venæ amplæ, distentæ:
pulsus velox, frequens, durus: urina flammea, sedi-
menta pæuca, excrementa biliosa: pustulæ in cor-
pore biliosæ: calor corporis acris, mordax: iracun-
dia, vigiliæ, aut somnus inquietus cum insomniis i-
racundis: frigidorum appetentia & similia. Vbi verò
bilis peculiariter in cerebro redundarit, aderunt de-
liria, iracundia cum vigiliis, si ad os ventriculi con-
fluat, sitis, nausea, &c. si ad intestina, diarrhæa bilio-
sa, &c.

Redundat Melancholia in corporibus ficcis, Melancho-
lia signa.
constitutionis melancholicæ & in tristibus curis &
molestiis implicitis, autumno potissimum, aut statu
temporis inæquali, in locis ficcis frigidis, ex alimen-
tis crassis ficcis: aliquando suppressa evacuatione
melancholiæ ab obstructione Lienis &c. Adesse
redundantiam illam demonstrant color corporis
obscurus, fuscus, præcipuè faciei: fœda scabies: ma-
culæ

culæ nigræ: habitus macilentus: aspectus mæstus
fixus: pulsus parvus, tardus, rarus: metus & tristitia
sine manifeste causa: somnus turbulentus cum in-
somnia horridis & terribilibus: urina tenuis alba
interdum crassa, livida: excrementa melancholica
erumpentia: levamen ab iis, quæ melancholiam
purgant & bonum succum gignunt: Verum si bilis
nigra adusta fuerit, quæ mediam quandam naturam
inter melancholiam & bilem flavam sortitur, mixta
magna ex parte signa aderunt.

*Signa pi-
tuitæ.*

Redundantia pituitæ aut aquosi humoris e-
venit corporibus frigidis humidis, senibus, otiosis,
bibulis, voracibus, somnolentis & similibus, hye-
me aut in aere & locis humidis frigidis, ex alimentis
pituitosis, aut victus ratione humectante, qualis
est à cibo frequens balneatio, ingluviæ, &c. His ad-
di poterit suppressio consuetæ excretionis urinæ.
Redundantiam pituitæ demonstrant, color corpo-
ris albus, lividus, habitus obesus, tumidus, œdema-
ta, morbi que pituitosi: dejectiones pituitosæ, sali-
va copiosa & mucus per nates: urina alba aut palli-
da, nunc tenuis, nunc crassa turbida: legnities,
somnia profundi cum insomniis aquosis: levamen à
calidis siccis, &c. Aliquando actione caloris pituita
salsa efficitur, quæ mixtis ex bile & pituita signis di-
judicatur.

Flatus

Flatus immodici, soboles cruditaris, iis natu-
ris accidunt, qui cruditatibus, obstructionibus lienis,
&c. obnoxii sunt, aut frigido humido ventriculo
præditi, ac cibis flatulentis utuntur, crapula inglu-
viæ & similibus. Adesse flatuum copiam demon-
strant fluctuationes, rugitus, flatuum eructiones &
suppressiones; ut colica: dolor vagus, tensivus: pal-
pitationes, aurium tinnitus: insomnia rerum celeri-
ter moventium, violenterque impellentium, &c.

Inanities.

Inanities, quæ nihil aliud est, quam ablentia
corum

DE SIGNIS CAUSARUM. 353

eorum, quæ ad sanitatem requiruntur, ut sunt humorum, spirituum aut substantiæ solidæ, eodem modo, quo repletio dignoscitur. Nam signa quæ causæ rationem habent, sunt constitutio corporis calida sicca, rara, acris & tenuibus succis prædita: vis retentrix debilis: copiosæ evacuationes: aer ficcus calidus, vigiliæ, inedia & cæteræ causæ manifestæ, quæ corpus & humores exhauriunt ac spiritus dissolvunt. Simpliciter signa sunt habitus corporis squalidus extenuatus: color non naturalis pallidus: pulsus languidus: actionum omnium debilitas & similia. His accedunt levamen à reficientibus, offensio ab evacuantibus. Hæ sunt notæ communissimæ præcipuarum causarum latentium in corpore, an verò in parte aliqua peculiari redundet materia morbifica; propriis illius partis notis indicatur & æstimatur.

C A P.
III.

C A P. IV.

De pulsibus.

Signa, quæ ex consideratione pulsuum & urinae sumuntur, in numero eorum sunt, quæ non solum futurum morbi eventum denunciant, sed etiam præsentem statum ægri, seu morbum, morbi causam, & partem affectam demonstrant. Nam pulsus, primario vitalis facultatis & totius corporis robor, deinde cordis corporisque statum indicat; ac urina propriè hepatis viscerum venosiq; generis constitutionem, humorumq; conditionem; obscurius paulò virium robor arguit. Quare urinæ contemplatio magis ad dignotionem, pulsus ad prælagitionem ac morbi futurum eventum prædicendum inservit. De utrisq; breviter tantum, prout compendii ratio exigit, dicemus.

*Vsus considerationis
pulsus &
urinae.*

N n 2

Pulsus

CAP.

IV.

Pulsus definitio.

Pulsus ut alibi definivimus, est functio cordis & arteriarum ex diastole & systole composita, cum utriusque intermedia quiete, orta à facultate pulsfifica cordis, ut calor natus in sua temperie conservetur, spiritusque generentur & distribuuntur. Nam per diastolem seu cordis arteriaque elevationem, ambientis aeris aliquid intrò attrahitur, quo calor natus refrigeretur, spiritusque vitales generentur; per systolem seu submisionem & contractionem, quicquid inest fuliginosi vaporis, expurgatur. Arteriae autem à corde originem trahunt, & omnes eodem pulsandi modo, & inter se, & cum corde conveniunt: quare ex una omnium motum ex quo percipere poteris, promptius tamen ex iis, quae per carnes proreptant, omniumque commodissime quae per brachiale excurrunt, ad motis supernè arteriae carpi tribus aut quatuor digitis medio modo inter arctam compressionem & lenem palpitationem: diastole enim pulpam digitorum ascensu comprimit, systole in descensu eam recurrere facit. Verum systolis notitia difficilior multò est, & nisi in magno, vehementi duro pulsu vix percipitur, sicut etiam quies interna.

*Pulsuum**differentiae.**Prima differentia**celeritatis**ter tardus**mediocris.**2. Longus,**latus, altus:**Brevis, ar-**ctus, humi-**lis.**Magnus,**parvus.*

Differentias pulsuum Paulus ex Galen alii-que decem numerant, aliqui novem, nonnulli octo tantum. Prima sumitur ex tempore motus tam in elevatione, quam submissione, cuius species sunt tres, nimirum celer sive velox, qui brevi tempore multum spatii absolvit, tardus contra, mediocris, qui medio modo se habet. Secunda à quantitate ipsius motus in omnes dimensiones, cuius species sunt pullus longus, qui naturalem in longitudinem excedit, latus in latitudine: in altitudine: quibus contrarii sunt pulsus brevis, arctus, humilis: concursu pulsus longi, lati, alti, fit magnus; contra concursu brevis arcti humilis, oritur parvus. In horum medio

medio est mediocris seu moderatus. Tertia differen-
tia à facultatis robore desumitur, cujus species sunt
pulsus vehemens seu validus, qui tangentis manum
validè ferit; debilis sive languidus, qui in validè, adeò
ut arcta digitorum compressione evanescere videa-
tur; mediocris in horum medio. Quarta differentia
oritur ex arteriæ substantia & qualitate, ut pulsus du-
rus, quando arteria dura intenta in occursum percipi-
tur, mollis contra, ubi laxa mollis; mediocris in ho-
rum medio.

Quinta ex contentis seu arteriæ perfusione
consideratur, scilicet pulsus plenus, ubi arteria digi-
torum impressioni humore plena turgidaque occur-
rit; vacuus contra quando bullæ modo sublationem
efficit; mediocris ubi medio modo se habet. Sexta à
temperamento arteriæ & contentorum dependet, ut
pulsus calidus, frigidus, temperatus. Hæc differentia
à pluribus omitti solet, ac à nonnullis prior quoque,
quæ sumitur ab arteriæ perfusione. Septima diffe-
rentia est ab ictuum intervallo & quiete, quæ duplex
est, una interna, altera externa, hujus species sunt
pulsus frequens seu creber & densus, cui breve quie-
tis tempus est; deinde rarus, cui longum: in quorum
medio est mediocris. Octava dependet ex rythmo, id
est, proportionem temporis motus ad tempus quietis,
& temporis systolis ad tempus diastolis, &c. hujus
species sunt, pulsus $\epsilon\upsilon\epsilon\upsilon\theta\mu\omicron$ consonus, qui cuique æ-
tati naturalis est, ejusque proportionem servat. Nam
suus cuique ætati certus rythmus est. Deinde $\alpha\pi\rho\upsilon\theta\mu\omicron$
 $\mu\omicron$ non est, qui nullum rythmum servat, sed qui ma-
lo præditus est, aut naturalem corrumpit; hujus tres
species seu gradus sunt. I. $\mu\epsilon\tau\epsilon\upsilon\theta\mu\omicron$, qui medio-
crem boni rythmi perversionem obtinet: II. $\epsilon\pi\rho\epsilon\upsilon\theta\mu\omicron$
 $\mu\omicron$ qui longius à bono recedit, & alterius ætatis
mutatur: III. $\epsilon\kappa\epsilon\upsilon\theta\mu\omicron$, qui bonitatem rythmi planè
corrumpit.

3. Differen-
tia. Veho-
mens lan-
guidus me-
diocris.

4. Durus
mollis.

5. Plenus
vacuus.

6. Calidus
frigidus.

8. Frequens
rarus.

8. Differen-
tia.

$\epsilon\upsilon\epsilon\upsilon\theta\mu\omicron$.

$\alpha\pi\rho\upsilon\theta\mu\omicron$.

Nona

C A P.

IV.

9.

Nona differentia sumitur ab æqualitate & in æqualitate in omnibus prædictis differentiis. Specatur autem æqualitas vel in uno pulsu, vel in pluribus, quæ in pluribus *συνημότητα*, id est, collectiva vocatur. Æqualis autem pulsus est, qui in omnibus prædictis pulsuum differentiis (ut magnitudine frequentia, vehementia, &c.) sibi semper & ubique similis est: Æqualis in uno pulsu, cujus initium, medium, finis æqualiter procedunt. Inæqualis verò pulsus dicitur, qui in una ex pluribus prædictis differentiis dissimilis & impar est, qui verò in omnibus, absolute inæqualis vocatur.

Pulsus æqualis & inæqualis.

Inæquales in pluribus pulsibus.

Æqualiter inæquales.

Myurus deficiens.

Myurus recurrens.

Inæqualiter inæquales.

Inæqualis deficiens.

Reciprocus.

Intercurrens.

Pulsus inæqualis in uno pulsu.

Inæquales in una parte arteriæ.

Deinde pulsus omnis inæqualis, vel æqualiter inæqualis, vel inæqualiter: æqualiter inæqualis pulsus est *μὲν* sensim diminutus, quando secundus ictus paulo minor est primo, & tertius secundo, atq; ita deinceps, qui si ad absolutam privationem deficiat, pulsus myurus deficiens nominatur: si rursus augeatur in parem majorem aut minorem prioris magnitudinem, myurus recurrens dicitur: accidit tamen ut pulsus magnitudinem, in qua deficiat, aliquandiu cōserves. Pulsus inæqualiter inæqualis est, qui similem inæqualitatem non servat, veluti cum duo aut tres priores ictus pares sunt, quartus & quintus, impar, &c. hic si definat inæqualis deficiens; si post duos, aut tres ictus prætermittos redierit, deficiens reciprocus: si non expectata quiete in medio quasi ictus supervacuus incidat, pulsus intercurrentes vocatur. Inæqualis in uno pulsu, cum initium, medium finis, aut omnes arteriæ partes non eodem modo procedunt. Hæc inæqualitas consideratur, vel in una parte arteriæ, vel in diversis; In una parte, quando pulsus incipiens, vel definens tardior, vel celerior est, aut intercidit, aut recurrit, seu quasi bis ferit, si pulsus continuus manens à tarditate ad

ad celeritatem, aut contra transferit, impar citatus nuncupatur: si à quiete intercisus celerior & vehementior multo appareat, caprizans à capra, quæ inter saliendum sublimis hæret, & secundum motum inopinatum priore celeriore molitur; sin ab elevatione recurrerit tanquam malleus ab incude resiliens, pulsus dicrotus, id est, recurrens & bis feriens nominatur.

Caprizans.

Dicrotus.

Inæqualitas verò unius pulsus in diversis arteriæ partibus duplici modo accidit: uno cum motus manet continuus & arteria juxta quosdam digitos celerius, juxta alios tardius movetur, ac vehementiæ celeritas, magnitudo similis ab omnibus non percipitur: alio si motus intercidat, & alii digiti pulsus apprehendant alii non.

Inæquales
in diversis
arteriæ
partibus.

Ubi motus à digito interiori magis percipitur, qui juxta proportionem in cæteris sensum minuitur, Myurus in uno ictu; si juxta medios digitos magnus occurrat, & utrobique minuatur, Archigenes *περιενδύουσα*, id est pulsus circumnutantem appellat; quod si ad inæqualitatem in magnitudine accesserit celeritas aut tarditas, tum pulsus undosi vermiculantes, formicantes oriuntur.

Myurus in
uno ictu.
Circum-
nutans.

Undosi autem, cum arteria simul tota non attollitur, sed magna inæqualitate primo pars una, deinde altera, mox tertia, hinc quarta, motusque continuus manet, ad modum undarum sese attollentium.

Undosus.

Undosus pulsus in parvitatem desinens, primum vermiculans, tandem formicans efficitur.

Nam vermiculans ab undoso; & formicans à *Vermiculans* vermiculante, non nisi magnitudine differt, ac formicans pulsus languidissimus est admodum parvus, creberrimus, & inæqualis, cui affinis est pulsus hecticus, sed hic perpetuò fere confimilis manet.

Hecticus.

- magnamque mutationem non habet. Sin ad inæ-
qualitatem in magnitudine aliisque differentiis ac-
cesserit situs partium, arteriæ mutatio, ut sursum
deorsum, dextrorsum & sinistrorsum inflectatur, pul-
sus vibrantes, convulsivi, serrati constituentur. Vi-
Vibrans. brantes & turbulenti, quando particulæ arteriæ sur-
sum feruntur, uno eodemque tempore quasi spicula
Convulsi- val- dius emissa celeriterque vibrata. Convulsivi si ar-
vus. teria tensa sursumque retracta chordæ cuiusdam ten-
Serratus. sæ speciem præbeat. Serratus vero cum ob duritiem
una pars arteriæ magis, quam alia elevatur. Ultima
Ultima dif- differentia pulsus consideratur potissimum in inæ-
ferentia qualitate ordinis, Nam æqualis pulsus semper
pulsus. ordinatus est; inæqualis vero vel ordinatus est, vel
Ordinatus inordinatus. Ordinatus dicitur, qui circuituum pa-
inordina- ritatem servat; inordinatus qui non servat. Quare
sus. pulsus inæqualis ordinatus erit, qui inæqualitatis si-
milem circuitum obtinet, veluti cum duo pulsus
parvi sunt, & unus magnus; deinde iterum duo par-
vi, unusque magnus, &c. Contra inæqualis inordina-
tus est, qui similem inæqualitatis ordinem non ser-
vat, &c. Hæ sunt maxime generales differentiæ pul-
sus, ex quibus conjunctis oriuntur compositæ pul-
sum species.
- Causa pul-* Causa efficiens pulsus est facultas à corde pro-
sum. manans, instrumenta sunt arteriæ, quæ cordi conti-
nuantur, & imperum cordis sequuntur: Causa fa-
cultatem impellens, est necessitas & usus. Nam pro
modo & conditione necessitatis pulsus perficitur,
modo facultas robusta sit, & arteriæ obsequentes.
Quare varietas in pulsu oritur, præcipuè aut à ne-
cessitate seu usu, aut à facultatis robore vel imbecil-
litate, aut ab arteriæ quantitate, qualitate & situ.
- Causa dif-* Nam hæc tria si secundum naturæ modum sese ha-
ferentiarū buerint, pulsus in omni genere moderati efficiun-
pulsuum tur. Moderatos dico non exactè (qui non dantur,
pres. m-

nisi in naturis exquisitè temperatis mediisque & fortasse ad momentum) sed minus exactè, & proportionatos ad naturalem temperiem. Ab hac mediocritate si longè recesserint ad alterum extremorum pulsus *I. Necessitas.* vitiosus oritur. Necessitas seu usus pulsus est ut calor *tas.*

nativus contemperetur, & spiritus regentur. Nam finis diastolis est, ut aliquid aeris ambientis attrahatur, quo calor nativus refrigeretur, spiritusque regenerentur; deinde systoles, ut fuliginosi vapores, & quicquid spiritibus inutile est, expurgetur. Igitur necessitate aucta vel diminuta pulsus à mediocritate recedunt, augentur vel minuuntur; & diastole, aucto vel diminuto calore: systole auctis vel diminutis fuliginosis excrementis, unde collato elevationis & submisionis tempore colligere licet, vincat ne calor aut fuliginosa excrementa.

Causa necessitatem mutant.

Nam usus à mediocritate recedit tripliciter, primò defectu spirituum, quem facultas pulsu resarcire conatur; deinde intemperie præter naturam calida vel frigida, simplici vel composita sine vel cum materia: tertio ex materia aliena & vitiosa, ut fuliginosis vaporibus, humoribus, &c. Procedit hæc immoderatio à causis seu rebus vel naturalibus, vel non naturalibus; vel præternaturalibus, naturales causæ magnitudinem maximè stabilem faciunt, cæteræ faciliè mutabilem, ut mox dicetur. Secundo robur facultatis vitalis comitatur bonam corporis dispositionem, ætatem, anni tempora, causasque cæteras temperatas. Debilitas vero, virium oppressio- *II. Virtutis vitalis robur & debilitas.* nem aut exolutionem: oppressio fit ab humorum copia aut cruditate vires premente; à qua vindicantur concoctione, evacuatione, &c. Exolutio vero virium ex inedia, vigiliis, doloribus, curis, magnis evacuationibus morbis acutis & diuturnis, a-ni pulsum nimi deliquiis. Tertia causa varietatis pulsus est in *Tertia causa mutatio in arte-* instrumento, nimirum arteriæ angustia, & amplitu- *tia.*

N n 5

do,

do, deinde nimia mollities & laxitas aut siccitas & durities: tertio situs partium ipsius mutatio, cum à causa tendente & trahente sursum deorsum aut sinistrorsum, dextrorsum deducta esse videatur. Hæ sunt tres proximæ pulsuum causæ, ad quas cæteræ referuntur.

Causa singularum specierum pulsus.

Consequens ut ordine singularum specierum causas explicemus. Pulsus, qui longus appellatur, fit ob arteriæ siccitatem, partiumque circumstantium colliquationem ariditatemque: latus solum ob superfluam humiditatem: sublimis, propter instrumenti mollitiem, virtute ad hoc opitulante: Ex contrariis causis oritur pulsus brevis, arctus, humilis. Celer frequensque pulsus fit ob usum auctum, nimirum caloris exuperantiam, aut spiritus vitalis penuriam; magnus propter necessitatem auctam cum facultate non imbecilla. Nam aucto calore si facultas debilis non sit & instrumentum obediens, pulsus magnus oritur, si magnitudo usui non suffecerit, statim celeritas ipsi accedit: ac si ne sic quidem satisfecerit frequentiam assumit. A contrariis causis fiunt pulsus rari, tardi, parvi, scilicet defectu caloris nativi, magnaue refrigeratione aut facultatis debilitate. Vehemens pulsus à facultatis vitalis robore perficitur, modo usus non absoluitur, nec instrumenti durities remittatur. Languidus à debilitate virium proprie fit. Durus pulsus vehementi similis interdum videtur, sed magnus esse nequit, ob arteriæ contumaciam, verum usu aucto pro magnitudine frequentiam & velocitatem assumit. Causa ejus est, arteriæ durities, orta ex immodica refrigeratione, vel exiccatione, vel inflammatione vehementer tendente, ac ex convulsione.

Celeris.

Magni.

Frequentis. Pulsus rari tardi, parvi.

Causa pulsus vehementis.

Languidi.

Duri.

Ex opposito pulsus mollis fit, ab arteriæ humiditate, nativæ vel ascititiæ, contracta ex victu copioso humectante, frequentibus balneis, vita delicata,

ficata, multo somno ac redundantia pituitosorum humorum, morbisque pituitosis, ut anasarca, lethargo, comate, &c. Plenus pulsus redundantiam humorum aut alimenti in corpore arguit; vacuus contra defectum; Bonus rythmus probam totius corporis temperiem, Arrhythmus pravam, veluti in pueris aut senibus: longius quietis tempus, quam motus, calorem præpollere notat, quemadmodum in juvenibus, &c. Inæqualiter citati & caprizantes pulsus febriles calores maximè comitantur: Sed in illa inæqualitate, si pulsus ad elevationis principium properet, seu diastole celerior sit, vehementem calorem arguit, qui refrigeratione tantum indiget: si elevationis principium dissolvat, & submisionis initium ac elevationis extremum acceleret, seu systole velocior sit, quam diastole, putredinem arguit, & copiam fuliginosorum vaporum, quibus excernendis natura incumbit, ut in putridis febribus. Turbulenti seu vibrantes pulsus fiunt, cum usus magnam elevationem exigit, & vis vitalis eam perficere valeat, & conetur, sed arteriæ ob duritiem ex inflammatione, tensione, obstructione valida &c. refragantur. Convulsivi, quando principium nervorum affectione inflammatoria laborat, ut in Phrenitide, aut acuta epilepsia & convulsione, ubi adhuc calentes moriuntur, contraria ratione, quam in syncope. Serratus pulsus ex inflammatione nervosarum partium oritur, & pleuritidi peculiaris est, maximè inconcoctæ.

Undosi, affectus humidos partiumque humidarum consequuntur, ut anasarcam, lethargum, peripneumoniam: si virtus dissolvi ceperit, in vermiculantem primum degenerat, tandemque viribus extremè collapsis in formicantem omnium pulsum languidissimum.

Pleni vacui.

Boni & mali rythmi.

Causa pulsus caprizantis & inæqualiter citati.

Vibrantis.

Convulsivi.

Serratilis.

Undosi.

Vermiculantis.

Formicantis.

Sem-itis.

IV.

*Causa pul-
suum defi-
cientium
recurrentiū
& inter-
currentiū.*

Semper autem pulsus deficientes extremam virtutis debilitatem denotant, concidentem & repentes imbecillem quidem, sed repugnantem adhuc. In omnibus morbis pulsus valde languidus imbecillitatem facultatis vitalis arguit, sed non uno modo. Nam magnæ imbecillitatis in pulsu tres causæ præcipuè sunt, quæ vim vitalem prosterunt: una quæ vires sensim dissolvit; altera quæ repente; tertia quæ materiæ copia, aut cruditate & malignitate obruit, premitque. In quovis imbecillitatis genere, pulsus languidus quidem semper est; verò in prima specie simul parvus est, sine inæqualitate. Deinde *puë* & deficiens tandem abolitus: in secunda specie languidus simul & parvus, frequens, celer sine inæqualitate: post vermiculans, formicans & deficiens. In tertia debilis, parvus, inæqualis, & inordinatus; deinde intercurrentens, dicrotus; tandem intermittens: si verò adfit simul febris, erit vna frequens, velox, inæqualis: si sine febre & calore, rarus, tardus. Intermissio autem quo diuturnior; eò periculosior, semperque juvenibus periculosissima est, minus pueris, minimè senibus. Pulsus inæquales ordinati rarè inveniuntur, eosque comitantur minores offensæ, quàm inordinatos.

*Causa pul-
sus natura-
lis.*

*Pulsus tem-
peramenti.*

Varietas & ætatio pulsus accidit à rebus naturalibus non naturalibus & præternaturalibus. In ægris à præternaturalibus potissimum, ut jam dictum est. In sanis verò primariò à causis naturalibus, deinde à non naturalibus. Naturales sunt temperamentum, habitus corporis, sexus, ætas & peculiaris corporis dispositio, ex his cognoscere oportet pulsus cuiusque naturalem; Nam citra cognitionem pulsus naturalis in ægris, nil certi ex pulsu conjicere possumus. Naturæ temperatæ pulsus moderatos obtinent, intemperatæ non item: sed calidæ, quæ multa refrigeratione indigent, pulsus celeres fre-

frequentes & magnos; contra frigida, raros, tardos, parvos: humida molliores: sicca duriores, angustiores, interdum si necessitas aucta sit, & virens robusta, bis ferientes, vibrantes. Deinde corpora, quæ latas habent arterias, magnos; quæ angustas, ut obesi parvos; quia angusta magnum pulsum perficere nequit. Quare mulieribus, quam viris minores & debiliores pulsus sunt, plerumque celeriores & frequentiores. Pueri in vehementia & magnitudine mediocres pulsus obtinent, sed velocissimos & creberrimos, ob caloris & fuliginosorum vaporum redundantiam: Juvenes, maximos & vehementissimos, contra senes, parvos, debiles, ac etiam tardos raros, sed proportionem diuturnius est motionis tempus, quam in juvenibus. Tandem ob peculiarem cordis arteriarum dispositionem aliquibus à natura inæqualitas pulsus accidit, quæ medicum latere non debet. Mutant naturalem pulsum in sanis ac etiam non naturalem in ægris res non naturales, primum aer sub quo continentur anni tempora, regio, &c. Vere medio, & in locis, regionibus temperatis, pulsus vehementiores sunt, in magnitudine, celeritate, frequentia, moderati: æstate locisque calidis ob virium resolutionem, debiles ac etiam parvi, sed ob necessitatem urgentem celeres, frequentes. Autumno debiliores quam vere sunt, magisque inæquales & duri. Hyeme & in locis frigidis, tardi, rari sunt, minores quam æstate, sed vehementiores. Deinde alimenti plenior usus pulsus vehementes facit, ac etiam magnos, crebros, veloces si fuerit alimenti calidioris, ut vini: Parcior usus contra debiles, parvos, raros, tardos: Immoderatus supra vires, debiles inæquales, inordinatos. Tertio in somno pulsus minores, debiliores, tardiores, rariore sunt, somno aliquandiu vehementiores, majores frequentiores. Præterea exercitatio immoderata,

*Pulsus senum.**Pulsus juvenum.**Pulsus creberrimus.**Pulsus tardus.**Pulsus inæqualis.**Pulsus varius.**Pulsus inordinatus.**Pulsus in sanis.**Pulsus in ægris.**Pulsus in febribus.**Pulsus in morbis.**Pulsus in temporibus.**Pulsus in locis.**Pulsus in regionibus.**Pulsus in temperatis.**Pulsus in calidis.**Pulsus in frigidis.**Pulsus in humidis.**Pulsus in siccis.**Pulsus in mollioribus.**Pulsus in durioribus.**Pulsus in angustis.**Pulsus in latas.**Pulsus in obesis.**Pulsus in magis.**Pulsus in minoribus.**Pulsus in celerioribus.**Pulsus in tardioribus.**Pulsus in frequentioribus.**Pulsus in rarioribus.**Pulsus in inordinatis.**Pulsus in inæqualibus.**Pulsus in variis.**Pulsus in immoderatis.**Pulsus in moderatis.**Pulsus in sanis.**Pulsus in ægris.*

C A P.
I V.

rata, ut superflua vigilæ, ob virium resolutionem debiles, parvos pulsus edit, sed ob necessitatem autem etiam celeres, frequentes: Moderata exercitatio vehementes, magnos, celeres, crebros; otium & ignavia contra debiles, parvos, tardos, raros: Tandem ira, vehementes, altos, magnos, crebros, veloces pulsus facit; tristitia, debiles parvos, tardos, raros: subitus timor, veloces, inæquales, inordinatos: celare aliquid studentes, si interrogati fuerint, repente pulsus magnos & inæquales edunt. Mutationes pulsuum à causis non naturalibus considerandæ sunt, tam in sanis, quàm in ægris. Nam nec naturalem cursumque pulsuum dignoscere; nec ex pulsu non naturali in ægris certi aliquid prædicere possumus, nisi sedata sit illa corporis animique perturbatio, quæ à causis externis oritur. De cæteris signis ex pulsu, tam prognosticis, quàm diagnosticis lege Galeni libros de pulsibus.

C A P. V.

De urinis.

Quid urina.

Differentiæ pulsuum obscuræ sunt, difficillimè dignoscuntur, multa que exercitatione indigent. Signa, quæ ex consideratione urinarum sumuntur, manifesta sunt, facile que dignoscuntur. Est autem urina serosum sanguinis excrementum, & vehiculum, ex superflua assumptorum liquidorum portione genitum, quod unà cum portione excrementiæ bilis & reliquis nonnullis tertiarum concoctionis, ex venis renes proliciunt, & per ureteres in vesicam dimittunt. Excrementum hoc serosum unicum simplexque non est, sed omnibus partibus massæ sanguinis commune. Nā tot sunt species serosi humoris, quot species

ies succorum in venis, & quilibet succus suum ha-
bet serum, quibus permiscetur portio biliosi tenuis
excrementi, scilicet bilis flavae rubrae, pallidae, unde
in temperatis naturis, urina subflava, subruffa aut
itrina redditur. Serosum hoc excrementum vehicu-
lum sanguinis est, per jecur in cavam minoresque
venas: ubi reliquias nonnullas tertiae concoctionis
assumit, unde hypostasis oritur: in ægris qualitatem
humoris peccantis contrahit, & partis affectae no-
tam, aut inquinamenta plerumque suscipit: tandem
que ex venis vi renum prolicetur, & in vesicam pro-
labitur.

Quare urinae eum de toto omnium excre-
mento maxime decidant, significationem maximè
generalem habebunt, evidentissimè dispositionem
ecoris, venosi generis, sanguinis, & humorum in
asis demonstrant, ac concoctiones & crudi-
tatem in venis. Deinde affectus partium per quas
elabuntur, & attingunt ut renem, ureterem, vesicæ,
etiam partium quarum inquinamenta aut ex-
cretionem assument: minus manifeste illarum con-
stitutionem, quas non attingunt, aut quarum ex-
cretionem nullas suscipiunt.

Colligenda autem est urina manè à somno
peracta concoctione universa in matula vitrea pel-
lucida alba, tenui inferne, nec nimis lata nec arcta,
non post coitum, evacuationem, vigilias, crapulam
medicamentorum, quæ urinas tin-
gunt, &c. servanda clausa in loco temperato non
ultra quinque aut sex horas; contemplanda ubi re-
fixerit & reuderit in aere lucido extra radios solis.
Considerantur autem in urina sex, nimirum sub-
stantia seu consistentia, perspicuitas, quantitas, odor
calor & contenta, quibus additur à nonnullis min-
gendi modus. Ab his sumuntur differentiae urina-
rum seu signa.

*Ex consi-
deratione
urinae qui
morbi co-
gnoscuntur:*

*Modus con-
sideratio-
nis.*

Sex consi-

deranda

in urinis.

Differentia

urinarum.

- V. Nam ratione substantiæ, urina, vel tenuis est, qualis
 1. aqua, quæ concussa spumam exiguam ampullasque
 parvas habet, quæ citò dissolvuntur: vel crassa qua
 si oleum, vinum potens, &c. vel mediocris substan
 2. tiæ. Deinde respectu perspicuitatis, vel clara perspi
 cua & limpida est, ut visus facile permeet, vel turbi
 da, opaca, obscura, &c. Tertiò ratione quantitatis
 3. assumpti potus, vel multa & copiosa, vel pauca vel
 4. potui proportionata. Quartò odor urinae, aut nul
 5. lus est, aut planè foetidus est, aut naturalis. Quintò
 colorum omnes ferè species in urina consid- ran-
 tur, quorum extremi sunt albus & niger, medi
 complures. Sub albo continentur primum color cri
 stallinus, deinde aqueus ac lacteus, quasi lac sero
 sum, post subalbus color ut glaucus quasi cornu
 pellucidum, ac charopus pilis camelorum similis;
 hinc sequuntur intermedii colores ut subspiceus &
 spiceus sive palearis, pallidusque color, qualis in an
 tiquis paleis conspicitur. De sequentibus discrepant
 Gal. & Avicenna Nam Gal. lib. 1. de crisib. cap. 12.
 post colorem subpallidum ponit pallidum, subru
 fum, subflavum, Deinde ruffum, post flavum, quartò
 rubrum, &c. Avicenna post spiceum statuit citrinum
 deinde flavum, post ruffum, hinc citrangularem, i
 gneum, croceum, rubrum, &c. Verum ruffus magis
 ad album vergit, flavus ad splendidum rubrumvè;
 subrubro continetur primum roseus, qualis in ro
 sis valdè rubris, deinde puniceus, ut in scarlato, ter
 tio vineus vino nigro, aut hepatis colori similis,
 tandem prassus, qualis in uvis nigris; post hos se
 quuntur species coloris ad nigrum inclinantes, ut
 viridis, æruginosus, prassus, ceruleus & venetus, i
 tem lividus plumbeusvè, ultimo color niger. Tan
 dem contenta in urinis sunt primum hypostasis,
 deinde enæorema, nubes, bullæ, tertio ramenta
 squammæ, pili, arenæ, pinguedo, pus, humores, se
 men, &c.

Colores u
rina.

6. Contenta
urina.

Cum

Cum bona constitutio, bonæque constituti-
onis urina, norma malæ sit, ab urina sana optima in-
cipiendum erit. In sanis optimo corporis habitu *Optima*
præditis, urina subruffa aut subflava est, talis ma- *urina.*
uens qualis mingitur quantitate potius proportio-
nata, mediocris substantiæ, non omni odore carens
vel graveolens, cum hypostasi alba lævi, æquali, acuta
seu pyramidali fundum matulæ occupante, sine ul-
lis crassamentis, ramentis, bullis, &c. levem subsiden-
tiam intelligo coherentem indivulsam: æqualem
quæ semper similis mingitur, & non hodie cocta est,
cras cruda. Hæc omnia bonam concoctionem ar-
gaunt. Nam consistentia, color, quantitas urinæ,
notæ sunt concoctionis in jecore, & venis majori- *Causa di-*
bus, hypostasis verò tertiæ concoctionis in venis mi- *versitatis*
noribus. Igitur urina quæ ab his notis longius rece- *urina.*
dit, eò deterior existimatur. Recedit autem non nihil
in sanis non optimo ferè corporis habitu præditis,
obres naturales ac etiam non naturales, longius
verò in ægris, mutationis naturalis status à rebus *Vrina sexus*
præternaturalibus, Naturales sunt sexus ætas, tem- *Vrina æ-*
peramentum corporis. Nam mulieribus secundum *tatum.*
naturam urina ad albionem virili colorem tendit,
hypostasinque ampliorem crassiorem, pluraque
contenta obtinent: Iuvenibus urina subflava, aut
subruffa est, mediocris substantiæ; pueris albiore cras- *Vrina tem-*
sior, quam juvenum cum multa crassa subsidentia; *peraturarū.*
senibus urina alba tenuis est cum paucis crudisque
contentis. Præterea natura calidis urinæ ruffæ ac
aureæ sunt, cum mediocribus contentis tinctis, & al-
bedinem naturalem diffugientibus, frigidis contra
magis albæ crassæ cum minoribus contentis, & quæ
facile turbantur.

Naturâ sicci urinas modicè tinctas obtinēt, medio-
cris substantiæ, pauciores, cum paucis contentis benè
coctis, humidi contra urinas magis albas, copiosas,

Oo

sub.

*Urina mu-
tationes à
causis non
naturalibus.*

*De causis
singularum
differen-
tiarum.
Quid de-
signet uri-
na tenuis
aut crassa.*

subtenuēs cum multis crudis contentis. Correspondent urinæ ætatum & temperaturarum urinis temporum, anni, & regionum, & quæ ratio est in temporibus anni, eadem in cæteris rebus non naturalibus. Nam æstas, calida aeris constitutio, ira, vigiliæ, inedia, vita, laboriosa, usus alimentorum calidorum, &c. urinas coloratiores reddunt cum paucis contentis, contra hyems, otium, somnolentia, crapula, victus frigidus, &c. urinas albiore crassiores cum multis crudis contentis. His definitis restat ut causas differentiarum, & quid quælibet urina designet, ordine explicemus.

De substantiæ modo, cum quibus coloribus jungantur, discrepant medici: plerique crassam urinam cum quovis conjungi posse arbitrantur, tennem ad rubrum tantum ascendere, mediocrem substantiam cum mediis coloribus reperiri.

Denotat autem urina mediocris substantiæ roburnativi caloris bonamque concoctionem viscerum venosique generis, quæ hac tenuior aut crassior imperfectam concoctionem. Tenuis causa est vel potus nimia copia, vel obstructio aliqua jecoris, renum, ureterum nihil crassi transcolare permittens, aut debilitas concoctricis ac retentricis vasorum, ab intemperie frigida, aut attractrice renum depravata ab intemperie calida, ut in diabete. Redditur autem tenuis urina in acutis morbis ob concoctricis debilitatem & cruditatem humorum designat; & si diutius perseverarit viresque debiles sint, mortem, invalidæ, abscessus in inferioribus partibus: In crisi bus semper recidivam. Crassa verò urina fit aut à laxitate viarum aut oppressione caloris nativi & copia crudorum humorum, ac peculiariter in februm initis & incremento virium debilitatem multitudinem humorum pugnamque naturæ cum humo.

humore arguit: verum si præcesserit tenuis, concoctionis principium Urina crassa vel clara seu perspicua est, vel turbulenta, sub crassa perspicua continetur oleosa non pinguis, quæ olei tantum colorem & substantiam repræsentat: Nam urinæ pingues dicuntur non ratione substantiæ, sed contentorum. Oleosa non pinguis denotat permixtionem pituitæ viscidæ, si candida sit, magnam cruditatem, si cum bonis signis salutem, alioquin longam periculosum morbum. In valdè acuris quarto die apparens mortem septimo portendit. Urina crassa, clara non oleosa, humoris crassi permixtionem, ut subalba pituitæ vitreæ resolutionem, qualis epilepticis quandoque accidit, citrina redundantiam bilis vetellinæ.

Urina crassa turbulenta, quæ non oritur vitio renum & vesicæ, ut in calculosis, aut ab externo frigore, causam habet permixtionem spiritus flatulentia ac copiam crudorum humorum, quos natura expellere nititur, sive vehementem humorum perturbationem & laborem.

Urina turbulenta triplex est, una quæ pura mingitur & paulò post subsidet, altera quæ turbida mingitur, & turbida manet, similisque est urinæ jumentorum: sub hac continetur urina confusa, quæ toti sibi similis est sine ullis contentis, & ignis calore non dissolvitur, nec clara redditur. quæ pura mingitur, & post conturbatur omnium turbidarum optima est, indicet cruda sit ob status crassi redundantiam, turbida mingitur, & post desidet, denotat humorum fermentationem cessare, & quodam modo attenuari ac separationem & secretionem incipere. At quibus turbida mingitur, & turbida manet, qualis est jumentorum, vigere crasso

2. Cause

urina turbulenta.

Triplex

urinat.

turbulenta est.

Singulari

causa.

V.

rum flatuum & humorum quasi fermentationem ad
in his dolor capitis aut adest aut aderit, ob humo-
rum conturbationem & evaporationem; qui diutius
perseverans lethargum, aut alium gravem capitis af-
fectum minatur. Turbida confusa omnium perni-
tiosissima præcipuè rubra aut citrina in febribus a-
cutis. Nam non modo magnam humorum crudita-
tem & perturbationem, sed etiam malignitatem ar-
guit viriumque summam debilitatem. Urina clara
nisi substantiæ mediocris, fida non semper est, præ-
cipuè tenuis alba, significat enim materiam quæ uri-
nis permiscetur in alium locum ferri, aut obstructio-
ne impediri.

3. *Vrina
copia aut
paucitas
quid de
notat.*

Præterea urina bona est, quæ potus propor-
tioni correspondet, quantitateque paulo minor; ni-
mis copiosa mala nisi diebus criticis, ubi robore na-
turæ causæ morbificæ expelluntur cum tollerantiâ
& conferentiâ, quod interdum in hydrope & cache-
xia accidit. Nam designat aut magnam substan-
tiæ corporis aut succorum in venis colliquationem;
ut in febribus ardentibus & malignis, aut conco-
ctricis & retentricis ventriculi & jecoris debilita-
tem, aut in renibus immodicam seri attractionem ex
intemperie calida, unde diabetes; aut ventris siccita-
tem humoribus ad vias urinæ transfluentibus. Pauca
verò urina redditur penuria potus usque alimēto-
rum siccorum, calidorum, &c. præcipue debilitata
attrahente & expultrice serosi humoris, ob intempe-
riem aut angustiam renum, vasorumque urinalium,
ac etiam jecoris aut ob immodicam evacuationem
per alias vias, ut, per alvum, sudores, &c. aut con-
sumptionem humiditatis à vehemente calore de-
pascente humidum, ut in febribus ardentibus.

4. *Odor u-
rine quid
designat.*

Odorem urinæ observare sordidum quidem
ridetur, non tamen inutile est; Nam urina quas a-
qua

qua odore omni carens magnam refrigerationem & cruditatem arguit, ac in acutis morbis nativi caloris extinctionem. Graveolens prorsusque foetida, nisi foetorem contraxerit ex qualitate assumptorum, aut ab ulcere & impuritatibus renum, vesicæ, pudendi, putredinem aliquam semper designat, & in febribus acutis pernitiola est, nisi die critico.

Variae colorum differentiae in urinis procedunt à varietate concoctionum, calorisque in visceribus totoque corpore, & ab alieni humoris permixtione, interdum sequuntur causas externas, ut usum alimenterum aut medicamentorum, quæ urinas tingunt, ac in ediam, crapulam, vigilias, immodicos labores, omnesque causas calefacientes & refrigerantes; Nam quæ calefaciunt, coloratiores urinas reddunt; quæ refrigerant caloremque nativum debilitant, minus coloratas, &c. Tingitur urina in sanis iusta portione ichoris biliosi & sanguinei humoris, seu tenuis bilis flavæ vel rubræ, vel pallidæ, & subflava, aut subruffa seu pallida & citrina efficitur, subflava generatur, non aliter quàm si in aquam puram parum croci aut bilis flavæ injeceris; subruffa, si parum bilis rubræ, aut multum bilis pallidæ; quæ verò bile flava tingitur, magis splendida evadit. Cæteri colores à mediocritate vel deficiunt, ut subspiceus, subalbus, albus; vel excedunt, ut flavus rubeus, viridis, lividus, niger, & sequuntur intemperiem malamque concoctionem viscerum, aut magnam redundantiam serosi humoris alicujus, nimirum sanguinei, biliosi, pituitosi, vel melancholici, aut humoris ipsius permixtionem. Urina quò ad album colorem magis vergit, eò minus bilis tingentis gigni, vel urinis permisceri designat, ac plus seripituitosi crudique humoris. Nam omnis urina alba aquosa à nimia potus copia oritur, aut magnam facultatis concoctricis imbecillitatem & crudita-

5. Causa diversitatis colorum in urinis.

Color in sanorum urinis.

Urina alba quid indicat.

tem validasq; obstructions arguit; aut tingentis humoris aversionem, quod in febribus ardentibus evenire solet, ubi bilis in cerebrū rapitur seu ascendit, unde phrenitis. Quare in febribus ardentibus urina tenuis, alba clara ut plurimū in mortem prænunciat: nē enim tolerare possunt vires cerebri debilitatæ a febre bilis acrimoniam. In pueris urina aquosæ pessimæ sunt, & in iſtero urina alba diu durans hydropem nominatur. Urina alba crassa, quo albior eo humoris pituitosi magis crassi permixtionem denotat, ut lactea non pinguis crassa, redundantiam crassæ viscidæ pituitæ; glauca aut charopa, pituitæ mucosæ, qualis interdum pueris calculo laborantibus accidit; alba pinguis, pinguedinis colliquationem & phthisin. Cæteri colores quò ab albo lōgius recedunt, eò plus humoris tingentis, permixtum habent coloremque intensiorem, ac proinde urina subspicea meliorem concoctionem indicat, quam subalba, licet debilem ac calorem temperato vicinum: temperatum verò citrinum, subflava, subrubra, ut diximus. Intemperatum seu calorem immodicè auctum, multumque excrementi biliosi, aut alterius humoris tingentis permixtionem, ruffa, flava & aurea, & crocea, subrubra, rubra, &c. Attamen subruffa aut subflava, si tenuis sit, media est inter urinas exactè coctas & crudas. Subrubea, habens hypostasim subrubram levem salutaris quidem est, sed media inter urinas illas semicoctas & crudas. Ruffa flavaque urina accidit sæpe ob vehementes labores, inedia m solis æstū ac ebullitionem sanguinis & humorum, &c. subrubra & rubra ob redundantiam serosi sanguinis & biliosorum humorum, subrubra verò si tenuis morbum crudum & periculosum, si crassa cum simili sedimento longum morbum, sed minimè periculosum ostendit, subrubra in frigidis morbis quandoq; reperitur, aut ex ingenti dolore, ut in colica, aut ob-

Urina subspicea quid.

Ruffa & flava quid significat? Subrubra & rubra.

structione vesiculæ fellis, aut debilitate substantiæ jecoris, ut in hydropē, ac etiam in hepaticis, in quibus interdum urinae similes sunt loturæ carnis recentē mactatæ; aliquando consequuntur putrefactionem frigidorum humorum in venis. In acuto morbo melior semper est urina rubra, quàm aquosa, valde rubra claraque magnum calorem jecoris, febrem ardentem denotat, rubra obscura crassa sanguinis saniosi multitudinem aut bilis rubræ aut vitellinæ redundantiam, & in morbis acutis, si diu perseveraverit, mortem minatur; & non raro renum inflammationem; si turbida fuerit, talisq; permanserit hepatis inflammationem, vel scirrhum, caloris nativi debilitatem. Tutior semper est urina sanguinea, quàm biliosa ex commotione bilis. Urina valdè rubra ad nigredinem tendens, si linteum incinctū eolorem citrinum referat & spumam citrinam habuerit, icterū ex obstructione vesiculæ fellis indicat, quæ securior est quòd urina rubicundior, hydropem verò minatur, si ictero manente parum rubra aut alba sit. Urinae cruentæ nephreticis frequenter accidunt laxatis ruptis aut erosis venis in renibus, ac etiam debilitata retentrice & secretice renum, aut expultrice stimulata copia sanguinis. In febribus bonæ sunt, quæ die critico copiose minguntur cum tolerantia ægri, sunt enim vi expultricis, seu à robore naturæ ad urinas id quod molestum est mittente; malæ sunt subtiles, vel foetidæ, vel paucae, denotant enim magnam retentricis & secreticis renum debilitatem ac sanguinis non elaborati crudi, tenuis aut corrupti copiam, ob imbecillitatem venosi generis; quod in febribus synochis putridis, malignis quandoque accidit. Veneta ac prassea urina sanguinis assatio nem indicat, in febribus ardentibus sanguinis putrescentis redundantiam, ac in bilem rubram adustam transmutationem; post prassicā ceteri colores sunt in

Urina cruenta quid?

Veneta & prassea quid denotat?

V.
Viridis.

*Veneta &
livida. quid*

*Urina ni-
gra duplex.*

transitu ad nigrum, & primum viridis color initium nigri est. Nam si morbus malignus fuerit cum vomitibus, dejectionibus & urinis viridibus, postea modum nigrae superveniunt. Omnis autem urina viridis aut flavæ bilis adustionem, & in viridem conversionem, aut viridis bilis ut prassinæ, eruginosæ glastæ in venis redundantiam notat; ejusmodi urina si diu perseveraverint cum ingenti ardore, vigiliis, & convulsionem ex siccitare, extremumque periculum minantur. Veneta urina humoris melancholici fusionem significat, quæ valdè crassa est, vehementem frigiditatem, ad nigrum colorem vergens nativi caloris extinctionem; idem quoque livida urina indicat, quæ magnæ frigiditatis soboles est, aliquando tamen consequitur plagas & vulnera inflicta. Urina nigra dicitur ratione substantiæ, aut humoris contenti; secundum substantiam propriam, quod urina ad colorem nigrum magis vergit, eò magis pernitiola est: Nam urina secundum substantiam nigra, aut extinctionem caloris nativi, aut vehementem adustionem designat, eamque præcedit urina, aut livida, aut viridis, rubra, &c. livida autem nigram ex frigiditate & extinctione caloris nativi; viridis verò ex vehemente adustione, ac propter adustionem urina nigra semper foetida est; ob frigiditatem odoris fere expers. Pessimæ sunt ejusmodi urinæ, tam in viris, quàm foeminis, Unde *Gal. lib. 1: de Crisibus cap. 12.* neminem se servatum vidisse dicit; qui nigram urinam reddiderit. In febribus acutis pernitiolissimæ sunt, præcipuè si graveolentes fuerint & crassam nigram subsidentiam habuerint. Urina verò nigra non secundum substantiam propriam, sed humoris melancholici permixti, quam nec livida nec viridis præcessit, mala non semper est; interdum salutaris præcipuè, quæ die critico accidit; aut in declinatione febrium quartanarum,

ac

Sex solutione delirii melancholici cum tollerantia & conferentia ægri: talem urinam illi ut plurimum mingunt, qui splenem debilem habent, accidit etiam calculosis. Deinde teste Avicenna gravidæ ob detentum sanguinem menstruum urinas impuras nigras reddunt, ad similitudinem vini nigri corrupti. A multa bilis permixtione in ictericis sæpè urina nigra primo intuitu apparet, sed ea ad colorem croceum inclinat & lintea intincta colore citrino tingit. Urina nigra in initio febrium semper mala est, ac in calidis renum & vesicæ affectibus, ac quæ evenit ex corruptione humorum, ac cum pravis symptomatibus.

Tandem urina vel contenta habet vel omnibus privata est. Contenta considerantur aut in corpore urinæ aut superficiæ. In matula corporis urinæ altitudo dividitur in infimam, mediam, & supremam regionem. In infima regione seu fundo matulæ consistit *ὑπόστασις*, Latinis subsidencia & sedimentum; in media quod à Græcis *ἐναίωγημα*, Latinis sublatio aut suspensum; in suprema *νεφέλη*, Latinis nubes & nubecula.

De hypostasis natura & causis dissentiunt medici, aliqui reliquias alimenti esse: seu chyli in jecore, quas nequit in sanguinē permutare: Actuarius alique non pauci reliquias excrementi tertiæ concoctionis, quæ in extremis venis perficitur: Fernelius crassiorem urinæ portionem vi caloris secretam. Valesius generari ut pus; medio motu inter concoctionem & putrefactionem; quæ quidem ratio in sanis locum habere non videtur. Probabilius enim est sanorum hypostasin, reliquias esse tertiæ concoctionis in venis; ægrotantium verò ac interdum neutrorum contenta non naturalia portionem materiæ morbificæ esse, cæterà plerumque constare ex reliquiis illis ter-

O o 5 tia

6. De urina
contentis.
Differentia
lecorum.
Regiones
urinatres.

Causa hy-
postasis.

V.

*Consideran-
da in con-
tentis.*

*Sanorum
hypostasis.*

In urinis

agrorum

optima con-

tenta qua?

*Causa ne-
bula aut su-
spensi in
urinis.*

*Urina con-
tentis pri-
mata quid
designat.*

tia concoctionis unitis cum parte materiae morbi-
ficæ, ex quibus oritur subsidentia humoralis, &c. Cō-
siderantur in contentis substantia, quantitas, color,
lenitas & æqualitas & situs. In sanorum urina hypo-
stasis continetur. Optima autem sanorum hyposta-
sis, est mediæ substantiæ & quantitatis, alba levis æ-
qualis diu durans, &c. ut supra diximus.

In ægrorum urinis contenta optima sunt, quæ
sanorum simi l m; pessima quæ dissimillima. Quare
in ægris bonam concoctionem denotat substantia,
alba levis, æqualis; debiliorem paulo enæorema seu
suspensum album, leve, æquale; adhuc debiliorem
maiorēque cruditate urina, quæ nubeculam tā-
tū obtinet: quò vero nebula altiùs pender, eò lon-
gius abest ab exquisita concoctione, nisi interdum in
exercitatis & biliosis febribus, ac naturis calidis. Ele-
vant enim subsidentiam, ipsamque dividentes vniri
non permittunt in profundo, crassi crudi flatus; igitur
quò flatus crudi ex profundo subsidentiam bonā
magis elevant, eò urinas magis crudas putabis. Ve-
rū in bonis urinis primū supernè nubes apparet,
deinde i variis generibus; tandem ubi humores perfectè co-
cti sunt laudabilis hypostasis; contra ubi humores
valdè crudi sunt, statim in initio multa materiae mali
coloris copia in fundo subsidet: Deinde paulatim
incipiente concoctione & attenuatione humorum
enæorema conspicitur, cum amplius concocti &
attenuati sunt, nebula oritur, quæ sensim in bo-
nam hypostasin plerumque terminatur. Urina
quæ nec subsidentiam, suspensum, aut nebulam
habet, designat ut plurimū naturam non aggres-
sam concoctionem; si aliquando habuerit, ali-
quandò non, pugnam naturæ & morbi. Privatur
urina contentis, primū ob magnum humorum
crudi-

cruditatem, aut corruptionem, ac viscerum debilitatem, inflammationem, valida s̄que obstructions, deinde ob materiae defectum ex immodicis evacuationibus, &c. adduntur ingentes dolores, vigiliae, exercitia, &c. In morborum acutorum initiis & augmento virium debilitatem indicant. In sanis urina contentis priuata diu perseverans obstructions & cruditatem significat & futurum morbum praenunciat; si conjuncta sint cum urina alba, tenui, extremam cruditatem valida s̄que obstructions; minores cum urina spicea aut citrina; cum rubra aut passea magnam humorum putredinem in vasis arguunt. *Pauca contenta ob causas minores oriuntur, nimirum tardam concoctionem, obstructions nimis validas, in ediam defectumque alimenti & exercitationes immodicas. Multa contenta à contrariis causis sunt, nimirum à copioso alimento, & robore virtutis alteratricis, &c. Proinde in febrium initiis & augmentis humorum copiam designant, quae ad concoctionem robore virium & tempore indigent; in vigore & declinatione cum cæteris bonis signis salutem portendunt: Contenta levia, continua sibi undique similia bonam concoctionem, contra aspera diuisa, debilem incitant: tenuia concoctionis tertiae debilitatem & humoris crudi attenuationem, ac in morbis concoctionis initium: crassa verò crassorum humorum soboles sunt, in initiis & incrementis febrium mala, magnam enim humoris crudioris copiam arguunt; post statum aut declinationem diuturniorum morborum: cum bono urinae colore & consistentia salutem promittunt. Accidit interdum humorem crudum album cum urina excrementum subsidere, bonaque hypostasis speciem referre; similiter pus excretum ex renibus aut supernis partibus.*

Pauca contenta.

Multa.

Contenta levia.

Aspera.

Tenuia.

Crassa.

*Distingue-
re bonum*

sedimentum

ab albo cru-

do humore

& pure.

Verum.

V.

*Contenta
colorata
quid deno-
tant?*

Verum crudus humor sibiipſi non cohæret nec o-
mninò levis, & æqualis eſt, ſed viſcidus mucoſus:
puſ verò ab albo crudo humore & bona hypoftaſi di-
ſtinguitur, quòd urina graveolens ſit, & præceſſit ab-
ſceſſus in renibus aut in aliqua ſuperna parte, &c.
Poſt album cæteri ſubſidentiaæ colores à bonitate
nonnihil recedunt, ut ſpiceus, &c. ſubſidentia ſub fla-
va & flava redundantiam bilis flavæ designant: ſub-
rubra rubraque ſanguinis non exquisitè cocti abun-
dantiam, rubræque bilis exceſſum; attamen ſubſiden-
tia ſubrubra levis in urina ſubrubrâ mala non eſt, ſed
ſecuritatem promittit. Sedimentum cruentum ſan-
guinis non elaborati multitudinem & virtutis ſecre-
tricis ſeri debilitatem arguit: Venetum, lividum, aut
nigrum, caloris nativi extinctionem aut vehemen-
tem aduſtionem aut atrii humoris permixtionem.

Contenta bona, quo magis ſubſident, meli-
ora ſunt, ut diximus; mala contra; quare hypoftaſis
livida aut nigra omnium pernicioſiſſima, minùs per-
nitioſum enæorema nigrum; adhuc minus nubecu-
la nigra.

*De contētis
ſpecificis.
De pingui
urina, Oleo
ſa & non
oleoſa.*

Sequuntur ſpecifica nonnulla contenta, ac
primùm pinguis urina, alia oleoſa eſt, quæ præter
ſubſtantiam & colorem oleo ſimilem pinguedinem
habet, alia cui citra olei colorem innatat pinguedo.
Proſciſcitur iſta pinguedo à magno calore adipem
colliquante, vel in renibus, vel ſupernis partibus
totoque corpore. Si continuatione confertim in u-
rina pinguedo appareat, & calor plurimus circa re-
nes percipiatur, ſignum eſt ex renum colliquatio-
ne oriri, ſi paulatim excernatur, & febris calorq;
plurimus per totum corpus diffuſus ſit, ex pingue-
dinis totius corporis colliquatione fieri, cujus por-
tio ad renes ſenſim deducitur, & cum urinis miſce-
tur. Calor autem ſi intendatur, non ſolum adipem
colliquat, ſed etiam carnem viſcerum invadit, ac

tan-

tandem partes spermaticas; dum incipit, adeps eliquatur, & oleosa pinguedo excernitur, interdum innarat quid arenarum telis simile; procedente adipis colliquatione læpè tota urina quasi oleosa redditur: consumpta pinguedine, caro deinceps liquescit & eruinæ subsidentia fiunt, farina hordeaceæ simili-^{Lamineæ} les; si a renibus magis rubræ, tandem consumpta^{furfuraceæ.} bona carnis parte calor substantiam partium solidarum invadit, & primum superficiès deraditur, & subsidentia lamineæ seu squammeæ fiunt, hinc furfura^{Pultaceæ.} cæ, tandemque, postquam substantiæ profunditatem majorem & longiorem invaserit, his crassiores pultaceæ, accidunt quoque squammeæ & furfuraceæ ex vesicæ affectu. Pultaceæ & furfuraceæ^{Carunculae.} albæ procedunt ex spermaticarum partium consumptione; rubræ plerumque ex crassi sanguinis adustione; interdum ex vehementi ardore jecoris aut renum in febribus ardentibus. Carunculæ cum^{Contenta mucosa.} urinis excernuntur in magno ulcere renum, ut furfuraceæ & squammeæ ob exulcerationē vesicæ. Contenta mucosa laminis & foliis plerumque similia^{pili.} crassorum viscosorum humorum copiam ex crassis^{Contenta saniosa.} viscidis cibis designat non raro arthritidem; pilis^{Arenosa.} similia, crassos quoque succos renumque caliditatem: saniosa, ulcus in viis urinariis. Arenæ subsidentes calculum; non subsidentes & interdum matulæ lateribus adhærentes hepatis calorem, sanguinisque crassi adustionem.

Tandem in urinis consideranda est superficiès, ejusque corona, seu linea umbra depicta, quæ^{Coronæ.} ambitum superficièi urinæ claudit, hæc in urinis tantum apparet, si vires ægri humores vicerint, aut ab iis victæ fuerint. Nam ubi humores vitiosi viribus pares sunt, corona in urina non conspicitur, si vincat natura, corona ad laudabilem seu album colorem vergit, sin vincat morbus ad parvum inclinat.

CAP.
V.*Bulle.*

nat. Quare urina rubra cum corona alba, bona extimatur, cum viridi aut livida, mala. Bullæ quæ in superficie urinæ manet post refrigerationem & quietem, fiunt à spirituosissimis vaporibus sursum ascendentibus, minores autem densiores, & quæ non facile dissolvuntur, & coloris urinæ sunt, à materia crassiore glutinosiore, crudiore; majores verò quæ facile discutuntur, à materia magis tenui, quare bullæ ambitum urinæ seu coronam occupantes, si parvæ densæ fuerint, & colore substantiæ urinæ imbutæ, magnum capitis dolorem denunciant, quod minus albæ eò dolores intensiores: quod albis similiores & à corona versus mediam superficiem concedunt, remissiores unde bullæ si; cum febre in urinæ corona apparuerint, vehementes capitis dolores denotant, verum graviores cum urina tenui, remissiores cum crassa, si pridem vitæ non sint, naturam concoctione indigere. Bullæ per superficiem urinæ palantes, caloris nativi debilitatem flatulentiorumque spirituum copiam, aliquando catarrhum ad petus denotant, accidunt quandoque in urinis bullæ densiores ob seminis fluxum, ac frigiditatem & angustiam renum. De cæteris judiciis urinarum vide Actuarii libros de urinis *Avic. Fen. lib. 1. Gal. cap. 12. lib. 1. de crisi*, &c. Ex his signis non perspecta ægri dispositione, aliisque accidentibus de morbo, morbi que eventu temerè pronunciandum non est.

Nam in morbis minimè lethaliibus urinæ interdum sanorum valdè dissimiles sunt, pessimæque notæ præcipuè instante crisi, aut subito vi naturæ refferatis obstructionibus, & expulsa parte vitiosæ materiæ cum urinis, contra in morbis lethaliibus & extremæ perniciosis ut febribus pestilentialibus & hecticis, non rarò urinæ sanorum similes videntur, quia malum substantiam cordis occupavit, & ideo tota materia morbifica eo loci conversa est, nihilque urinis permiscetur.

DE

De præsagiis in agris, deque signis prognosticis.

Invento affectu, parteque affecta & causis, mox ad Præsentia sive Prognostica accedere debemus: quæ Medicinæ parte nulla præstantior nullaque difficilius & admirabilior. Nam futura prædicendo in agris, triplicem usum comparamus: primò, ut ægri maiorem fidem nobis adhibeant, facilius se concedant & iussis constantissimè pareant, quod eorum affectiones perspectas nobis esse videant. Deinde perfectius curamus; sive enim dietam instituamus, sive medicamenta præscribamus, quam minimum delinquemus, si nec præsentia nec futura nos lateant: Terriò, ut fieri nequeat ut omnes ægri ad sanitatem perduantur, prædictio morituri Medicum à calumniâ & mortis culpâ immunem præstat. Hoc præfagiendi munus omnium veterum iudicio difficilimum est, sed non impossibile. Nam peritus & industrius Medicus non fallitur in prædictionibus, nisi malignitas aliqua subit, aut humores vitiosi in corpore turgeant, quod in morbis acutis interdum accidit, in quibus, auctore Hipp. 2. Aphor. 19 incertæ sunt prædictiones: Deinde cum aliquid peccatum est vel à Medico in curatione; vel ab ægro, qui non obsequitur; vel ministris & astantibus, qui iussa non exequuntur, vel ab externo casu: Nam error interdum motum naturæ impedit, & bona prævisa avertit. Nec enim satis est, auctore Hipp. 1. Aph. 1. Medicum suum officium fecisse, nisi suum quoque ægrotus, suum astantes faciant, & externa sint ritè comparata.

Prognosticorum dignitas & usus.

Quare

V.

Quare Medicus certi nihil prædicere potest, nisi addita cautione, ut nihil delinquatur.

*Præfagitio
quid.*

Præfagitio, aliàs præcognitio & prænotio Hippocrati i. Prognost. providentia, nihil aliud Medicis est, quàm scientia rerum futurarum in humano corpore, ea quæ manifesta sunt. Ex præfagitione prædictio oritur: Nam præfagitio sive prænotio in mente proprie est: Prædictio verò eorum quæ præcognita sunt per vocem efficitur: Manifesta autem illa signa prognostica vocantur, ex quibus prænotio. Res futuræ quæ præcognoscuntur, sunt status futurus corporis; In ægris peculiariter exitus & eventus morbi. Modus præcognoscendi est per demonstrationem, ut ex superioribus disputatione constat, si prædictio certis nitatur & non planè conjecturalibus.

*Tria præ-
cognoscen-
da in ægri.*

Nos hoc loco, de præfagiis tantum in ægris, dicemus. In ægris tria potissimum sunt præcognoscenda: 1. quo erumpet morbus, an ad salutem vel ad mortem, &c. 2. quo tempore potissimum: 3. quidnam erit modus salutis vel mortis. Signa ex quibus hæc præcognoscimus, triplicia potissimum sunt: primò, salutis & mortis: secundò, concoctionis & cruditatis: tertio signa decretoria & modi eventus.

*Signa pro-
gnostica
unde su-
menda.*

Sumuntur autem signa prognostica non ab effectis, cum effecta futurorum nondum sint: sed à causis proximis, scilicet à morbo & à natura seu viribus laborantis, quæ duo inter se pugnant; ex quorum vehementia & viribus, utrius sit futura victoria, deinde quando sit futura, & quomodo, prævidet Medicus. Quare duo erunt fontes signorum prognost. dupliciaque signa, quorum alia sumuntur ab ipso morbo, alia à natura laborantis & ab iis, quæ circa laborantis corpus apparent.

Ac primum in morbo quinque considerari poterunt. 1. Idea sive species morbi: 2. Magnitudo: 3. Quinque Mos: 4. Motus: 5. Eventus sive exitus. Hæc omnia considerantur in morbo, qua certis signis manifestantur. Nam morbi species dignoscitur, ut supra dictum est, ex propriis symptomatibus. Magnitudo morbi duplex est: una simpliciter considerata in sua specie, altera virium comparatione: magnitudo simpliciter considerata ex vehementia & parvitate priorum symptomatum dignoscitur; magnitudo ad vires comparata ex comparatione virium agri & morbi dijudicatur, ut ex omnibus sequentibus patebit. Nam ex hac comparatione certa prædicendi ratio desumitur.

Mos morbi, est benignitas vel malignitas, benignitas securitatem, malignitas periculi instantis magnitudinem denunciat: generaliter autem omnis morbus magnus in parte principali, malignus dici solet: proprie tamen malignus est, qui furtim vitæ insidiatur & graviora, quam pro magnitudine morbi, symptomata habet. An talis sit ex supervenientibus accidentibus aestimatur. Accidentia supervenientia triplicia sunt, quorum primum genus simplex est, & semper idem significat scilicet bonum vel malum, ac proprie morbi morem ostendit: Cætera duo genera idem non semper significant, & critica dicuntur. Nam decretiora signa alia tantum signa sunt futuræ crisis, alia signa simul & causæ ut suo loco dicemus.

Motiones causæ morbificæ tempora morbi à Gal. dicuntur, quæ quatuor sunt: principium, augmentum, status, declinatio, ut alibi dictum est: in quæ tota duratio morbi dividitur. Extremus terminus & meta, ad quam sua natura tendit morbus, est summus vigor, ubi vehementissima est lucta naturæ & morbi, cujus præcognitio Medico planè necessaria est, tam ad curationem & accommodatam

Pp

victus

victus rationem instituendam, quam ad salutis & mortis, temporis & modi eventus præfagitionem. Tendit autem morbus ad hunc terminum celeriter vel tardè; motu æquali vel inæquali, constanti & ordinato, vel inconstanti & inordinato, uno continenti motu, vel certis periodis distincto. Celeriter aut tardè ad summum vigorem morbus properare iudicatur quatuor modis, ut vult Hippocrates *Aphor. sect. I.* primo ex ipsa constitutione: deinde, in morbis qui periodos habent, observatione proportionis accessionum inter se, tertio ex anni tempore & ex signis post apparentibus in excrementis his addi poterunt laborantis natura, ætas, sexus, vitæ ratio, cōsuetudo, iuventia & leventia ac similia. Sub constitutionibus contineri debent, morbi species, deinde magnitudo & mos, quæ ex propriis & superveniētibz accidentibus designantur item morbificæ causæ. Ac primum celeritas tarditasque morbi colligitur ex morbi specie, Nam apoplexia & pestis sua natura citò ad statum deveniunt: secundò ex symptomatum tam propriorum quam superveniētiū incremento; Nam symptomata cuncta, prout celeriter vel tarde augentur, brevem vel longum morbum declarant, maxime signa concoctionis & cruditatis, quæ morem quoque morbi demonstrant, & post apparentibus annumerantur, sed sub constitutione non propriè continentur: de quibus infra dicemus. Tertio ex accessionum naturâ & partibus, siue cum febre periodos habeant siue sine febre. Nam ubi posterior accessio priori multo longior & vehementior est, citiusque recurrit, velocissimè ad statum tendit, similiter si accessio quævis sua particularia tempora velocissimè & vehementissimè percurrat. Si vero accessio posterior priori brevior & mitior esse incœperit, & insultus tardetur, morborum jam sum-

mum

num vigorem superasse, & ad declinationem tendere declarat. Verum si morbus periodos non habeat; ex incremento symptomatum motum illius perspicies: Nam si celeriter augeantur, velox illius motus erit, si diu sibi plane similia videantur, tardissimus. Præterea ex causis: Nam morbi à succis calidis tenuibus celeriter moventur, contra à frigidis, crassiss, lentis. Similiter ex anni tempore: morbi enim qui æstate incidunt, magna ex parte breves sunt, & à biliosis humoribus: contra, qui hyeme. Correspondent anni temporibus regio & locus. Insuper ex natura ægri; nam in corpore calido robusto habitus rarioris, morbi citò ad statum deveniunt: contrarium in contrariis naturis evenit. Cum naturâ coniunge ætatem, sexum, victus rationem, &c. nam in juvenibus victu tenui utentibus morbi citò ad æquilibrium deveniunt, contra in senibus &c. Præterea juvantibus & lædentibus: nam si celeriter suum officium fecerint, morbum celeriter moveri ostendendum; quia acuti morbi commodum aut incommodum celeriter accipiunt. Tandem ex signis post apparentibus in excrementis: quod enim citius excrementa erumpunt, ut sputa in pleuritide, aut signa coctionis apparent, eo brevior morbum significant: verum de his signis infradicemus.

An verò per omnia quatuor tempora morbus æqualiter moveatur, vel inæqualiter: scilicet velociter principium transeat, deinde tarde augeatur, &c. item an constanti ordine & lege moveatur, aut inconstanti, veluti sine ordine intermissiones & intentiones subeat; ex incremento & decremento priorum ac supervenientium accidentium intelligitur, ac ex excrementorum mutationibus. Nam anomali morbi plerumque ex mixta materia fiunt.

P p 2

Tem.

VI.

*Signa tem-
porū mor-
bi duplicia.
1. ex incre-
mento sym-
ptomatum.*

*2. ex mo-
tionibus
causarum.*

Tempora morborum dierum numero non definiuntur: Aliquando enim ut in peracutis affectibus, principium sensum fugit, statimque ad *apex* morbus properat. Cognoscuntur autem morbi tempora duobis modis 1. ex symptomatum incremento 2. ex motione causarum morbificarum. Principium autem morbi iudicatur non tempus primi insultus sed totum illud quo leviora sunt symptomata & morbus nondum sevit deinde, augmentum est, ubi augentur symptomata propria & nova superveniunt, ac ubi accessionum celeritas, anticipatio & vehementia: summus status cum vehementissima luctu est morbi & naturæ, vehementissimisque symptomatis, ut supra dictum est: Licet enim morbus salutaris sit, tamen in statu, cum maximus sit naturæ conatus & imperus, quo materiam peccanter vincere & expellere festinat, necesse est ægrum vehementissimè conflictari & gravissima fieri symptomata: Tandem declinatio est quando omnia symptomata se remittunt.

Secundo motiones causarum unde discernuntur morbi tempora, oriuntur vel à natura, vel ab ipsis causis: natura autem actione sua materiam morbificam alterando si fieri queat, in benigniorem naturam convertit, quæ concoctio dicitur: Quod verò magis alterat materiam, nisi alteratione illa continuo absumatur, vehementissima symptomata succedunt, donec ad terminum alterationis pervenerit, siue materia morbifica planè concocta fuerit, ubi declinatio incipit. In talibus autem morbis, principium est, quando causæ adhuc crudæ & parum, aut nihil mutaræ sunt: augmentum, ubi aliqua concoctionis, notæ apparent: summus status, quando concoctio ad ipsum terminum tendit: post concoctionem succedit declinatio. Verum accidit interdum in morbis nonnullis, qui conco-

quuntur, ut ad portionem concoctionis præcedentis materia morbifica absumatur: veluti in pleuritide, ynocho *παρενμασιν*, &c. In talibus ad portionem concoctionis, morbus non augetur, sed una cum materia morbifica immittitur; ac proinde ex symptomatibus illorum tempora tantum iudicantur. Tandem sine naturæ adminiculo in morbis non raro motiones ab ipsis causis eveniunt, ob materiæ fluentis copiam, vel malignitatem: ut in scirrho, cancro, gangrana, &c. Hi ac quoque omnes morbi lethales, declinationem propriè non habent: tempora verò sua sortiuntur ex magnitudine & parvitate causarum, ac intelliguntur ex magnitudine symptomatum tantum, ut supra dictum est. Eadem penè ratio est in morbis immaterialibus. Quintum & ultimum in morbis est eventus sive exitus, in cujus consideratione tota præsagiorum doctrina propriè consistit: sub eventu comprehendimus tria supra proposita, scilicet qualitatem eventus, an ad vitam vel mortem: deinde tempus; tertio modum, an paulatim vel subito, &c. ut suo loco apparebit,

*Tempora
morborum
lethalium.*

His demonstratis consequens nunc est, ut de signis agamus, quæ laborantis statum aperiunt, & circa ægri corpus considerantur; quorum plurima ad morbi morem, magnitudinem & motus qualitatem dignoscendam non parum faciunt. Talia signa triplicia videntur: nam alia ad functiones referuntur, alia ad excrementa, nonnulla ad ipsum ægri corpus pertinent.

*Signa sum-
pta à statu
laborantis
triplicia.*

Facultate quibus totum animal gubernantur tres primæ sunt, ut alibi demonstratum est: uniuscujusque robur & debilitas propriis functionibus semper manifestatur: Nam vis vitalis ex pulsu, naturalis ex concoctione & cruditate animalis ex functionibus sensus & motus, propriè æstimantur. De

*Signa robo-
ris & im-
becillitatis
triplicium facultatum.*

singulis paucis dicemus, & quantum instituti ratio exigit. De pulsibus peculiari capite suprâ dictum est. Indicant pulsus primùm vitalis facultatis, deinde omnium vitium totius corporis robur & debilitatem. Imbecillitatem quoq; facultatis vitalis denunciant animi deliquia, quæ si graviora sint, ut quæ syncopas vocamus, summam malignitatem arguunt & grave periculum minantur.

*Signa im-
becillitatis
facultatis
animalis.*

Secundo facultatis animalis robur & imbecillitas ex singulis sensus motusque functionibusprehenditur. Nam sensus hebetes subito facti, præcipuè visus & auditus, item torpor extremarum partium, imbecillitatem & perniciosum affectum declarant: idem quoque delirare statim initio, oblivisci, festucas legere, floccos evellere, dolorem non sentire, cibos adversari, in calidis affectibus non sitire, non dormire, aut quasi soporatum iacere, turbari pravis insomniis, &c.

Deinde observare oportet virtutem motricem in partibus, an facile & prompte partes moveantur, an non. Nam magnam debilitatem denotat ægrum in pedes delabi; artus tremere & quasi convelli, ut pollex quasi ad mediam palmam concidat; urinam aut faeces suppressi, vel præter voluntatem erumpere; stridorem dentibus edere præter consuetudinem; os contortum fieri & labia perverti; respirationem eodifficultatis devenisse, ut omnium musculorum genera ad eam perficiendam concurrant; spiritum densum vel magnum; frigidam expirationem per os & nares exire, &c.

*Signa vi-
rium, à cor-
pore labo-
rantis.*

De signis concoctionis infra dicemus, quæ cum signis sumptis ab excrementis concurrunt. Signa quæ à corpore laborantis sumuntur, varia sunt: nam alia sumuntur ex vultu; nonnulla ex oculis; quædam ex decubitu ægri; alia ex hypochondriis aut aliis partibus: qualia sunt quæ ab Hipp. 1. Pro-
gnost.

nost & de Coacis prænotionibus enumerantur. O-
 timum autem est in ægris, vulrum, oculos, decubi-
 tum, &c. sanorum similia esse, pessima dissimilima:
 quare præter consuetudinem & sine evidenti causa in
 vultu pessima signa sunt: oculi concavi, natus acutus,
 collapsa tempora, aures frigida contractæ, earum-
 que extremitates aversæ; cutis frontis dura, circum-
 scripta, arida; color totius faciei pallidus, niger, livi-
 dus, aut plumbeus, præter naturam.

Deinde in oculorum consideratione prava si- *Ab oculis.*
 gna habentur, si lucem fugiant, involuntariè lachry-
 ment, distorqueantur, alter altero minor sit, albæ
 partes rubentes, venula nigra & livida evadant, for-
 des circa oculos appareant, instabiles, eminentes, ve-
 hementerque cavi, squallidi, aut obscuri fiant: lethali-
 tas admodum, album oculorum præter consuetudi-
 nem apparere commissis palpebris; ipsas palpebras
 contractas, pallidas, aut lividas esse; nasum aut labia
 desoluta, pendentia, albescentia, frigida.

Tertiò ex decubitu ægri: signa mala sunt supi- *à decubitus*
 num jacere; manus, collum, aut crura extenta ha- *forma.*
 bere, aut inæqualiter disiecta; item in ventrem præ-
 ter consuetudinem decumbere: lethalia; hianti ore
 dormire; crura supini jacentes incurvata & compli-
 cata esse: velle sedere in morbi vigore, maximè in
 peripneumonicis. Præterea in hypochondriis *Ab hypo-*
 malum est si durities dolor aut inflammatio sit: pe- *chondriis,*
 jus si inflammatio per tota præcordia extensa &c.

fit, aut dextra parte magis affligat: insuper ubi ul-
 cera aliqua adsunt, pessimum est, si malè colorata, si
 livida aut nigra sint, aut ulcera ante humida exsic-
 centur: item in quibus pustulae, tubercula, & similia
 apparuerant, si repenti delirescant. His omnibus
 perniciosus signis adde molem corporis nimium
 contabuisse, initio morbi, citra evacuationem vehe-

VI.

mentem, vigilias, aut similem manifestam causam; interiora corporis exuri, & simul extrema frigida esse; gingivas cruore nigro manantes & nigras;ordes siccas circa dentes esse; linguam planè adustam, fxtorem anhelitus cum magno incendio habere, & similia.

*Signa con-**coctionis &**cruditatis.*

Ex his signis virium imbecilitas dignoscitur: verum, ut intelligatur, an natura an morbus dominetur, signa concoctionis & cruditatis observanda erunt: ex quibus quoque robor virtutis naturalis aestimatur. Cognoscitur autem concoctio ex excrementis, quæ quanto sanorum excrementis magis similia sunt, eò meliora judicantur, & meliorem concoctionem arguunt.

*Consideran-**da in ex-**crementis**quinque.*

Considerantur autem in excrementis quinque. 1. Notæ cruditatis, concoctionis & pravitatis sive corruptionis: Signa concoctionis semper bonam & stabilem significationem habent: pravitatis semper malam: cruditatis neutram, propriè in initio morbi. 2. An excretio intempestivè contingat: nam tempestiva in excretio post concoctionem semper bona; intempestiva, quæ ante concoctionem & vi morbi, sive symptomaticè, mala. 3. An citò appareant excrementa an tardè: nam quando citò apparent velociter moveri morbum denotant; quando serò; tardius. 4. An constanter unoque modo appareant, an inconstanter: nam quæ crebro mutantur, instabilem significationem habent, quæ constanter permanent, stabilem. 5. Tandem an excretio utilis sit & morbo congrua: Nam non una excretionem omnes morbi solvantur, nec unâ excernendi viâ, ut infra apparebit. Omnium excrementorum eadem significatio non est: nam dispositionem universi habitus corporis, sudores arguunt; ventris constitutionem dejectiones: quæ in venis continentur, in hepate, circa renes & vesicam, ex urinis dignoscuntur.

ur: quæ in pectore, ex sputis: quæ in cerebro, ex iis
uæ per os & palatum: quæ in ventriculo, ex iis quæ
omitu rejiciuntur. Eadem in cæteris ratio. Ab his
mnibus singulisque certa signa sumuntur: potissi-
mum ex colore, odore, quantitate, modo substantiæ
excretionis: semperque ea excretio in ægris o-
tima est, quæ sanorum similima; pessima maximè
contraria.

Ac primum sudor in ægris omnium optimus *De sudore.*
est universalis, calidus, continuus, opportunè erum-
pens, scilicet apparentibus signis concoctionis in
ie critico, morbo inclinante, cum virium toleran-
tiæ & robore: pessimus sudor est diaphoreticus &
syncopæ, ubi cum syncope sudor frigidus erum-
pit ex substantiæ solidarum partium dissolutione, ob
caloris nativi exolutionem. Deinde sudor omnis
frigidus aut foetidus potissimum in circa caput & cer-
vicem erumpens: nam sudor frigidus in acutis mor-
bem denotat, in lentis morbis prolixitatem: foetidus
vero sudor magnam putredinem: Præterea sudor
intempestivè erumpens, scil. morbo adhuc crudo
& in initio, malus. Nam vitiosorum humorum co-
miam aut virium imbecillitatem significat. Secundò
de urinis & judiciis urinarum superiori capite dictum
est.

Tertio, feces alvi maximè naturales sunt, mol- *Deiectiones*
les, conjunctæ, sine ulla extranei admistione, colo- *alvi.*
re subruffo, quantitate cibis proportionata, odore
nec nimis foetido nec omnis foetoris experte, quali-
tate non nimis acri, & quæ facile sine dolore, labo-
re & strepitu vehementi exeunt, idque hora solita.
Quæ ab his notis longius recedunt deteriores sem-
per sunt. Nam malæ judicantur & inconcoctæ, te-
nues, & aquosæ; nisi à cibis aut medicamentis, aut
tempore crisis: similiter albæ, quæ ciborum ser-
vant qualitatem: malæ quoque ruffæ, quia ex bilis

confluxione in ventrem: item, pallidæ, spumosæ: pe-
iores purulentæ, ramentosæ, cruentæ, nisi ex hæ-
morrhoidibus, aut ubi lividum quid in fecibus ap-
paret. Perniciosæ sunt virides, & lividæ, nigrae, nisi
cibis, aut in crisi: item viscosæ & pingues; Nam col-
liquationem significant: Præterea cum tetrum odo-
rem spirant, cum pernicioso colore; significant enim
vehementem putrefactionem. Pessima quoque per-
niciosorum colorum in fecibus magna varietas: quia
inducant corpus variis perniciosis aff-ctibus detine-
ri: Vermes die critico si fecibus permisceantur bo-
num: malum si initio morbi appareant: perniciosum
in acutis affectibus si mortui exeunt, aut per se sine
fecibus.

De vomitu.

Quartò, quæ vomitu ejiciuntur constitutio-
nem ventriculi & vicinarum partium indicant: utilis-
simus autem vomitus est, non nimis copiosus, ex bile
& pituitâ permixtus: malus, humoris alicujus sinceræ
pejor, si id quod vomitu rejicitur, sit coloris pravi,
scil. porraci, lividi, aut nigri, nisi vitio ciborum: ma-
gis perniciosum si omnes hos colores habuerit: le-
thale, si colores lividi aut nigri, & simul tetri odoris
fuerint. In principiis verò morborum si bilis nigra
supra vel infra exierit, lethale.

De Sputis.

Quintò, in pectoris & pulmonis vitiis sputa con-
siderare oportet. Optima autem judicantur lævia, æ-
quali consistentia, non nimis tenuia aut crassa, qui-
bus flava albo benè permixta sunt, & talia quæ facile
& cito expuuntur. Mala & cruda sunt tenuia, ubi ni-
hil expuitur, & crassa, lenta, quæ tenaciter adhærent:
mala quoquo sincere flava: item alba, viscosa, rotun-
da, pallida, spumosa: pejora multo, viridia, cerulea,
nigra, permixta vel impermixta: item si nihil puti re-
jiciatur, sed plenius in gutture ferveat.

Sextò, emuncta è naribus & excreta è palato
cerebri dispositionem aperiunt: Bona sunt, colore
albo

Ibo, benè permixtò, & substantia mediocri: ac quæ
 facile citòve excernuntur, sine ulla mordacitate. Ma-
 itaque tenuia, acria, viscosa: pessima, vitioso colore
 infecta maleque olentia nisi ex ulcere narium: lethar-
 guttam sanguinis nigri è naribus stillare, in acutis
 ie quarto. Pari ratione ceteræ partes affectæ sua ex-
 crementa emittunt, quæ concoctionem, cruditatem,
 ut perniciem significant. In omnibus id commune
 est, partis affectum non sanari, priusquam in super-
 fluitatibus, quas emittit, signa concoctionis appare-
 nt: Deinde superfluitates siue bonæ siue malæ, quò
 citius apparent, cò velocius morbum moveri: quò
 serius, cò tardius: Quare ubi signa concoctionis citò
 apparent, salutarem & celerem affectus solutionem,
 quo serius cò tardiore: At excrementa plane cruda
 & corrupta, crisis defectum, laborem, recidivas, vel
 mortem significant.

*De iis qua
 per nares &
 palatum
 excernun-
 tur.*

CAP. VII.

*Ex signis prognosticis qua ratione in agris
 predicere queamus salutem
 aut mortem.*

HÆc est vis signorum omnium, unde vires acri *Qua obser-*
 & morbi æstimentur: ex quarum cognitione *vanda sunt*
 omnis morbi eventus præcognoscitur: Nam *incompara-*
 quæ futurum eventum propriè denunciant, ea pro- *tione viriū*
 prie ab his duabus causis sumuntur: deinde differen- *agri & mor-*
 tia, tempus & modus eventus ab iisdem signis de- *bi.*
 monstrantur à quibus eventus.

Verùm cum morbo morbi causas & sympto-
 mata conjungere debemus, & cum natura omnia
 auxilia naturalia & artificialia; postea perpendere,

utrum

utrarum vires sint majores. Sub causis morbificis omnia lædentiā comprehendimus : sub auxiliis verò omnia juvantia, scilicet medicamenta & similia. Quare sex res non naturales; aer, cibus, potus, &c. item sexus, ætas, consuetudo, &c. quatenus pro viribus contra morbum pugnant, auxiliis annumerantur : quatenus morbum fovent, causis morbificis.

*Officium
medici.*

Medici autem officium erit, vires partium primū conferre, & æstimare, ac observare an ipsa natura per se valeat morbum superare : si non auxiliariis copiis & Medicinā ei subvenire queat, ut impetus & vehementia morbi reprimatur ; an non queat : si queat, Medici erit ut in cunctis occasiones intentus sit : scilicet diligenter observet, ubi & quando natura certis propositis signis Medicum in auxilium vocet : Deindè quomodo subveniendum sit : nam Medicus minister naturæ, vires motumque naturæ attentè observare, & sine signis, aut ductu naturæ contra morbum pugnare non debet. Proindè militaris prudentia & disciplina hic elucet; Quemadmodum enim in bello, duce prostrato cæsisque omnibus aliis copiis, frustra nudis auxiliis pro salute ducis certatur, ita in morbis, prostratis viribus ægri violentiā morbi, frustra medicina paratur. Deindè, ut militum non est pro lubitu quocunque loco & tempore hostem aggredi, sed Imperatoris ductu & arbitrio, arrepta oportuna occasione datoque signo : ita nec Medici sine ullo naturæ ductu quicquam contra morbum moliri, sed occasiones semper expectare : scilicet, quando natura propositis signis Medicum in auxilium vocet. Quomodo autem & quando subvenire debeat, in Therapeuticis dicemus.

*Delectus si-
gnorum.* Verū in consideratione signorum, ubi temerè & præter rationem bona apparent, non fidendum, neque ubi mala desperandum. Deindè in di-

versis

eritate signorum videndum diligenter, quantum
 alia aliis antecedant aut præstent: Antecedere autem
 dicuntur alia aliis tripliciter. 1. numer. 2. magnitudi-
 ne 3. dignitate: Numerus autem signorum, quæ ro-
 bur aut imbecillitatem naturæ declarant, licet certus
 non sit, tamen aliquo modo colligitur ex supra di-
 ctis. Verum in prognosticis numeri non ma-
 gna est ratio: Nam plura debilia paucis fortioribus
 non semper sunt potiora: quare uniuscujusque
 signi facultates exquisitè considerare oportet ex sui
 magnitudine & præstantia. Magnitudo signicujus-
 que percipitur, ubi comparatur cum aliis ejus-
 dem generis; semperque robur naturæ arguunt, quæ
 simillima sunt iis, quæ naturaliter apparere solent:
 imbecillitatem verò, quæ dissimilia. Dignitas
 omnium signorum, tam malorum, quam bono-
 rum ad vitam refertur: semperque dignissima & præ-
 cipua dicuntur, quæ robur aut debilitatem virtutis
 vitalis declarant: deinde, in signis bonis, quæ natu-
 ralem virtutem satis validam, signis malis, quæ a-
 nimalem facultatem vehementer debilitatam signi-
 ficiant: Nam ubi vires animales suo munere fungi, &
 musculos thoracis mouere nequeunt, respiratio im-
 peditur & vita tollitur: quod adeò cito non euenit,
 ubi naturalis facultas vehementer debilitata, est: ni-
 hilominus in omnibus morbis, qui vitio humorum
 fiunt; concoctio, siue robur naturalis virtutis, præ-
 cipuum maximeque salutare signum est.

*Comparatio signorum
ratione.*

His præmissis consequens est, ut ex compara-
 tione virium, morbi, & naturæ, tria illa supra pro-
 posita ordine prænoscamus, initio facto ab exitu
 siue euentu morbi, an ad salutem vel ad mortem.
 Præcognoscimus autem exitum morbi potissimum
 ex morbi specie, magnitudine, motu, & more, fa-
 cta comparatione cum viribus agri, de quorum si-
 gnis supra dictum est. Nam primò si speciem
 morbi

*Quomodo
salutē aut
mortem
prædicere
licet*

morbi spectes, inuenies nonnullos sua natura lethales & desperatos esse: ut consummata tabes, venter cordis, præcipuorum viscerum: aliquos magna ex parte lethales & periculosissimos, ut apoplexia, pestis: quosdam periculosos tantum ut febris ardens: aliquos saluare esse, qui omni periculo carent, ut tertiana pura intermittens. Sin morem & magnitudinem morbi consideres, reperiens morbos quosdam, qui sua natura periculum non afferunt, aut lethales magna ex parte non sunt; ob malignitatem & magnitudinem, magnum periculum & aliquando mortem inducere: deinde quosdam morbos sua natura periculosos, quia parvi sunt & malignitate carent, sine periculo esse. Præterea periculum auget vel minuit morbi longitudo præcipue in acutis, quare cum viribus morbi coniungenda est longitudo morbi siue tempus status. Nihil autem Medicos magis turbat, quam morbi malignitas. Nam maligni morbi placide & benigni videntur, adeo interdum, ut, apparentibus signis quibusdam concoctionis, aut salutis, præter expectationem ægrum subito interficiant: Verum hos detegit aliqua principum partium læsio, quæ ex paruo pulsu, vitiosa respiratione, animi deliquiis, turbulentis insomniis, & similibus dignoscitur. Ante omnia autem cavendum est, ne symptomata critica nos imprudentes terreant, aut cum signis malignis confundantur. Deinde ne complexum morbum pro simplici habeamus: nam simplex morbus propriis signis statim in initio cognoscitur, complexus non item, propter signorum varietatem. Proinde propria cuiusque affectus signa discernenda erunt & inter se conferenda, nunquam autem confundenda. Nam interdum unius morbi ratione signa quædam concoctionis aut salutis apparere solent, cum tamē alterius morbi violentia æger ex insperato moriatur.

Cum

Cum his signis conferenda sunt illa, quæ ab ægro & viribus ægri sumuntur: de quibus supra. Jam pugnat morbus cum viribus ægri, & periculi magnitudo semper augetur vel immittitur pro virium debilitate & robore: Nam morbi qui magna ex parte lethales dicuntur, ex virium robore periculi tantum evadunt: le contra qui tantum periculi sunt, ex virium debilitate lethales. Vires hic intelligo omnes tres, quibus animal gubernatur, quarum distinctissimæ sunt virales, ut supra dictum est. Comparantur quoque signa cruditatis cum viribus, tantoque morbus periculosior æstimatur quanto cruditas major est in comparatione ad vires: planeque lethalis, si ipse morbus una acutus fuerit. nam causæ morbificæ ob cruditatem cito vinci nequeunt, & vires, licet robustæ, vehementiam morbi illius acuti non diu sustinent: morbus enim qui ab humore oritur, ante concoctionem legitimè nunquam soluitur.

Adjungenda est viribus morbi status præcognitio, & hæc duo potissimum cum ægri viribus conferenda: unde non difficile erit prævidere exitum morbi. Quemadmodum enim cognoscerequit, an oneri portando aliquis sufficiat: nisi vires portantis, oneris magnitudo, & itineris longitudo fuerit prius perspecta, ita in ægris eventus morbi prædicari nequit, nisi vires ægri, vis morbi, & tempus status sive longitudo morbi præcognoscatur: Correspondent enim vires ægri, viribus portantis, morbus, oneri, tempus status, itineris longitudini. Quare liberabitur æger si vires tam validæ fuerint, ut ad extremum usque statum, morbum sustinere & superare queant: morietur si vires debiles, morbus magnus & malignus sit, sine ullis aut minus manifestis signis concoctionis.

Ex his non difficile erit prævidere exitum morbi,

VII.
In quibus
incerta
prædictio.

bi, scilicet an ad salutem vel mortem tendat. Aliquando tamen dubia & incerta spes est: Nam ubi bona malis æqualia sunt, incertum est utrius sit futura victoria: donec alterius vis prævaleat, victoriæ suæ evidentiora signa ostendat. Incerta quoque spes est in morbis malignis, licet vires sint robustæ: ac in iis, qui fiunt ab humoribus torgentibus, id est temerè vagantibus, nullamque certam sedem obtinentibus: item à causis ignotis. Præterea in morbis, qui motus incertos & inconstantes habent. Nam in his natura ex se constanti modo non movetur: sed morbi proritacione: Unde lethales plerumque evadunt. Quare in talibus non statim de eventu morbi pronuntiandum: sed aliquandiu constanti, donec satis manifesta victoriæ signa appareant. Nam quæ initio morbi obscura fuerunt, tempore patefiunt: veluti in febribus acutis, quando primo die ignoramus eventum morbi, diem quartum aut septimum expectamus, qui tandem quid evenit, denunciat.

CAP. VIII.

De crisi & diebus decretoriis.

Modus
eventus mor-
bi ad sa-
lutem vel
mortem quo-
duplex..

DE signis prognosticis deque eventu morbi ad salutem vel mortem supra dictum est: consequens est, ut de modo & tempore illius eventus nunc agamus. Ac primum modus eventus in morbis est subito vel paulatim: Paulatim morbi salutares alteratione aut concoctione solvuntur: lethales consumptione, calorisque nativi extinctione sensum ad mortem tendunt.

Subitus verò eventus, vel cum pugna natu-
ræ &

ra & morbi est, & materiæ morbificæ secretionē, vel sine pugna: Subita mutatio quæ cum pugna, si-
ve salutaris siue perniciosa, crisis communiter voca-
tur: subita verò mutatio sine pugna oritur, quia na-
tura repugnare nequit, sed planè succumbit, unde
non crisis, sed subitus interitus dicitur.

Talis accidit non rarò in principiis accessionem
ex magnis inflammationibus, quæ partes principales
occuparunt, vel ob humorum crassitudinem, tena-
citatē, & copiam intrò confluentium, à quibus
meatus spirituum obstruuntur, & calor naturalis
non aliter suffocatur, quàm flamma injecto acervo
viridum lignorum. Deinde evenit aliquando mors
subitò in morbi vigore, natura oppressa à morbo.
Tertiò in declinatione, id quæ particularium acces-
sionum tantum, ex soluto vitali robore, non autem
in declinatione universali, ut post apparebit.

Crisis vocabulum aliqui ἀπό τῆ κρίσεως vel κρί-
σεως scilicet secretionē vel excretionē deducunt: *De Crisi-*
nam in omni crisi humorum secretio requiritur, *bus.*
perfecta crisi excretio. *Galenus 3. de Crisibus c. 2.* non
à medicis sed à plebejis primum inventum esse dicit,
& 3. Prognost. à foro translatus, (ubi reus ab a-
ctore in iudicium raptus se defendit, omnium quæ
sententiis absolvitur, vel in defensione succumbit
& damnatur) ad medicam considerationem in lu-
cta morbi & naturæ, unde plerique crisin non inep-
te iudicium vertunt; licet nonnulli certamen malint.
Nam ut in foro pronunciata sententia cessat alter-
catio, ita in crisi post separationem & excretionem
cessat pugna & certamen, solviturque morbus.

Sumitur nomen crisis ab Hippocrate & Galen. *Crisis*
pluribus modis: nam interdum pro quavis morbi *quorū ma-*
mutatione; aliquando pro quavis morbi solutione *di sumi-*
accipitur, sæpè pro perturbatione & agitatione, *tur.*

quæ subitam morbi mutationem præcedit: propriè pro subita mutatione in morbis ad salutem vel mortem, cum pugna & perturbatione. Mutatio autem illa quadruplex est, vel immediatè ad salutem, vel immediatè ad mortem, vel ad statum meliorem, vel ad statum deteriorem, quare crisis quadruplex erit, verùm illa per excellentiam absolutè & sine adjectione, aliquando optima crisis, & crisis propriissimè dicitur, quæ ad salutem ducit: quæ verò ad mortem, crisis simpliciter mala, reliquæ duæ crises imperfectæ: sed quæ ad statum meliorem, crisis bona imperfecta, quæ ad deteriorem, crisis mala imperfecta. Quare in morbis septem mutationis eveniunt, tres ad salutem, quatuor ad mortem. Galen. 3. de Crisib. cap. 7.

*Definitio
crisis perfectæ.*

Absoluta crisis, norma cæterarum, propriè definitur, subita mutatio ad salutem cum pugna & perturbatione, facta die critico bono in statu, à naturali virtute, universam materiam morbificam vincente, & expellente.

*Quinquere
quisita in
crisi perfectæ.*

Requiruntur in optima crisi quinque. 1. ut sit perfecta & salutaris, deinde ut fida, 3. ut tuta, 4. ut subita excretionem potius, quàm translationem fiat 5. ut prius iudicata sit, & die decretorio bono eveniat. Salutaris autem crisis dicitur, quæ ægrum à morbo planè liberat: Fida, quando certa salus succedit, & nihil causæ morbificæ relinquitur, unde recidiva, sed quæ totam materiam vincat & expellat: Tuta vocatur, ubi omni periculo caret: nam accidit quandoque ut crisis ad salutem terminetur, cum tamen ob gravia symptomata periculosa, minusque tuta iudicetur. Verùm symptomata illa signi rationem tantum habent, & perturbationem faciunt.

Signa critica duplicia.

Nam duplicia sunt signa, quæ à Galen. critica dicunt, alia tantum signa, à quibus perturbatio incipit, alia simul causæ & signa, scilicet, materiæ expulsi

pulsio aut translatio; præcedit semper perturbatio ex lucta naturæ & morbi, subsequitur expulsio & translatio. Signa tantum sunt, deliria, graves somni, difficultates anhelitus, vertigo, dolor capitis, colli, stomachi, & similia, vehemens rigor, vani splendores ante oculos, tinnitus aurium, æstus, sitis, urinæ retentio, &c. Signa simul & causæ sunt, repentinæ in motibus expulsionones, aut translationes, quæ perturbationi succedunt, scilicet subita copiosaque ventris solutio, urinæ excretio, copiosus sudor, sanguinis profluvium, parotides, defluxus, & similia. Adduntur his signa consequentia crisin, de quibus infra.

*Causa
crisis.*

Causa efficiens crisis est natura, quæ cum morbo pugnat. Vocabulo quidem naturæ intelliguntur omnes vires, quibus animal regitur: verum cum expulsio translatioque materiæ peccantis naturali facultati propriè tribuatur, erit naturalis facultas proxima & immediata causa crisis. Utitur autem naturalis vis in morbo omnibus quatuor facultatibus, sed in crisi primariò expultrice, deinde concoctrice. Proinde principalis causa crisis erit natura, quatenus munus expellendi exercet. Verum hoc suum munus natura oportune exercere nequit, nisi materia cocta aut superata sit: quare optima crisis evenit sine vigoris, quando concoctio viget, quæ verò vigoris tempus magis antevertit, eò semper deterior erit, nam à morbo non perfectè liberat. Crisis ad mortem summum vigorem nunquam superat, ac plerumque in augmento contingit.

*Crisis dif-
ferentia.*

Ex pugna naturæ & morbi sequitur materiæ morbiificæ excretio vel translatio, unde crisis duplex: alia per excretionem sive evacuationem extra corpus, alia per translationem sive transmissionem à parte affectus ad partem debiliorem & ignobiliorē. Excretio semper manifesta est, nisi in pueris, in

quibus aliquando per longos somnos materia concoquitur & dissolvitur, ac per insensibilem evacuationem dissipatur: semper autem excretio materiae morbificae si perfecta, optima est, & melior, quam translatio.

Observanda in crisi

In excretionis & translationis observare oportet quae, qualia, quanta, qua via & modo humores excant, & an morbo & naturae convenient: nam si materia morbifica excernatur, solvitur morbus, si aliud, non item. Deinde, ubi parum excernitur, recidiva metuenda est; ubi nimium, viribus metuumdum: praeterea, quo qualitas perniciosior, eò periculosior rem minusque bonam crisin arguit.

Tandem modus excretionis & natura, morbo parti quae affecta congruere debet: semperque locus, unde bona excretio, eò directo partis affectae esse oportet, tempus excretionis post concoctiones diebus bono critico, ut infra apparebit. Translatione materiae morbificae ad partes debiliores & exteriores potissimum, morbi judicantur, verum acri non absoluitur sed quasi novo interveniente morbo, liberantur, quare translatione crisis propriissime dicta non fit. Solvit translatio perfecte morbum, si oportuno tempore & loco, ac debita quantitate à natura fiat, & materia omni malignitate careat, ut latius infra dicemus. In pugna naturae & morbi virtus bellica conspicitur. Ut enim prudens imperator pugnam sponte non descendit, nisi oblata occasione, ita natura, nisi violenter cogatur quocunque morbi tempore non aggreditur morbum, nec ad expulsionem causae morbificae statim properat, sed expectata tantum concoctione, quae pro conditione humoris peccantis constitutione corporum, &c. citius & tardius fit, unde morbi alii citius alii tardius judicantur.

Verum non quovis die crisis bonae incidunt, sed

ad certis tantum, ut longa experientia docuit, in
 quibus septenarii & quaternarii ordo potissimum ob-
 servatur, quo determinato motu natura munia sua
 exsequitur: nam natura septenario numero gaudet,
 & septimo mense foetus vitales edit, septimo ætatis
 anno dentes generantur; decimo quarto menses
 potissimum erumpunt, &c. Dierum criticorum
 non eadem dignitas aut vis, verum illi optimi æsti-
 mantur, quibus plurimæ crises optimæ incidunt,
 nempe, perfectæ, fidæ, tutæ, antea indicatæ, cum
 subita excretionē potiùs, quàm abscessu: Deinde,
 qui non adeò magnum apparatus in corpore requi-
 runt, id est, non magnum robur virium, & omnia a-
 leò expedita: talis intra 20. diem primum est dies 7.
 deinde 14. hinc 9. 11. mox 17. 3. 5. & 4. tandem. 18.
 & conversò, intra vicesimum diem, periculosissi-
 mus & naturæ maximè contrarius est 6. qui à Ga-
 leno tyranno comparatur, quod vel interficiat vel
 difficilimas crises faciat, licet nonnulli criticum esse
 sentiant in morbis sanguineis, hinc sequitur 8. & 10.
 deinde 12. 16. 19. At 13. & 15. indifferens est nec pla-
 nè bonus, nec omninò malus. Post 20. diem, ad
 40. quia crises de vehementia sua plurimum remit-
 tunt, rariusque incidunt, aut imperfectæ sunt, pau-
 ciores dies critici numerantur, in quo ordine pri-
 mus est 27. 34 & 40. hinc 21. 24. 31. 37. Post qua-
 dragesimum verò, quia morbi absoluta crisi non ter-
 minantur sed abscessibus vel simplici solutione, di-
 es omnes medicos 60. usque Hippocrates negle-
 xit: huic 80. subjungit, deinde 100. 120. post hos,
 alios morbos septem mensibus, alios septem an-
 nis judicari, eandemque in mensibus, quam in an-
 nis rationem Galenus statuit. Verum ut bonus
 imperator, pugnaturus cum hoste, primò diem pu-
 gnæ præfinit, quo omnes auxiliaræ copiæ coeant,
 deinde, arrepta occasione, datoque signo milites ad

CAP.
VIII.

pugnam vocat, hostemque subito opprimit: ita natura autem pugnam diem crisis præfigit, certamque futuræ crisis notam ostendit, quò Medicus omnibus auxiliariis copiis de critico accurrat, & naturæ laboranti, quantum fieri queat, subveniat.

Dies indices.

Dies illi indices & contemplatorii vocantur, quia in iis contemplari & prævidere possimus, quæ futura sunt sequenti die critico. Nam dies indices proprie sunt, qui vim habent peculiarem denunciandi crisis aut motum aliquem criticum, sequenti die critico: Habent enim dies critici suos indices antecedentes, sed critici integris septimanis magis definiuntur: indices, mediis septimanis; nam cuiuslibet septimane duo quaternarii tribuuntur, ita tamen, ut 8. dies initium sit tertii quaternarii, sive secundæ septimane, 14. dies, finis secundæ septimane, initium tertiæ septimane; 20. finis tertiæ; 26. initium quartæ, &c. ac quaternarius primus cuiusque septimane sit semper index septimane. Quare quartus dies index est septimi; 11. decimi quarti; 17. index vigesimi; vigesimus quartus, index vigesimi septimi, &c. Attamen indices non rarò critici sunt, veluti, in exquisitè peracutis affectibus, quartus interdum criticus est; sæpius 3. vel 5. item 11. die ut dictum est, non pauci judicantur; quare tam indices, quam critici communi nomine critici dicuntur; nam indices critici esse possunt, & critici indices. Præterea, dies intermedii, qui intercidentes vocantur, scilicet sextus. 8. 10. 12. &c. aliquando indicant, sed rarissime, quia ob violentiam aut errorem aliquem natura cogitur inordinate movere, unde dies Provocatorii vocantur, malique critici.

Ratio numerandi criticos.

Ratio numerandi dies criticos juxta Galenum est, ut processus per septimanas fiat; sed non vulgari modo, nam prima & secunda septimana, à novo prin-

principio incipit, tertia ab ultimo die secundæ septimanæ, ita ultimus dies tertiæ septimanæ scil. 20. propriè criticus est, & magis quàm 21. ut Galenus experientia & ratione ostendere conatur.

Nam in confesso est, eum diem magis criticum esse, quo natura aptior est ad pugnam, talem esse viceſimum magis, quàm vigesimum primum experientiam constat: Deinde ratio numerandi, ducta est à mense medico, sive critico, qui authore Galeno, componitur ex mense periodico 27. dierum. 8. horarum: & Apparitionis 26. dierum. 12. horarum: utriusque dimidium, scilicet 26. dies, 22. horæ, à Galeno mensis medicus, & Criticus vocatur, ejusque pars quarta, 6. dies, 17. horæ cum semisse, prima septimana critica: ejusdem semissis, scilicet, tredecim dies, 11. horæ, septimana secunda: tres quartæ, id est, dies 20. horæ 4. cum semisse, septimana tertia; qui numerus horarum magis 20. quàm 21. congruit: igitur 20. magis criticus erit.

Verum mensis ille medicus Galeni, commentitius plane videtur: deinde, mensis apparitionis, nunc major, nunc minor est: præterea, qua ratione 20. dies magis criticus est, quàm 21. eadem 13. magis quodammodo erit, quàm 14. Nihilominus dierum criticorum constans & ordinata ratio, à cœlestibus revolutionibus dependere videtur, licet ipsa crisis à natura immediatè fiat, quæ motum cœlestium, quantum fieri queat imitatur, & à cœlestibus dirigatur. Nam constans vicissitudo & mutationis ordo, in omnibus corporibus sublunaribus, aliunde non dependet, quàm à constanti vicissitudine cœlestium motuum: talis authore Galeno, in morbis primariò est motus Lunæ & Solis, Deinde, cæterarum stellarum: breves enim morbi teste Galen. 3. de Diebus Decret. motu Lunæ reguntur, longi motu Solis. Deinde alienum à ratione non est, in morbis

Mensis medicus Galeni.

Cause dierum criticorum.

acutis dies criticos à mense Lunæ periodico dependere. Nam experientia constat & Astrologi testantur, Lunam motu proprio insignes qualdam mutationes excitare in iis locis Zodiaci, quæ locum, in quo Luna fuit initio morbi, quadrato & opposito radio intuentur. Est autem mensis medius periodicus, 27. dierum, horarum, 27. minutorum; quarta sive prima septimana, 6. dierum, 19. horarum, 55. minutorum: secunda septimana, 13. dierum, 15. horarum, 51. minutorum: tertia septimana, 20. dierum, 11. horarum, 45. minutorum. Hoc modo 14. dies magis criticus erit, quàm 13. Sed 21. penè tam criticus, quàm 20. Vetum apparens motus Lunæ, nunc tardior, nunc velocior est, unde credibile non est crises statò temporis intervallo, aut præciso horarum numero, accidere, sed lata determinatione, die 7. 14. 20. ut ipse Hipp. lib. 6. Epidem: innuere videtur, ubi dierum numero præpositionem circa addit, scilicet circa 20. circa 40. &c.

Dierum criticorum causa.

Fit quidem crisis ut supra dictum est, immediate à naturali facultate, sed tempus crisis dupliciter variatur: primò à causis superioribus, deinde inferioribus; Causæ inferiores præcipuè sunt facultatis robur & imbecillitas: deinde materiæ aptitudo vel ineptitudo ad motum. Nam pituita singulis diebus, bilis tertio die, melancholia quarto die movetur. Semper autem quo virtus validior & materia morbifica melius disposita est ad motum, cò promptius movetur. Superiores causæ ut jam dictum est, sunt motus & positus cœlestium corporum, præcipuè Lunæ in morbis acutis: quare constans vicissitudo & ordinata ratio dierum criticorum à Lunæ motu proprio dependet. Verùm crisis una aut altera hora nunquam incipit & desinit, raro uno eodemque die, interdum ad plures dies extenditur: quare satius videtur, diem 20. aut 40. criticum vocare,

are, quia circa 20. aut 40. incidit, aut quia perturbationis ratio 20. incidit, crisis verò 21. desinit: nam tota duratio perturbationis, pugnae, & excretionis temporis, crisis plerumq; dicitur.

Aliqui tamen his causis rejectis ad numeri dignitatem confugiunt, cujus per se nulla est efficacia: Quidam ad sympathiam naturæ nostræ, cum quaternario & septenaria numero, quæ occulta est: nonnulli ad institutionem DEI in creatione mundi, septimique diei benedictionem, quem tamen propter lapsum primorum parentum non totum benedictum, sed ultima sui parte maledictum esse arbitrantur. Sed ita septimana illa Galeni non constabit, nec 20. dies criticus erit, nam in sacris vespera & mane est dies unus, & initium diei semper ab occasu: at incipiendo ab occasu completur septimana illa Galeni, ex 6. diebus, 17. horis cum dimidia paulò ante meridiem, maledictio verò incidit die inclinante, quare hæc ratio non congruit.

Francastorius humori melancholico tribuit vim criticam, quia omnium ultimo mouetur, ac propriè quarto quovis die: cum tamen multis morbis crises debeantur, quorum materia extra venas est, & cum melancholia cognationem nullam habent. Deinde necesse non est, uno humore putrescente, cæteros labem contrahere; nec si melancholia ex aliis labem contrahit, vim habere significandi stabilitatem, aut instabilitatem. Nam vis critica diebus aut numero dierum non tribuitur, sed tantum significatio stabilitatis, aut instabilitatis, an secundum naturam, an præter naturam eveniant. Averrhoes arbitratur, totam hanc dierum criticorum rationem dependere à proportionem naturæ agentis & morbi resistentis: verum, cum proportio illa varia sit, inde certa enumerandi ratio, sumi nequit; nec sciri poterit, cur crisis septimo die melior & tutior sit, quàm 6. aut 8.

*Opiniones
medicorum
de causa, dierum
criticorum.*

*Francastorius
rii.*

*Averrhoes
opinio.*

Qq 5

In

I.

Ratio nu-
merandi tē-
pora crisi-
um.

In morbis continuis dies tantum numeran-
tur, in intermittentibus, pro diebus numerus acces-
sionum: ut enim tertiana continua septimum diem
criticum habet, ita tertiana intermittens septimum
circuitum. Initium numerationis fieri debet ab eo
die, in quo actio ægri manifestè læsa conspicitur illi-
us morbi ratione: Verùm in puerperiis, si non longè à
partu febris oriatur, dies computamus à doloribus
partus, quod hinc morbos oriri existimemus, sed si
longè post partum febris oboriatur, alia causa evenis-
se credendum est, & tum à manifesta actionis læsio-
ne illius morbi ratione, numeratio auspicanda erit.
In complexis morbis uniuscujusque ratio seorsim ha-
benda.

CAPUT IX.

*Qualis & quomodo sit futura crisis, & qui-
bus notis cognoscatur.*

Vnde præco-
gnoscitur
modus solu-
tionis mor-
bi, ad salu-
tem vel
mortem.

His præmissis superest, ut in omnibus mor-
bis modum tempusque eventus præcognos-
camus. Primum autem morbi eventus,
an subito an paulatim, ex morbi magnitudine
potissimum æstimatur, facta comparatione cum
viribus: sicut tempus illius eventus, an citò an
tardè, &c. ex motu præcipuè colligitur: Verum
sub magnitudine comprehendenda sunt species &
mos morbi, & ut certior fiat conjectura, conjun-
gendus est motus morbi, sive tempus status. Vicissim, ut
tempus eventus melius æstimeretur, motui adjun-
genda erit magnitudo morbi, & quæcunq; morbum ac-
celerant, vel tardant, ut sunt, natura, ætas, tempus an-
ni.

ni, regio, &c. Nam adjuvant morbi brevitatem vehementia morbi, virium robur, ætas juvenilis regio, tempus, & causæ calidæ: tarditatem verò contraria. Semper autem morbi acuti, id est magni & celeres, qui ex calido humore gignuntur, aut subito cum pugna ad salutem vel mortem terminantur; aut subito sine pugna ad mortem: nemo enim subito sine crisi mortem unquam evasit. Cum pugna quidem, quando natura non tantum resistit, sed subito ad morbum & morbificam causam expellendam insurgit: sine pugna verò ad mortem, quando natura subito prostratur, ut supra dictum est. Ex magnitudine morbi crisis potissimum æstimatur; an verò ad salutem vel mortem, ex viribus ægri, facta comparatione cum violentia morbi, ut in superiori disputatione dictum est. Verum mors cum crisi postulat quidem vires debiliores morbo, sed non omnino debiles, alioqui non tentarent pugnam, sed mors sine pugna eveniret: Tempus verò crisis ex motu morbi, siue tempore status potissimum dijudicatur. Cæteri morbi, qui magni simul & celeris motus non sunt, nec materiam morbificam habent, sensim ad salutem vel mortem tendunt: salutare quidem qui ex materia, concoctione, cæteri alteratione potissimum: lethales verò consumptione, & caloris nativæ lenta extinctione. Nam morbus lethalis cum validus est & celer, hominem repente necare solet, cum nec vehemens nec celer, paulatim tantum. Contra in minimè lethalibus. Natura valida hominem subito sanare solet, imbecilla non nisi paulatim, alioqui si cogatur ad pugnam, in ipsa pugna deficit.

Tria obser-

Semper autem, si ea quæ primum ferocia evadant, deinde mitescant, non terminabitur morbus vanda in
crisi, sed simplici solutione. Considerantur in crisi, qualibet
ut in cæteris solutionibus tria 1. Qualis sit futura, crisi.
an ad salutem vel mortem, & si ad salutem, an fida,
tuta,

IX.

tuta, & omnes conditiones bonæ crisis habeat: Deinde, quomodo sit futura, an per excretionem, vel translationem, & qua via: 3. quo tempore sit futura: cum tempore crisis & solutionis morbi coinciderit tempus salutis & mortis.

1. Qualis sit futura crisis an ad salutem vel mortem.

Ac primum qualis sit futura crisis an ad salutem & mortem, ex superioribus disputatione constat, scilicet, facta comparatione virium morbi & naturæ quibus adjungenda sunt signa concoctionis & cruditatis in urinis potissimum, item consideratione temporis status, partis affectæ, naturæ, ætatis, & similibus. Semper autem instantis bonæ crisis signum est concoctio. Potissimum in urinis; mala & infidæ, cruditas. Deinde optima crisis in statu contingit, ut alibi dictum est. Nam statu elapso, nemo vi morbi perit, sed vel errore, vel vi alterius morbi: præterea, in statu facta concoctione, etiam si natura à nullo alio irriteretur, ad pugnam se accingit. Mala igitur crisis est, quæ ante statum evenit sine signis concoctionis, quia sit viribus irritatis morbi magnitudine, aut celeritate. In omnibus morbis, quando vires ægri robustæ sunt, & materiæ dominantur, propriis statisque legibus pugnant, & determinatos motus faciunt; at ubi succumbunt, non per se, sed morbi proritacione agunt, & incerta ratione ac ordine moventur, ut vix præsciri queat, quæ sit mortis ratio; nihilominus ubi vires in morbis lethaliibus ad pugnam insurgunt, irritatæ morbi violentia & celeritate, siue exstimulatæ ad expulsionem rei graviter infestantis, statim in ipsa pugna deficiunt, & mors in crisi erit: Ubi verò subito vires opprimuntur, mors subito sine crisi tribus modis accidere potest, ut supra dictum est. In his casibus ut plurimum occurrit virium imbecillitas, cum signis cruditatis, morbi magnitudine, malignitate & celeritate. At ubi vires nec ad pugnam insurgunt,

nec

nec subito opprimuntur, sed sensim deficiunt, æger
sensim & paulatim interibit.

Modus quidem solutionis omnium morbo-
rum salutarium est subito vel paulatim. Verum *Quomodo
sit futura
crisis.*
causa solutionis, est vel natura tantum, vel ars tan-
tum, vel natura & ars. Nam leviores intemperies sine
elcum materia, leves continui divisiones, natura
ola sanat: luxatas verò partes, sola ars reponit, item
nalè figuratas partes restituit; quæ numero redun-
dant, secatur, quæ augentur, minuit. At graviores in-
temperies & continui solutiones ac morbos qui gra-
ri humorum vitio eveniunt, ars simul & natura cu-
rat, ars, quatenus naturæ subservit. Curat autem &
ars & natura per contraria, ut in therapeuticis dice-
mus: quod si verò ad illum finem pertingere neque-
ant, incurabiles relinquunt. In lethalibus morbis
pro ratione morbi, partisque affectæ, & virium ægri,
modus mortis evenit, ut ex dictis constat. Commu-
nis causa mortis, est caloris nativi interitus: Interit
tribus præcipuè modis; 1. extinctione à frigore 2.
consumptione à nimia caliditate & siccitate, ab hu-
morum acrimonia & malignitate, à qualitate vene-
nata, à vehementissimis doloribus & similibus. 3. su-
bita suffocatione ab humorum copia. Præterea
in morbis ex humoribus non raro accidit, ut vires
ægri irritatæ morbi violentia ad expulsionem
morbi insurgant, & in ipso conatu deficiant, dis-
soluto vitali robore. Fit crisis quando natura
morbificam causam excutit & removet, quod tri-
bus modis accidere potest, ut vult Hipp. lib. de Hu-
moribus: aut foras per cutem, sudores; aut intro-
sum, alvi dejectionibus, urinis, hæmorrhagia, &c.
aut alia via, qua maximè expedit, scilicet transmis-
sione à parte affecta ad partem ignobilem, vel ad
cutem, ictero, maculis, pustulis; vel ad glandulas &
articulos, abscessu, ut infra latius dicemus. Hi tres
ad

ad duo reducuntur, scilicet ad excretionem & translationem.

*Qua via
sive ad
quas partes
fit futura
crisis*

Cum modo crisis conjunge viam. Modus crisis colligitur ex natura ægri & morbi, cum quibus conjunge considerationem partis affectæ causæ, naturæ ægri, ætatis, sexus, temporis anni, & similia. Via vero sive locus per quem fit excretio, & ad quam translatio, æstimatur ex inclinatione naturæ. At primum in crisis natura expulsionem morbificæ materiæ semper molitur, quæ naturæ scopus est, sed cum id non succedat, vel ob virium debilitatem & viarum angustiam, vel ob morbificæ materiæ contumaciam à parte affecta in partes ignobiles traducit. Excretio autem alia obscura est per somnum ut in infantibus tantum, ob magnam calidi innatam copiam corporis quæ raritatem, quod facile humorem noxium concoquit, & insensibiliter discutit, alia manifesta per sudores, sanguinis profluvium, urinas, vomitus, dejectiones, hæmorrhoides, & in foeminis per menstrua. Dependet quidem via excretionis & transmissionis, ex inclinatione naturæ: verum sub inclinatione naturæ comprehenditur, non tantum impetus partis mittentis, unde principium motus, sed etiam conditio partis recipientis, & materiæ: semper autem natura cum ordinatè movetur, à partibus robustioribus & præstantioribus ad debiliores & ignobiliores, per vias faciliores, vitiosam materiam traducit; quæ vero partes debiliores & viæ faciliores, ex natura ægri æstimantur. Nam in his qui podagra infestantur, humores ad articulos plerumque decumbunt. Deinde sunt, qui per alvum, sudorem, hæmorrhagiam, aut aliam peculiarem viam à morbis se liberare solent, conferente ad id certa naturæ proprietate, & viarum facilitate, quæ in aliis eodem modo affectis non reperitur. Præterea confert aliquid natura humoris;

nam

am bilis, aut sanguis calidior, sua natura sursum
ergit: pituita & melancholia pondere suo deorsum
magis decumbunt: Insuper non omnes excretionēs
nicuique morbo conferunt, sed alia magis vel mi-
us, pro ratione partis affectæ, ubi continetur ma-
teria morbifica. In omni autem morbo ubi natura
ordinatè agit, per vias faciliores, id est, proximas,
est directo, id quod noxium est expellere tentat. Ve-
rum cum in aliis atque aliis partibus materia mor-
bosa sit collecta, fit ut una via expulsionis omnibus
utilis non sit: ita in ardente febris optima crisis per
sudores fit, si materia in extimas partes fundatur, si
in venis sit, crisis optima erit, si inclinet natura in
partes directas. In contrarias inclinare, malum; Ve-
runt, in jecoris inflammatione, sanguinis profluvium
ex nare dextra, bonam, ex sinistra malam crisin ar-
ruit.

Quare ut in pauca conferamus, excretio criti-
ca æstimari debet, ex morbo, scilicet, ut forma
morbi congruat, Nam febris ardens solvitur, vel
sanguinis fluxus è naribus, vel post rigorem sudore,
vel fluxu aut vomitu. 2. à loco affecto, veluti mor-
bi in gibba hepatis, renibus & vasis urinariis, urinis
commodè sanantur: at in hepatis sima, in mesente-
rio, circa ventrem, vomitu vel dejectionibus. 3. ab
inclinatione humoris ut supra dictum est: 4. ab æ-
ri natura, cum qua conjungit ætatem, tempus an-
ni, regionem, & similia: veluti, ante annum 30. na-
gis calidis, vere, sanguinis profluvium per nares è-
venit; hyeme, euacuatio per inferiora magis, æstatè
per superiora. Præterea à sexu, quos morbos in ma-
ribus profluvium sanguinis è naribus judicare solet,
eos in fœminis aliquando mensium profluvium.
Tandem à consuetudine, quibus fluunt hæmorrhoi-
des, evacuatio per hæmorrhoides expectanda erit,
His conjunge quæ à similitudine aliorum sumuntur.

Nam

*Vnde æsti-
metur cri-
tica ex-
cretio.*

*Signa in-
stantis cri-
sis per hæ-
morrhagi-
am.*

Nam ubi alii ferè omnes, eodem tempore, ab eodem morbo, una evacuationis specie liberantur, eadem species speranda erit.

Instantis crisis modum aperiant symptomata illa potissimum quæ perturbationem constituunt & evacuationes præcedunt, ac tantum signa vocantur: habent enim singulæ evacuationes certa symptomata. Nam in ardentibus febribus ubi instant hæmorrhagia, caput circa tempora & frontem gravatur, cum dolore extensivo & pulsante: facies & oculi rubent ac nares quoque cum pruritu splendunt circa oculos versantur, lacrymæ involuntariæ fluunt, pulsus magni ad exteriora potius, quàm interiora sentiuntur, præcordia sine dolore tendunt cum anhelitus difficultate, cervix dolet, sternutationes in initio statim eveniunt: certius fore sanguinis profluvium sperabimus, si ætas intra 30. annum sit deinde morbi conditio, tempus, consuetudo, & cætera consentiant, ac absint signa alterius excretionis. Nam fluxu sanguinis febres, ardentes inflammationes hepatis, lienis, phrenitides, aliquando pleuritides solvuntur.

2.
*Signa crisi-
sis per vo-
mitum.*

Deinde crisis per vomitum appropinquare designant, totius capitis dolor cum gravitate, visus hebes, tenebrosus, vertigines, rigor unà cum frigiditate partium, quæ infra præcordia sunt, morsus orificii ventriculi, fastidium, pulsus durus altus inæqualis, labii inferioris agitatio cum saliva copiosa tenui; aliquando delirium & difficilis respiratio. His signis præsentibus, si aliquid æger biberit aut comederit, evomet. Conjecturam confirmant, si nulla adsint signa, quæ aliam excretionem designant, & consentiant morbi natura & circumstantiæ: nam vomitu bilioso febres tertianæ, & morbi in cava hepatis parte judicantur; vomitu pituitoso, febres quotidianæ.

Tertio

DE PRÆSAGIIS.

625 CAP.

IX.

Tertio excretionem per sudorem imminere, testantur urina & alvus præter rationem suppressa, vehementis rigor suppressionem consequens, præcipue si vomitus signa non adsint, delirium, præsertim accessione crescente, pulsus undosus, mollis, partes exteriores solito calidiores, & rubicundiores, vapor calidus copiosus per totum corpus, qui antea non aderat, &c. Hoc modo judicantur non raro febres ardentes, continuæ, ac intermittentes, inflammationes viscerum, &c.

3. *Signa crisi-
sis per su-
dorem*

Quarto excretio per dejectionem & urinas instare potissimum indicantur, quando aliarum excretionum per sudores vel superiora notæ non apparent: nam ubi æger riguit sine aliarum excretionum motis, & urina præter rationem suppressa sit, alvusque paulò liberalius fluat cum morfu & rugitu intestinorum, pulsus magni, præsertim in contractione sint, crisis per dejectiones alvi instare judicabis: contra, si alvus sit suppressa, & urina solito copiosior appareat, evacuationem per urinas. Verùm lumborum dolor cum tensione & gravitate sine alia-

4. *Signa crisi-
sis per alvi
deiectiones.*

um evacuationem notis, evacuationum per uterum vel hæmorrhoides designat: in mulieribus autem per uterum, si tensio dolor magis ad pubem vergat; in aliis verò quibus fluere solent, per hæmorrhoides.

5. *Pars urinas.*
6. *Per uterum
aut hæ-
morrhoi-*

Quod si nulla adsint evacuationis, signa, nec materia, nec humores, nec meatus excretioni commu-

7. *Signa crisi-
sis per
translati-
onem ma-
teria.*

parata sint, transmissione ad partes debiliores & ignobiliores morbus judicabitur. Verùm in morbis translatio humoris noxi duplex esse solet, una à parte exteriori & ignobiliori, ad interiorem vel præstantiorem: alia contra, à parte præstantiori, & interiori, ad partem ignobiliorem vel exteriorem, per vias directas & patentes; illa semper perniciofa est & metastasis speciali nomine vocatur: hac morbi-

R. inter-

interdum judicantur & diadosis dicitur. Transferuntur autem humores interdum minus manifestè per partes interiores, plerumque manifestè ad partes externas. Occulta autem translatione morbus unus in alium terminatur, ob partis suscipientis debilitatem, ita apoplexia, translatione humoris ad nervos in paralyfin definit. Manifesta vero translatio dupliciter fit, vel ad unam partem, scilicet ad glandulas & articulos, unde abscessus, vel ad plures cutis partes unde exanthemata, maculæ, icterus. Hæ translationes dependent non solum ab inclinatione naturæ, & imbecillitate partis suscipientis, sed etiam à dispositione materiæ. Nam morbi longi à crassioribus succis, abscessus potius faciunt: morbi breviores tenuibus succis, pustulas vel maculas. Verùm materia pustulatum magis crassa & acris est, quàm maculatum.

Quæ translatio critica vel non critica est.

Omnis hujusmodi materiæ translatio, critica propriè dici non debet, sed quæ vi naturæ fit, & non sola morbi proritacione. Nam critica translatio propriè fit vi naturæ, propellentis materiam morbosam ad partes ignobiliores, quod non una via & modo fit, ut supra dictum est. Præcognoscitur via & modus ex constitutione ægri, morbi natura, motu humorum, debilitate partium suscipientium; nam naturis frigidis, senibus, & similibus, morbisque longioribus, &c. abscessus magis contingit: deinde qui longo tempore urinas tenues, & crudas mingunt, si alia, velut superstitibus signa sint, his abscessus exspectare oportet infra septum, &c. Ad quas partes potissimum abscedat humor, & expectandus sit abscessus ostendit debilitas, dolor, rubor, distensio, aliaque accidentia circa partem suscipientem: Verùm ad partes inferiores, humores crassiores, frigidioresque magis abscedunt, ad superiores, humores calidiores, & tenuiores, quare in morbis magis diuturnis,

Quomodo præcognoscitur ad quas partes sit translatio.

urnis, ad inferiora, in non adeò diuturnis, ad superiora abscessus magis expectandi erunt.

Peculiariter abscessus circa aures, quos parotides appellamus, instare demonstrant in morbis non adeò diuturnis, si post subitā anhelitus difficultatem nox succedat gravitas, dolorque capitis, præcipue circa tempora, gravis somnus, surditas subitò adveniens, tinnitus aurium, faciei rubor, &c. Cæteræ translationes morbis acutis magis accidunt.

Signa per parotides.

Morbus regius oritur interdum in crisi, jecore nequaquam malè affecto, ex bile crassa, transmissa per cutem, qualis bilis concoctionem ante septimum diem non admittit, proindè morbus regius criticè ante septimum diem non fit, sed symptomaticè: nam febres biliosæ, quæ ante septimum diem terminantur, potius fluxu alvi, sanguinis profluvio, aut simili evacuatione judicantur, quàm transmissione ad cutem. Verùm 7. die, 9. ii. aut decimo quarto morbus regius criticus æstimatur, & non symptomaticus, nisi dextrum hypochondrium durum sit ab inflammatione, schyrho, aut obstructione jecoris & vasorum.

Signa criticæ per Ictericum.

Maculæ verò quales in pestilentialibus febribus apparent, ex unica quidem causa proveniunt, scilicet, ab humoribus putrescentibus, & perniciofa qualitate inquinatis, sed diversimodè erumpunt: aliquando criticè, aliquando symptomaticè. Criticè autem cum in parte, vel in toto, superata putredine & qualitate prava corrupta, ipsa natura corruptum humorem ab internis ad externa transmittit, die aliquo critico, & tum sequitur alleviatio morbi: symptomaticè verò cum natura exstimulata copia aut malignitate, partem aliquam materiæ, ante concoctionem aut prævæ qualitates correctionem ad exteriora transfert, id accidere potest, quocunque morbi tempore, rarissimè statim in initio.

Maculæ in febribus quando critica vel symptomaticæ sunt.

Re a

æpius

IX.

sapius post initium. Verum cum nulla coctio præcedat, nec maligna qualitas superata sit, nullum ex maculis erumpentibus subsequitur levamen, sed ob hanc etiam illam majorem debilitatem, cum qua vigent adhuc causæ morbificæ, quæ, si ante pugnam à natura demori non potuerunt, nunc ob majorem debilitatem multò minus superari posse videntur. Quæ est ratio in ictero & maculis, eadem in pustulis, quæ à materia magis crassa & acrisunt.

Signa crisis perfecta fidaque.

His modis absolvitur crisis: an verò evacuatio & translatio laudabilis, & legitima sit, & crisis perfecta fidaque, ex signis comitantibus & consequentibus apparet. Signa comitantia sumuntur à excretionis vel translationis qualitate, quantitate, tempore, modo, via, & facilitate. Signa consequentia sumuntur à functionibus ægri, ab excretis, à qualitate corporis post crisin. Ac primum perfecta fidaque crisis æstimatur, si materia morbifica concocta excernatur, & talia purgentur, qualia oportet. Nā autore Hippocratis ejusmodi purgatio confert, & ægri facillè ferunt. Secundo, si opportuno tempore fiat, scilicet apparentibus signis concoctionis, die bono, non critico, qui ab indice prius denunciatus fuit: Nam manente cruditate, nulla est spes bonæ crisis, deinde crises quæ diebus non criticis contingunt, nec ab indice prius denunciata, suspectæ semper sunt, & plerumque vel recidivas, vel mortem inferunt. Tertio si debita quantitate, id est, non parum nec nimis copiosum evacuetur, sed morbo proportionatum: nam nihil paucum criticum est ut sudatiuncula, vomitiones exiguae, &c. nec evacuationes immodicæ tutæ sunt. Paucitas autem semper materiæ malignitatem & contumaciam & naturæ irritatæ, & fatescentis debilitatem aut exolutionem, vel meatuum angustiam arguit. Deinde quæ relinquuntur in morbis recidivas facere consue-

verunt;

erunt; Immodicæ verò evacuationes vires dissol-
unt.

Quartò si debito modo & via evacuatio & translatio contingat: modus autem congruens est confertim & citò, non paulatim & tarde: via debita per partes ignobiliores & directas & meatus patentiores, ut supra dictum est.

Eadem ex signis crisin consequentibus djudicantur: nam post crisin perfectam, si damque, redit æro vividus color, naturalis forma, pulsus, excrementa, & omnes naturales actiones inculpatè obit, & corpus pro refectionis modo roboratur; contraria infidam crisin denunciant, quæ recidivam minantur.

C A P. X.

De Tempore futurae crisis & quomodo præcognosci queat dies & hora salutis, aut mortis in ægris.

TEmpus futurae crisis ea omnia aperiunt, quæ Vnde dignos longitudinem morbi, tempusq; status: nam quò citur tem- morbus brevior, eò crisis propinquior, & bona pus crisis, so- lutionis vè- morbi. Tercis in statu semper evenit; tempusq; status colligi- tur, ut dictū est, ex morbi natura, & incremento sym- ptotomatum: Deinde ex tempore anni, natura, ætate la- borantis, & similibus: Tertiò in iis, qui circuitus ac- cessionum habent, ex circuituum anticipatione, in- cremento, & magnitudine: Quartò ex signis conco- ctionis, quæ post apparentibus annumerantur; his addi poterunt observatio dierum tam criticorum, quàm indicantium, & consideratio virium ægri, Nam vires validæ in pernitiolis affectibus nisi irri-
Rr 3 tentur

X.

tentur crisin tardant, salutaribus, concitant: contrarium evenit ubi vires debiles sunt. Verum vires validæ, irritatæ morbi violentia, ex acri calidaque materia, summum morbi vigorem non expectant sed ante statum crises accelerant. Nam facultas expultrix, quæ crisis causa est, diu vehementiam illam sustinere nequit, sed ad pugnam intempestivè congitur. Primum & maximum bonæ crisis instantis indicium, sunt concoctiones præcipuè in urinis secundum, quod ab aliquo die indicatorio prius indicetur, cui annexa est diei indicantis potentia, ut supra dictum est. Indicatur quidem dies criticus suo quaternario antecedente unà cum signis, quæ motum, magnitudinem morbi demonstrant. Semper autem morbus, qui subito crisin habet, peracutus est, nam exquisitissimè peracutus, primo quaternario judicatur, peracutus tantum, primo septenario: simpliciter acutus, die decimoquarto, non simpliciter acutus, 20. Acutus enim peracutus, ad 40. usque diem interdum extenditur: post 40. diem morbi longi terminantur.

Modus præcognoscendi tempus crises.

Crisis ex magnitudine morbi potissimum æstimatur, tempus crisis ex motu ut supra dictum est. Igitur, ubi primo statim die signa omnia secuta apparent, morbus primo quaternario finietur; parvus, simplici solutione, magnus ut synochus, crisi. Verum in tertianis continuis, si morbus magnus sit, celerrimeque moveatur, tertio die: si non adeò magnus nec velox, quinto die crisis accidere solet; nam continuæ tertianæ, quæ in accessionibus crisin habent, die tertio, vel quinto finiuntur, & licet interdum quarto judicentur, tamen id evenit ratione illius accessionis, quæ tertio die fit. Morbi tamen ex sanguinis vitio, (ut synochus) magis quarto finiuntur. Hi omnes exquisitè peracuti dicuntur, & primo quaternario continentur. At si primo die,

acc

ec secundo concoctionis signa appareant, morbus
 acquisitè peracutus non erit, nec primo quaternario
 æger liberabitur: sed si quarto die primum in
 urinis nubecula rubra, vel hypostasis alba æqualis
 appareat, & morbus velox magnusque sit, septimo
 crisis eveniet, nisi interim error accadat: at si adeo
 velox non sit & error incidat, in nonum diem ali-
 quando crisis transfertur: ubi verò septimo die con-
 coctionis signa apparent, & morbus simul magnus
 & velox sit, undecimo potius quàm 14. crisis ex-
 pectanda erit: at si minor tardiorque, decimoquar-
 to magis. Eadem est ratio in cæteris quaternariis
 & septenariis. In lethalibus morbis, singulis quater-
 nariis & septenariis signa in urinis, pulsibus, &c. ob-
 servanda erunt; quemadmodum enim morbi, qui
 omnia bona signa præ se ferunt, primo quaternario
 solvuntur, ita qui omnia mala, ad mortem ducunt:
 eademque in cæteris ratio. Pessima autem signa
 sunt; urinae albæ tenues in acutis: item urinae rubræ
 tenues in statu: urinae nigræ sine admixtione hu-
 moris nigri: urinae pingues cum contentis pingui-
 bus oleaceis: urina cum nigra hypostasi, aspera,
 inæquali, &c. ut prius & supra dictum est. Ve-
 rum in morbis lethalibus non raro mutationes il-
 læ, quæ septenariis expectandæ essent, intercidenti-
 bus diebus contingunt, vel ob errorem aliquem, vel
 ob morbi violentiam, quam natura tam diu sustine-
 re nequit; vel ob vim accessionis alicuius irritantis
 naturam ad expulsionem: unde fit, ut crisis ad mor-
 tem quarto die indicata, non sequatur septimo, sed
 sexto. Nam perniciosi morbi accessiones sæpe ha-
 bent dieb. paribus, aut malis criticis. Semper autem
 crisis die illa laudabili cum sanguis bonis, recidivam mi-
 natur, cum signis malis mortem. In complicatis affe-
 ctibus signa cujusque simplicis morbi distinguenda &
 inter se conferenda erunt: deinde si duo sint, confide-

X.

tandum, uter prius finietur, ex utriusque specie, magnitudine, motu, ex viribus ægri, & similibus, ut jam dictum est. Nam plerumque unus affectus desinit manente alio, aliquando natura unum superat, ab alio superatur. Semper autem in iis affectibus, quorum unus alterius causa est, aut alterum fovet, is prius solvitur, qui causæ rationem habet, veluti, obstructio, si febris causa sit, prius tollitur quàm febris; item in partibus exulceratis, intemperis, dolor, tumor, prius tollenda, quàm ulcus curari queat. In initio difficile est præsentire tempus crisis, item tempus salutis vel mortis, verùm à primò die prout singuli quaternarii adduntur, observare oportet signa virium morbi, & naturæ, motumque morbi, & non latebit tempus crisis, nec tempus solutionis morbi ad salutem vel mortem. Nam diebus decretoriis iudicationes fiunt, & ad salutem & mortem: tempus verò salutis & mortis, ex comparatione virium ægri & morbi æstimatur, & tempore status; si enim morbus & natura quasi pares in conflictu pugnant, plus temporis erit ad alterutrius victoriam. Sin magnus sit excessus, citò ei victoria erit, quæ viribus superiore est: quare exiguos morbos, qui cum signis non malis eveniunt, natura citissimè vincit, à maximis verò cum signis difficilissimis, celerrimè evincitur; eaque victoria evidentibus noris, de quibus supra, per singulos quaternarios æstimatur. Quicunque sanantur, omnia universalia morbi tempora pertransire debent; moriturus, ad universalis declinationis tempus propriè pervenire non potest, non tamen ad statum necessariò pervenient; nam evenit mors, cum, vel sine crisi; non rarò in augmento, aliquando in principio morbi: sine crisi mors in principiis maximè evenit, ubi natura plurimum à morbo superatur. Deinde in augmento, si nulla adsint signa concoctionis, ac morbus magnus malignus sit

*Vnde præco-
gnoscitur
tempus salu-
tis & mor-
tis.*

*In lethali-
morbis quo
tempore
morbi mori
æst. ager?*

fit, celeriterque moveatur. Igitur, ut tempus salutis præcognoscamus, scire oportet tempus status, & an vires ægri valeant statum superare; nam superato statu, ut alibi dictum est, nemo morbi illus ratione interit, nisi alius succedat, aut error committatur.

Tempus verò mortis prædici poterit, observando, quantum morbus naturam superat, & quo tempore æger gravius afficitur: Item in morbis qui circuitus accessionum habent, quo tempore insultus recurrit, an quotidie, an alternis diebus, aut alio modo, item qua hora. Nam in lethalibus morbis, ubi magnus excessus est, mors citò supervenit, sin excessus adeò magnus non sit & vires sufficiant, eod die morietur, quo accessio erit, ac illa nocte vel die, qua se ipso magis intollerans est: sin vires aliquo modo resistent, differri adhuc poterit ad unum vel alterum diem, pro virium robore. Quare in hac conjectura, solertia Medici imprimis conspiciuntur. Horam diei vel noctis non difficulter prævidere poteris, si observaveris, in quibus morbis principia particularium accessionum mortem afferre solent, in quibus vigor & declinatio, ut supra dictum est. Item si memineras, quo tempore diei vel noctis, particularis cujusque exacerbationis gravissima, maximeque lethalia signa supervenire solent; nam illa hora maximè morietur, quâ æger languidior factus fuerit & gravissima symptomata inpervenerint. Instantis verò mortis signa sunt, pulsus formicinas, deficiens, gravissima animi deliquia, maxima respirationis difficultas, frigida exspiratio per os & nares, & cætera lethalia signa. Nonnulli ad prædictiones astrologicas confugiunt, & indicia temporis mortis, ex remotioribus causis, astris nimirum sumunt, quæ medicæ considerationis non sunt. Pro-

Rt s babile

X.

babile quidem videtur ægrum eo tempore potissimum mori, quo astra maxime adversantur. Verbi gratia : Si in primo ortu æger planetas infestos & lethales in geminis habuerit, morietur aut periclitabitur, ubi luna aut aliquis malificus planeta singulum geminorum, aut quadratum, vel oppositum in sexta vel octava domo occupaverit. Verum certior & evidentior illa conjectura semper est, quæ ex proximis causis & manifestis signis colligitur.

* *

FINIS LIBRI
QUARTI.



DE

DE METHODO MEDENDI. 635 CAP.
I.
DE THERAPEUTICA,
SEU UNIVERSALI MEDEN.
di ratione & materiis auxilio-
rum.

LIBER QUINTVS.

CAPUT PRIMUM.

*De Methodo medendi, & indicatio-
nibus.*



Medicina auctore Galeno lib. de Cōst.
Artis, in numero artium factiva-
rum est, quæ aliquid faciunt, & ex
parte viciatum corrigunt. Subje-
ctum medicinæ est corpus huma-
num quatenus sanabile: scopus, sa-

*Tres partes
medicinæ
Therapeu-
tica.*

nitatis, à qua functionum omnium integritas. Fruitur
autem corpus sanitate, vel illæ sanæ conservando, vel
ne corpus in morbum planè labatur & à causis mor-
bificis vincatur, præservando: vel sanitatem amissam
restituendo curandòve. Quare tria præcipuè munera
medicinæ erunt, conservare, præservare, curare: &
tres partes medicinæ operatricis, conservatrix, præser-
vatrix & curatrix.

Conservatrix propriè in eodem statu sanitatem I Conserva-
tuetur ac conservat, aut parva minusque sensibilia trici mu-
vitia, contracta à causis necessariis externis vel inter-
nis corrigit. Externæ illæ causæ sunt, quæ res non
naturales dicuntur: Internæ verò præcipuè sunt,
ex quibus constamus elementa, & quæ gignimus
excrementa. Nam propter siccum elementum
quod in generationis primordio prævalet ad
extre-

I.

extremum usque senium corpus nostrum exsiccatur. Deinde ob vim caloris nativi humidum continuo absumitur, & substantia nostri corporis dissolvitur, ad quam refarciendam alimentis necessario indigemus; quæ cum similia planè substantiæ nostri corporis non sint, mutatione opus habent, in quâ excrementa necessario coaccervantur, quæ sanitatem immutant.

*Partes do-
ctrina de tu-
enda sanita-
te.*

Has mutationes, quantum fieri potest, corrigit, qui curam suscipit tuendæ sanitatis. Nam tres scopi præcipui sunt: Primus, quod continuo à corporis substantia dissolvitur, salubri diætâ restituere; Secundus excrementa expellere; Tertius hos duos consequitur, ne animal præproperè senescat prohibere.

*2. Præserva-
triciæ mu-
nus.*

Quod si vero in horum usu error manifestus committatur, gravioraque vitia morbis proxima nascantur, aut causæ existant, quæ morbos foveant & augent, præservatrice opus erit: Nam præservatio sive præcautio sanis propriè non debetur, sed ægris aut neutris, idque diverso modo; conservamus enim sana non parata ægrotare; præservamus neutra corpora, sive sana parata ægrotare, & ægra dum morbi in fieri sunt, & à causa foveantur. Nam in morbis fientibus, qui causam antecedentem tollit, non propriè curare, sed quod futurum est præcavere & avertere dicitur, ex qua præservatione sequitur custodia naturalis habitus. At curatio morbum tantum respicit, quantum morbi genitum est propriè tollit: quare præservatio in ægris est cum curatione propriè dicta & conservatione: in neutris cum conservatione tantum: sola verò conservatio propriè sanis debetur.

*3. Curatri-
cis munus.*

*Officia me-
dici.*

Officia medici peculiariora sunt sanos conservare, convalescentes reficere, senes fovere, causas morborum præcavere, ægros à morbis liberare sive curare, symptomata omnia mitigare. Verum cum Me-
dicus

dicus minister naturæ sit, ut hæc sua munera exequatur, necesse erit prius cognoscere naturam, causas, differentias & signa omnium eorum, quæ secundum & præter naturam humano corpori insunt, nimirum universa Physiologiæ, Pathologiæ, & Symptomaticæ fundamenta.

Causa efficiens illarum operationum est natura & ars: Nam multa natura sola efficit, multosque morbos curat & causas morificas tollit sine externo auxilio. Multos autem natura citius & facilius expugnat, excitata directa & adjuva idoneis remediis & opera peritorum medicorum. Paucos vero morbos solus medicus curat, parum aut nihil adjutus à natura, ut alibi dictum est. Verum si quid curat & auerit natura incitata, directa & adiuta opera medici, id medico tanquam causæ primo moventi, naturæ ut causæ proximæ erit adscribendum. Nam ut *Galenus lib. 4. Meth. cap.* Morbum omnium iudicio ab illo dicitur curatus, qui vel sustulit impedimenta, propter quæ natura morbum vincere non potuit, vel ipse aliquid medicamenti molitus est. Deinde quicumque recta ratione sanitatem præsentem conservat, & à morbo morificisque causis hominem liberat, sive per mediam naturæ actionem, sive ab ea parum aut nil adiutus, is medicus rectissime dicitur.

Instrumenta per quæ operationes illæ perficiuntur, sunt similia & contraria: nam duo Medicinæ principia sunt, quæcumque humano corpori secundum naturam insunt conservanda esse, quæ præter naturam, tollenda. Conservantur omnia in sua statu similibus, tolluntur & immutantur contrariis. Modus agendi est, cito, tuto, jucunde. Materia illorum instrumentorum triplex est, diæta, pharmacia & cheirurgia. Via & modus inveniendi materias auxiliorum, aut eligendi salubria, evitandi insalubria.

bria

I.

bria, duplex est; ratio five methodus per indicationes: & experientia à sensuum evidentibus: nam cuncta salubria alterutro horum inveniuntur.

*Viamate-
rias inve-
niendi.*

*Opinio Em-
piricorum,
Methodi-
corum &
dogmati-
corum.*

*De via in-
veniendi
materias
remedium.*

Verum Empirici rejecta iudicatione omniumque causarum consideratione, quæ illis incomprehensibiles videntur, solam experientiam & analogisimum ad salubria eligenda & insalubria vitanda sufficere putarunt. Contra Methodici contempta experientia, & neglecta causarum, partium, & facultatum consideratione, solam indicationem, quæ ab ipso morbo & evidentibus communitatibus, sufficere ad curationem iudicarunt. At Medici rationales five dogmatici cum ratione experientiam coniungunt, & causarum tam latentium, quàm evidentium, item signorum partium affectarum & cæterarum rerum naturalium & non naturalium cognitionem, ut alibi dictum est. Juvant enim se mutuo ratio & experientia; & certiores erimus, si quod experientia invenit, comprobet ratio; & quod ratio dictat, confirmat experientia, semperque duobus quævis oculis certius & acutius videbimus quàm uno.

Nam experientia sine ratione temeraria est & fallax, iudicium sine experientia difficile. Utitur itaque rationalis methodo in universalibus, & experientia in singularibus; nam auct. Galenò non licet perfecte medicinam cognoscere, nisi per universalia. Theoremata methodum habueris, & particulatim in ægris curandis te exercueris. Is arte agit, qui non casu & temere ut Empirici, sed certa methodo omnia adhibet, quæ ad sanitatem conservandam vel recuperandam conducere posse perspexit: methodus verò per indicationes fit. Hactenus in genere de propriis medici officiis, nunc de Methodo medendi.

*De Metho-
do meden-
di.*

Methodus medendi hic non sumitur pro modo organico habitu, communi omnibus disciplinis,

ave

sive pro via & ratione cognoscendi, sed pro ipsa rerum salubrium cognitione legitima ratione & ordine procedente, per intentiones & indicationes ad sanitatem conservandam & amissam recuperandam. Ille ordo in arte medica est à nobis notis ad ignota, ita tamen, ut aliud sit primum, aliud secundum & tertium, atque ita deinceps, donec ad id perventum sit, quod quaesitum est. Semper autem quod ultimum est inventu in methodo curativa, id in ipsa curatione est primo peragendum. Sub methodo medendi continetur methodus curativa propriè dicta, & methodus sanitatis tuendæ.

Definitur autem methodus curativa perfecta *Quid methodus curativa.* ratio & ordo inveniendi per intentiones & indicationes certa cuique morbo remedia, gratia sanitatis amissæ restituendæ. Ratio illa & ordo est à primis cōmunissimisque indicantibus & indicationibus ad secundas & subalternas & hinc ad proximas, donec ad maximè speciales appropriatas deventum fuerit.

Remedia, ut supra dictum est, morbo contra. *Quid remedia.* ria sunt, causisque morbisicis: nam contrariorum ea natura est, ut simul & semel in eodem subjecto subsistere nequeant, seseque mutuo pellant. Verùm vocabulo contrarii hic, non solum intelliguntur, quæ manifestis facultatibus inter se pugnant, sed etiam quæ occulta facultate & specifica forma, præterea privantia, & tam ea, quæ ex accidenti & potentiata sunt, quam per se & actu. Finis Medicinæ in quo acquiescit actio, autore Galen. est sanitatis fruitio. Scopus propositum sive intentio, ad quam omnes operationes diriguntur, est ipsa sanitas. Peculiariter tamen in methodo curativa est morbi depulsio & sanitatis introductio. An vero depelli queat, in præsagis dictum est. Nam medici est, teste Hipp. morbos radicitus extirpare aut saltem

CAP.
I.

rem vehementiam eorundem retundere: In iis autem
tem, qui à morbis victi sunt nihil experiri. An vero
victi sint & morbus curabilis & incurabilis sit,
præfagiis colligitur: si morbus curabilis sit, con-
quens erit, ut de mediis consultemus, siue scopos
indicationes curativas compertas habeamus. Con-
sultatio vero Medici non est de fine, an sanate de-
beat sed de mediis tendentibus ad finem, scilicet si pla-
ra sint, per quod omnium optimè? Sin unum, quomodo
modo per id rectissimè, donec ad primam causam
deventum fuerit, ubi incipit curatio. Nam semper
quod in deliberatione est primum, id ultimum
est in curatione. Atque hæc vera methodus cura-
tiva.

*Quid in-
tentiones
& scopi
medici &
quætriples
sint.*

Scopi proposita, siue intentiones agendi, com-
muniter à Galen. vocantur omnia illa, quæ in me-
dium proponuntur, dum consultamus, vel ad agen-
dum nos accingimus: ita dum consultamus de ve-
niæ sectione, scopi, à Galen. dicuntur magnitudo
morbi & virium robur. Verùm propriè scopi curativi
sunt intentiones, quas medici in agendo proponunt
siue cum ad agendum se accingunt, ut sanitatem asse-
quantur.

Hæ intentiones sunt, considerare 1. quid sit a-
gendum, an alterandum, evacuandum, reficiendum
&c. 2. quibus remediis an refrigerantibus, bilem eva-
cuantibus & similibus, item an solidis, an liquidis, 3.
quantum agendum, an multum, an parum ac quomodo
mensura vel gradu. 4. quomodo agendum an sensim
vel confectum, an continenter, vel per vices. 5. quo
tempore potissimum, an statim in initio, an in au-
gmento vel in statu, nam non omnia quovis tempo-
re fieri debent. 6. quo ordine, scilicet quid primo sit
faciendum, quid secundò, quid tertio, & quæ cum aliis
liis, quæ sine aliis. Tandem his addi poterunt loci
& via agendi.

Quia

DE METHODO MEDENDI. 641

CAP.
I.

Qui facultatem habet consequendi hos scopos perfectus Medicus judicatur: Empiricus quidem se experientia assequi putat; Rationalis methodo ex indicationibus sumta, à natura rei in singulis scopis. Est autem Indicatio agendi insinuatio, sive *Indicatio quid.* ratio dirigendi actionem, sejuncta ab experientia, sumta à natura rei sive contemplatione scopi. Nam ex scopis sive intentionibus deliberantis sequitur indicatio, scilicet mediorum electio; proinde quot scopi tot indicationes, & ut scopi alii generales vel speciales, alii simplices vel compositi, ita indicationes: nam tota ratio dirigendi actiones ad scopum consequendum est per indicationem. Definatur autem indicatio comprehensio juvantis cum comprehensione illius cui conferre debet, adveniens citra observationem aut expressam ratiocinationem, gratia sanitatis amissæ restaurandæ. Considerantur in indicatione primum duo, indicans & indicatum, quæ ad se mutuo referuntur, & ex indicante indicatum cognoscitur. Est autem indicans, unde sumitur indicatio, nihil aliud quàm quiddam in corpore secundum aut præter naturam observatum & designatum, cujus gratia aliquid fieri dicitur, quod ei conferre debet: sive omne quod secundum aut præter naturam intellectui manifestum est, ducens ad rei juvantis comprehensionem. Indicatum vero est illud ipsum juvans, sive id quod indicanti congruit, aut consequens agendum gratia sanitatis restaurandæ. Hoc consequens sive juvans ex natura indicantis colligitur: nam debet indicatum ad suum indicans justam proportionem habere; unde percepta natura indicantis, an secundum an præter naturam sit, facile erit absque ulla observatione, sive experientia, aut expressa ratiocinatione unà percipere & comprehendere utile indicatum sive remedium, idquæ ductu duorum principiorum, quod præ-

Quid indicans & indicatum.

I.

ter naturam sui ablationem, quod secundum naturam, conservationem expetit: Conservatur res secundum naturam in suo statu, ut dictum est, similibus, quod à naturali statu recessit, ad naturalem reduci tur contrariis, proinde omne indicatum vel simile vel contrarium erit.

Modus procedendi ab indicantibus ad indicata.

Hic modus procedendi ab indicantibus ad indicata, sine expressa ratiocinatione fit, & tamen ad expressam reduci poterit. Ea ratiocinatio syllogismus factivus est, cujus tota vis, ex duobus principiis dependet: Contraria contrariis curantur, similia similibus conservantur, Assumptio fit ex indicationibus, conclusio ex indicatis. Proinde ipsa indicatio sive processus ab indicante ad indicatum est Enthymema compositum ex antecedente indicante & consequente indicato: Veluti, Plato febricitat, ergo est refrigerandus.

Hujus consequentiae ratione, à Galen. indicatio definitur insinuatio consequentis agendi ex præcedente designato. Indicans omne quatenus ad suum indicatum refertur, rationem effectus habere videtur: nam vel conservari, vel removeri debet, quatenus verò conservatione, vel remotione indiget in corpore, rationem causæ semper acquirit, nam morbus indicationem non præstat, quatenus constitutio præter naturam, sed qua causa actionis læsæ, nec ullum symptoma, quâ symptoma, sed quâ rationem habet nocentis. Ex quibus patet, quod indicare, nihil aliud sit, quàm ex rei natura manifestare, quid propriè unicuique conferat.

Quale debeat esse indicans.

Omne utile indicans primum nobis notum esse debet, deinde permanentiam quandam habere, & pro sua natura unum aliquod certum indicare, nam eorum, quæ actum non sunt, nulla est indicatio. Deinde quidvis de se magis indicare potest, quàm de alio, cum absurdum sit, aliud esse quod cure.

curetur, aliud quod curationem præscribat: proinde si ipsum indicans simplex aut compositum generale aut speciale sit, erit quoque indicatum sive remedium simplex aut compositum generale aut speciale.

Tres præcipui scopi in medicina sunt, ut supra dictum est. Curare, præservare, & conservare. Curatio morbo, præservatio causæ, conservatio facultati debetur. Sublato morbo tolluntur symptomata, quare tres indicationes primæ erunt. *Tres primæ indicationes, præservativa & conservativa, & tria prima Principia indicantia, morbus, causa morbi, & facultas.* Morbus primario causa propter morbum sublationem indicat per contraria, facultas conservationem per similia. Ab his generibus incipere debemus, in methodo curandi & ordine per subalterna ad specifica descendere. Verum indicationes primæ non sufficiunt, nam indicatio, quæ sumitur à morbo, plebeis & brutis nota est, quæ ubi ingentem calorem sentiunt, frigus appetunt, & ubi frigus, ad calorem confugiunt. Atque hic appetitus conservationis naturæ innatus est, ex quo consentanea expetimus, ut aliena removeamus. Verum hæc indicationis pars minima est, & tantum principium, unde procedit medendi ratio, non autem pars artis, non enim satis est scire affectum calidum esse refrigerandum, sed quibus, quantum, quomodo, quando & ubi refrigeratio molienda, ut pro-
*Indican-
tia secun-
daria.*
 sis, nunquam obsis, quæ omnia absque ratiocinatione & consideratione rerum naturalium in humano corpore cognosci nequeunt, inter quas præcipue sunt, temperamentum, & constitutio totius corporis, patusque affectus, consuetudo, ætas & sexus, ær ambiens, symptomata urgentia. Ab his a-
*Indican-
tia secun-
daria.*
 illisque pluribus indicationes sumuntur, quatenus illas primas indicationes promovent vel impediunt. *daria.*
 Indicationes quidem primæ & præcipuæ tres sunt, &

I.

*Coindi-
cantia.**Correpu-
gnantia seu
contrain-
dicantia.*

tria quoque indicantia ut morbi, morbus causa, & facultas, quæ per se primo quid faciendum sit insinuant. Cætera magis, quantum, quomodo, quando, quo ordine & loco singula fieri debeant, ostendunt. Verum quæ id promouent, quod à primo indicante suggeritur non tam indicantia, quàm coindicantia à nonnullis vocantur. Nam coindicantia sunt, quæ non per se, sed per aliud indicant; quæ verò impediunt, quod à primo indicante suggeritur, ea vel contra indicantia vel correpugnantia dici solent, contraindicans autem est, quod per se primo impedit: Correpugnans verò quod secundo, veluti Cacochymia evacuationem indicat, coindicant vires robustæ, consuetudo, &c. Contraindicant vires debiles, correpugnant ætas, sexus, tempus anni, &c. quæ vires fractas demonstrant. Similiter facultas victum indicat, coindicat ætas, temperamentum, quæ quantæ vires sunt declarant. Contraindicat morbi vehementia, correpugnant symptomata consequentia. Ex quibus apparet, unumquodque pro diversa ratione coindicans, repugnans aut contraindicans dici posse, & quod secundum suam essentiam indicans est, in respectu ad aliud nunc prohibens, si vehementius; nunc permittens, si debilius: quare Gal. 2. *Method. cap. 7.* sublata nominum controversia, sine discrimine omnia indicantia vocat, quæ conducunt ad auxiliorum inventionem, siue propter quæ curationem mutare cogimur, talia sunt non solum morbus, sed omnia supra posita. Verum in dissensu vel consensu indicationum illarum 10. *Method.* sufficere existimat. pugnantes indicationes inter se conferre, semperque eam præferre, quæ violentior est & magis urget. Distinguenti ante omnia sunt morbi iam facti à morbis in fieri, qui causam adhuc in motu habent; nam morbis iam genitis curatio tantum debetur, morbis vero in fieri, qui à causa

intecedente soventur, curatio junctâ præservatione. L.
Primum igitur ut methodi ratio exigit de curatione
& indicationibus curativis, deinde de præserva-
tione, ultimò de conservatione & indicatione vita-
liagemus.

C A P. II:

De Indicatione curativa.

Prima maximeque generalis indicatio curativa
autore Gal. 9. *Meth. cap. 14.* est, ipsa contrarietas,
quæ à morbo sumitur, nam sanitati morbus con-
trarius est; mutatio igitur à morbo ad sanitatem, quæ
sanatio dicitur, est per contraria, & morbus semper
genus remedii indicat. Cæteræ indicationes sumtæ
à parte affecta, ab ætate, &c. magis particulares sunt
& mutationis illius mensuram, modum & tempus de-
terminant.

Nam quantitatem remedii sive mensuram
mutationis illius nemo intelligere potest, nisi prius
cognoverit naturam corporis, partisque affectæ
temperamentum; quânto enim morbus à natu-
rali constitutione longius recedit, eò vehe-
mentioribus contrariis sive remediis indiget. Qua-
re quantitatem agendi, veluti in febre quantum
sit refrigerandum, an intense an remisse, indicat
naturale temperamentum corporis, partisque af-
fectæ, facta comparatione cum magnitudine mor-
bi, item situs partis affectæ. Nam inter indicans
& indicatum iusta proportio, quoad fieri queat,
servari debet. Perspecta quantitate agendi, ex do-
ctrina de fac. simpl. & comp. med. materia reme-
diorum deligenda erit: deinde accommodata
materia dosis sive quantitas, differt enim dosis

ss 3 sive

*De indica-
tione cura-
tiva.*

*Primum
indicans est
morbus qui
ostendit*

*quid & quibus
agendum
in curatio-
ne.*

*2. Indican-
tia quanti-
tatem agē-
di in curati-
one.*

sive materiæ remediorum quantitas, à quantitate agendi; verum cum illa recessus morbi à naturalitè temperamento, aut proportio indicantis; & indicati in singulis individuís diversa sit & proinde, & ineffabilis (nam non curatur homo in specie, sed individuum ut Socrates, Plato) definita agendi mensura, & accurata in singulis naturis remediorum quantitas sive dosi, certa scientia comprehendí, aut exactè præscribi nequit, sed sufficit ea actionis quantitas; & remediorum dosi, quæ ab illa proportione insensibiliter recedit, unde Medici triplices doses assignant, medias, infimas. Verum in illa proportione determinanda artificiosa conjectura locum habet, quæ experientia & ratione invenitur. Nam ille Medicus optime curat, qui recta ratione propriam uniuscujusque naturam cognoscit, & in artus operibus exercitatus est.

3. Indicantia
modum agendi.

4. Tempus.

5. Locum &
vias per
quas.

6. Formam
remedii.

7. Ordine
agendi.

Indicatio-

nes à parte
affecta,
quinque.

1. A tempe-
ramento.

Modum agendi sive remediis utendi, indicant dignitas sensus & situs partis affectæ, item vires ægri. Tempora oportuna administrandi remedia, ipsa morborum tempora & præsentia eorum, quæ postulante remedia absentia eorum, quæ impedire possunt. Locum cui debentur remedia & vias, per quas indicat figura & situs partis affectæ. Ipsam remedium formam, situs & forma affectus & partis affectæ: tandem ordinem, quid primum agendum, id quod primæ efficientis causæ rationem habet, aut quod violentissimè urget.

Peculiariter à parte affecta 5. indicationes sunt, nimirum à partis temperamento. 2. ab actione læsa 3. à figura 4. à situ. 5. à sensu. Ac primum à temperamento partis affectæ facta comparatione cum magnitudine morbi indicatur quantitas agendi, & mensura remediorum, ut jam dictum est. Magnitudo autem morbi dignoscitur ex magnitudine propriorum symptomatum; temperatura vero

fero iis, quæ dicta alibi sunt de temperamentis. Item ex ætate, sexu, consuetudine, vitæ exercitio & aliis, ex anni tempore & similibus: à quibus omni-
bus indicationes sumuntur; nam gravius ille semper laborat, cujus naturæ, ætati, consuetudini minus consentaneus est morbus, & vehementioribus et-
quantum iam remediis indiget; igitur ubi senex & juvenis fe-
bre laborat, aut unus natura calidus, alter frigidus;
seni & frigido frigida remedia; juveni verò & natu-
ræ calidæ minus frigida debentur, ut par remedium
in morbo existat, nec multo infirmius aut vehementius;
contrarium fieri debet, ubi frigido morbo juvenis &
senex laborat. Similis ratio in partibus, quæ in natu-
ris: veluti ossa ubi solutione continui laborant, siccio-
ra remedia requirunt, quàm tendines; & tendines sic-
ciora, quàm caro; eademq; ratio est in ætatibus, sexu,
tempore anni, &c.

4. Ab actio-
ne partis.

Ab actione partis, sive officio, indicatur mo-
dus agendi, nam ubi actio partis sibi soli inservit
audacter & confertim alterandum sive evacuandum
erit, tantaque sit remedii vis, quanta morbi poten-
tia. At si functio partis ad vitam necessaria sit, to-
tique communis, quæ multo spiritu & calore nati-
vo indiget: qualis est primario cor, deinde jecur, ven-
tricularius, cerebrum, confertim relaxantibus, discuti-
entibus, aut vacuantibus nunquam utendum, sed
paullatim benigno remedio pars firmanda & rela-
xantibus, aut discutientibus roborantia commif-
cenda, ac corde jecoreque affecto nunquam valide
purgantibus, aut vehementer refrigerantibus uten-
dum.

3. A figura
partis.

Tertiò sub figura partis continetur forma, su-
perficies, deinde cavitates & meatus. Figura autem
& superficies indicat remedii figuram & magnitu-
dinem, nam majora emplastra ventriculus requirit,
quàm jecur, & jecur quàm lien, atque singula pecu-

II.

liari forma, item quæ in vesicam & intestina injiciuntur, liquida esse debent. Meatus veto & cavitates indicant viam modumque agendi, nam ventriculus ob duplices meatus dejectione & vomitu evacuat; intestina, cava jecoris, dejectionibus; gibba jecoris, renes & vesica (quando non nimis copioso humore redundant) urinis: pectus per asperam arteriam, tuſſi.

4. *A situ.*

Quarto situs partis affectæ sub se comprehendit non solum positum in corpore, scilicet an in superficie an in profundo, sed etiam rectitudinem & societatem seu connexionem cum aliis partibus. Positus autem partis indicat, & cui debentur remedia & vim sive mensuram remedii; nam quæ in superficie corporis sunt, levioribus indigent; quæ in interioribus sunt aut longè remota à loco cui medicamenta adhibentur, semper multò valentioribus, quia in itinere de virtutis robore multum perit. Societas vero & rectitudo indicat per quas vias pars evacuada sit: debet enim humor ex affecta parte duci, per vias directas & patentes, ita cava jecoris ob connexionem & societatem cum intestinis per alvum expurgantur; gibba, urinis: similiter dextris partibus laborantibus, locamus venas dextri lateris, &c.

5. *A sensu
parti.*

Tandem sensus acris & hebes partis affectæ vim remedii modumque utendi insinuat, nam pars acuti sensus confertim acris remediis aut validis tentanda non est; sed tutò potius in tempore sive paulatim & cum mora curanda, ne vires dolore resolvantur: at si partis sensus hebes sit, remedia congruentia licet acria & valida facile sustinet, ita ut confertim unoque tempore detergere & erodere tuto liceat. Hæ considerationes sumptæ à natura ægri partisque affectæ, ad certa appropriata remedia invenienda conferunt, & vel prohibent vel promovent id, quod à primò indicante suggeritur. idem quo

quoque faciunt consuetudo, sexus & ætas, quæ indicia sunt præsentis & acquisitii temperamenti, unde metimur recessum morbi: nam in curatione ad illud temperamentum tantum respicere debemus & ad illud reducere, quod corpus eo tempore habuit, quo ægrotate cæpit; ita ætas & consuetudo, quæ auctore Galen. maximam vim habent, tam ad victum instituendum, quam ad curationem, per intercedentem corporis naturam & temperiem indicant. Indicant enim similia & consueta, quia natura gaudet consuetis: unde febricitantibus diæta humida convenit, Item pueris & qui tali victu uti consueverunt, contra senibus & qui siccis alimentis uti consueverunt, magis sicca. Aer ambiens ex eorum numero est, quæ fugere non possumus: ac interdum habet rationem materiæ sanantis, interdum causæ procatarticæ morbum foventis; proinde ubi rationem causæ lædentis, contraria indicat & arte quantum fieri potest alterari debet, aliquando tamen prohibet id, quod à morbo & causa iudicatur, nam ante canem & sub cane difficiles sunt purgationes. Cum aere coniunge cæli statum & regionem. Eadem est ratio in cæteris rebus non naturalibus.

*Indicatio-
nes sumt a
rebus natu-
ralibus &
non natu-
ralibus.*

In curatione igitur primum principaleque indicans, ad quod determinandum cætera considerantur, est morbus, indicat autem simplex morbus simplicia contraria, compositus composita. Tres sunt simplices morbi, intemperies, mala compositio, unitatis solutio. Intemperies autem quælibet sibi contraria in eodem gradu & proportionem requirit; sed si cum materia, ea prius tollenda, omnesque causæ antecedentes, semperque cavendum, ne accidentalis impressio nos decipiat. Tempus refrigerationis temporis calefactionis æquale est, sed calefacere tutius est, quia caliditas naturæ magis amica est; in humectatione & exsiccatione æquale periculum,

*Indicatio-
nes curati-
ve in singu-
lis morbis.
I. In simi-
laribus.*

II.

culum, non æquale tempus, nam siccus affectus tardius & difficilius tollitur, quàm humidus at calida intemperies & frigida minori tempore, quam humida & sicca curatur, sed cum majori periculo.

2. *Indicantia in morbis organicis.*

In morbis organicis indicatio est, per contrariam reducere corpus ad eundem statum, unde recessio facta est, ita dilatatio meatuum, indicat adstringentia; angustia meatuum, dilatantia, veluti obstructio, asperientia, detergentia, &c. lævitas, exasperantia; asperitas lævigantia, aucta magnitudo auctusq; numerus, diminuens, veluti caro excrecens, septicum: Luxatio, repositionem, &c.

3. *In solutione continui.*

Solutio continui indicat proprie uniens, verum cum unio naturæ opus sit, quæ non præstatur, nisi bene habeat subiectum, corpus & natura à nullis impedita sit, oriuntur aliæ indicationes impedimenta causatque nocentes tollentes. In compositis morbis, composita ratio est, ac quoque in implicitis, qui vicinis partibus insident, communesque functiones lædunt. Singulis enim sua remedia adhibenda sunt, idque debito tempore & modo, semperque videndum, quid cum quo, quid sine alio sanari queat, ac ab eo incipiendum, cujus curatio alteri sanando conducit, aliquando plures morbi uno remedio eodem tempore sanari possunt, uti jecoris frigida intemperies & obstructio. Interdum nec eodem tempore nec iisdem remediis, veluti ulcus cavum cum inflammatione, nam prius inflammatio sedatur, deinde cavitas repletur, tandem ulcus consolidatur & cicatrice obducitur: Præterea unius sanatio, alteri sanando non rarò conducit, aliquando alteri incommodat, veluti ubi jecur calido, ventriculus frigido affectu laborat, &c. in huiusmodi casibus utriq; affectui & parti consulendum, sed primum & potissimum ei, quod maximè urget, sive plus periculi minatur.

Ordo servandus in curatione ubi complicati sunt affectus.

Ordo servandus in curatione ubi complicati sunt affectus. Sanari queat, ac ab eo incipiendum, cujus curatio alteri sanando conducit, aliquando plures morbi uno remedio eodem tempore sanari possunt, uti jecoris frigida intemperies & obstructio. Interdum nec eodem tempore nec iisdem remediis, veluti ulcus cavum cum inflammatione, nam prius inflammatio sedatur, deinde cavitas repletur, tandem ulcus consolidatur & cicatrice obducitur: Præterea unius sanatio, alteri sanando non rarò conducit, aliquando alteri incommodat, veluti ubi jecur calido, ventriculus frigido affectu laborat, &c. in huiusmodi casibus utriq; affectui & parti consulendum, sed primum & potissimum ei, quod maximè urget, sive plus periculi minatur.

Urget

DE METHODO MEDENDI. 651 CAP.

II.

Vrgens affectus.

Urget affectus tripliciter, aut magnitudine
 propriæ essentia suæ quæ ex propriis symptomatibus
 agnoscitur, aut ob præstantiam & dignitatem
 partis affectæ sive functionis læsæ; aut ratione fa-
 cultatis totum corpus gubernantis: nam ratione
 essentia intemperies calida in 4. gradu magis urget
 ve periculosior est, quam in 2. item morbus mali-
 gnus, quam benignus: ratione partis ipsiusque
 functionis læsæ eadem affectio, si præstans mem-
 brum lædat, periculosior, quàm si minus præstans.
 Omnium autem affectuum periculosissimus ille est,
 qui principalem sive communem facultatem & vi-
 res totum corpus gubernantes sævissimis symptoma-
 tibus, vehementissimis doloribus, deliquis animi, im-
 modicis evacuationibus & similibus profternit. Nam
 spirituum dissolutio ægrum maxime in discrimen vitæ
 adducit; cum maxima virium dignitas sit, quare pri-
 ma omnium indicatio est, ut viribus laborantib. suc-
 curramus, mitigando symptomata ea; prohibendo
 & corrigendo, quæ substantiam virium alterant &
 dissolvunt, mitigantur autem dolores anodynis, vigi-
 liæ soporiferis, animi deliquia reficientibus, &c. Ve-
 rum hæc indicatio non tam curativa est quàm con-
 servativa; & hoc modo fit extra ordinaria curatio,
 nam ordinaria curandi ratio est, ut causæ prius tollan-
 tur, & priora posterioribus conferant, quod hic non
 semper evenit.

CAPUT III.

*De indicatione præservativa, & con-
 servativa*

Indicatio

CUM autem methodus curativa analytica sit, & præservati-
 va ab effectis ad causas proximas ordine procedat
 donec

III.

donec ad primas devenierit ubi incipit curatio ; post indicationem curativam sequitur præservativa , causa morbi. Verum hic causam morbi non intelligimus formalem aut continentem , nam his curatio debetur ; neque etiam causas procatasticas & regimen sex rerum naturalium , quæ ad conservationem magis referuntur : sed causam internam sive antecedentem potissimum , quæ morbum gignit & fovet , licet cum morbo neque incipiat , neque desinat.

Indicatio à causa antecedente.

nam causa antecedens dicitur , quia morbum antecedit & mutatione sua morbum gignit & fovet , ad quo minus curari queat , prohibet , quare præservativa ipsi convenit. Existit autem causa antecedens in corpore vel sine morbo , quæ ex lassitudine spontanea aliisque signis colligitur , vel cum morbo , morbum augens & fovens , ex priori oritur indicatio nuda præservativa , cujus usus est in methodo Sanitatis tuendæ. Ex posteriori mista indicatio ; partim præservativa , partim curativa , nam curatio morbo debetur , præservatio causæ. Verum cum causa antecedens multiplex sit , pluribusque modis peccare soleat , scilicet secundum substantiam , quantitatem , qualitatem , motum & quietem : Indicatio præservativa appropriata multiplex quoque erit , sed propriè sumi debet , vel à substantia causæ , vel à qualitate , vel à quantitate , vel ab ubi , scilicet à motu & quiete. Si secundum substantiam consideres , causa ea erit humor , vapor , vel solidum corpus , idque per se toto genere præter naturam , ut calculus , vermes , vapores , flatus , &c. aut ex accidenti talis , ut humor aliquis naturalis corruptus , caro putrescens , &c. unicuique indicatio competit : nam pars corrupta separationem , solida contenta in partibus detractionem ; flatus & vapores dissipationem per insensibiles meatus ; humor corruptus evacuationem per sensibiles meatus.

Indicatio sumpta à substantia materia peccantis.

Verum

Verum quia quatuor humores non tam substantia, quam quantitate, qualitate motu & quiete eccant, vitia humorum secundum qualitatem àalen. dicuntur ea Omnia, quæ naturali constitutione adversantur, vel qualitate manifesta scilicet, *Indicatio* *sumpta à* *qualitate* *humoris* *peccantis* *venenatus* *alexipharmacum* *Præterea humor crudus concoctionem requirit, corruptus qui ad benigniorem naturam reduci nequit, evacuationem pro conditione humoris & modo corruptionis, nam purgatio propriè est humorum evacuatio qualitate peccantium. Verùm in putredine si humores in latitudine speciei contineantur, & adhuc putrescant, Phlebotomiam requirunt, qua ad alterius evacuationem putredinis causa evacuetur; si humores actu putridi sunt, & à naturali specie recesserunt, accuratam purificationem.*

Indicatio *sumpta à* *quantitate* *humoris* *redundantis*
Præterea vitiosa quantitas humoribus accidit indicatione defectus vel excessus, defectus indicat re-
taurans scilicet alimenta deficientia: redundantia *quantitate*
vacuans. Evacuans specificum & determinatum *te humo-*
umitur à natura humoris redundantis, à modo *re-* *vis redund-*
ludantia & à parte affecta. Nam primum *redundantis.*
dantia est, vel in prima regione corporis, vel secun-
da, vel in tertia, vel in aliqua regionis parte. Deinde
redundantia vel est sanguinis vel omnium succo-
rum æqualiter se habentium, quæ Plethora dicitur,
vel bilis, pituitæ aut melancholiæ, quæ Cacochy-
mia vocatur. Præterea redundantia illa est vel quoad
vasa, vel quoad vires & quoad vires vel naturales
adum imminet putrefactio, vel animales, quando ad-
est sensus gravitatis, vel vitales quando imminere vi-
detur

detur caloris vitalis extinctio. Omnis plethora indicat remedium sanguinem evacuant, nimirum Phlebotomiam, scarificationem, &c. Nam Phlebotomia propriè est evacuatio humorum quantitate peccantium, at cacochymia indicat purgans appropriatum humoribus redundantibus: nam purgans est evacuatio humorum qualitate peccantium; redundantia in prima regione per superiora, vomitus & per inferiora, dejectione: in secunda, purgans vel sanguinem evacuant aut urinas: in tertia regione & in habitu corporis sudorem provocans. Peculiariter verò redundantia in capite, Erithina & Apophlegmatismos, in pectore, bechica in utero, menses detinentia, &c. Tandem peccat materia in ubi, ratione motus vel quietis. Motus vitiosus materiae aut est diminutus sive imperfectus, aut immodicus sive superfluous; diminutus motus materiae, quando non ratum movetur aut evacuat quantum debet; indicat auxilium adjuvans & perficiens motum, veluti, ubi materia in ventriculo ad os imperfectè movetur, vomitorium; ubi ad alvum, dejectorium, si ad vias urinarias, diuret cum.

*Indicatio
sumpta à
motu hu-
moris pec-
cantis.*

Motus vero immodicus materiae generaliter indicat remedium minuens & compescens motum illum: verum cum motus omnis à termino sive partem mittente ad terminum, sive partem suscipientem, per spatium sive partes intermedias fiat, speciatim quatuor duplex remedium indicatur, nimirum ratione partem mittentis à qua influit in partem affectam, oritur medicamentum revellens: ratione spatii medicamentum intercipient, motum supprimens: ratione partem affectae, ad quam, oritur medicamentum transferens: quod duplex est, unum derivans, à parte affecta, ad vicinas, alterum reprimens.

*Revellen-
tia.*

Est autem revulsio tractio humoris cum impetu jam ruentis ad locum directa oppositum, temo-

tum

um à parte affectum: trahit enim revulsio humores
 d fluxionis originem, sive fontem, ac quod ab a-
 o fluit, eadem qua intercedit via, retrocedere cogit,
 uare pro ratione partis mandantis & recipientis, re-
 alio multis modis fieri solet Instrumenta sunt Phle-
 otomia, cucurbitulæ, fricationes validæ oppositæ
 artis, vincula dolorifica, lotiones calidæ, clysteres
 alidi, vesicatoria & similia veluti in fluxu vehementi
 nguinis per nares, basilicam secamus, artusque va-
 de ligamus, & regioni jecoris cucurbitulas admo-
 nemus: in profluvio menstruorum venas brachii se-
 amus: suppressis menstruis, venas malleoli: humo-
 is in caput ruentes validis clysteribus revellimus.

Medicamenta intercipientia sunt, quæ vias *Intercipi-*
 claudunt, & impediunt, ne humor in partem affe- *entia.*
 am feratur, unde defensiva vocantur, & interme-
 o spacio adhibentur. Derivatio est tractio humo- *Derivati-*
 s à parte affecta ad vicinas; humor ille consistit, *via.*
 el in ipsa parte affecta, sed nondum planè impactus
 t, vel in spacio vicino: derivatur multis modis pro
 utione partis affectæ, veluti quæ in cerebro conti-
 erur, per palatum Apophlegmatismis, per nares
 rrhinis item sectione venæ frontis derivantur: quæ
 intestinis, jecoris cava & liene dejectione expur-
 antur, &c Tandem reprimentia sunt, quæ à parte *Reprimen-*
 affecta humorem tantum repellunt, talia adstrin- *tia.*
 gentia sunt, quæ admodum partibus affectis duplicem
 sum præstant, nam robur partibus illis afferunt, ne
 imis promtè affluxum humorum in se recipiant,
 eade contenta in partibus nondum planè impacta
 xprimuat.

Tempus opportunum revulsionis est, quando *Tempus*
 materia jam influit, scilicet in initiis inflammati *revellen-*
 onum at derivationis quâdo in parte affecta materia *rium deri-*
 ontinetur, nimirum in progressu morbi: vacuato *vantium,*
 corpore, &c.

*Indicatio
à quiete
& situ hu-
moris pec-
cantis.*

*Tempus e-
vacuatio-
nis, quan-
titas &
modus.*

corpore, supra partes affectas intercipientia applicantur; ipsis vero affectus partibus in initio repugnantia, in augmento adstringentia mixta digerentibus, nisi fluxus Criticus sit aut materiæ venenata. Verum in omni aversione humorum cavendum est ne noxius humor per partes principales trahatur. Postremo peccat humor quiete, idque dupliciter, nam primum aut quiescit nondum impactus, qui secundum naturam fluere debet, veluti quando consuetudine evacuatio cessat, per nares, hæmorrhoides, & ex materiæ crassitie, frigidityte, & viarum angustia. Ejusmodi quies indicat remedia morum consuetudinis promoventia, scilicet materiam extenuantia, calefacientia, vias dilatantia. Secundo humor quiescentis substantiæ partis impactus est, ut in tumoribus, indicat remedia, quæ evacuant per ipsam partem affectam. Ea remedia duplicia sunt, nam vel sensibilibus evacuant, qualia sunt abscessus maturantia, aperientia & expurgantia: vel insensibiliter evacuant per poros cutis, nimirum discutientia.

Tempus opportunum in omni evacuatione est ubi materia cocta est, aut turgescit: nam cocta purgare oportet & non cruda, nec in initio morborum nisi turgescant, sive huc sive illuc moveantur; ubi vero in parte materia firma est & fixa, primum concoquenda, deinde expurganda: si in motu adhuc sit, evacuanda, ac à parte affecta revellenda aut transferenda. Quantitas evacuationis pendet ex magnitudine materiæ morbificæ & viribus ægri; verum ipsæ vires non primo evacuationem indicant, sed vel permittunt, vel prohibent id quod à morbo & causa indicatur. Nam si vires validæ sunt & morbus magnus, tantam talemque evacuationem ferant, quantum exigit morbi causa; contra, si validæ non sunt, minorem, aut paulatim & per vices. At si ne hanc quidem ferant, in iis sive contemperatio tantum

tantum molienda est, qua vitiosus humor sensim educitur, & pro eo, quod salubre est, reponitur, nam virium ante omnia ratio habenda est, Cætera de modo, forma, via, cæteris que scopis observandis in evaluatione, ex supra dictis facile intelliguntur, scilicet ex indicationibus sumtis à parte affecta, toto corpore, ab ætate, consuetudine &c.

Hæ sunt præcipuæ indicationes, quæ à causis commununtur. Verum nonnunquam ipsa symptomata rationem causæ habent, nimirum vehemens dolor, vigilæ, animi deliquia, &c. quatenus vires prosterunt vehementerque urgent: sed hæc ratio curandi extraordinaria est, ut jam demonstratum est. Nam ordinata ratio postulat, ut primum causas communissimas tollamus: deinde proximas ordine: tandem ipsum morbum; sublato morbo desinunt symptomata & redit sanitas. Veluti in feбри tertiana, à feбри incipiendo, sunt putredo, prohibita transpiratione, obstructio, postremo redundantia humorum in corpore: quare ordinata curatio requirit, ut redundantiam humorum primo tollamus, deinde obstructionem, & ex obstructione prohibitam transpirationem & putredinem, hinc febrim, nā redundantia & obstructio febrim fovēt & curationem impediunt: quare prius toti deinde parti consulendū. Præterea nulla pars validis remediis subjicienda est non purgato toto corpore. Complicantur interdum morbi inter se cum suis causis, nonnunquam morbus cum symptomate vehementissimè urgente. Primum omnium, si quid vehementissimè urget tollendum, ut jam dictum est, deinde ad causam aut morbum qui causæ rationem habet redeundum, nam in ordinata curatione, à causis incipiendum est, quæ curationem morbi impediunt, sublati causis affectus si in fieri tantum sit, una tollitur; sin factus sit, per se facilius curatur. Plerumque autem morbus

*Quando
sympto
mata in-
dicant.*

*Curatio
ordinaria
& extra
ordinaria.*

T

&

& causa morbifica eadem indicant siue consentiunt remedia, quæ utrumque oppugnant; interdum contraria requirunt, veluti febris putrida, ab obstructi-
one ex crassis lentisque humoribus, &c. in hujus-
modi casibus à causa incipiendum est, & quoad fieri
ri queat, ea medicamenta exhibenda, quæ causam
abscindunt, & morbum non augent: sublata causa
ad morbum deveniendum est, atque hæc operatio
mixta dicitur ex curatione & præservatione.

*Remedio-
rum dele-
ctus.*

In ipsis remediis delectus esse debet, pro ratione
morbi, causæ morbificæ & natura ægri, nam extre-
mis morbis, extrema remedia debentur: veluti in
diæretice victus extreme tenuissimus, scilicet inedia: in
Pharmaceutice valide purgatione: in chirurgis Phle-
botomia ad animi deliquium, sectio, ultio. Quare in
extrema pleuritide, imperanda est inedia, & Phlebo-
tomia ad animi deliquium, ac ubi ad desperationem
inclinat, causticis utendum, latusque aperiendum:
melius enim est anceps experiri remedium, quam
nullum, & melius cum periculo ægros juvare quam
sine ullo remedio emori: Verum ubi tempus permit-
tit, siue in mora periculum non est, & malum vehē-
menter non urget, lente festinandum, tutoque re-
mediis minus violentis utendum habita semper vi-
rium ratione, quarum maxima dignitas est. Nam ip-
sa vita constat ex virium custodia.

*3. l. dica-
tio conser-
vativa.*

Quare superest, ut de indicatione vitali siue
conservativa, quæ viribus debetur, nunc demum a-
gamus: indicant autem vires per se conservationem
quæ similibus perficitur, secundario id permittunt
vel prohibent, quod morbus aut morbifica causa
insinuat, indicant autem vires similia, ut jam dictum
est, similia illa sunt, quæ virium substantiam refici-
unt siue nutriunt, igitur alimentum victusque ratio-
nem propriissime dictam virtus primo indicat, se-
cundario morbo, quatenus id permittit vel prohibet
quod

quod virtus dicat. Considerantur in victus ratione
 quinque, forma, quantitas, qualitas, modus, tem-
 pus. Forma victus hic sumitur pro ipsius alimenti ad *Forma*
 nutriendum seu vires reficiendas efficaciam, quæ æ- *victus.*
 qualis, maior, aut minor est, quam vires postulant,
 & quam id, quod de substantia corporis deperditum
 est; unde victus ratio triplex statuitur, una exactè ple-
 na, quando substantiæ corporis & virium plus appo-
 nitur, quam deperditum est; alia simpliciter plena ubi
 tantum apponitur, quantum deperditum est; tertia
 tenuis, ubi minus apponitur, & substantia virium di-
 minuitur; tenuis verò dividitur simpliciter tenuem, &
 tenuissimam, ut infra latius dicetur. Subsistunt autem *Materia*
 vires in partibus viventibus, & authore Gal. II. *Me tho-*
victus.
 di triplici substantia complentur, spirituosam, carnosa
 & spermatica solidam. Nam fundentur seu radican-
 tur in temperamento partium solidarum & carnosa-
 rum, sed non exercentur, nec actiones suas perficiunt,
 sine debita quantitate & qualitate spirituum calorisq;
 nativi. Quælibet harum sui custodiam indicat pro sua
 substantia quantitate & qualitate nam si virtus de-
 ficere incipiat ratione spirituum, quod confertim ac-
 cidere solet, indicat reficiens spirituosum scilicet. tenue
 aereum humidum, quale est vinum & liquida fragran-
 tia. Sin ratione substantiæ solidæ, ut in phthisicis ali-
 mentum crassum & solidum, ut caro caponis, canero-
 rum, viruli, &c. sin ratione carnosæ, alimentum mediæ
 constitutionis. Deinde quantitas victus propriè su- *Quantitas*
 matur pro copia majori aut minore alimenti sub qua- *victus.*
 cunq; victus forma; æstimanda autem erit ea quantitas,
 prout virtus magis minusq; indiget & morbus per-
 mittit vel prohibet Nam autore Hipp. I. aph. 10. nor-
 ma victus in ægris est extremus vigor morbi, quo tem-
 pore tenuissimo victu utendum erit in comparatione
 ad alia tempora. Morbi autem alii acuti, alii longi.
 Deinde acutorum variae sunt differentiae, in omnibus

tantum exhibendum, quantum odus erit, ut æger a statu
statum morbi deveniat; si per inediam, ut in exquisito
re peracutis, ea utendum; alioqui potius in excessu
quàm defectu peccandum, quia excessum ægri facilius
ferunt: in minus acutis affectibus pleniori victu
utendum, & semper tantum exhibendum, quantum
postulant vires, & permittit morbus.

*Qualitas
victus.*

Qualitas victus morbo & causæ morbificæ
contraria esse debet, sed temperamento, ætati, corpore
suetudini similis, unde Hipp. 1. Aph. febricitanti victus
ctus humidus convenit; item pueris & qui tali victu
uti consueverunt. Ubi verò morbus cum tempera-
mento, ætate, & consuetudine pugnat, morbo occu-
rrendum, & aliquid naturæ, ætati, & consuetudi-
ni tribuendum.

Modus.

Quomodo autem sit cibandum, an sæpè ve-
raro, an multum vel parum, indicatur ex ipsa indi-
gentiæ & virium magnitudine, habita ratione mor-
bi; nam ubi magna utilis alimenti indigentia est &
vires debiles sunt, parum sæpèque nutriendum, si
corpus utili succo abundat, parum raroque. Contra-
rium faciendum, ubi vires robustæ sunt cum humo-
rum defectu: ubi verò redundat vitiosorum humo-
rum copia, iis alimentis utendum, quæ & vires re-
ficiunt & humores contemperant. Verum in his o-
mnibus aliquid dandum est ætati, regioni, con-
suetudini & tempori anni.

*Tempus
cibandi.*

Tandem tempus opportunum cibandi ægrum,
est ea hora, qua cibum facillimè sustinere potest, aut
hora consueta sanitatis, facillimè sustinet cibum,
quando à morbo minus gravatur. Proinde in inter-
mittentibus tempus aptissimum cibus est, declinatio,
aut quod longissimè recedit à paroxysmorum incur-
su. In continuis vero hora minoris afflictionis, nisi
vires vehementissimè urgeant, nam in accessionibus
cibum præbere noxium est.

DE

*De differentia Medicamentorum & alimen-
torum, deque facultatibus me-
dicamentorum, earumque
causis in genere.*

CUM omnia instrumenta, quibus ars medica
utitur sive ad curandum, sive ad sanitatem hu-
mani corporis conservandam, sub triplici ge-
nere comprehendantur, Medicamento, Dieta, &
Chirurgia: Deinde medicamentorum considera-
tio latè pateat & perplexa sit: De natura & facultati-
bus medicamentorum primum agemus.

*Instrumenta medica-
ria.*

Medicamentum & nutrimentum in relatione
quadam ad corpus animatum dicuntur, sed modo
& ratione diversâ. Nam nutrimentum dicitur, qua-
tenus in substantiam corporis animati convertitur,
id est, nutrit & auget. Pharmacum verò, quatenus
à statu non naturali immutat: sive quatenus cor-
pus curatur. Communiter tamen vocabulo *Pharmacum*
apud Græcos, & medicamenti apud Latinos, non so-
lùm morborum remedia, sed etiam venena, & pig-
menta continentur.

*Quid medi-
camentum
& alimen-
tum?*

Propriè verò medicamenta vocantur, quæ in-
stã vi corpus humanum alterant, sed non corrup-
punt. Venena verò, quæ suâ naturâ & alterant &
corrumpunt. Alimenta, quæ à corpore nostro alte-
rantur, & in substantiam corporis convertuntur,
sive perfectè ei assimilantur. Alterant autem medi-
camenta propriè dicta corpus humanum à non na-
turali statu ad naturalem, sumto mutationis initio à
nostro calore. Venena verò non solum corpus alte-

*Discrimen
Medicamen-
torum, Ve-
nenorum
Alimento-
rum.*

II.

rant à statu naturali, sed etiam substantiam ejus corrumpunt, & calorem nativum evertunt. Quare natura nutrimentorum plurimum discrepant venena, & inter alimenta & venena media quodammodo sunt medicamenta. Nam alimentum est quod substantiam nostri corporis reficit, & potentia passiva præditum est, per accidens verò alterat. Nutritur & reficitur omne, sibi convenienti alimentum. Quare inter nutrimentum, & quod nutritur, similitudo quædam substantiæ esse debet: sicut inter venenum, & id cujus est venenum substantiæ dissimilitudo: Verum in venenis omnibus eadem proprius dissimilitudo, nec in alimentis similitudo est, sed in aliis alimentis major, in aliis minor: unde, ut nutrant, alia majori, alia minori mutatione indigent.

*Alimenta
duplicita.*

Proinde tam alimenta, quàm venena duplicita erunt: Alia enim sunt nutrimenta, quæ corpore nostro assimilantur, & dum concoquuntur nullam manifestam qualitate corpus alterant, quæ absolute alimenta vocantur. Alia quæ & manifestè agunt & patiuntur aliquid, sed temporis spacio vincuntur, & perfecte assimilantur: quæ absolute nec medicamenta, nec alimenta vocantur, sed alimenta medicamento-fa, aut medicamenta alimentosa. Nam dum à calore nostro concoquuntur, qualitate suam corpus nostrum non aliter alterant, quàm medicamenta: at peractam concoctione assimilantur, & in substantiam corporis convertuntur, ut alimenta: igitur & potentia activa & passiva prædita sunt. Horum magna est varietas, pro ut alia magis, alia minus agunt, aut patiuntur à corpore nostro.

*Venena du-
plicita.*

Similiter *δηλητῆρα* sive venena alia sunt, quæ nullam substantiæ suæ parte mutata, corpus humanum caloremque nativum vincunt, atque ad eum ferè modum mutant, quo ipsum cibos, veluti venenum

um viperæ & scorpionis, aconitum, &c. Hæc nisi subito expellantur, & cum excrementis prius excernantur, aut cibis aliisque conferentibus misceantur, & parva etiam quantitate lædunt, longo tempore postquam assumpta sunt, interimunt. Itaque deleteria totâ suâ naturâ dicuntur, & alimentis propriissimè dictis maximè opponuntur. Alia verò sunt, quæ à calore nostro initium mutationis accipiunt, & inde in multifarias mutationes vertuntur, quibus corrumpi nostram naturâ contingit: Quæ deleteria non totâ substantiâ, sed quantitate dicuntur, quia assumpta parvâ quantitate, aut conferentibus mixta sæpè prosunt: unde nunc medicamenta, nunc venena dicuntur. In horum numero est opium, aliaque stupefacientia; quæ longo tempore postquam assumpta sunt, nunquam interimunt: item nonnulla electiva purgantia, ut helleborus alb. elaterium, &c. quæ non interficiunt, nisi modum excesserint. Cætera de venenis suo loco proponemus.

Hinc manifestum est, Medicamentum propriissimè dictum, ut à venenis & alimentis distinguitur, esse, quod initium à calore nostro accipiens, corpus humanum immutat, sed nec corrumpit nec nutrit. At in communi significatione, ut comprehendit venena, & alimenta medicamentosa, esse, quicquid corpus humanum infirâ facultate alterare potest. Cum autem omnia corpora animata unius naturæ, aut temperamenti non sint: & inter agens & patiens, scilicet medicamentum, & id cuius est medicamentum, nutritum & nutriens, certa proportio esse debeat: fit ut quæ homini, eadem cæteris animalibus alimenta & medicamenta non sint: imò ut quædam homini sint venena, (ut cicuta) quæ aliis nonnullis alimentis, (ut sturno.)

*Definitio
medicamenti.*

De facultatibus medicamentorum.

His definitis & determinatis in genere consequens est, ut facultates medicamentorum secundum

T t 4 quas

IV.

quas agunt, cognoscamus. Agit quidem medicamentum omne ut formæ suæ substantialis, (nam omnis actio fit à forma) sed mediante facultate, siue qualitate suâ, sine quâ nulla forma corporea efficere potest. Quare in medicamenti efficacia agendi facultati, ut causæ proximæ semper debetur: in quolibet medicamento tot facultates sunt, quod diversæ actionum causæ: cum facultas medicamenti propriè sit causa proxima actionum. Verùm facultas per se considerata qualitas est, consequens essentiam rei: quatenus verò ad actionem refertur causa quædam effectrix vocatur, quâ mediante agit in determinatum corpus. Proinde & medicamentum, & facultas medicamenti, ad aliquid dicitur ac à propria sua facultate medicamentum denominatur.

*Qualitates
ali. actu, a-
lia potètia.*

Insunt autem qualitates, quibus agit medicamentum & à quibus denominatur, vel actu vel potètiâ. Actû, quando id ipsum quod esse dicitur nunc, aut actu absoluto est, ut ignis actu calidus, glacies frigida est: nam quod actu dicitur esse, id præsens & perfectum est. Potentiâ verò, quando id ipsum quod esse dicitur, nondum est, sed potest evadere, si exhibeatur vel corpori nostro admoveatur, leviter immutatum à nostro calore: ita pipera dicitur calidum, & lactuca frigida, licet actu talia non sunt. Nihilominus à Galeno; de temperamentis caporissimum medicamenta vocantur, quæ potestate talia sunt: potestate autem talia hic dicimus, non quia suo naturali impetu ad absolutionem perveniunt, sicut avem à primo ortu volatilem vocamus: nec quemadmodum quorum propinqua est materia, & facilè transmutantur, ut sanguinem potètiâ carnem, aut siccos calamos ignem: sed quia pro sua natura & varia commixtione insitas viros habent, quas actu non exerunt; nec exercere possunt, nisi

si à calore nostro aliquo modo immutentur, sub-
iunguntur, impedimenta; tollantur. Verum ea altera-
tione calor noster medicamenti nullas peculiares vi-
res impertit, sed proprias insitasque detegit: ac medi-
camentum vicissim, primum calori nostro aliquo
modo resistit, deinde leviter mutatum, vires la-
tentes exprimit, & in actum perfectum transit,
corpusque humanum pro sua natura alterat. Non
nimis medicamenta potentiâ passivâ, sed activâ defi-
niuntur, nec calidum ullum dicitur, quia à calore
nostro initium mutationis habet, facileque calorem
accipit, sed quia suâ naturâ calefacit: nec frigidum,
quia difficulter à calore superatur, facileque refrige-
ratur, sed quia insitâ vi refrigerat. Proinde ut me-
dicamentum vi insitâ in corpus nostrum agat, & à
potentia in actum deducatur, id primum à calore no-
stro accipit, verum non subito sed aliqua temporis
mora. Deinde ut ligna citius vertuntur in ignem, quò
ficciora gracilioraq; fuerint, ita medicamenta in ten-
niores partes fracta, à calore nostro citius in actum
deducuntur. Considerantur autem à medico faculta-
tes cujusque medicamenti non absolutè, ut in sua natu-
ra medicamentum est, sed ad hominem comparatum
& prout in hominem, non in aliud agere potest. Igitur
quæcunque hominem temperatum, per se calefaci-
unt, refrigerant; adstringunt, relaxant. &c. ea per se
(à Medicis,) calida, frigida; adstringentia, relaxantia,
&c. dicuntur.

Dico per se, ut removeantur semper ea, quæ
per accidens; nam quæ per se alterant, vi propriâ,
immediatè sine alterius alicujus interventu id a-
gunt: quæ per accidens, non suâ vi, immediatè, sed
alterius tantum effectus interventu: ita aqua frigi-
da per se refrigerat; at liberaliter affusa juveni robu-
sto, ætate mediâ, laboranti tetano, ex accidente ca-
lorem adauget: nimirum quia condensando poros

Tt s cutis

*Facultas a-
lia per se alia
per accidens.*

I V.

curis, calorem intro coercet. Igitur omne quod facultate aliquid esse dicitur, id per se est: cui opponitur id, quod ex accidente.

*Differentia
facultatis.*

Cum igitur facultates medicamentorum sin-
proximæ omnium actionum causæ, ex effectibus
merito & intelliguntur & distinguuntur. Ex effe-
ctibus autem quatuor facultates medicamentorum
deprehenduntur: quarum alix temperamentum
alix formam substantialem medicamenti consequun-
tur. Quæ autem à temperamento promanant, qui-
operationum causæ evidentes sunt, qualitates au-
facultates manifestæ vocantur: quæ verò à forma
substantiali, qualitates occultæ, aut à tota substan-
tia. Illæ ex effectuum ordine & differentia, ut à tem-
peramento promanant, triplices esse deprehendun-
tur: nimirum primæ, secundæ & tertiæ, ut latius infra
apparebit.

*Opiniones
Medicorum
de differen-
tia faculta-
tum.*

Verùm de his facultatibus, non una est omni-
um medicorum opinio. Alii enim occultas facul-
tates prorsus negant, omnesque actiones à manifestis
& sub sensum venientibus qualitatibus fieri putant
& profluere à primis qualitatibus, quæ determinata

*I opinio
omnes vires
à primis
qualitati-
bus oriri.*

sunt elementorum causæ, & eorum quæ ex elementis
componuntur: cum omnis actio per motum fiat & à
contrario in contrarium, quod in qualitatibus evi-
dentibus tantum locum habet.

*2. Opinio est
Empirico-
rum.*

Altera opinio huic planè contraria est, scilicet
veterum Empiricorum. Nam Empirici, cum
etiam medicamentorum facultates nobis occultas ef-
se voluerunt, & quales sint solâ experienciâ & usu
constare, & definiti non debere effectibus prima-
rum qualitarum. Unde Pelops Empiricus, præce-
ptor Galeni, medicos rationales ridere solitus fuit,
quod semper in ore vocabula calidi, frigidi; humi-
di, sicci; haberent, quibus balneatores quoque utun-
tur.

Ab

Ab hac opinione in multis discrepat Paracelsus, qui rejectis qualitatibus evidentibus vires consubstantiales excogitavit. Opinantur enim paracelsi vires medicamentorum adscribendas non qualitatibus evidentibus, sed ipsi substantiæ, viribusque arcanis, quæ sensibus obviæ non sunt. Nam qualitates manifestas per se steriles signaturas, sive rellolatas qualitates appellant, & accidentia innata soli corporis medicamenti & non alterius gratia, ut frigiditas in glacie, caliditas in igne, in quibus nulla confluentia est cum astris morborum, nec ulla vis curandi: Facultatem verò consubstantialem medicamenti esse arcanum aut Cherionium naturæ, sive vim tincturâ seminali præditam, in qua scientia & prædestinatio sanationis viget: hanc confluentiam cum morbo habere. Ac proinde medicamenta huiusmodi arcanis & occultis viribus efficacia esse, sicut astra efficacia sunt movendis his inferioribus. Deinde cum morbi sint naturæ Cherionis in corpore sine destructione trium principiorum, medicamenta Cherionia ordinanda esse, quorum vires corpora sua deserunt & in naturam ægri spiritumque vitæ vergunt, & morbis liberant, ut frigiditas non simplex innata, sed externa qualis in camphora, quæ in substantia suarum primarum calida permanset, ut sulphur licet ægrum refrigeret præsentaneumque remedium sit inflaturis juxta Paracelsum lib. 2. de gradibus. cap. 3. Deinde quemadmodum vires consubstantiales, ita morbos quoque consubstantiales esse statuunt: sulphureos, tartarcos, scammoniatos, &c. quorum semina consistunt in his impuritatibus adhærentib. balsamo microcosmi. Quibus opposita sunt medicamenta substantiæ ratione arcanisq; virtutibus, trium principiorum, in vegetabilibus, animalibus & mineralibus: quorum maximè proprium est, impuritates illas balsamo humano adhærentes separare & diff.

IV.

diffipare, ac balsamum ipsum conservare. Ad has vires non sensu sed mente penetrare licet, & artificioso resolutione & præparatione, quibus cruda concoquantur, vitiosa corriguntur, aliena & impura nullo seminali tincturâ prædita, separantur.

4. *Opinio:*

*vires alias
à qualitati-
bus primis
profluere,
alias à tota
substantia,*

Postrema opinio eorum est, qui vires medicamentorum alias occultas, alias manifestas sensibusque evidentes esse putant. Et quanquam omnis actio à forma substantiali producatur, tamen illarum virium duas proximas causas assignant, ut supra diximus: vnam ipsam medicamenti formam essentialem, alteram *negotiorum*. Proficiscuntur enim vires illæ occultæ & specificæ immediatè à forma essentiali, sive à tota substantia, quam Galenus interdum totum temperamentum vocat: & non sensibus aut ratione, sed solâ experientiâ deprehenduntur. Aliæ vires manifestæ, id est, potentiæ materiales, à temperamento immediatè promanant, ac certâ elementorum mixtura definiuntur, sed determinante a efficiente formâ substantiali. Forma autem substantialis primum præcipuumq; operationis principium simplex est, sibiq; semper similis. Temperamentum verò, instrumentum formæ magis aut minus sufficit, nec omnes actiones immediatè producit; cum actiones quædam specificæ sint, quæ qualitatibus evidentibus nullo modo attribuantur: Licet negari nequeat, vires illas occultas juvari à qualitatibus manifestis, ut in calefactione succini apparet quod calefactum paleas attrahat.

*Examinā-
tur opinio-
nes.*

Hæc media opinio, rationi & experientiæ maximè consentanea videtur: Nam juxta priorem illam opinionem, non solùm cum Empedocle, causæ instrumentales pro principalibus assumuntur, sed etiam qualitatibus evidentibus ea vis tribuitur quæ ultra naturam earum est, & nulli nisi formæ essentiali debetur: cum nihil ultra suam speciem a-

gat

t, & agens effectum sibi proportionalem in mate-
 riam introducat. Nam operationes admirabiles & oc-
 ultæ, demonstrant causas earum non esse eviden-
 tes, sed ipsas formas essentielles: non quod formæ
 in invicem sint contrariæ, sed quod principia sint
 contrarias actiones perpetrandas, aut fundamen-
 talem actionem, in quibus ratio contrarietatis funda-
 ta. Verum medicamenta actionis suæ initium ab
 aëre corpore accipiunt, viresque suas medicinales
 suscitatas a calore nativo primum exerunt, & in
 naturam spiritumque vitæ distribuunt, tandemque
 actu naturæ morbos depellunt, quod per Cherio-
 num suum Paracelsus denotare videtur. Attamen à
 cherionio propriè dicto, quod ex complexione ca-
 lida aut frigidum est, distinguit ap. 2. lib. 3. de gra-
 dibus, quintam essentiam sive accidens elemen-
 tare, id est, specificam formam secundum veteres:
 quinta autem essentia ab ipso dicitur, quia in tri-
 bus primis quatuor essentiæ delitescunt, cujus na-
 tura nec calida, nec frigida est, & citra complexio-
 nem firmam sanitatem introducit, sub qua conti-
 geri videntur Arcana Specifica, viresque astrales sive
 planetares. Deinde ipsæ contrariæ qualitates in
 his alterationibus modum servare nequeunt, nec
 illud determinatum effectum producant, nisi qua-
 tenus à forma diriguntur. Unde Paracelsus tot
 res medicamentorum specificæ, seminali tinctura
 præditæ, quot substantiæ aut species vegetabilium,
 mineralium, & mineralium: rejectis eorum qualita-
 tibus, quas tamen re ipsa non rejiciunt, nec rejicere
 possunt, ut ex variis scriptis Paracelsi apparet, potis-
 mum libris de Gradibus & Compositis: Recepto-
 rum, ubi de frigidis & calidis cherioniis eorumque
 gradibus agit. Nam omnem vim evidentibus quali-
 tatibus adimere, & ad specificæ & arcana tantum
 confugere, est non solum cum ignis pugnare,
 sed

*Examina-
 tur opinio
 Paracelsi.*

sed etiam citra necessitatem plerumque ignotum per
ignotius declarare: non enim in rebus evidentibus
vel balneatorum iudicium medicum contemneretur
debet. Manifestum est, omnibus aut plerisque medi-
dicamentis simplicibus, sub una forma diversas sub-
stantias inesse, pluribus aliquando contrariis quali-
tatibus præditas, in quas velut in parres dissolvitur
ut in rhabarbaro apparet. In qua dissolutione ex-
cellitars Chymica, medico minimè negligenda: quæ
partes viribus diversis, aut contrariis præditæ se-
runtur, pura ab impuris, salutaria à non salutaribus
segregantur, omniaque debite in usum medicæ præ-
parantur. Verùm in ea præparatione potentia essen-
tialis à sua substantia non separatur, sed tenuiores
interdum efficaciores substantiæ partes: cum nihil
separabile sit nisi substantia. Nec etiam ipsa separa-
tio vires medicamentorum detegit, sed experientia
& ratio, ut suo loco apparebit.

CAPUT V.

*De Primis Facultatibus Medicamentorum
in specie, & quomodo ex primis Se-
cundæ & Tertiæ oriantur.*

*De primis
facultati-
bus.*

*Medica-
mentum,
tempera-
tū, intem-
peratum.*

HIS declaratis, restat ut singulas medicamentorum
facultates in specie proponamus. Ad pri-
mū, cum medicamenta sint composita ex ca-
lido, frigido, humido & sicco; æqualiter contem-
peratis, ita ut una qualitas alteram non excedat: ve-
inæqualiter temperatis, ubi una aut duæ cætera
vincunt. Igitur medicamentum aut tempera-
tum erit aut intemperatum. Temperatum aut in-
temperatum dicimus non absolute, sed compa-
ratione

ione facta ad corpus humanum: non quod ul-
 medicamenti temperatura eadem sit cum hu-
 na, nam temperatura hominis non nisi humano
 corpori debetur: Verum temperatum hic vocamus,
 vel assumptum, vel admotum corpori humano
 temperato, calorem, aut naturalem ejus humidita-
 tem, nec auget nec minuit, ac proinde quo ad sen-
 sitivum non qualitatibus similibus præditum est. Nihilomi-
 nus quæ qualitate totiusque substantiæ similitudine
 humano corpori conveniunt, non medicamenta,
 sed alimenta dicuntur: quare melius temperatum
 medicamenti, intemperatum medicamenti tribuitur.

Verum cum de nulla materia certa ars consti-
 queat, sine norma aut regula, ad quam omnis
 equalitatis ratio dirigitur & mensuratur: necesse
 quoque erit in medicamenti medium aliquod, id
 temperatum statuere, ad quod medici respicien-
 tes, omnia intemperata, omniumque medicamen-
 tum vires examinare, & in certo gradu collocare
 debeant.

Deinde cum in qualibet specie, peculiariter
 humana, detur temperatum & intemperatum,
 necesse erit in medicamenti, idem contingere com-
 paratione scilicet permutationis, quam à nostro
 corpore suscipiunt. Verum alia temperata dicuntur,
 omnibus qualitatibus, ut oleum, cera, adianthum.
 Alia in caliditate & frigiditate temperata sunt, quæ
 manifestè vel humedant, ut glycyrrhiza, vel exsic-
 cant, ut mastiche.

Alia contrà siccitate & humiditate temperata
 sunt, quæ calefaciunt, ut sem. lini vel refrigerant, ut
 semper vivum, quod valide refrigerat, sed nihil aut
 modicè exsiccat.

Intemperatum medicamentum vocamus, Intempe-
 ratum quod assumptum aut admotum corpori humano ratū quid
 est.

*Norma
 temperati
 & intempe-
 ratū.*

V.
*& quotu-
 plex.*

temperato, calorem aut humiditatem ejus auget vel minuit. Quod autem auget caliditatem corporis temperati, calidum, quod minuit frigidum; quod auget humiditatem humidum, quod minuit in edimentum siccum vocatur. Proinde medicamentum intemperatum erit quadruplex, & quatuor facultates primæ, quæ assimilantur virtutibus elementarum, & mixtionem consequuntur: scilicet caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas. His prima debetur actio, licet pro varia sua intentione, deinde pro modis substantiæ suæ, effectus dissimiles producant. Incumbunt autem corpora calida, frigida; humida & siccata; vel absolute, ut elementa, vel per excessum, vel symmetrum sui generis aut speciei, vel ad quod obuium collatum, ut de temperamentis dictum est. Verum hoc loco talia dicuntur ad symmetrum humanæ speciei, id est, ad hominum optimè temperatum collata, quem mensuram statuimus omnium eorum, quæ ad hunc modum dicuntur. Eadem est ratio in duro, molli; cæteris secundis qualitatibus.

*In singulis
 facultati-
 bus qua-
 tuor gra-
 dua.*

Nam omnium calidorum, frigidorum, & humidorum una vis aut æquè valida facultas non est, sed alia magis, alia minus nos alterant. Proinde ex affectibus & recessu à temperato, quatuor ordines sive gradus singulos medicamentorum facultatibus medici assignant; nam primus gradus vocatur primus recessus à temperato, ubi obscure aut non nimis manifestè medicamentum corpus temperatum alterat. Secundus gradus est, secundus recessus, quando manifestè quidem, sed citra noxam agit.

Tertius gradus est tertius recessus, quando vehementer, non citra noxam aliquam corpus temperatum immutat. Quartus gradus est summus recessus, quando vehementissimè & gravissima cum noxa corpus alterat vel corrumpit.

Verum

DE MEDICAM. FACULT.

673

CAP.

V.

Verum cum in singulis gradibus intensio & remissio sit, & satis magna latitudo: cum omnia secundum gradum calida aut frigida; non æquè nos calefiunt aut refrigerant: igitur medici eam latitudinem in tres mansiones, aut partes dividunt: scilicet principium, medium, & finem. Nam quæ in principio sunt, remissius, quæ in medio vehementius, quæ in fine vehementissimè agunt. Considerantur quidem quatuor gradus eorumque mansiones, cæteris quoque medicamentorum facultatibus, præcipuè in secundis & tertiis: verum evidentissimè in primis deprehenduntur, quæ causa cundarum & tertiarum: licet in calidis & frigidis agis accuratè, quam in siccis, & in his omnibus agis, quam in humidis. Nam cum humiditas omni-
ni qualitatū minimè activa sit, fieri nequit, ut cum gravissima noxa corpus humanum afficiat, id est, quartum gradum perfectè attingat. Deinde cum calitas omnium qualitatū efficacissima sit: fieri nequit, ut vehementissimè calida sint humida. Verum nullum quarto gradu desiccatur, quod non urit: atteritur ordine complura desiccant quæ vehementer, ad-
tingunt, frigidaque sunt, ut galla omphacitis.

In quolibet gradus tres mansiones & partes.

Deinde modus substantiæ medicamenti triplex est: Nam medicamenta alia dicuntur tenuis essentia aut substantiæ, alia crassæ, alia mediocris. Tenuis substantiæ sunt, quæ celeriter in partes res solvuntur, sive promptè facileque sese in corpus & strum & humores inferunt & insinuant. Crassæ autem contra, quæ substantiam corporis aut humorum non penetrant, sed hærent & subsistunt. Mediocris, quæ medio modo se habent.

Differentia medicamentorum ex modo substantiæ

Secundæ qualitates communiter dicuntur, De secundis. quæ à primis promanant, & actiones primarum consequuntur. Consequuntur autem primas tactiles sunt.

V u

in

V.

*Triplises
qualitates
consequun-
tur primas.*

in mixtis, triplices qualitates: quarum alia passiva dici merentur, quia certa potentia aut impotentia tantum definiuntur, quibus intelliguntur subiectis iis prædita apta vel inepta esse, ut aliquid patiantur non agant: qualia sunt, quæ ab *Aristot. 4. Meteor. cap. 8. § 9*, enumerantur: Scilicet *τηκτὸν*, *ἄτηκτον*; *μαλακτὸν*, *ἀμαλακτὸν*; *πηκτὸν*, *ἄπηκτον*; *ῥιζὸν*, *ἀῤῥιζον*; *τμητὸν*, *ἀτμητον*; *καυστὸν*, *ἀκαυστὸν* &c. Deinde consequuntur primas tactiles qualitates, præter colores, odores, sapes, cæteræ tactiles qualitates, ut durities; mollities; tenuitas, crassitudo; tensio, laxitas; asperitas, levitas; visciditas, friabilitas, item raritas, densitas; plenitudo, vacuitas &c. Quorum omnium respectu propria sensoria tantum afficiuntur, & non cæteræ partes corpori, nam per se vi alterandi prædita non sunt, sed mollities, durities; tenuitas, crassities; & similes qualitates, tantum termini sunt alterationum, quibus intelligitur subiectum iis præditum non agere, sed aliquid jam perpeßsum esse: aut habitus sive affectus sunt actu existentes, quibus distinguuntur omnia similia corpora. Hæ à prioribus illis, quas passiva vocavimus, distinguuntur, ut id quod actu & posterius, ab eo quod potentia & prius: nam quod indurabile est, id actu durum non est, sed molle, potest tamen quatenus induxabile, durum facile evadere. Tertio consequuntur primas, quæ viribus primatum agunt, & activæ dicuntur, ac potentia activæ definiuntur: quia subiectum iis præditum agere est, ut certo & determinato modo in aliud agat: nimirum ut subiectum habile à suo statu in contrarium alteret. Status autem illi sunt qualitates, quas habitus subiecti, & terminos alterationem supra vocavimus: durities, mollities; raritas, &c. Habile vero est subiectum, præditum potentia passiva: sci-

licet

et indurabile, extenuabile, sive quod ex molli, durum; ex crasso, tenue fieri queat, &c. Igitur emolliens, quod corpus durum molle reddit, extenuans, quod crassum tenue, &c. secundæ facultates medicamentorum tantum dicuntur; Cæteræ qualitates minus propriè. Verùm ut omnis motus à contrario contrarium sit; & omne agens in relatione ad suum patiens dicitur, ac ab effectu denominatur: ita in his activis qualitatibus earumque alterationibus venit, ac proinde, ex prioribus intelliguntur & distinguuntur. Alterationes verò harum qualitarum, scilicet induratio, extenuatio & similia, in patiente affectiones & passiones subjectorum appellantur. ex affectione verò & passione affectus, durities aut mollities, terminus alterationum gignitur. Considerantur quidem hæ omnes qualitates in medicamento: nam potentiâ quoque passiva præditæ sunt. Verùm cum medicamento, quatenus medicamentum, proprium sit corpus humanum alterare, & à statu non naturali ad naturalem reducere: Igitur in corpore humano sanabili, ejusque contentis, dispositiones aut status illi considerandi erunt, scilicet durities, mollities; tenuitas, &c. quatenus sunt affectus præter naturam, & remedium indicant: in ipsis verò medicamento, quatenus medicamenta, activæ istæ qualitates nimirum indurans, emolliens, &c. uæ semper à morbo vel morbi causa indicantur.

Nam quod in corpore præter naturam tenue indicat remedium non crassum, sed incrassans; durum indicat remedium non molle, sed emolliens. Dico autem medicamentum non tenue, & molle, sed extenuans, vel emolliens: quod ipsa vis extenuandi & emolliendi in medicamento, non proficitur à tenuitate aut mollitie ejusdem, sed ab ipsis qualitatibus primis pro modo materiæ: aut quod affectiones istæ secundæ, primarum qualitarum

V u x

actiones

*Quæ propriè
dicuntur
secundæ fa-
cultates
medicæ.*

*Actiones
secundari
promanant
à primis
pro modo
materia.*

actiones consequantur, iisdem vestigiis insistentes.
Nam calidum medicamentum primum calefacit
post si tenuis essentia, attenuat, rarefacit, &c. Eadem
est ratio in cæteris. Itaque promanant actiones se-
cundarum facultatum in medicamentis, à primis
sive ab ipso temperamento propriè: & reipsa secun-
dæ facultates nil aliud sunt, quam peculiares dispo-
sitiones primarum qualitatum in materia; aut certæ
operationum modi, quibus corpora nostra alteran-
tur: in primis enim qualitibus pugna & contra-
rietas consistit. Verùm primæ facultates earumque
actiones, quæ temperamentum medicamenti im-
mediatè consequuntur, magis formales dicuntur,
quæ per se primò nudam intemperiem alterant, &
morbis similaribus sine materia tantum conveni-
unt. At secundæ qualitates earumque actiones, ut
rarefacere, condensare, quæ primas consequuntur,
magis materiales dicuntur, quia circa materiam pro-
priè versantur, morbosque à materia & secundam
corporis compositionem respiciunt. Odores verò,
colores, sapes medicamentorum: item durities,
mollities, & similia, facultatibus medicamentorum
non annumerantur, ut dictum est: quia respectu
horum propria sensoria tantum afficiuntur, & non
cæteræ partes corporis à suo statu alterantur: sed
notæ potius sunt primarum & secundarum: præ-
cipuè verò sapes gustus qualitates, quia viribus
primarum gustum alterant, & naturam secundarum
præ cæteris æmulantur, ut infra apparebit. Facul-
tates autem medicamentorum, quæ à primis quali-
tatibus promanant, ex effectibus duorum generum
esse deprehenduntur: alix enim sunt quæ indeter-
minatè, in quamvis partem humani corporis vel
humorem eodem modo agunt, quæ secundæ fa-
cultates medicamentorum speciali nomine dicun-
tur: alix quæ determinatè, in certum aliquod mem-
brum

um aut humorem agunt, quæ ab Averrho & ple-
que recentiorum tertiæ facultates nominan-
r.

Facultates autem quæ propriè secundæ dicun- *Facultates*
r, ex effectibus, ut supra diximus, variæ numeran- *secunda.*
r, præcipuè verò sunt hæ, quæ oppositis viribus
stinguuntur: emolliens, indurans, intendens, re-
xans; rarefaciens, condensans; incrassans, & at-
nuans; incidens, & viscidum reddens; item attra-
ens, repellens; vasa aperiens, & occludens sive ad-
ringens: obstructions tollens, & infarciens; de-
rgens, & oblinens sive emplastica; agglutinans,
tulnerans; exasperans, levigans; his adduntur: e-
acuans, replens; dolorem leniens, & irritans; flatus
iscutiens, & generans; maturans sive concoquens,
putrefaciens, &c.

Tertiæ facultates, quæ determinatum mem- *Facultates*
rum, aut materiam respiciunt; particulares facul- *tertia.*
ates aut qualitates interdum vocantur, & mediæ
quodammodo naturæ videntur, inter facultates se-
undas & quartas à tota substantia. Nam ut Aver-
rhoes testatur, magna ex parte dependent à forma
substantiali: unde Fernel, alique plures tres tan-
um medicamentorum facultates constituunt, &
as vel ad secundas, vel ad occultas referunt. Nihil-
ominus quia modo non occulto, ut quartæ, sed e-
identi ut secundæ, detergendo, aperiendo, attenu-
ando, &c. agunt in determinatam materiam, ab u-
risque non incommodè distinguunt, aut utrisque
participant, utrasque vires obtinent: nam si modum
agendi respicias, evidentibus qualitatibus magis
annumerantur, sin materiam in quam agunt, ma-
gis occultis. Ejusmodi facultates duplices sunt:
aliæ enim respiciunt contenta, aliæ ipsas partes con-
tinentes. Quæ respiciunt contenta, sunt lac, vel se-
men excitantia, & comprimentia; menses, aut uri-

V.

nas moventia, & sistentia; calculos minuentia, & Deinde quæ determinatas partes respiciunt, à partibus illis denominantur: unde alia medicamenta cephalica dicuntur, quia manifestâ qualitate cerebro profunt, alia cardiaca, quia cordi, alia hepatica, splenetica, bechica, &c. quatenus igitur vires istiusmodi manifesta qualitate & modo evidenti agunt, à se invicem differre non videntur, quatenus verò non in omnem, sed in determinatam materiam agunt, & medicamenta cephalica, cardiaca, hepatica, splenetica, &c. dicuntur, ad occultas facultates reducuntur. Itaque diverso respectu ab aliis tres, ab aliis quatuor medicamentorum facultates enumerantur.

Causa sectionum & tertiarum facultatū.

Promanant autem qualitates evidentes, à materia medicamenti perfusa qualitatibus primis, sive à primis qualitatibus: pro modo materiæ in se invicem vestigiis insistentes: non quòd materia per se sola aliquid agat, sed quòd primis qualitatibus in agendo, majorem aut minorem aptitudinem tribuat. Materia autem, ut diximus, vel est tenuis, quæ altè sese in corpus & humores infert, sive in tenuia facillè solvitur; vel crassæ substantiæ, quæ sese non infert; aut mediocris. Pro modo materiæ qualitas actiones suas variat: nam summa caliditas in materia tenui & aërea flammæ correspondet, in crassa terreaque prunis aut ferro candenti, in media aquæ ferventi: quæ tria eodem modo non urunt, licet medicamentum nullum adeo urat ut flamma, pruna, aut aqua fervens. Quæ est ratio in summa caliditate, ea est in remissa, atque etiam in frigiditate. Verùm caliditas pro sua intensione, omni materiæ celeritatem agendi tribuit: contrà frigiditas: deinde caliditas eorum, quæ tenuis sunt essentiae vires auget, & quæ crassæ sunt minuit, sive longius quàm pro sua natura deducit; contrà frigiditas, quæ humo-

homogenea & heterogenea in unum cogit. Pro-
inde medicamentum tenuis substantiæ, tempera-
tum fuerit, ut adiantum, nonnihil rarefacit & at-
tenuat, sed minus evidenter, quàm calidum: si e-
videnter calidum ut fœniculum, validè attenuat,
penetrat, discutit, aperit, adeo ut urinas & sudores
moveat: si validissimè calidum, ut euphorbium, le-
limum, inflamat, urit, dissolvit, colliquat. Ve-
rum si frigidum fuerit, qualia sunt pleraque acida,
foras repellit, intus humorum ferociam reprimat:
validius, partes penetrat, mordet & vellicat. De-
inde medicamentum crassæ essentia, si nonnihil
temperatum, obstruit, lavigat, infarcit, minus
penetrat, quàm frigidum: si calidum sit, sed ita tempe-
ratum, ut sese inferre nequeat in humores & mea-
tus corporis, corroborat, leviterque adstringit: si
vehementer calidum, ut meatus subeat abradit, ex-
ulcerat, exasperat: si summè calidum, ut calx vi-
vehementissimè mordet, vellicat, abradit, exulce-
rat, ut crustam inducat. Nam calida crassarum parti-
um magis vellicant & mordent, quàm tenuium,
contra frigida tenuium magis, quàm crassarum par-
tium: Interdum enim calida tenuium partium om-
nino non mordent, sed duntaxat calefaciunt, &
cet aliquando mordeant, non tamen exulcerant:
vehementissimè calida crassarum partium, sem-
per vellicant & exulcerant: Frigida verò crassarum
partium omnino non penetrant, nec humorem ul-
lum introducunt, semperque adstringunt; assu-
munt vasa obstruunt, humores incrassant, fluxiones
sunt, foras repellunt, condensant, cicatricem in-
ducunt. At quæ tenuium sunt partium, si inæqua-
lem nata fuerint temperiem, valenter mordicant.
Porro, medicamentum mediocris essentia, medio-
modo se habet: nam si temperatum ut oleum, leviter
emollit, maturat: si calidum, modicè dolores lenit,

V.

relaxat: si intensè calidum, rarefacit & discutit, si minus quàm id quod tenuis substantiæ est; abstergit, incidit & expurgat, sed non valenter abradendo, ut id quod crassæ essentia est: si calidissimum violentè expurgat & exulcerat. Hinc manifestæ sunt causæ secundarum qualitatum, & quomodo primis oriantur, ac actiones primarum consequantur: de singulis secundæ facultatis speciebus, deinde de tertiæ, tandem de quartæ, ordine dicemus.

CAP. VI.

De secundis medicamentorum facultatibus in specie.

*Medicamentum
indurans & emolliens.*

IN speciebus secundæ facultatis medicamentorum explicandis, initium sumemus ab indurante & emolliente. Indurans autem & intendens tantam affinitatem habent, ut alterum pro altero plerumque sumatur: nam quod tensum est, ut plurimum durum dicitur; nihilominus omne quod induratum est, intensum propriè dici non debet, nimirum quod sine substantiæ suæ incremento vel decremento tactui non cedit. Proinde indurans propriè non erit, quod tenuis substantiæ partes dissolvendo aut exprimendo ipsum corpus cogit, aut quod materiæ alicujus influxu distendit; sed quod manente naturali humido, corpus minus aptum reddit, ut tactui nostro cedat. Tale Galeno frigidum humidumque est, sine manifesta adstrictione, ut lenticula palustris, portulaca, sempervivum & similia: in quibus tamen frigiditas maximè dominatur, humiditas vero moderata est: & plerumque ex duplici substantia constant, terrea scilicet & aquea, qualis in sempervi-

in vivo conspicitur. Proinde μαλάκησα emollientia, quæ indurantibus opponuntur, calefacientia erant, sed non ultra secundum grad. (nam intensa humiditas magis discutit aut attrahit, quàm emollit) inde modicè siccantia aut temperata in siccitate humiditate, non crassarum partium: licet nonnulla emollientia interdum dicantur, quæ valide siccant, ut opopanax, ammoniacum, galbanum, &c. alia quæ manifestè humectant, ut oleum amygdalarum dulc. violarum, &c. Sed nec hæc perfecte, nec illa propriè emollientia sunt, nisi contrario temperentur. Ex genere emollientium potissimum sunt: sem: lini, scenugræci, Althæa, malva defacta. Verùm pauca sunt emollientia, quæ non calefaciunt & discutunt, ut pleræque axungia, mellis, Osmilla, Osypus, &c. Unde plerique emollientia à relaxantibus non discernunt.

Deinde tensio partis fit, vel exsiccatione, à calore humido dapescente; vel concretione, à frigore congelante, aut tenues partes exprimente; vel repletionem, ex humore influente: aliquando ex hac conjugatione. Igitur intendens triplex primum erit: unum exsiccans, aliud congelans, tertium replens. Et relaxans quod intendenti opponitur, triplex quoque: nimirum humectans, calefaciens, evacuans: Igitur sub relaxantibus evacuantia; sub intendentibus repletia contineri poterunt. Quæ intenduntur nimia exsiccatione, relaxantur humectantibus, ut sunt viola, malva recens, oleum amygdalarum dulc. &c. quæ intenduntur frigore, relaxantur calefacientibus, & emollientibus, ut anetho, meliloto, camomilla, althæa, sem: lini, adipe anseris, &c. quæ intenduntur repletionem ex humore influente, relaxantur evacuatione vel insensibili, vel sensibili & manifestâ. Insensibili enim evaporatione, materia in habitu corporis emollientibus,

tibus, rarefacientibus, attenuantibus, discutientibus, nonnunquam attrahentibus & absorbentibus dissolvitur: verum aliquando, ut in initiis inflammationum, repellentibus & exprimentibus, materia revocatur: quod si verò repelli aut dissolvi nequeat, primum maturantibus & pus moventibus præparatur, deinde vomicam aperientibus & abstergentibus educitur. Ubi verò materia vasa distendit aut obstruit, primum attenuantibus, incipientibus præparatur, deinde aperientibus, expurgantibus, & abludentibus educitur. Si ex duarum aut trium causarum conjugatione oriatur tensio, promodo & diversitate affectus, relaxans medicamentum erit: aliud enim relaxans in phlegmone convenit, quàm in scirrho, ubi nec nimium exsiccat, nec nimium calefaciens, aut discutiens prodest, sed quod congelatum humorem fundit, & quod fusum est, discutit.

Diaphoretica.

Propriissimè verò relaxantia dicuntur, quæ rarefaciunt & attenuant, ut quæ diaphoretica communiter vocantur, licet sub diaphoreticis à pluribus sudorifera comprehendantur. Diaphoretica autem hic appellamus, quæcunque humores in halitus dissolvunt, vel contenta corporis per cutem dissipant. Talia omnia, tenuium partium, calda siccaque sunt non ultra tertium gradum: nam quæ vehementer calida sunt, adurunt aut attrahunt magis, quàm rarefaciunt & discutunt: Omne autem diaphoreticum rarefacit & discutit. Rarefacere autem nihil aliud est, quàm id quod crassum solidumque est, tenue & porosum reddere, quod fieri nequit nisi penetrando, aut ea quæ intra partes sunt dissolvendo. Horum omnium similis efficacia non est: nam alia leviora sunt, emollientibus vicina aut similia, quæ poros cutis rarefaciunt, tenues humores digerunt, crassos tantùm concoquunt, unde simplici-

Rarefacientia.

rarefacientia dicuntur, ut camomilla, melilo-
 , anethum recens, parietaria, &c. Modice ra
 facientia & quæ his vicina sunt emollientia, quia
 intemperando cutemque relaxando causam dolo-
 mitigant, Anodyna propriissimè dicuntur: Ve-
 communiter Anodyna sunt, quæcunque dolo-
 tollant. Tollitur dolor tribus modis: Uno
 odynis propriè dictis sive Paregoricis, quæ no-
 calori similia sunt, causam doloris demulcent
 coquunt & æquabilem reddunt, tenuitate par-
 rarefaciunt porosque aperiunt, ut Melilotus,
 momilla, Malva, Oesypus. Deinde tollitur dolor
 omnibus, quæ causam doloris tollunt: Veluti si
 a frigida, calida sit ab intemperie calida frigidis: Si a frigida, ca-
 is: Si à materia, evacuantibus, &c. Tertio omnibus
 quæ sensum partibus adimunt, nim: Narcoticis
 propriè dictis, quæ sua natura vehementissimè retri-
 rant & torporem inducunt, ut Opium, Mandrago-
 Hyosciamus, &c.

Narcotica

Præterea alia relaxantia fortiora sunt attra-
 antibus vicina, sed debiliora, quæ rarefacta cute
 assos humores attenuant, & in halitus dissolvunt,
 per se facile dissipentur & discutiantur: unde at-
 nuantia & discutientia, aliquando simpliciter dia-
 retica dicuntur, ut origanum, pulegium, ruta,
 urus sem: calida, &c. Quare condensantia, quæ
 refacientibus, deinde incrassantia, quæ attenuan-
 bus opponuntur, & spiracula cutis humoresque
 gunt & incrassant, frigida crassarumque partium
 unt, & modicè adstringentia, qualia sunt planta-
 o, myrtus, rosa, & similia. Huc referri poterunt vehe-
 enter frigida, ut papaver, mandragora, &c. Nam si
 his modicè iis utatur, condensant, incrassant; si
 liberalius, stupefaciunt; si liberalissimè, mortem in-
 ucunt.

Attenuan-
tia & discu-
tientia.Condensan-
tia, in-
crassantia.

Atte-

VI.

Attrahentia.

Attenuantibus vicina ἐπισπαστικά sive ἐλκυστικά
 latinis attrahentia, quæ foris imposita humores a
 vapores ex alio in summa corporis transferunt & discutiunt. Attrahentium autem varia materia: alia
 nim occulta materiæ proprietate aut similitudine
 attrahunt, ut cancer fluvialis tritus & impositus
 la attrahit, scorpius suum venenum: alia metu vacuum
 ut cucurbitulæ, de quibus hic non dicemus.

Alia manifesta qualitate, scilicet calore, vel
 fito ut sinapi, vel adscititio aut contracto ex putredine
 ut fermentum, fimus columbinus, anserinus, &c. Omnia
 omnia autem quæ manifestâ qualitate attrahunt, evi-
 denter calida, tenuium partium, & cò magis quæ
 magis intensus: siccitas & tenuitas substantiæ adju-
 vant.

Quare quæ calida sunt non supra secundum
 gradum, ut propolis, ammoniacum, bdellium
 &c. leviter tantum attrahunt: quæ 3. gradu calida
 ut aristolochia, calamintha, castoreum, tapfia
 lidè attrahunt & discutiunt: quæ 4. gradu ut sinapi
 nasturt. lepidium, euphorb. validissimè attrahunt, humores
 mores colliquant, rubificant, aut pustulas excitant.
 Ac proinde sub attrahentibus interdum continen-
 tur Dropaces Sinapismi, Phœnigmi, quæ id quod
 extenuantibus & attrahentibus attenuari & discuti-
 nequit, violenter attrahunt, dissolvunt, colliquant
 & consumunt: quorum usus est purgato tantum
 corpore.

Repellentia.

Ex quibus apparet ἀποκρητικά, id est repel-
 lentia, quæ non ad se foras, sed à se ad interiora, sive
 à loco cui admoventur, humores movent & repri-
 munt, frigida esse crassarumque partium. Verùm
 de repellentibus non consentiunt medici: alii enim
 sub reprimentibus comprehendunt omnia adstringen-
 gentia; alii non solum adstringentia, sed etiam ob-
 linen-

onia, incrassantia, oppilantia; contra plurimi
 adstringentibus reprimentia ponunt, & alia ad-
 gentia repellere, alia non repellere volunt. Ve-
 cum adstringere sit cogere, partes firmare, &
 um humorum sistere; repellere verò sit humo-
 id interiora revocare: propriè idem adstringens
 est quod repellens, nec omnia repellentia, ad-
 gentia: nam multa evidenter frigida per se hu-
 res repellunt, quæ non manifestè adstringunt, ut
 scyamus, papaver, lactuca, psyllium: Deinde
 nulla calida adstringunt, quæ non ita propriè
 ellunt, ut spica, cassia, aloë, absinthium. Nihilo-
 us quæ validè adstringunt, evidenter repellunt,
 natura frigida sunt, crassæ substantiæ, ut pluri-
 m saporis acerbi aut austeri, ut galla, acatia, ba-
 tia, &c. quod enim crassæ substantiæ est, quò
 lidius, magis adstringit. Quæ minus validè ad-
 ungunt, ut rosæ, semen coriandri, coronia, san-
 &c. viscera partesque firmant & corroborant.
 n nonnulla repellentia tenuis sunt substantiæ, partes.
 ne minus adstringunt quàm repellunt, quia altè
 metrant, ut camphora, santalum, & similia. Ni-
 minus adstringere, quemadmodum & dilatare
 sumitur: Nam adstringere communiter dice-
 quod cogit, partes roborat, intendit, condensat,
 init: humores incrassat, repellit, refrenat, Con-
 dilatare. At propriè *συμπλην* live adstringens
 dicamentum, secundum Averrh idem est quod
συνωλινόν, scilicet quod orificia venarum
 stringit: Qua significatione facultas *συμπλην* & *συνωλινόν*
συνωλινόν opponuntur, ac vis *συνωλινόν* a sty. & *συνωλινόν*
 ea distinguitur: Nam adstringens hoc modo κα.
 aptum, non est quod tenues meatus aliquo mo-
 cogit aut infarcit, sed quod orificia vasorum

*Quomodo
distingui-
tur repel-
lens & ad-
stringens.*

*Corrobo-
rantia &
firmantia*

pro-cur. &c.

propriè contrahit, totumque instrumentum uno quo constringit, & sensibiles evacuationes cohibet, que nomine adstringentia sive *συσπνικὰ* à condensantibus & incrassantibus distinguuntur. Medicamentum verò obstruens, sive meatus infarciens est, quod orificia vasorum tantum opplet: opplet autem, consistendo fluxus humorum, & cohibendo evaporationem, facit ut vasa impleantur, & impleta obstruantur. Utrumque naturæ frigidae sine omni acrimonia & mordacitate est. Verum quæ orificia vasorum & meatus adstringunt, magis sicca & crassarum partium, sive substantiæ proflus terrenæ sunt, ut galbalaustia, cæteraque acerba & austera. Quæ verò vasa infarciunt & obstruunt, emplasticis similia sunt substantiæ lentæ, viscosæ, ut infra dicemus: Nam orificia vasorum constringantur, requiritur ut medicamentum incumbens, ob substantiæ suæ crassitudinem, ne exiguos quidem meatus penetrer, & propter frigiditatem partes premeas, & undiqueque contrahens, vicina corpora cogat, unde toto instrumento undique se contrahente, evenit ut orificia vasorum claudantur, & quasi manibus foris compressimentibus, constringantur. Nihilominus nonnulli adstringentia vehementer calida sunt, ut calchanthum, & similia, sed ea ex contrariis naturis, calida & frigida, composita sunt, & mordacia, quare stegnoticis propriè non annumerantur. Vnde *συσπνικὰ* & *ἀνὰ σπνικὰ* opponuntur, quemadmodum *συσπνικὰ* & *ἐκφρακτικὰ*. Est autem *ἀνὰ σπνικὸν* quod orificia vasorum recludit, *ἐκφρακτικὸν* quod materiam meatibus impactam sive infarctam extergit & evacuat. Cum autem orificia à frigidis nulla mordacitate prælitis claudantur, necessarium erit à calidis mordacibus recludi & deobstrui.

Calida autem quæ orificia vasorum ape-

riunt

*ἀνὰ σπνικὰ
ἢ καὶ, & ἐκ
φρακτικὰ.*

et, absolute tenuium partium non sunt, quæ prom-
p- me substantiam vasorum penetrant, sed nonni-
crassarum, cum mordacitate quadam, ut expul-
- facultas in parte excitetur: qualis vis, in alliis, cœ-
cyclamine, felle tauri, & similibus reperitur, quæ
- nota hæmorrhoides aperiunt. Averrhoes tres
- us operationum in anastomoticis statuit: unum
- mores abstergendi, alterum aperiendi, tertium
- ficia dilatandi.

Verum hi gradus non sunt unius facultatis,
- diversarum, licet una alteri subserviat: deinde vis
- tergendi in deobstruentibus, aperiendi & dilatan-
- ficia venarum in anastomoticis potius con-
- eratur & requiritur.

Nam πύλινον extergens, & ἐκφραγνύλον de-
- struens, interdum pro eodem sumuntur, diffe-
- nt potissimum duobus modis: Primum quod
- πύλινον superficiem corporis & externos meatus
- in ulceribus) expurgat: ἐκφραγνύλον internas
- itates. Deinde quod extergens calidius sit & ma-
- tenuium partium, quàm obstruens. Cum enim
- teriores meatus angustiores sint internis, requiri-
- ut vis extergens altius penetret, quàm deobstru-
- s: unde absinthium intus meatus validè expur-
- , foris non, nam cum amaritudine acerbiter
- obet, quæ tenues meatus non subit. Utrumque
- edicamentum calidum propriè est, & substantiæ
- nihil crassæ, cum aliqua mordacitate, qualis vis
- plærisque amaris & nitrosis deprehenditur; licet
- nulla detergentia sint, quæ ob partium diversi-
- tem frigida dicantur, aliqua dulcia. Crassitudo
- tem illa substantiæ, mediocri tantum sua adstri-
- one, caloris transitum non impedit, sed promo-
- et & conservat, facitque ut medicamentum tam diu
- roretur, vellicando & abradendo crassos lentosque hu-
- mores,

*Detergen-
tia & deob-
struentia.*

mores, donec cedant: siccitas verò cum calore
sa lentaque dissolvit, ut facilius abradantur &
purgentur: nam calor penetrando, crassam ma-
teriam secum deducit, & simul ob crassitiem, quod
quid obviū est incidit, secumque rapit & expurgat.
Ad *ἐκφροσίνην* reducitur λεπικὸν extenuās & *τριπτικόν*
incidens: Ut enim vasa infarctu liberares, requiritur
ut crassa extenuentur, lenta & viscida incidantur
dissecantur. Ac *ἐκφροστικόν* id communiter vocatur
solet, quod materiam extenuat incidit & simul ma-
teriam expurgat. Extenuantium autem & incidentium
similis materia est, magna ex parte calida, sicca: in-
terdum frigida tenuium partium, ut acetum.

Verū extenuans magis tenuium partium
est, & non semper evidenter calidum, ut asparagus,
asparagus, &c. Incidens verò magis crassarum, si-
cut à calore ita attenuatum, ut longè penetrare, & le-
tos viscidosque humores adhaerentes dissecare, dis-
videre & separare queat, ut hyssopus, &c. Sed haec
omnia pro diversitate humoris peccantis varian-
t plurimum: semper enim calidis humoribus frigida
diora conveniunt, ut cichoracea, & frigidis calidiora,
ut chamædris, &c. Post materiam extenuationem & incisionem
si non cedat, meatus acrioribus expurgari & abstergi debent:
Verū pro natura partium alia atque alia expurgantia & deobstru-
entia conveniunt; validiora pro liene, quam pro je-
core, & pro jecore, quam pro ventriculo, ob vias pa-
rentes & vicinas. Quare huc referuntur, quæ per os
aut alvum manifestâ qualitate evacuant; de obstruentibus
cognata sunt, quæ per os & alvum manifestâ qualitate
evacuunt. Evacuunt autem per alvum alia specifica formâ,
nimirum cathartica propriè dicta, de quibus infra, alia
manifesta qualitate: quæ autem manifesta qualitate per alvum

evacu

vacuant, *ὑγαινωτικά* sive lenientia communiter di-
 cuntur. Hæc unius naturæ non sunt: Nam quatuor *Hypaethica*
 modis evacuare putantur, undè *ὑγαινωτικά* quadru- *quadru-*
 plicia dicuntur, nimirum lubricantia, abluentia, de- *plicia.*
 rgentia & comprimentia. Lubricantia autem
 sunt, quæ vias ductusque inæquales lævigant, ut hu-
 mores adhærere nequeant; inæqualitas enim sive as-
 peritas viarum motum impedit, lævitas vias æqua-
 les & patentes reddit, ut humores sine impedimen-
 to defluant. Igitur lubricantia lentâ pinguique sub-
 stantiâ prædita sunt, modicè calida, cum aliqua te-
 nuitate, qualis vis est in oleosis & pinguibus: cujus
 generis sunt málva, althæa, cassia, manna, jura pin-
 gvia, pruna & similia.

Lubricantibus abluentia & detergentia con- *Abluentia.*
 traria videntur; nam hæc non oblinendo, sed for-
 tis diluendo vias complanant & lævigant: utroque
 enim modo lævigatio fit, & à contrariis exasperatio.
 Interùm sub detergentibus abluentia plerumque
 continentur. Propriè tamen abluens dicitur, quod
 superficiem partium expurgat: Detergens verò
 quod altius penetrans, & tenuiores meatus subiens,
 ordes educit.

Deinde abluentia magis aqueæ sunt naturæ, *Detergentia.*
 minusque mordent & calefaciunt, ut serum lactis,
 aqua hordei, jus galli, hydromel, jus brassicæ, mer-
 curialis: Detergentia magis calefaciunt, exsiccant,
 magis penetrant, vellicant & abradunt: qualia
 sunt, ut diximus, potissimum nitrosa & amara, ut
 centauræum minus, aristolochia: item non-
 nulla dulcia, prædita aliquâ acrimonia, ut mel, &c. *Compri-*
 mandem comprimentia non per se immediatè al- *mentia.*
 ter expurgant, sed dum vasa contrahunt, ut hu-
 mor contentus exprimat; igitur impropiè aut
 acccidente leniunt: talia omnia adstringentia
 sunt, ut myrobalani, mastix, tamarindi, &c. Huc
 Xx etiam

etiam referuntur, quæ in ultima mensa exhibita
cibos, alvum lubricant, ut cydonea, pyra, & similia.
Similis ratio in cæteris partibus ut in alvo, velut
faucibus, alia exasperata leniunt, alia sordes, ablu-
alia meatus expurgant, alia comprimunt & iussu
humorum repellunt. Item vomitum manifestâ q-
litate provocant, alia lubricando, alia abluendo, a-
detergendo, nonnulla flatus & extensionem faci-
do, quatenus superius os ventriculi irritant, ut ec-
presso fundo contenta sursum extrudat. Sed de
alio loco plenius agemus.

*Emplasti-
ca.*

Abstergentibus opposita sunt, Emplastica, quæ
tenacitate sua meatus infarciunt, tenuesque humo-
res ineraffant, sed manifestè non adstringunt: al-
enim est meatus oblinere & obstruere, aliud adstr-
gere & coarctare. Emplastorum autem duplex
materia: una planè terrea & sicca, sine evidenti
gore & calore, ut amyllum, lithargyrum, cerussa,
thia, terra Samia, &c. alia lenta & viscosa peni-
mista ex terreis aqueis, aliquando ex aereis, ut
leum dulce, cera potissimum lota, quod in lacte
seosum est, pinguedines quæ carent acrimonia, &
His omnibus addunt nonnulli, quæ non solum
nues humores exsiccant, sed etiam evidenter adstr-
gunt, meatusque coarctant, quæ propriè emplastici
non sunt, ut sanguis draconis, alumen &c. M-
dendiratio postulat, ut post repellentia parti, c-
materia impacta est, discutientia adhibeantur, quæ
si materia discutientibus non cedat, vel ad cutem a-
trahenda & validioribus discutienda, vel absorbent-
da, vel ad suppurationem perducenda. De attrahent-
tibus supra dictum est. Absorbentia autem sunt
quæ valida exsiccandi & extenuandi vi humores
frigidos impactos, & tumores œdematosos & aqueo-
fos, aliquando leirrhosos, sed præmissis emollient

*Absorben-
tia.*

& attenuantibus absument. Hæc validè discutibus vicina sunt, sed magis exsiccantia, aded ut etiam magis depascant & absorbeant quam discutiant, ejus generis sunt sal, alumen, nitrum, sulfur, calx, cineres herbarum nitrosarum: unde cum aliquando admixta vino, aut aquæ vitæ variâ lixivâ, interdum cum cera & oleis convenientiunguenta & emplastra.

Si materia calidior fuerit & discutientibus non patet, suppuratio tentanda erit. *Εκπυλινδον*, id est, suppuratorium, emplastico simile est, ei que cognatum *αετιον*: nam utraque & *εκπύσησις* & *πεπασμός* est eadem *πέπασις*, id est, maturatio, concoctio, sive maturati humoris in convenientiorem naturæ statum ductio. Verùm suppuratio est, humoris corrupti in venas, in pus conversio: *πεπασμός* verò est, humoris qualitate nocentiù, intra venas potissimum, in pus, sed in benigniorem naturam conversio: utrumque naturæ opus instrumento caloris. Verùm hoc substantiam caloris nativi adauget, nec qualitatem ejus intendit, sed æqualem accendit ei, qui est nomine secundum naturam, id propriè suppuratorium est. Proinde medicamentum suppurans naturæ humanæ simillimum erit, magisque temperatum, quam ullum emolliens: nam emolliens paulatim humoris, qui præfuit in partibus induratis, abigit: suppuratorium totum conservat. Ut autem substantiam caloris nativi conservet, non qualitatem ejus intendat, necesse est ut temperatum sit cum calore quodam ut emplastica, quo poros corporis obstruat, & humorum effluxum prohibeat: Unde emollientia & relaxantia, quæ humores in halitus dissolvunt, pus propriè non gignunt.

Verùm cum temperamentorum magna sit varietas, accidit ut idem respectu unius sit suppuratorium, quod alterius sit discutiens, expurgans,

X x 2

aut

Suppuratoria.

Sarcotica

aut sarcoticum: ut ficus, radix altheæ, liliörum
rebinthina, & similia. Suppuratoriis opponuntur
σαρκοτικά de quibus infrà. In tumoribus geruntur
pure, & aperta vomica ferro, igne aut medicamen-
tis causticis, pus & sanies primùm expurganda
detergentibus, deinde cavitas ulceris implenda
sarcoticis, tandem ulcus plenum consolidandum;
ducta cicatrice epuloticis. De natura detergenti-
um jam dictum est. Medicamentum autem perfe-
ctum nullum dici potest; nam carnis gignit
dæ materia est sanguis bonus, efficiens aut opus
non medicamentum, sed natura illius partis cui
ro superinducitur, quæ consistit in apta tempera-
ra. Proinde ut ulcus carne impleatur, requiritur
pars naturali temperamento prædita sit, deinde
sanguis bonus confluat. Ubi igitur hæc duo con-
runt, prima sanguinis generatio contingit sine
ullius medicamenti. Verùm cum in ipsa carnis
generatione perpetuò duplex gignatur excremen-
tum, unum tenue, ichor sive sanies, unde ulcus hu-
midum redditur: alterum crassum, sordes, unde sordidum
efficitur. Proinde ulcus semper duplici indiget
medicamento, uno humidum exsiccante, alterum
sordes expurgante: & quod utrisque facultatibus
preditum est, scilicet exsiccat simul & deterget,
blande sine morsu, id σαρκοτικόν propriè dicitur.
Ejusmodi varia sunt pro natura corporis & partium
affectarum: siccioribus enim & durioribus corpori-
bus sicciora conveniunt; humidioribus minus
sicca. Nam sarcotica imbecilliora ulcus sordidum
reddunt, vehementiora exasperant, fluxionesque in-
ritant: Leviora sunt farina hordei, fabarum, sarco-
colla, thus &c. vehementiora, farina erui, iris, aristolochia,
& multa quoque validè detergentia, exsic-
cantia: nam in corpore duro sicco, aristolochia, aut

carnem gignit, ubi thus sordes commovet: & his sufficit thus & sarcocolla, ubi auribus vix pa- Andronis, aut scoria ferri præparata. Sarcocolla opposita καδαυστικά, quæ excrecentem carnem, verrucas, callos, & similia, sensim quasi liquefaciendo absumunt. Hæc pyroticis annumerantur, vehementissimè calefaciunt: nam sub pyroticis comprehenduntur φοινυμοί, καδαυστικά, ἰχθυήματα & σπηλικά: addunt nonnulli rubrificantia, ut drosera acres, & sinapismos. Omnia πυρωτικά summè πυρωτικά. sicut igneaq; substantiæ, licet modo materiæ præstant, unde discrepantes effectus.

Nam ut in cæteris idem caloris gradus pro modo substantiæ actiones variat, ita in pyroticis: summus enim calor in crassa materia non facilè diffiatur, tenaciter adhærens violenter vellicat & urit, & cui inhæret stipitis ritu infixus, excruciat: contra tenui materia calefacit quidem vehementer, sed ad eam similitudinem facilè dissipatur, nec vehementem doloris sensum movet.

Quare rubrificantia, quæ ardore suo humores attrahunt, & cutim rubore inficiunt, sed necesse non vellicant, nec exedunt, tenuium partium sunt, attrahentibus similima, sicut suprâ dictum est, sinapismi, &c. Deinde phœnigmi sive vesicatoria φοινυμοί. propriè dicta: quæ ardore suo humores proliciunt, supremam cutis partem exulcerant, sive pustulas vesicas movent, minus tenuium partium erunt, sed rubrificantibus vicina, ut mel anacardinum, cantharides cum fermento, & similia. At καδαυστικά καδαυστικά, quæ sensim colliquando carnem consumunt, citate cum partium tenuitate prædita sunt, ut citate illâ virtus exedendi cito dissipetur, priusquam longè penetrare queant, & superficiem exsic- cando comprimendoque sensim carnem colliquant

& absumant, cuius generis est vitriolum & alumen
stum, ærugo & similia.

σηπτικά.

Quartò σηπτικά quæ altius penetrant, quæ
phœnigmi, & carnem teneriorem colliquant, in
tumque calorem dissolvunt, superioribus aciora
runt crassiorisq; substantiæ, sed non absolute crassa
ut aut pigmentum, arsenicum, & alia quæ qualiter

ἐχάρωνικά.

quoq; occulta naturæ nostræ contraria sunt. Quæ
τὸ ἐχάρωνικά, quæ altissimè penetrant ad ferri ca
dentis similitudinē, cutim ita exurunt, ut crustas
ducant, ac etiam dura callosaque corpora absumunt
& ea quibus inhærent, stipitis ritu infixæ, excruciant
absolute crassæ substantiæ erunt, omniumq; pyro
corum mordacissima, ut calx viva; cum lixivio saps
nis, præciditatum, & similia: quibus potissimum
murinæ cauteriis potentialibus. Atq; hæc sunt disti
ctiones pyroticorum. Verum cum singula medic
menta πυρῶνικά, pro natura corporum quibus admo
ventur, & temporis mora aut brevitate, dissimili
effectus producant; fit ut idem nunc vesicans, nunc
σηπτικόν, nunc ἐχάρωνικόν dicatur: nam καθαρστικά
aut vesicantia mollioribus corporibus admota, aut
longo tempore, idem faciunt, quod σηπτικά aut ἐχάρωνικά
durioribus corporibus, aut brevi tempore: Im
sæpè quæ in durioribus corporibus sunt vesicantia, in
mollioribus sunt escharotica: Similiter quæ in mol
lioribus sunt καθαρστικά, in durioribus sunt ἐσχα
ρικά.

ἐσχαρικά.

Sunt autem ἐσχαρικά, quæ repleti ulcer
summam carnem desiccant & indurant, in callum
sive cicatricem cuti similimam: nam cutis est quæ
in callum indurata caro, eique similis cicatrix. E
iusmodi medicamenta necessariò sicca sunt, sub
stantiæ crassæ, ut plurimum vi adstringente prædita

ne evidente calore & frigore, ac etiam sine morfu, humores tenues in superficie absumant, ipsamque contrahant & condensent, ut lapis hæmatites, tutia ap. cerussa, &c. Verùm inter *πυλωτικά* numerantur multa, quæ sine evidenti adstrictione desiccant, cornu cervi ustum, corallia, cerussa: alia, quæ cum morfu desiccant, & duriorib. corporib. tantum coniunt, ut alumen, æs ustum, & alia quæ catharticis quoque annumerantur.

Inter *πυλωτικά*, *σαρκωτικά* & *ιμπλασικά*, medicæ *Glutinosa* quodammodo naturæ esse videntur *κολλητικά*, id est, *tiā*. utinania quæ labia cruenti vulneris adducta uniunt, desiccant enim cum adstrictione, siue omni morfu & evidenti calore, ac substantiæ nonnihil crassæ terrenæque sunt, cum quadam tenacitate, qualis in plantagine, consolida, sanicula, verbena & similibus apparet.

CAP. VII.

De tertiis & quartis facultatibus medicamentorum.

Consequens nunc est ut in specie primum de tertiis, deinde de quartis medicamentorum facultatibus agamus, initio facto à diureticis. *Διυρητικά* id est, urinas moventia propriè non sunt, quæ obstructions in viis urinæ ab humore crasso, aut calculo aperiunt, à quibus violenter detinetur, nec quæ vias illas tantum leniunt, sed quæ serum ita præparant, ut copiosè facileque à renibus attrahatur & educatur. Talia extenuandi vi prædita sunt, calida, sicca, cum partium

Xx 4 tenu

tenuitate. Verum quæ perfectè diuretica sunt, non solum sanguinem extenuant, sed etiam fundunt, tenue serosumque secernunt, crasso in se coeunt non aliter quàm coagulum in lacte: Quod verò serosum in sanguine segregatum est, renes ad se naturaliter trahunt. Ac proinde urinas ejusmodi non solum movent, sed etiam faciunt, & tota ad renes penetrant; cujus generis sunt daucus, seseli & similia. Nihilominus diureticis annumerantur, quæ extenuant, non ita vehementer ut sanguinem fundant, sed ut serum tantum ad vias urinæ moveant. Moverent autem alia vehementer, alia moderatè: vehementer, quæ cum evidenti calore extenuant & detergunt, ut sem. calida: moderatè, quæ cum calore temperato, ut quatuor sem. frigida, quæ ita dicuntur collata cum seminibus calidis, & non quia manifestè refrigerant. Annumerantur etiam diuretica nonnulla, quæ vias urinæ leniunt, ut glycyrrhiza, althæa & similia: Præterea quæ fervorem in sanguine contemperant, sed ea minus propriè diuretica sunt.

Calculos

*dissolventia
& commi-
nuentia.*

Quæ validè urinas movent, & simul renes ac vasa diuretica expurgant, calculos & arenas dissolvunt & expurgant; verum non propriè: nam dissolvitur lapis vel occultâ naturæ proprietate, qualis est in sanguine hircino, vel manifesta qualitate. Oritur autem lapis ex materia terrea, viscido humore coagulata, à calore exsiccante & indurante. Quæ hoc modo concreverunt, nec vehementer calidis, nec frigidis propriè resolvuntur, sed à moderatè calidis, vi extenuandi incidendique præditis, non sine naturali aut adscititia humiditate: cujus generis sunt asparagus, rad. eryngii, graminis, oxymel compos. & similia. Verum præter hæc, nonnulla magis ex accidente calculos dissolvunt; vel quia asperitate suâ conterendo & abradendo superficiem, non parum minu-

minuunt, ut vitrum combustum; vel quia nimiam soliditatem parvam in lapide glutinositatem absumunt, & quasi in pulverem reducunt, ut cantharides, & alia quæ urinas vehementer movent.

Diureticis cognata sunt menses moventia *Menses moventia.* stuntur autem menses ob tres causas potissimum: Ob imbecillitatem facultatis expultricis. 2. Ob vitium sanguinis, quia paucus, crassus, viscosus. 3. Propter obstructionem venarum in matrice, aut quia sanguis avertitur à matrice. Propriè autem, quæ obstructions matricis aperiunt, & abstergunt, & sanguinem ad uterum deducunt, menses moventia dicuntur: minus propriè, quæ facultatem expultricem roborant, aut vitia sanguinis emendant. Aperiencia illa & abstergentia, quæ menses movent, valida esse debent, non prorsus tenuis substantiæ, quorum vires brevi tempore facileque resolvuntur, sed nonnihil crassæ, ne citò virtus dissolvatur, & longè penetrent. Proinde vehementer calida erunt, cum evidente siccitate, sed minore quam in diureticis: hujus generis efficacissima sunt, quæ amaritudinem aliquam acrimoniâ permixtam habent, ut sabina, aristoloch. pulegium, myrrha.

Quæ menses movent, similitudinem cum iis *Lac & semen promoventia &c.* habere videntur, quæ lac & semen promovent; calidificant enim omnia: & ut menses moventia sanguinem ad uterum, ita lac promoventia ad mammas, & semen excitantia ad vasa spermatica movent. Differunt tamen plurimum: nam lac & semen moventia minus sicca sunt, nec vehementer calida, ut menses moventia: deinde non carent aliqua humiditate; qualis vis est in anetho & fœniculo viridi ad lac gignendum; in crucea ad semen excitandum. Verum aliud est lac & semen gignere, aliud provocare, & materiam ad mammas vel testes derivare: Generatio enim fit ex optimis alimentis aut medi-

Xx s camen;

camentis temperatis, si milibus naturæ humanæ: verum excitant semen aut ad testes deducunt, ac ad expulsiōem seminis impellunt, quæ semen spiritu copioso replent, & materiâ crassâ ac humore viscido prædita sunt, cum caliditate, ut scineus, eruca, &c. Igitur quæ vehementer refrigerant, semenq; cogunt & incrassant, ut nymphæa, lactuca: Item quæ validè dissolvant, ut ruta, agnus castus, &c. vim suppressendi seminis habent.

Bechica.

Βεχικά autem, quæ contenta in pectore & pulmonibus apta reddunt, ut tussi facilè expurgari queant, duplicia sunt, quemadmodum humores: nam humores contenti in pectore, qui ægrè tussi expurgantur, vel crassi & viscosi sunt, vel tenues & subtilis.

Proinde bechica alia extenuant & incidunt, sed sine vehemēti calore, ut hyssopus; alia contemperant, modicè incrassant & leniunt, ut amygdala, nuces pineæ, sem. malvæ, tragacantha, &c. Præterea *ἐπὶ πνεύματι*, quæ superfluum pituitam circa meninges & cerebrum per nates expurgant: & *ἀποφλεγματισμοὶ* qui per palatum; aliquando occultâ qualitate agunt, plerumq; manifesta, scilicet acri, nitrosâ incidendo, abstergendo.

*Errina.**Corroborantia partes.*

Postremò visceribus omnibus manifestâ qualitate conveniunt, quæ robur membri conservant, sive adstringendo corroborant, in primis ventriculo, deinde jecori & cordi. Verum hepatica cum adstrictione aut aperiunt, sanguinemque purificant, ut agrimonia, intybi genera, &c. aut fervorem sanguinis & bilis flavæ restringunt ut hepatica, santala: Splenetica hepaticis similia sunt, sed magis aperiunt & incidunt, ut capparis, scolopendrium, &c. aut bilem retorridam refrenant, ut buglossa, succus pomorum dulcis. Cardiaca verò substantiam cordis modica tantum adstrictione corroborant, & vel virtutem

tutem spiritusque gratâ adstrictione congregant, ut corallia, ebur, rosæ, margaritæ: vel grato odore prædita sunt, ut moschus, ambra: vel spiritus fragrantia suâ reficiunt, ut aqua cinnammomi, vinum aromaticum: vel tetros malignosque vapores refrigerant, ut viola, succus citri & pomorum dulc. vel peculiari substantiæ proprietate confortant, & venenum à corde expellunt, ut lap. bezoar, theriaca & similia. Cephalica alia peculiari substantiæ proprietate cerebro nervisque conferunt, non pauca manifestâ qualitate: vel quia phlegma expurgant vel modicâ adstrictione cum exsiccatione corroborant, & vapores arcent aut discutunt; vel quia odoris quadam suavitate spiritus animales reficiunt: eadem in cæteris ratio.

Quartæ medicamentorum facultates à temperamento non promanant, nec à materia perfusa qualitatibus primis, sed immediatè à tota substantia, & forma substantiali, quæ Galeno qualitates à toto temperamento interdum vocantur. Agunt hæ non evidenti modo ut superiores, sed occultâ ratione, extrinsecus vel intrinsecus, in bonum aut in malum, dupliciter; vel per motum aliquem localem, vel per transmutationem sive alterationem aliquam. Per motum aliquem localem tripliciter: vel retinendo reprimendovè ea, quæ præter naturam moventur, in parte aliqua sistunt, vel expellendo, vel attrahendo è corpore noxia educunt. Nam retinendo Sardonius lapis ventri deligatus, ætites brachio, peculiari proprietate conceptum retinent, fimus porcinus fluxum sanguinis narium sistit, &c. Deinde expellendo movent, quæ substantiæ quadam dissimilitudine & contrarietate à se aliquid propellunt. Attrahunt verò, quæ substantiæ similitudine alliciunt sive ad se movent, veluti alexiteria quadam, ut lapis bezoar & similia, dissimilitudine sub-

Quarta facultates.

stan-

stantiæ venenum è corpore expellunt, corallina verò mes. At nonnulla, quæ totius substantiæ similitudine iis conveniunt, non aliter ferè alliciunt, quàm magnes ferrum, ut dictamus & radix arundinis tela & spicula. Deinde venenata non pauca, ut scorpius, vipera, mus araneus, suis propriis venenis succurrunt; nam dissecta & suis moribus admota proprium venenum attrahunt, & sic demorsos curant.

καθαγλικά.

Similiter nonnulla certos determinatos humores educunt, aut saltem naturam ad eorum expulsionem irritant; quæ *καθαγλικά*, electivè purgantia dicuntur & ab iis distinguuntur, quæ manifestâ qualitate lubricando, abluendo, extergendo, comprimendo, quicquid obvium est evacuant. Nam quæ electivè purgant, id est, certum determinatumque humorem educunt, aut ex determinata corporis parte, ea omnia peculiari substantiæ proprietate agunt, & non mediantibus evidentibus qualitatibus: licet negari nequeat, qualitates primas, præcipuè verò calorem, actionem illam plurimum juvare. Evacuant autem peculiari proprietate unum humorem determinatum potissimum, ut rhabarbarum, scammonium, aloë, bilem: agaricus, turbith, colocynthis, piritam: epithymus fol. senæ, helleborus, melancholiam: soldanella, iris, elaterium, aquas. Deinde alia evacuant ex quacunque parte corporis, alia ex peculiari potissimum: veluti rhabarbarum ab hepate magis, aloë ab intestinis & ventriculo, agaricus & colocynt à capite, hermodactili ab articulis potentius trahunt. Huc referuntur errhina, apophlegmatismi, &c. quatenus occulta qualitate agunt. Præterea purgant alia magis per superiora ut asarum, helleborus albus: alia per inferiora, ut scammon. Cætera de differentiis medicamentorum purgantium alio loco latius proponemus. Postremò
per

per transmutationem aut alterationem aliquam;
occulta substantiæ proprietate agunt medicamenta
triplicia. 1. Deleteria sive venena. 2. Antidota quæ
venenis medentur, nimirum alexipharmaca & alexi-
terria. 3. Quæ peculiari substantiæ proprietate cer-
tas partes humani corporis respiciunt, easque affi-
ciunt.

Venena autem medicamentis & alimentis, ut *Venena.*
superius dictum est, opponuntur, & potissimum cor-
rumpentem caloris nativi oppugnant, ipsamque substan-
tiam caloris corrumpunt. Verum non omnia vene-
na unius generis sunt, nec uno modo agunt, ut su-
perius dictum est: alia enim manifesta qualitate interi-
ori operantur, alia solius substantiæ proprietate: Manifesta
autem illa qualitas est calida, frigida aut sicca, nun-
quam propriè humida. Nam calida corrodendo, ut
scorpius, maritus, vel inflammando, ut euphorbium
vel putrefaciendo corrumendoque ut sublimatū,
interimunt. Deinde frigida vel congelando cor cum
spiritu & sanguine, ut opium. vel obstruendo vias
spirituum ut gypsum, plumbum ustum: Sicca vel de-
siccando humidum, ut calx viva, vel erodendo ut
arsenicum mortem afferunt. Adduntur his, quæ-
dam validissime purgantia, quatenus violenter &
cum gravissimis symptomatibus evacuant, ut helle-
borus albus, colocynthis, &c. Verum ex his omnibus
plurima cum manifesta qualitate occultam quan-
dam naturæ contrarietatem habent. At non tam
manifesta qualitate, quam totius substantiæ con-
trarietate calorem nativum corrumpunt & cor for-
tem caloris lædunt, ictus scorpii, viperæ, phalangii,
scorpiæ & similia quæ venena à tota substantia po-
tissimum dicuntur.

Præterea venenis contraria sunt alexipharma-
ca sive alexiterria propriè dicta, quæ vel venenum alexi-
pharmacum proeliant, de quibus supra, vel contrarietate sub.
stantia.

stantiæ suæ vires ejus frangunt: obrundunt, plane-
que immutant, & cor confortant: sub quo genere
continentur theriaca, mithridatium, semen citri, la-
pis bezoar & alia plura, quæ & alterant, & venenum
à corde expellunt. Verùm venena quæ evidenti calo-
re potissimum interimunt, contrariis alexipharmacis
alterantur & curantur, ut calida frigidis, sicca humi-
dis, &c.

Appropri-
a.

Tertio, quæ peculiari proprietate certas hu-
mani corporis partes respiciunt easque transmu-
tant, alia totius substantiæ familiaritate juvant, alia
totius contrarietate lædunt. Totius autem fami-
liaritate siue quadam *συμπάθεια*, salvia capiti, pul-
mo vulpis pulmonibus, smaragdus & os de corde
cervi, cordi, &c. conferunt. Proinde sub hoc gene-
re comprehenduntur omnia cephalica, cardiaca, sto-
machica, hepatica, &c. quatenus familiaritate sub-
stantiæ agunt: Item quæ certis morbis conveniunt,
ut *πρῶνια*, viscus quercinus, carniū hominis,
epilepsia: stercus canis, angina: cinis leporis, san-
guis hirci, calculo: cerebrum leporis, tremori: Ve-
rùm totius substantiæ contrarietate siue *ἀντιπάθεια*,
cantharides vesicam, lepus marinus pulmones exul-
cerat, argentum vivum dentibus & nervis
infectum est, &c. Hactenus de me-
dicamentorum facultati-
bus.



DE

*de Modo indagandi & explorandi Vires
medicamentorum, deque differentia
medicamentorum respectu ma-
terię.*

HIS determinatis, superest nunc, ut rationem & modum investigandi singulorum medicamen-
torum vires proponamus. Medicamentorum
autem omnium noticiam, facultatumque cognitio-
nem, duobus artis medicę fundamentis consequi-
mur: ratione nimirum & experientiâ; licet alia solâ
experientiâ, ut facultates à tota substantia, alia ex-
perientiâ cum ratione deprehendantur, ut primę &
secundę facultates. Verum sine experimento nullius
medicamenti vires rite cognoscuntur: Sæpè enim
ficta ratio cui non adstipulatur experimentum,
quemadmodum sæpè experimentum demonstrat,
cujus nulla ratio reddi potest, igitur quantum fieri
poteat, ratio cum experientiâ conjungenda est. Ve-
rùm quę ratione inventa sunt, si experimentum
non sentiat probanda, si dissentiat semper rejicien-
da: at eorum, quę experientiâ inventa sunt, si ratio
adhiberi queat, semper præferenda, si nequeat non o-
mnino rejicienda.

Nam cum medicina circa singularia occupa-
ta sit, magis errant, qui rationi sine experientiâ,
magis quàm experientiâ sine ratione nituntur.

Nos primùm de modo indagandi & proban-
di medicamenta per ratiocinationem, deinde per
experientiâ dicemus. Oritur autem cognitio de
medicamentorum viribus, per ratiocinationem,
ex primarum qualitatum manifestis effectibus.
Pro.

*Fundamen-
ta medici-
næ duo, &
duplex mo-
dus inda-
gandi vi-
res medi-
camento-
rum.*

*Modus in-
dagandi
per ratio-
cinationē.*

Promanant autem à primis qualitatibus in generatione mixti duplices effectus: alii priores, alii posteriores. Priores sunt vel meræ passionis mixtorum, nimirum congelatio, condensatio, & solutio, emollitio, &c. vel passivæ qualitates, de quibus præ, ut combustibile, incombustibile; durabile, indurabile, &c. Posteriores verò sunt objecta sensuum, scilicet colores, odores, sapes, dures, mollities, quæ termini sunt passionum, & mixtionem consequuntur. His addit Averrh. considerationem loci, regionis, temporis, & naturalium operationum. E his omnibus sumitur conjectura aliqua de temperamento medicamenti: Nam primùm ex modo congelationis, inspissationis, resolutionis, &c. Quæ dissolvuntur frigore, coagulantur sive concresecunt calore, & contra: verùm quædam coagulantur à frigore, quæ prius inspissata fuerunt calore; quædam non; quædam ab utroque inspissantur. Quæ autem calore tantum concresecunt, ut sal, calida siccaque putrantur, nisi terrestris planè sint substantiæ, ut ferrum, aliaque nonnulla metalla, quæ frigida siccaque judicantur. Quod à frigore tantum concresecit, sine actione caloris, frigidum humidumque est, ut de argento vivo sentit Averrhoes. Quæ à frigore coagulantur, si prius à calore inspissata fuerint, temperata videntur, nisi planè terrestris sint substantiæ, vel aqueæ, aut aeræ: si terrestris substantiæ, frigida, siccarunt; si aqueæ vel aeræ, calida. De cæteris lege Averrh. Colligér. 5. & Avicē. Verùm hæc aliaque similia indicia non solum obscura minusque manifesta sunt, sed etiam incerta, quemadmodum & illa quæ sumuntur à passivis qualitatibus, sive à potentia & impotentia: nam quæ facillè ignem concipiunt, promptèque incallescunt, calidiora semper putantur; eùm interea, quæ similes habent qualitates facilis fit transitus.

Ac

hæc regula plarumque fallit, ut cæteræ, nisi idem
agens, & subjecta corpora eodem modo se habe-
ant, iisdemque potentiis prædita sint. Deinde mul-
ta extra corpus nostrum facile ignem concipiunt,
arida ligna, sicci calami, &c. quæ suâ natura corpus
nostrum non calefaciunt. Præterea ad objecta sen-
tum quod attinet, cum in omni colorum genere
calida, frigida, humida, sicca reperiantur, solo visu ex
coloribus; de medicamento temperamēto nihil cer-
te colligere licet, multò minus ex auditu, cum pa-
ram referat in viribus indagandis, an medicamenta
sonora an insonora sint: Nec ex asperitate, levitate,
duritie, &c. nam plurima tam dura, quàm mollia; as-
pera quàm levia, &c. oppositarum qualitatū sunt,
ut diversimodè corpora nostra afficiunt. Præterea nec
ex odoribus, nisi propter sapes, cum in homine ol-
factus obtusissimus sit, ut nihil penè olfaciat, sed cum
insu doloris aut voluptatis: deinde quod plurima
medicamenta odore omni careant, ac, ex tã fœtidis,
quàm benè odoratis multa diversas plane vires ha-
beant. Nec etiam ex regione, loco & tempore, aut
ex naturalibus quibusdam operationibus, ut ortu,
incremento, fructificatione, &c. ut *Averrh. 5. Coll. g.*
p. 30. proponit. Nihilominus ex his omnibus de
temperamentis medicamentorum aliquam inter-
im conjecturam facimus, sed ea incerta & dubia
sunt.

Igitur gustui potissimum cōfiderere oportet *De sapes.*
ex saporibus, cum gustus tactus quidam sit, & sapo- *ribus.*
ribus viribus primarum tactilium qualitatū gustum
moveant, & naturam secundarum qualitatū amu-
nentur, licet magis particulares sint. Est autem sa-
por, ut alibi diximus, qualitas orta ex sicco terreo
luto aqueo humore, actione caloris in mixto, de-
terminante formâ substantiali. Nam materia sapo-
ris in mixtis est, pars terrestris sicca sapidaque, delu-

Y y

ta &

ta & transcolata humore aqueo. Proinde distinguuntur saporēs pro varia mixtione humidi cum sicco, per diversam actionem caloris. Unde alii calidi ut acris, amarus, salus: alii frigidi ut acidus, acerbus, austerus: alii temperati ut pinguis, insipidus, dulcis. Verū n̄ insipidus propriè sapor non est, sed privatione saporis in mixtis intelligitur. Nam octo tantum sunt saporēs, licet sub dulci quidam pinguem comprehendant, nonnulli acerbum ab austero genere non differre, sed tantum gradu putent. Deinde ex tribus, tam calidis quàm frigidis, & temperatis, prior semper tenuioris substantiæ est, secundus ejus respectu crassioris, tertius utriusque comparatione tantum mediocris, & non semper respectu corporis temperati: ita acris sapor tenuis substantiæ est; amarus terrenæ & crassæ non simpliciter, nec ut acerbus, sed ad cineris similitudinem; salus utriusque comparatione mediocris, &c. In dignoscendis medicamentorum facultatibus ex his saporibus, decet medicum præexere ratum esse in sensu gustus, & uniuscujusque gustus proprietatem exactè tenere, deinde causas saporum & vires medicamentorum ex saporibus indagare: verū n̄ oportet ante omnem naturalem saporem cujusque medicamenti ab adfectione distinguere, item simplices à compositis.

*Acerbus
& Auste-
rus.*

Ac primum, ut à frigidis incipiamus: adstringens sapor, qui linguam constringit & coarctat: communiter duos sub se comprehendit: Primò acerbū qualis in galla immatura percipitur, quæ linguam vehementer contrahit, & contrahendo exasperat. Secundò austērū qualis in cydonis, qui linguam moderatè contrahit. Causa utriusque est, dominium sicci terrei, à calore parum attenuati, & humido non satis permixti. Verū austerus sapor fit ex sicco magis attenuato, meliusque permixto a-

queo

quo humore, quàm acerbis. Resolvitur enim acerbis teste Ae. i. tripliciter: vel calefactione, vel humectatione potissimum, vel utraque simul. Si calefactione resolvatur acerbum, humidius molliusque non evadit, & tamen dulcedinem quandam contrahit, ut in castaneis. Si humectatione sine evidenti calore, sensim mollius redditur: sed si illa humiditas magis tenuis & aerea fuerit, ac dum, si magis crassa & aquea, austerum efficitur: aquosa enim humiditas omnis saporis vim hebetat. Unde plerique austerum ab acerbis non genere, sed gradu tantum differre putant. Sin acerbum humectetur, & simul evidenter calefiat, cum magis aerea humiditate, pinguedinem, cum magis aquea, dulcedinem acquirit.

Quare quæ parum aut nihil calidi vel humidi admittunt, acerbæ permanent. Ex quibus colligitur acerbæ crassæ prorsusque terrenæ substantiæ esse & naturæ magis frigidæ, siccæ, & adstringentis, quàm austera: proinde vehementius contrahere, constipare, vias claudere, fluxiones sistere, reprimere, &c. ut austera magis in usum ciborum venire, roburque partibus conciliare. Deinde utraque ab acidis differre, quod hæc in superficiem magis agant, acidæ longius penetrent, minusque refrigerent.

Acidus:

Acidus autem sapor, qualis in ox. lide percipitur, qui linguam sine sensu caloris altè facileque penetrat, ac in terram effusus ipsam fermentat; olitur ex sicco terreo permixto copioso tenui humido, à calore attenuante, sed non perfectè elaborante, quia citius calor deficit aut exhalat, quàm terminum assequatur.

Quare simpliciter acidæ, tenuitate substantiæ, refrigerant, desiccant, sed non vehementer ut acerbæ, nec eousque ut interficiant: non enim substantiæ subtiles forent, si extreme frigida essent. Unde nullum venenum frigidum acidæ saporis est.

Yy 2

Igitur

Igitur acida incidunt, attenuant, aperiunt non violenter ut amara, humorum ferociam contemperant, crassos ventriculi humores extenuando subducunt purum ventriculum sistunt sine evidenti adstrictione, foras repellunt & reprimunt. At quæ simplicitate acida non sunt, sed cum aciditate permixtam habent vel acrimoniam, ut acerum; vel dulcedinem, ut cerasa nonnulla, uvæ maturescentes, &c. non necessariè frigida sunt, ut infra apparebit.

*Dulcis &
pinguis.*

Medii saporis sunt dulces, qualis in saccharo percipitur, qui cum manifesta jucunditate gustum oblinat & replet, ad nullum excessum trahendo: & pinguis, qualis in oleo maturo, qui linguam cum lentore oblinat, & idem in gustu efficit quod dulcis, sed sine manifesta jucunditate. Oritur uterque in mixtis à calore proportionato, ut cæteri saporis ab inproportionato. Nam quæ dulcia aut pingua redduntur, ut fructus, prius ob defectum caloris acerbæ plerumque sunt, deinde austera vel acida, hinc à calore proportionato perficiente & concoquente, dulcia vel pingua evadunt: at si calor modum illum excedat, amara vel acia redduntur, ut in melle & vino apparet.

Quare sapor dulcis & pinguis omnium temperatissimi sunt, ab optima concoctione & determinatione humidi cum sicco: ac ob id naturæ humanæ familiarissimi, & alimentis maximè idonei. Verùm sapor dulcis fit ex sicco terreo, permixto humido magis aqueo: pinguis permixto humido magis aereo. Quare pinguis tenuioris, dulcia crassioris non nihil substantiæ erunt. Ultraque moderatè calida, sine evidenti siccitate & humiditate: unde maturant & leniunt, item emolliunt, relaxant, attenuant, &c. Sed pinguis magis quàm dulcia. At dulcia pro dulcedinis modo, calorem magis evidentem habent: unde ex vehementer dulcibus nullum propriè frigidum.

Præter-

Præterea acris sapor, qualis in pipere & capis
prehenditur, est, qui gustui oblatu, linguam cum
hementi calore penetrat, inflamat & mordet.
ritur in generatione mixti ex sicco terreo permix-
sufficienti humido, à calore igneo attenuante, &
a elaborante, ut effervescat pars tam humida quàm
sca. Quare naturæ calidæ siccæque est, cum sub-
stantiæ tenuitate. Unde acris medicamenta si non
vehementer calida, rarefaciunt, attenuant, discuti-
unt, &c. si vehementissimè calida inflament, col-
quantur, &c. si aliquid crassæ substantiæ admixtum
est, abradunt, vesicas movent, putrefaciunt, &c. Dif-
fert autem acris sapor ab amaro, primò forti calore
& substantiæ tenuitate, deinde quod acris per-
mixta sit humiditas, & quod in usum ciborum non
arò veniant, aut condimenti rationem habeant:
quod perfectè amaris non contingit, quæ squalli-
da & sicca sunt, veluti fuligo ex adustione, ac nullam
animal nutriunt.

Nam amarus sapor (qualis in felle & colocyn-
thide) est, qui linguam detergit, & cum gravissima
nolestia abradendo exasperat, & contrarium planè
in gustu efficit ei, quod dulcis. Generatur à vech-
nenti calore humidum totum ferè exhauriente, &
siccum terreum adurente. Igitur calidus, siccus e-
st, & substantiæ terrestris, ad cineris aut fuliginis si-
militudinem: verum non planè crassæ substantiæ,
sed multò tenuioris quam acerbus, & crassioris
quàm acris: unde minus penetrat, rarefacit, discuti-
t quàm acris; at dum penetrat materiam crassam,
quicquid obvium est, violentius secum rapit. Qua-
re amara incidunt, abradunt, detergunt, meatus ape-
riunt, ac immodico usu exasperant & exulcerant,
inprimis quæ vehementer calida: nam amara quo-
minus calida siccaque sunt, minus incidunt, deter-
gunt, expurgant, &c. Omne autem perfectè ama-

*Acris.**Amarus.*

rum, aut quatenus amarum, calidum est: licet multa evidentius frigida nobis amara videantur, quia e contrariis partibus conflata sunt: in quibus minimi amari portio efficacior est magnâ alterius saporis cum amarus sapor omnium sit ingratissimus, & cum gravissima molestia facile gustum afficiat.

Salsus.

Salsus sapor amaro propinquus est, uterque enim linguam abstergit, sed salsus magis eluendo quam abradendo. Deinde uterque calidus, siccus & substantiæ crassioris, sed amarus à calore magis præssante, & diu multumque humidum exsiccat: quare si salsum diu multumque calefeceris, amarum efficies. Generatur enim salsus sapor ex sicco terreo, permixto copioso humido aqueo, à calore assante, verum non prorsus humidum depascente, sed cum sicco cogente. Proinde substantiæ non omnino terrestris erit; nec prorsus aqueæ, sed mixtæ, atque ita mediæ: licet revera magis crassæ, quam tenuis substantiæ sit, cum valida siccitate, & non vehementi calore. Unde salsa vehementer exsiccant, absorbent, liquant, sitim excitant; deinde incidunt, abstergunt, abradunt &c. minus tamen quam amara.

*Inspidus si-
ve aqueus.*

Tandem sapor ille, qui inspidus aut aqueus à nonnullis dicitur, qualis in aqua simplici & eucubira aliquo modo percipitur, propriè sapor non est, sed privatione saporis intelligitur: licet pleræque insipida dicantur, quæ obscurum tantum saporem habent, leviterque dulcia aut pingua sunt: nam quæ cibis apta sunt, dulcedinem aliquam, etsi obscuram, admixtam habent: quare pauca planè insipida sunt. Oritur autem inspidum, non ut sapor, ex sicco terreo transcolato per humorem aqueum, verum ex materia crassa, non plane transcolata, sed potius perfusa humore aqueo, sine evidenti calore. Quare insipida aliquo modo temperata videntur, & dulcibus cognata, sed frigidiora crassiorisque substantiæ.

stantiæ, & plerumque cum lentore: qualia suâ naturâ exasperata leniunt, & si magis siccam nacta fuerint compagem, emplastica sunt, & meatus obducunt, infarciunt, obstruunt, &c. Hæc est natura simplicium saporum, & ratio dignoscendi ex sinceris saporibus vires medicamentorum. Verum cum omnia ferè medicamenta diversas partes habeant, puri syncerique saporis raro admodum in medicamentis erunt, sed diversi mixtiq;: qui omnes gustum secundum suam naturam afficiunt, licet à sapore prædominante, qui maximè obuius est & vehementissimè gustum mouet, medicamentum denominationem suscipiat ut absinthio. Mixti saporis mixtæ sunt naturæ, & mixtas vires designant: velut dulcis sapor, si acri commisceatur, ut in melle, magis calefacit, longiusque penetrat quàm dulce, meliusque abluie & abstergit: similiter acidus, si acri commisceatur, ut in aceto, minus refrigerat, sed longius penetrat, &c.

Eadem est ratio in cæteris. Nihilominus cum in pugnantium facultatum mixtione, sapor qui gustui vehementior apparet, vehementiorem operationem non habeat (nonnulla enim evidenter amara sunt, quæ vehementer refrigerant, ut opium: aliqua gustui austera videntur, quæ assumpta calefaciunt, expurgant, ut squama æris) in dijudicandis medicamentorum viribus gustui confidere nimium non oportet, sed ea, quæ ratione ex saporibus cæterisque sensuum evidentibus inventa sunt, ex-

*Modus indagandi
per experientiam.*

perimento semper confirmare: non enim in hoc falli potes, & ut suprà diximus, optimum est singulorum vires ab exacto experimento invenire. Attamen priusquam experimenti vim cognoscas, de primis secundisque qualitatibus multum gustus iudicat, cui attestatur paululum odor, &c. de occultis verò facultatibus nihil plane, sed sola experientia.

Yy 4

Expe:

*Tria obser-
vanda sunt
in indagandis
viribus
medicamen-
torum per
experientiā.
1. Medica-
mentum.
2. Subiectū
corpus in
quo explora-
mus vim
medicamēti*

Experimentum autem hīc intelligo non fortuitum sed voluntarium aut imitatorium. Verum experimenti certitudo non statim ex uno successu probanda, sed multa simul observanda: oritur enim experimentum ex manifestis medicamenti effectibus. In effectu autem producendo tria considerantur: 1. Efficacitas, id est, medicamentum quod explorare debemus. 2. Subiectum corpus, sive patiens in quo exploramus. 3. Modus tempusque agendi. Medicamentum autem quod explorare debemus, primum omni qualitate aliena sive adscititia aut accidentaria liberum esse debet, & suā tantū facultate agere. Deinde ad agendum idoneas sufficientesque vires habere, nimirum morbo semper oppositas, sed lapsui morbofo gradibus fieri queat, æquales.

Subiectum corpus sit, humanum potissimum, ad quod propriè medicamentum refertur, & à quo præcipuum iudicandæ facultatis experimentum sumitur: nam quam vim in homine, eandem in alio animali non necessariò sortitur, licet in aliis interdum experimentum fiat. Corpus autem humanum in quo experimur, aliud sanum, aliud ægrum: Et sanum, aliud temperatum, aliud intemperatum: Ægrum aliud simplici, aliud composita intemperie laborat. Experimur autem medicamentum in humano corpore duplicis rei gratia: Primò ut sciamus ipsam facultatem tantum, vel facultatem & facultatis gradum, an calefaciat, vel refrigeret, & quo gradu: non autem an illi corpori profit, vel obstat. Deinde experimur gratia sanitatis in illo individuo, an lædat, vel juvet. Si experimur tantum ut facultatem medicamenti in genere cognoscamus, an calefaciat aut refrigeret, &c. experimentum faciendum erit, non solum in temperatis aut intemperatis, sed etiam in ægtis, simplici non composita intemperie laborantibus. Sin ut facultatem, & facultatis gradum

um, an primo, secundo aut tertio gradu; in corporibus tantum temperatis experimentum faciendum: nam ex alteratione, facultatem: ex quantitate alterationis sive recessus à temperato, gradum facultatis perfectè deprehendimus. Verum cum Medici sit, sanitatem propositam habere, & sine omni vel cum minimo periculo agere, experimentum porissimum fieri debet in corpore ægro, affectu simplici non composito morbo. Nam experimentum eorum, quæ gustui acida sunt, an refrigerent, in sanis magis periculosum est, quàm in ægris, simplici intemperie calida laborantibus non composito aliquo morbo. Si enim quis laboraverit febre, aut obstructione jecoris, an acetosa, aut cichoream refrigeret, experiri non possumus: quia si febris uretur, dubium adhuc erit, an quia caliditate suâ incidendo abstergendoque obstructions aperiat, vel est causam febris tollat; an quia frigiditate suâ calorem non naturalem, aut fervorem bilis restinguat.

Tandem in explorandis viribus medicamentorum, observandus est modus tempusque agendi. Non enim omnia uno eodemque modo semper agunt, sed nonnulla aliter initio quando applicantur, deinde aliter. Si medicamentum à principio ad finem uno eodemque semper modo agat, id est, calefaciat vel refrigeret, &c. certum experimentum erit, per se & vi insitâ agere, ac propriè calidum aut frigidum esse. Sin initio uno modo, deinde alio modo agat, experimentum dubium erit; & incertum intra actio sit per se, id est, vi insitâ & immediatè; utra ex accidente, scilicet aliena vi aut mediante alio effectu. Nam duobus his modis agit aliquid ex accidente: veluti aqua calida admota corpori, primum aliena adscititia qualitate calefacit, deinde insitâ vi refrigerat: at aqua frigida liberaliter affusa

3. Tempus
& modus.

Yy s æstare,

æstate, juveni laboranti tetano, primum vi infusa refrigerat, deinde ex accidente, quia calorem introcoercet, calefacit. Debet autem medicamentum, ut supra diximus, omni alienâ & adscitiniâ qualitate recare: Nihilominus si medicamentum alienâ qualitate affectum sit, actuque præditum, ut quæ calida, prima actio est accidentaria, secunda propria, si ab omni aliena qualitate liberum sit, prima actio semper per se, secunda per accidens erit & prioris interventu, & tum remoto medicamento aliqua actio remanet.

*Paracelsi
ratio inve-
niendi vi-
res per Sig-
naturas re-
rum.*

Præterea ad explorandas & indagandas vires medicamentorum, Paracelsus novam quandam Physiognomiam & Chiromantiâ excogitavit, & ex Signaturis rerum, occultas vires inveniendas esse putavit: Nam (authore Paracello *lib. de Signaturis rerum nat. & libro de Persicaria*,) natura omnia signavit & latentes vires certis signis expressit, nobisque manifestavit: Signaturæ autem aliæ externæ sunt ut forma, figura, lineamenta & similia: Aliæ internæ spagirica & artificiosa præparatione introductæ; veluti quæ partis similitudinem habent, ei potissimum conferunt, ut hepatica hepati, eufrasia oculis: halicacabum vesicæ; pulmones vulpis pulmonibus, &c. Item lapidosa & quæ lapidosum quid proferunt, ut saxifragia calculo: herbæ perforatæ, ut Hypericon vulneribus, &c.

Hæc ratio contemnenda non videtur, licet universalis non sit, nec in omnibus locum habeat, præcipuè in signaturis externis. Quid per internas sibi velit inter ipsos chymicos adhuc controversitur. Hactenus de facultatibus, restat ut de materia medicamentorum agamus.

*Differentia
medicamen-
torum*

Medicamentum omne respectu materiæ, aut simplex aut compositum est. Simplex comparatione ad compositum dicitur, & utrumque variis modis: nam

am pleraque medicamenta, licet sensibus simplicia
 appareant, substantiâ tamen suâ dissimilaria & com-
 posita sunt: deinde multa arte composita sunt, quæ
 tamen simplicia à medicis dicuntur, ut syrupus ace-
 losus simplex, oxymel simplex. Verùm hoc loco
 simplex medicamentum id vocamus tantum, quod se-
 cundum naturam suam sincerum est, aut suâ natu-
 râ tale, ab arte nihil alieni permixtum habens. Con-
 tra compositum, quod suâ naturâ sincerum non
 est, sed arte ex diversis commixtum. Simplicium ma-
 teria, teste Galeno 6. de Simpl. med. fac. cap. 1 & 1. de Com. p.
 med. per gen. c. 1. sumitur ex vegetabilibus, minerali-
 bus, & animalibus.

*Simplex Cō
positum.*

*Materia
simplicium
triplex.*

Sub vegetabilibus continentur omnes stirpes
 sive plantæ, nimirum arbores, frutices, & herbæ; ea-
 rumque partes, ut sunt radices, rami, ligna, cortices,
 stipites, surculi, folia, flores, semina, fructus succi,
 liquores, gummi, resinæ, olea, &c. Sub minerali
 continentur hoc loco non solùm fossilia, sed
 etiam aquæ thermales, & omnia mixta inanimata,
 contenta terra & aquis.

*1. Vegetabi-
lia eorumq;
species.*

*2. Minera-
lia. Aqua
thermales.*

Fossilia autem secundum Agricola alia sim-
 plicia, alia composita sunt. Simplicia iterum quadru-
 plicia: 1. Terræ insigniores, ut bolus armenus, terra
 sigillata, Lemnia, Samia, &c. 2. Lapides, ut omnia
 saxorum, marmorum & gemmarum genera: item
 quæ speciali nomine lapides dicuntur, ut magnes,
 ætites, hæmatites, &c. 3. Succu conereti, ut omnia sa-
 lina, aluminum, atramentum & bituminum
 genera, &c. Huc referuntur, quæ à Chymicis spi-
 ritus dicuntur, quia in igne volatilia sunt, ut sul-
 phur, argentum vivum, arsenicum, &c. 4. Metalla, pro-
 priè dicta, numero sex, quæ majora mineralia vocan-
 tur: item metallorum recrementa, ut lithargyrum,
 scoria, pompholyx, &c. Composita autem fossilia,
 varia sunt, prout duo aut plura horum in unum corpus
 con-

*Fossilia
Terra.*

Lapides.

*Succu con-
creti.*

Spiritus

Metalla.

*Composita
fossilia.*

con-

3. *Anima-
lia eorum
que partes.*

concreſcunt: unde lapides compoſiti, alii terris per-
miſti ſunt, alii ſuccoſi, ut gagates, lapides alumno-
ſi, falſi, &c. non pauci metallici, in quorum nume-
ro ſunt marchasitæ, ut antimonium, biſmutum,
lap. pyrites, &c. His omnibus adduntur, quæ ex me-
tallicis arte compoſita ſunt, ut ſublimatum, præci-
pitatum, ceruſſa, minium, cinnabaris factitia, &c.
Tertiò ſimplicium medicamentorum materia ſu-
mitur ex animalibus vel totis, ut ſunt lumbrici,
cantharides, cancri, hirundines, &c. vel ex partibus,
aut excrementis animalium, veluti pinguedines, a-
dipes, medullæ: item oſſa humana, coagulum, cor
& cerebrum leporis, caro & lapides cancerorum,
cornu & ſanguis cervi, tunica ventriculorum gal-
linæ, &c. item lac, ova, mel, cera, fel, urina, ſtercus ca-
prinum, &c.

*Obſervan-
da in ſingu-
lis ſimplici-
bus.*

Horum omnium ſingulorumque vires, viri-
umque gradus, quantum fieri queat, medico co-
gnoſcendæ & indagandæ erunt: obſervatis iis, quæ
ſimplicium vires augent minuuntque: qualia ſunt
regio, tellus, cultura & ſitus loci ubi proveniunt, i-
tem tempus collectionis & ætas, tandem præpara-
tio. Nam locus & regio calida, ſicca, calidiora acri-
oraque ſemper producit. Deinde plantæ plantarum
que partes meliores tum putantur, quod ſucco ma-
turo probeque concocto turgentes ſunt. Verum
alio tempore ipſæ plantæ, alio flores, alio ſemina
perfecta ſunt. Deinde alia ratio in plantis adhuc
virentibus, alia in ſiccis aridiſque eſt. Præterea
plurimum poteſt præparatio medicamenti, ut ſuo lo-
co apparebit.

*Dofis medi-
camentorū.*

Dofis autem ſive quantitas cujuſque medica-
menti, in humano corpore mediæ ætatis & conſti-
tutionis, ex facultatis ipſius ordine ſive vehementia
deprehenditur. Quæ enim pari ordine ſunt, ea-
demque vehementiâ agunt, pari menſura ſive doſi
ſtatū-

tuuntur: quæ dispari modo agunt, dispari dosi.
 rum in alterantibus potissimum, pro magnitudi-
 situque partis affectæ, dosis augenda minuenda-
 erit, ut supra dictum est, & latius infra dicemus
 plicia medicamenta ubi per se satis faciunt ope-
 efficiendis, nullum peculiare artificium requi-
 nt. Verum quia per se plerumque minus idonea
 nt, ut id præstent, quod intentio medica requirit,
 aliqua *Phlegma in iis* necessaria videtur: quæ vel
 debita præparatione, vel in legitima simplicium
 compositione, vel in utraque.

C A P. IX.

*De Compositione Medicamentorum,
 eiusque Causis.*

Uemadmodum artificis est, ut scopum suum
 consequatur, de instrumentis & materiis ope-
 rationum suarum deliberare: ita medici, ut sa-
 tatem restituat prima cura esse debet, idoneas au-
 ciorum materias, nimirum medicamenta, non so-
 m simplicia, sed etiam composita, in promptu ha-
 ere, eorumque omnium vires intelligere. De medi-
 mentis, medicamentorum facultatibus, deque
 mplicium medicamentorum differentiis, dictum
 est. Quia autem medicamenta simplicia per se, sine
 la artis ope, minus idonea plerumque sunt, ut id
 præstent, quod methodus curativa præscribit: ars a-
 qua necessaria viderur, quæ, ut alibi dictum est, vel
 ora simplicium præparatione, vel compositione, vel
 traque continetur. Ipsa autem ars per se, licet nul-
 s peculiare vires conferat (nam vis omnis à na-
 ra insita est) tamen, dum simplicia rito præparat,
 aut

aut convenienter permiscet, formasque idoneas a tribuit: multa aliena & inutilia remouentur; noxia corriguntur, acria contemperantur, debilia acuat, & plurium permixtione nova, aut reconciliata vis emergit. Quibus omnibus medicamentum morbo, parti affectæ, & ægro prorsus redditur idoneum. Nam scopus artis *φάρμακον ὡς ἔστιν* est, medicamentum idoneum efficere, ut id præstet, quod indicatio curativa postulat, idque citò tuto & jure eunde. Cùm autem artificiosa si simplicium compositio sine omni præparatione non fiat, & præparatio compositioni seruiat: primum de compositione, si permixtione simplicium medicamentorum, deinde de de præparatione in genere dicemus. Ac primum, compositum medicamentum in relatione ad corpus simplex dicitur, & ut superius dictum est, id compositum vocatur, quod non natura sua tale, sed arte pluribus simplicibus ortum. Quare medicamentum componere, erit plura simplicia in unam aliquam formam reducere, gratia sanitatis restituendæ, aut conservandæ, nimirum ut instrumenta idonea habeamus, ad id præstandum, quod indicatio requirit. Ubi igitur nullum simplex aptum reperitur ad id perficiendum, quod necesse est: compositio aliqua necessaria videtur.

Tres causas compositionum medicamentorum.

Non reperitur triplici ratione potissimum. Cùm enim medicamentum in relatione ad corpus humanum dicatur, & id proprie medicamentum sit, quod morbum è corpore depellit: scopus & necessitas omnis compositionis dependebit, aut ab ipso affectu, ejusque causa & symptomatibus: aut ab ipsa parte affecta, cui curatio debetur: aut ab ipso medicamento, quo curatio perficitur.

Prima causa com

Omnium autem maxime necessaria compositiendi causa, est morborum diversitas, item causa

im, & symptomatum urgentium. Nam quilibet
fectus, teste Galeno 1. Methodi, pro sua natura re-
edium indicat: simplex affectus, remedium sim-
ex, simplici facultate præditum: compositus affe-
us, remedium compositum, aut natura, aut arte,
le. Complicantur primū n morbi, qui diversa,
ut contraria exigunt remedia, vel in una parte, ut
cus cum inflammatione; obstructio jecoris cum
temperie calida: vel in diversis, ut hydrops cum fe-
re: calida jecoris affectio cum calculo. Deinde, a-
ud interdum morbus, aliud morbi causa indicat,
ut febris à pueritia putrescente & obstructione visce-
s.

Similiter, aliud morbus, aliud symptomā
rgens, ut inflammatio in principio cum vehemente
lore: Præterea quæ à diversis, aut contrariis, ori-
ntur causis, diversa, aut contraria, exigunt remedia.
Cum igitur natura simplicia non progignat, quæ o-
nibus his indicationibus satisfaciant, & sigillatim
numquæque affectum, affectusque causam, depel-
ant: necessaria erit medico, ex pluribus diversa, aut
ontraria, facultate præditis, idoneum medicamen-
um componere.

Secundò ipsa pars affecta, ægrique natura, & *Secunda*
onstitutio, componendorum medicamentorum *causa com.*
occasionem præbent. Considerantur verò in parte *positionis*
affecta, ut alibi dictum est quinque, dignitas, actio- *natura &*
isque necessitas: situs connexioque: temperamen- *gri partis.*
tum, conformatio, & sensus. Nam primum ventri- *que affecta.*
culo, jecore, aut alia p̄ncipe parte laborante; nun- *In parte*
quam utimur solis relaxantibus, ne robur visceris *quinque cō.*
dissolvatur, sed astringentia permiscemus, aut quæ *siderantur.*
facultate substantiæ corroborant, ut monet Galenus 1. *Actionis*
13. *Methodi medendi.* Roborem enim partis p̄ncipis *dignitas.*
semper tuendum est similibus appropriatis, licet af-
fectus contraria exigat.

Deinde

2. *Situs
pariu.*

Deinde vis medicamenti ad partem in profundum, aut remoto loco sitam, non facile deducitur, si admixto aliquo, quod tennitate, aut peculiari proprietate eò penetret, aut quasi vehiculum sit: alioquin in longo itinere, magnoque intervallo, de virtutis robore multum perit. Quare Galenus in inflammationibus & doloribus capitis, acetum oleo rosaceo & similibus admiscet, quod alias sua natura doloribus noxium est: Et in affectibus pulmonum, bolo ammenio, & similibus astringentibus mannam, tragacantham, succum glycyrrhizæ, permiscet, ut vis eorum ad pulmones transeat. Similiter frangentibus calculum, cantharides: medicamentis cardiacis, buglossum, crocum: cephalicis, betonicam: epaticis agrimoniam, cichorium: spleneticis, scolopendriam &c. quæ ad partem affectam cætera dirigunt, & similes peculiari facultate confortant. Sub situ continetur connexio partis cum aliis. Ob consensum autem ventriculi cum corde, aut cerebro: à valide refrigerantibus temperamus, & medicamentis stomachicis admiscemus, quæ peculiari proprietate partes illas respiciunt.

3. *Tempe-
ramentum.*

Præterea, cum actione partis concurrit temperamentum à quo primum actio. Temperamentum autem conseruatione semper indiget: igitur ubi cum temperamento morbus plurimum pugnat, ut si cerebrum Erysipelate laboret, non solum vehementioribus indiget, sed etiam quæ partis temperamentum, & robur tuentur, & conseruant, præcipuè si pars princeps sit. Eadem ratio est, ubi curatio temperamento contraria est, veluti si jecur obstructione laboret, quia substantiæ potioris est, & dissolutioni idoneum; valide extenuantia, & dissoluentia non sustinet, sed extenuantibus dissolventibusque, necessario corroborantia, & astringentia, miscenda erunt.

Quarto

DE COMPOS MEDICAM.

221

CAP.

VIII.

Quartò, conformatio partis, quæ medica-

4. Confor-

mario.

tenti formam, modumque utendi præscribit: com-
ponendorum medicamentorum occasionem ali-
quam exhibet. Propter formam enim idoneam,
multa miscemus, ut infra apparebit. Deinde propter
avitates & meatus partis affectæ, addimus, quæ per
atentes vias ducunt, ut malum sit in cava epatis
purgantia; si in gibba, diuretica, epaticis mi-
scemus. Tandem, cum pars acutis sensus validis reme-
diis tentanda non sit, ne vires dolore dissolvantur,
ut partes in consensum trahantur: remedia congru-
entia erunt contemperanda, & si acria validaque
miscenda, quæ acrimoniam obtundunt, & par-
tis robur confirmant.

5. Sensus

partis.

Quæ est ratio partis affectæ: Eadem ipsis ægri.

Natura

ægri.

in agro autem considerantur potissimum, ætas, se-
xus, consuetudo, vitæ genus, temperamentum, na-
turæ proprietas, quæ omnia medicamentorum
compositionem interdum variant. Vires enim inte-
ræ, ætas consistens, validiora semper sustinent, &
consuetudo deteriora sæpè minus infesta reddit, &
propter peculiarem *ιδιοσυγκρασίαν* alia aliis magis
accommodata sunt, & alii fortiora faciliè, alii levio-
ra agere sustinent. Quæ omnia intentionem medici
variant, & compositionis causam præbent.

Tertia causa compositionis, est in ipsis medi-

Tertia

causa com-

positionis

est in medi-

camanti.

amentis, quod nullum tale simplex reperiatur qua-
cupimus, & necessitas exigit. Non reperitur potis-
simum, vel ob minus idoneam substantiam, vel non
debitam qualitatem, vel non justam quantitatem, vel
minus convenientem agendi modum. His addi-
mus duas alias necessitates, scilicet formam, ut &
medicamenta *πολύχρηστα* habemus.

Substantia autem medicamenti varia est, va-

1. Ratione

substantia

rumque apparatus, & permixtionem, requirit. Nam

Zz

liqui.

liquidis sicca miscemus, ne diffuant, & siccis liquida
ut facilius penetrent: crassis, viscidisque, attenuan-
tia, incidentia, ut acetum: aspera laevigamus, & visci-
dis miscemus, ut metallica in affectibus oculorum
Medicamentis tenuioris substantiae, & facile resolu-
bilis, ut oleo cinamomi, cardui, &c. aliquid crassio-
ris, viscidiorisque, addimus, ne vis facile evanescat.

Medicamenta, quae facile putrescunt, & cor-
rumpuntur, saccharo, melle, aceto, sale, aut similibus
conservantibus, condiuntur.

Deinde, minus apta medicamenti simplicis
qualitas, inter praecipuas componendorum medica-
mentorum causas numeratur. Qualitas autem, sive
vis, medicamenti simplicis aliquando intentioni ne-
cessaria est, sed affectui non proportionata, & vel
nimis remissa, vel intensa vel cum malignitate aliqua
conjuncta, vel parti affectae non appropriata. Ali-
quando facultas aliqua medicamenti intentioni ne-
cessaria non est, sed supervacanea, & aliena. Nam
debiliora, aut ignaviora vehementioris, aut acrioris
permixtione, intenduntur, & excitantur, ut
medicamenta primo gradu calida, permixtis ca-
lidis secundo, aut tertio gradu. Vis purgans pilula-
rum intenditur additis granis aliquot diagridii: vis
purgandi in turbith, aut Agarico, excitatur, & agendi
celeritatem acquirit, addito gingibere, aut sale gemi-
mae: vis Rhabarbari, addita spica, &c. Deinde validio-
ra, intensioraque medicamenta, permixtione medica-
menti, vel contrariae facultatis, vel ejusdem, sed debilio-
ris, contemperantur, ita in confectioe Aromatici Ga-
ryophyllati calor intensus garyophyllorum, piperis,
galangae contemperatur, non solum permixtione
rosarum, sandali, trochiscorum diarhodon, quae
frigida sunt: sed etiam glycyrrhiza &c. Nam ro-
mam remittit intensum, & intensum intendit re-
missum,

issum. Ad eundem modum, ubi purgantium violentiam metuimus; validioribus ignava interdum nascemur, ut scammonia mannam, Helleboro solia, Epithymum, &c. Aliquando violentiam purgantium tantum contemperamus contrariis, ut scammonii, tragacantha & malo cydonio &c. Ut quorum vis in crassa materia hæret, qualia sunt turbit, agarius, rhabarbarum, acrioris extenuantis permixtione extimulantur: ita aciora, & vehementiora, ut Scammonium, colocynthis, crassioris & scidioris permixtione contemperantur. Tertio, quod maligna qualitate præditum est, benignioris permixtione obrunditur, aut contrariis contemperatur, aut mitigatur, ut opii malignitas addito croco, castoreo &c. colocynthidis, addito castoreo amygdalarum, tragacantha: Ellebori malignitas, qua ventriculum afficit, addito aniso, dauco, &c. Quarto, si parti affectæ medicamentum appropriatum non sit, adduntur dirigentia, de quibus supra. Quinto, si medicamentum supervacanea, non necessaria qualitate, sit præditum, ut si illa humectatio intentione nostræ necessaria sit, & datur medicamentum frigidum humidum: tum de-
ta permixtione calidi humidi frigiditatem illam supervacaneam temperabimus, & intentioni nostræ satisfaciemus. Præterea sapor, odor, interdum calor jucundus, assumptionem medicamenti impedit, vomitum, anxietatesque aliquando inducit: Proinde medicamentorum insuavitas vino, aqua cinamomi, aromatis, &c. corrigenda: Pro odoris jucunditate suaveolentibus cinamomum: gariophyll. anom. &c. addimus. Item moschum, aquam rosar. quæ odoris fragrantia spiritus reficiunt, & animum exhilarant: coloris: verò causa unguentis cerussa miscetur, ut albescant, & pilulæ, boli, aut electuaria foras auri integuntur.

Z z z

Tertio

VIII.

3. *Ratione
quantita-
tis.*

Tertio, propter quantitatem non debita interdum compositio necessaria videtur, sed rarius & potissimum, ubi iusti medicamenti necessaria quantitas deficit, qui defectus alio simplici, ejusdem facultatis, suppleri debet, veluti, si opus sit binis drachmis Agarici, & ii deficient, suppletur, addita quantitate proportionata alterius phlegmagogi, ut turbith.

4. *Propter
modum a-
gendi.*

Quarto modus agendi medicamentorum, ubi intentioni nostræ non satisfacit, compositione occasionem præbet. Intentio enim est, ut nunc citò, nunc tardè agat: nunc faciliè penetret, nunc subsistat, aut non descendat, &c. Quorum omnium ratione aliquid plerumque miscemus. Ita agaricò ut citò ad fundum ventriculi, descendat, sal gemmæ, & ne ad fundum ventriculi moveatur, semina raphani: Rhabarbaro in dysentericis, ut tardè agat pulverem myrobalanorum: Emplastris & unguentis lienis, aliisque, acetum addimus, ut vis faciliè penetret.

5. *Ratione
formæ.*

Quinta causa compositionis in medicamentis est, ut formam eam consequantur, quæ maxime ex usu nobis futura sit. Formæ autem multiplex utilitas. Nam non solum alii hac, alii illa forma magis delectantur: sed etiam aliæ atque aliæ formæ aliis atque aliis affectibus, partibusque affectis, & operationibus, magis accommodatæ sunt, pilulæ enim magis à capite, potiones à ventriculo, viciniisque partibus, trahunt.

Propter formam autem varia miscemus, ut propter formam Emplastri, pulveribus ceram, oleum resinam; propter Electuarii, speciebus syropos, aliasque liquida; propter Syrupi, succis, & decoctis, mel saccharum, &c. Cum forma conjungi poterunt medicamenta conservantia.

Postremus compositionis scopus est, ut medicamen-

anenta πολύχρηστα semper in promptu habeamus,
alia sunt Theriaca, Diacatholicon, &c. quæ variis
abus serviunt, & intentioni nostræ promptè satil-
iunt. Hæ sunt præcipuæ causæ componendorum
medicamentorum. Consequens est, ut viam, modum
componendi, & proportionem componentium
ponamus.

6. Propter
varias cō-
positorum
vires.

CAP. X.

*De modo compositionis, & differentiis
compositorum medicamen-
torum.*

Modus componendi medicamenta requirit, ut
præcognoscamus: i. morbi speciem & ma-
gnitudinem, conditionem ægri, partisq; af-
fectæ. Deinde, ut naturam ipsorum simplicium, ex qua requi-
ritur, sit compositio gratia curationis, nimirum sin-
pliciorum simplicium facultates facultatumq; gradus,
doses. Morbi autem speciem, & magnitudinem, ex
his signis, & causis indagare oportet; ut iis remedium
contrarium inveniatur, de quibus Galenus in *libro
pathologia, & Methodi medendi*. Natura ægri, partisq;
affectæ, ex physiologia cognoscitur. Simplicium fa-
cultates, facultatumque gradus; ex Dioscoride, &
libris Galeni de *Simplic. facult.* aliisque probatis au-
toribus. His præcognitis, non difficile erit, modum
compositionemque componendi, & quomodo singula ad
compositionem concurrant, definire, & determi-
nare.

Concurrunt autem simplicia in compositione *Partes in*
non uno, eodemque modo, nec iisdem viribus, sed *compositis.*
Zz 3 quem-

X.
one medica-
mentorum.

Quemadmodum in organis humani corporis, nimirum in oculo, una pars præcipua est humor crystallinus, radix, & domicilium, facultatis videndi: ceteræ partes tantum intervniunt, & in unius actionis famulatum conspirant, vel quia sine illis non actio, vel quia tutius, faciliusque vel quia melius: in cõpositione medicamentorũ una pars principa est radix, & domicilium curationis, quæ per similitudinem basis dicitur. Ut enim in ædificio, basis est columen, sive fundamentum, cui totum ædificium perstruitur: ita in compositis medicamentis, basis est pars illa præcipua, quàm ceteræ omnes spectant, profiligando morbo accommodatissima. Accommodatissima autem putatur, si morbo planè æqualis, id est, qualitatem, & quantitatem, sive gradum idoneum habeat. Qualitas autem medicamenti donec ex morbi specie: quantitas agendi, sive gradus, ex morbi magnitudine, & natura partis affectatæ estimatur.

De basi-
bus differe-
ntiis & qua-
litate.

Quemadmodum autem affectus, alius simplex, alius compositus: ita basis, quæ affectui correspondere debet, alia simplex, alia composita est. Vtrumque simplex, & composita basis, diversis modis dicitur. Nam uno modo simplex basis est, quæ unum usum præstat, licet ex pluribus simplicibus ejusdem facultatis, composita sit, ut in Elect: Diatriopipereon. Deinde alio modo, quæ uno simplici medicamento constat, ut Aloë in Hiera picra. Ita basis composita erit, vel quæ plures usus præstat, vel quæ ex pluribus simplicibus composita est. Vtrumque quæ ex pluribus simplicibus, eadem facultate præditis, composita est, pro simplici habetur, quia uni intentioni tantum satisfacit. Quæ verò ex pluribus, diversa, aut contraria facultate præditis, compositæ sunt, bases compositæ potissimum vocantur, quod varios, discrepantesque usus præstent, ex quibus

funt



unt medicamenta πολυγενεα, quæ diversas ope-
rationes habent. A basi plerumq; tota compositio
denominatur, & ex basi facultas facultatisq; gradus
Dosis totius compositi æstimatur, cum in cura-
onibus ipsa basis morbo, aut causæ morbificæ,
semper opposita sit. Nam facultas ipsius basis, ex
affectus specie; magnitudo verò, ex magnitudine
affectus indicatur, ut dictum est. Proinde
magnus morbus, magna validaque remedia, parvus
debilia requirit. Tamen variant basin alia quàm plu-
rima, ut morborum tempora, & symptomata ur-
gentia, deinde natura partis affectæ, ut supra dictum
est, & constitutio ægri, sub qua continentur vires,
ætas, sexus, consuetudo &c. præterea aër ambiens,
liæque circumstantiæ. Nam alia basis in principio,
non apparentibus signis concoctionis, alia in incre-
mento, & statu, convenit, alia tempore exacerba-
tionis, alia remissionis. Deinde pars affecta ignobi-
lis, densa, in profundo sita, aut sensus hebetioris,
validiorem basin & remedia indicat. Eodem modo
vires ægri robustæ, ætas consistens, consuetudo,
genus laboriosum &c. item aër ambiens, ubi
morbo conspirat. His contraria debilem ba-
sin exigunt. Præterea ob ιδιουσυχροσίαν, sive peculi-
arem naturæ proprietatem, alii validissima medica-
menta & alimenta facile sustinent, alii levissimis eti-
am facile afficiuntur; alii his, alii illis, magis delectan-
tur.

Variatur etiam basis pro qualitate, & quan- De cateris
titate, cæterorum componentium, quæ basi in partibus cõ
serviunt, vel ratione morbi, & causarum mor- positionem
bificarum, vel partis affectæ. Nam si morbum, cau- ingredi-
sasque morbificas respicias: basis aliquando morbo ribus.
accommodata planè est, aliquando non, & inæqua-
lis. Inæqualis autem, quia vel nimis remissa, vel ni-

mis intensa, vel maligna, vel aliena sive non necessaria qualitate prædita. Remissa dicitur, quæ debilis, ignava, tarda, in crassiori minusque efficaci materia fixa. Nimis intensa contra, quæ vim validam vehementem habet, celeriter & cum vehementia agit, acri & efficaci materia prædita est. Maligna dicitur, quæ cum noxa partis alicujus agit, pravaque symptomata inducit, ut folia senæ ventris tormina helleborus suffocationem, anxietates: Aloë hæmorrhoides aperit. Aliena sive non necessaria qualitate prædita est, quæ intentioni nostræ non satisfacit, ut in Rhabarbaro qualitas adstringens, ubi intentio tantum est bilem purgare. Huc referuntur calor, sapor, odor ingratus.

Basis corrigentia.

2. Dirigentia.

Medici autem est in compositione medicamentorum omnem inæqualitatem tollere, & medicamentum morbo, parti; affectæ, prorsus accommodatum reddere. Nam si vis ipsius basis ignava, debilis, tarda sit, aut in materia minus efficaci: extimulantibus & acuentibus corrigitur. Sub acuentibus continentur corroborantia, quæ virtutem medicamenti tenuis substantiæ in unum cogunt, augent, & quasi concentrant, ita camomeli vis augetur, & diutius conservatur, addito modico aluminis, aut alterius astringentis: Vis in materia crassæ essentiæ excitatur, additis extenuantibus. Si basis sit nimis vehemens, violenta, acuta, corrigitur refrenantibus. Si maligna aut aliena qualitate prædita; admixtis contrariis contraperantibus benignioris naturæ. Sub his continentur, quæ calorem, odorem, & saporem jucundum conciliant. Appropriata verò parti affectæ redditur basis directivis, seu dirigentibus. Sub dirigentibus autem comprehendi poterunt, non solum quæ familiaritatibus substantiæ parti conveniunt, sed etiam quæ vias ductusq; aperiunt, humores præparant, & concoquunt.

Hæc

Hæc omnia, ut melius componantur & agant: lia nonnulla requirunt, quæ corrigentia & dirigentia basi affigunt, vel quæ formam idoneam toti composito attribuunt, ut pro internis medicamentis, liquores, syrapi, decocta mucilagines, pro externis, oleum, cera, &c. Conservantur autem medicamenta, vel idonea præparatione, ut alibi dicemus, vel aliorum permixtione, nimirum saccharo, melle, sale, & aceto, &c. ut supra dictum est. In compositis autem plerumque quæ basi affigunt, formasque attribuunt; totam compositionem conservant. Igitur in compositis præter basin tria potissimum considerantur corrigentia, dirigentia, & conservantia. Quorum proportio in compositione Medico observanda erit.

3. Conservantia.

Modus componendi partim ratione, partim experientia usuque constat. Ratio autem experientiam dirigunt. Nam nemo verum componendi modum intelligit, nisi qui methodo curare potest. Methodo curare, est per indicationes remedium invenire unicuique morbo accommodatum, & contrarium, ut dictum est.

Vis medicamenti judicatur ex basi, cui in compositione cætera serviunt: igitur de basi, basisque proportionem in compositis, sive ea simplex, sive composita fuerit, primum dicemus: deinde de cæteris compositionem ingredientibus, eorumque ad basin proportionem. Nam ex debita simplicium proportionem tota compositionis ratio dependet. Dosis autem, sive determinata quantitas basis, dependet ex ipsius facultatis vehementia. Nam si basis sit robusta, ut scammonium, aut opium, de ea minorem quantitatem in compositione sumimus: si debilis, ut crassia, rosa, majorem; Si mediocris, ut agariæcus, lacca, mediam. Nihilominus variatur dosis sive quantitas pro natura ægri, magnitudine, sensu, situ,

Zz s

& di-

& dignitate partis affectæ, item actionis celeritate aut tarditate. Nam vires robustæ integræque; paræ magna, ignobilis, sensus hebetioris in profundo sita majorem dosin exigit, quemadmodum ubi actionis celeritate indigemus. Verùm purgantia tantam quantitatis, siue dosis variationem, id est, incrementum & decrementum non ferunt, quantam medicamenta alterantia.

De compositione medicamentorum secundum qualitates primas.

Composita autem basis, pro componentium ratione, multis modis variatur. Commiscentur autem medicamenta secundum qualitates primas, secundas, tertias aut quartas. Secundum primas autem quando in uno simplici non datur gradus, quem cupimus, sed vel remissior, vel intensior, ut si opus sit medicamento calido secundo gradu, & nullum detur simplex tale, sed vel calidum, aut frigidum gradu primo, & calidum in tertio gradu, dubitatur, non solum ex quibus componi debeat calidum secundo gradu: sed etiam de dosi singulorum. Nam de proportionem ordinum, siue graduum in alterantibus non consentiunt medici.

Opiniones medicorum de gradibus eorumque partibus.

Primum autem opinatur Alchindus Arabs, temperatum medicamentum habere æquales partes caloris & frigoris, sed calidum in primo, duplum caloris temperati; calidum in secundo, duplum gradus primi; in tertio, duplum secundi; in quarto, duplum tertii, proinde calidum in quarto gradu quadruplam habebit rationem respectu secundi; octuplam, ratione primi, sed eundem, ratione temperati; eadem ratio est in cæteris qualitatibus primis.

Verùm hic modus physicis rationibus accommodatus non est, sed errat, quòd minimum augmentum præsupponat duplum semper esse. Deinde ex hac ratione sequeretur, gradus inæquales partes habere, majores secundum gradum, quam pri-

primum, adhuc majores tertium, maximas quartum. Item medicamentum tertii gradus lethale esse. Melius igitur constituuntur gradus alterantium ex affectibus sensui evidentibus, ut partes sive gradus æquales constituantur, & æqua omnium partium distantia, ita medicamentum temperatum æquales partes caloris & frigoris, humiditatis & siccitatis habebit. Nimirum si summus gradus sit quatuor partium in temperatis, erunt duæ partes caloris, totidem frigoris. Si duodecim, sex caloris totidem frigoris. In intemperatis verò, tantum unius contrarii semper corrumpi debet, quantum alterius generatur. Proinde calidum in primo gradu dicitur, quia uno gradu vincit temperatum: in secundo, quia duobus: in tertio, tribus: in quarto, quatuor. Ut igitur intelligatur in quolibet gradu, quot partes utriusque contrarii sint, nimirum calidi, aut frigidi: primò à tota graduum latitudine, scilicet quatuor, auferatur numerus appellationis propositi gradus. Deinde dimidium relictæ numeri addatur numero dati gradus & prodeunt partes qualitatæ prædominantes, alterum relictæ dimidium, erit quantitas partis alterius contrarii in mixto, ita calidum in primo gradu partes $2\frac{1}{2}$ caloris, $2\frac{1}{2}$ frigoris habet. Calidum in 2 gradu tres partes caloris, unam frigoris. Calidum in tertio gradu partes caloris $3\frac{1}{2}$, frigoris $\frac{1}{2}$: in quarto gradu omnes quatuor partes caloris, nullam frigoris. Quæ est ratio in gradibus: eadem etiam in singulorum graduum mansionibus, ita calidum in prima mansionem primi gradus habet partes $2\frac{1}{8}$ caloris, frigoris $1\frac{7}{8}$. in secunda mansionem secundi gradus partes caloris $2\frac{1}{4}$ frigoris $1\frac{3}{4}$ &c. Nam ut in compositorum, ita in simplicium partibus intensum intendit remissum, & remissum remittit intensum ad medium

*Ratione
randi par-
tes cuiusque
gradus aut
mansionis
in quolibet
simplici.*

stri-

*Ratio cogno-
scendi gra-
dus & mā-
siones com-
positorum.*

utriusque proinde gradus in semisses, mansiones in sextantes graduum, dividuntur. Ex hac ratione non difficile erit determinare proportionem simplicium in compositis, & qualitatem, qualitatisque gradum. Componuntur autem simplicia plura vel ejusdem facultatis, vel contrariæ, item vel ejusdem gradus vel diversi. Quando plura unius & ejusdem facultatis, & gradus, componuntur, necesse est & compositum ejusdem tam facultatis, quàm gradus esse. Verum ubi componuntur plura ejusdem facultatis, sed gradus diversi, ut piper calidum in tertio gradu, & spica calida in primo gradu, remissum remittit intensum, & intensum intendit remissum ad medium utriusque, oriturque compositum in secundo gradu calidum. Quando verò plura misceantur contrariæ facultatis, si gradus ejusdem, ut rosa, & spica, oritur compositum temperatum. Si gradus diversi, ut rosa & piper, compositum reducit ad medium utriusque, scilicet ad calidum in primo gradu. Eadem est ratio in mansionibus. Nam calidum in prima mansioni primi gradus, reducit frigidum in tertia mansioni tertii gradus, ad frigidum in prima mansioni secundi, ad calidum in tertia mansioni primi, idem reducit ad primum gradum perfectum. Verum in his quantitas omnium componentium æqualis esse debet, si inæqualis, pro suo augmento, aut decremento cujusque, qualitas ejusdem in composito augetur, & minuitur. Nam magna vis quantitatis in compositis est, verum non tanta, ut duplicata aut quadruplicata quantitate medicamenti, duplicetur aut quadruplicetur facultas, deq; suo gradu aucta dosi, medicamentum recedat, ut Montanus voluit. Nam quantitas medicamenti aucta, actionem quidem intendit, sed ad certum usque gradum à natura præfixum, quia quantitas aucta diuturniorem actionem habet, minoremque resistenti;

entiam. Propter resistantiam enim fit, ut idem nunc
 intensius, nunc remissius, agat, veluti piperis,
 ut cardamomi magna quantitas diutius aut vio-
 lentiùs alterat, & licet aliquando interficiat, non
 tamen ultra tertium gradum agit, sed interficit,
 quatenus habitum partium corporis diu multum-
 ue alterat. Verùm si minuatur dosi medicamenti
 simplicis; minuitur quoque à contrario actio ad mi-
 nimum propè, veluti drachma una rosarum, drach-
 mam unam piperis reducit ad primum gradum ca-
 loris, sed drachmæ duæ rosarum, drachmam unam
 piperis ad medium ferè primi gradus caloris.

Contra drachmæ duæ piperis, drachmam unam ro-
 sarum ad medium tertii gradus caloris reducent,
 tres drachmæ piperis, ad tertiam mansionem se-
 cundi gradus. Verùm maxima piperis quantitas to-
 tam compositionem ultra tertium gradum deduce-
 re nequit. De his lege 9. cap. libri 9. *controvers. medicar.*
Calesii.

Observandum autem imprimis est, hanc ra-
 tionem tantum locum habere in compositis ante
 illam fermentationem, quàm diu vires simplicium
 integræ adhuc sunt. Nam medicamentorum com-
 positio, vera mixtio non est, nec ipsa simplicia, quæ
 in potentia tantum sunt, & actum à corpore nostro
 recipiunt, in compositis agunt, aut patiuntur, nec à
 se invicem contemperantur, nisi accedat fermenta-
 tio, quæ nihil aliud propriè est, quam per mutuam
 alterationem unio, qua pristinæ singulorum vires
 integræ non permanent. Nam theriaca recens aliis
 viribus, quam verus, prædita est,

Igitur ante fermentationem singula simplicia
 in compositis, ubi à calore nostro tantum excitata
 fuerint, & in particulas comminuta, secundum pro-
 prias vires agunt, non solum in corpus nostrum,
 sed etiam, dum à calore nostro dividuntur, in se
 mutuo

*Quomodo
 agunt sim-
 plicia in
 mixtis.*

*Fermenta-
 tio quid.*

*Vie fermenta-
tionis.*

mutuò. Atque ita actione sua se invicem refrangunt, oriturque ex proportionem majoris & minoris æqualitatis, actio. Quare nulla facultate discretrice indigent partes humani corporis, ut voluit Avicenna, quæ singula illa in compositis sece nat, & ad proprios usus referat. Agunt enim singula secundum suas vires, in actum deducta. Post fermentationem autem nova & occulta vis emergit. Oritur autem fermentatio ex mutua simplicium alteratione, ab igne, vapore, aere, putrefactione & similibus. Medici officium est, non solum medicamentorum vires virumque gradus dignoscere, sed etiam mixturarum rationes, quid, quale, aut quantum oriatur, ac omnium fermentationum vires modosque inter quos excellent chymicorum digestionem circulationes &c. quibus non solum aliena & inutilia separantur, sed etiam vires discrepantes consociantur & ununtur.

*Ratio mi-
serendi sim-
plicium se-
cundum
qualitates
secundas
aut tertias.*

Quæ est ratio in primis qualitatibus: eadem quoque in secundis, tertiisque. Verum cum secundæ, tertiæque viribus primarum tantum agant: necesse est contemperatis simplicium primis qualitatibus, in compositis secundas, & tertias una simili que ratione alterari, nimirum assumpta; in corpore secundum vires proprias, singula simplicia agere propter actionem primarum qualitatum; ex quibus resultant secundæ tertiæque: quod si ejusdem sint facultatis, ut rosa, & galla astringentis, apium & semen melonis diureticæ; intensum intendere remissum, & remissum remittere intensum: si diversæ facultatis, veluti unum emplastrictum, alterum epouloticum, pro modo mixtionis, & ratione primarum qualitatum novam plerumque secundam, aut tertiam, qualitatum oriri. Nam ex debita mixtione emplastricti cum epoulotico, aut detergente, oritur sarcoticum: ex sarcotici cum astringente, glutinans: ex astringentis cum validè siccante, epouloti-

ouloticum &c. Proinde tota compositionis ratio medicamentorum secundum qualitates secundas, triasque, dependet à compositione, & affectibus, primarum. Purgantia medicamenta, alia manifesta qualitate quemcunque humorem evacuant, lubrificando, abluendo, & detergendo aut comprimendo: alia occulta substantiæ qualitate peculiarem humorem evacuant: Deinde alia remisse leniter purgant: alia vehementer aut citò, alia mediocriter. Antequam autem hæc omnia componantur, singulorum vires & doses cognoscendæ erunt. Dosis longa experientiaprehenditur; facultates, utalibi dictum est.

Miscentur autem purgantia variis modis primum *ὁμοειδέσσι*, similia similibus, nimirum *Compositio pur-*
lenientibus; aut mediocria mediocribus: *gantium.*
et vehementia vehementibus, secundò dissimilia dissimilibus, ut lenientia mediocribus, aut vehementibus: mediocria vehementibus; Quando similia similibus miscentur, & alterum alterius actionem promouet: totius compositi quantitas nunquam excedat justam eorum dosin, tantum enim de singulorum dosi detrahendum est quantum reliquorum quantitate suppletur: Verùm rationem habere oportet facultatis, quæ nobis maximè necessaria est, scilicet si maximè necessaria sit facultas bilem purgans, & misceatur rhabarbarum cum agarico; compositi quantitas non excedat drachmas duas, quæ utriusque dosis est, verum major pars in composito sit rhabarbari, minor sit agarici. Quando componuntur purgantia, quorum unum alterius actionem impedit, ut cassia cum hiera, aut pulvere myrobalanorum, semper augenda erit compositi dosis. Quando lenientia mediocribus, aut validis miscentur, utriusque ea dosis sit quæ separatim. Ubi valida mediocribus ut vires mediocrium acuant;

*Observan-
da in mix-
tione medi-
camentorū
secundum
qualitates
occultas.*

*Proportio
basis.*

acuant, mediocrium dosis sit usitata, vehementius multò minor, in gravis aut semiscurpulis tantum si pari ratione purgare debeant, augeatur medicamentum quantitas supra partis debitæ proportionem.

Verum in his omnibus cautio adhibenda est, ut perpendamus, quæ manifesta, quæ occulta viuant. Nam tutius multò est plura miscere, quæ manifesta, quam quæ occulta qualitate agunt. Vis enim compositi, ex simplicibus manifesta qualitate præditis, sensibus est evidens, & ratione dijudicatur; at ex simplicibus occulta facultate præditis, occulta, sensibusque obscura est, & non ratione, sed solius experientia comprobatur. Nam in qualitatibus manifestis evidens est, contraria se mutuo contemperare, remissum remittere intensum, intensum intermittere remissum, ad medium utriusque. In occultis qualitatibus talis ratio non datur. Nam compertum est, nonnulla simplicia similes effectus edere, quæ tamen in compositis repugnant, & tacitis quibusdam viribus dissident. Quare ea simplicia occultis viribus prædita potissimum permiscenda, quæ longo usu deprehenduntur consentire; nec temere novæ composita excogitanda, sed vetera comperta novis incompertis semper præferenda.

Cum autem in omni compositione, basis si non quantitas, vis saltem summa esse debeat: cum basi nunquam miscenda erunt, vehementiora majori dosi. Proportio autem basis, & cæterorum ingredientium, ex basis vehementia, & debilitate æstimatur, habita ratione morbi, partisque affectæ. Nam si basis vehemens, ut scammonium, opium, &c. de ea minorem quantitatem sumimus, si debilis, multò maiorem quam cæterarum. Deinde ubi basis una simplexque est, plus in compositione requiritur; ubi ex diversis composita, singulorum minus. Præterea quæ partem affectam simul alterant

& cor-

corroborant, aut longè penetrare, & in profundum agere debent, aut quorum vis citò facileque solvitur: majori quantitate semper sumuntur: contra minore; ubi partem affectam tantum altè agunt, aut in superficiem tantum agunt, aut quorum vis tardè difficulterque dissolvitur. Eodem modo & alius, quod facultate aliena, & non necessaria præstitum sit, aut quod nullum in contrario oppositum habeat.

Corrigentia autem quæ augent, vel minuunt, *Proportio corrigentium.* occultatam basis, in minori quantitate semper esse debent. Communiter autem basis proportio ad minuentia, & acuentia tripla nonnullis putatur: Vt si variatur hæc proportio pro natura basis, & ingredientum corrigentium. Nam alia magis, alia minus, vires basis augent, minuuntque. Deinde variatur proportio pro varia intentione medici, ut in compositione Hieræ picræ, proportio aloes ad cætera corrigentia, quemadmodum testatur *Galenus 7. Methodi. et 4. de Sanitate tuenda.*

Quæ malignitatem basis occulta naturæ proprietas corrigunt, ut plurimum æquali quantitate *Proportio dirigentium.* assumuntur: quæ verò qualitatibus manifestis non necessaria, aut supervacanea corrigunt, qualia potissimum oppositis viribus constant, æquali, aut majori. Dirigentia sequuntur rationem basis. Quod enim basis debilior est, ejusque quantitas major, eò quantitas dirigentium minor sit, ad eò, ut sæpe octupla, ut decupla, sit basis ad dirigentia. Contra quo basis vehementior, ejusque dosis minor, ut Scammoniū, Colocynthis: dirigentium quantitas major esse debet, nimirum quantitati basis æqualis, aut paulò major, quemadmodum est stæchas in pilulis cochiis: quæ ob id cephalicæ vocantur. Nam vis medicinali dirigentis valida non est, & in exigua dosi ad partem affectam aliorum vires medicamentorum deducere nequit,

A a a

Tan-

*Praportio
conservan-
tium.*

Tandem quæ conservationis, formæ, & suavitatis gratia compositis permiscantur, basin nec nimia quantitate planè obtundere, nec aliena qualitate pervertere debent, sed qualitate sua aut vires basis juvare huc mel in syrupis, electualis, aliisque compositis calidis, extenuantibus, & abstergentibus: aut viribus basis nihil, aut quàm minimum resistere, ut Saccharum in syrupis, Julepis, aliisque compositis frigidis: Cera & oleum in unguentis, & Emplastris. Quantitas autem nunc cæteris æqualis nunc major, nunc minor, prout basis fortior, aut debilior. Quæ consistentiam compositi variant in dispari proportionem sumuntur. Verum hæc aliaque omnia necessaria, & perpetua lege definita non sunt, sed pro intentione prudentis medici discernant, ut in singulis pendè compositionibus apparet, ubi plurimum artificiosa compositionis ratio & exigentia potest, pharmacopœis notissima. Proinde proportionem conservantium medici plerumque pharmacopœorum judicio permittunt. Totius compositi ex omnibus partibus facultas, ante fermentationem; ex supra dictis regulis, post fermentationem, experientia, & usu, deprehenditur. Dosis verò ex basi potissimum, iis, quæ basis vim augent. Cum autem finis compositionis sit, remedium invenire morbo, parti affectæ, & ægro accommodatum; accommodatum autem non est, nisi quod idoneam formam habet, proinde in compositis forma primum consideranda erit, deinde usus.

*Divisio
medicamentorum
compositorum
i. Ratione
formæ.*

Utriusque ratione dividuntur composita. Nam primo forma medicamenti, aut solida, id est, sicca, dura, crassa est: aut liquida: aut mediocris consistentiæ.

Igitur composita alia solida erunt, alia liquida, alia mediocria. Solida autem vocantur quæ sicca, ut pulveres: vel dura, aut crassa, ut pastilli, cataplasma, Ele-

Electuaria solida, Emplastra, glandes, &c. Liquida, quæ humidam fluxilemque substantiam habent, ut aquæ destil: decocta, infusa, syrupi, olea, &c. Mediæ consistentiæ sunt, quæ medio modo se habent, ut eclegmata, Elect. mollia, quæ communiter opiata dicuntur, linimenta, &c. Verum quæ consistentiam mediam habent interdum solidis annu-

2. Ratione
us.

Deinde, quia composita formam usui accommodatam habere debent, pro modo utendi distinguuntur communiter in interna, & externa. Interna autem medicamenta vocantur, quæ intra corpus assumuntur aut ingerantur. Externa verò, quæ extrinsecus corpori admoventur.

Internorum medicamentorum plura sunt genera, quorum alia assumuntur, sive devorantur: alia injiciuntur, sive ingeruntur. Assumuntur, sive devorantur tragemata, trochisci sive pastilli, cataporia, boli, condita simplicia, & composita. Eclegmata, Electuaria liquida, & solida, nimirum confectioes aromaticæ, catartica, opiata aut antipharmacæ, antidoti, in quibus omnibus continetur tabulæ, pantalea, dasta, morselli, orbiculi, adduntur apozemata diluta, poriones, syrupi, julepi, Emulsiones, succi, sapes, &c. Inter olea destillata, tincturæ, magisteria, extractions, sales, aliæque chymicorum medicamentorum formæ. Ingeruntur verò, sive injiciuntur, clysteres, gargarismi, erihina, apophlegmatismi, glandes sive suppositoria, pelli, & similia, quorum nonnulla magis sunt facultatum, quàm formarum nomina.

Internorum
medica-
mentorum
forma.

Externæ medicamentorum formæ sunt Externorū
olea, unguenta, linimenta, cerata, empl. cataplas. forma.
sive malagmata, fomenta sicca & humida, infusus, balnea, Epithemata, Embroche, sacculi, pulvres inpergendi, saponess, suffitus &c.

A a a 2

addunt

addunt aliqui cauteria aliaque quæ magis sunt facilius
cultatum nomina. Verum ex his omnibus nonnulla
sunt, quæ & apponuntur & injiciuntur, aut olea, deco-
cocta, emulsiones & similia.

*Composita
medi. unde
nomen for-
tiantur.*

Distinguunt composita non solum à forma, sed etiam ab effectibus, & à parte affecta. Nam ab effectibus alia purgantia, alia diuretica &c. A parte verò cui destinantur, aut ab usu variè distinguuntur, & denominantur, unde quæ auribus injiciuntur, *ωτὶ γλῦται*; quæ oculis, collyria; quæ utero, *μικτὴ γλῦται*; quæ naribus, Errhina; quæ pituitam per os purgant, apophlegmatismi nominantur. Eodem modo alia cephalica, cardiaca, &c. dicuntur, quia cum facultate forma talem habent, qualem figura partis requirit.

Verum cum non eadem forma omnia purgantia, vel cephalica præscribantur: satius erit à forma compositiones & di videre & denominare. In genere quidem omne compositum non enim habet à formâ: sed in specie singula à basi potissimum, ut theriaca à theriis, sive viperis, dialacca, à lacca, &c. Aliquando tamen ab aliis compluribus composita denominantur, & vel ab aliis ingredientibus, ut Elect. Diaphœniconis à dactylis: vel ab usu, Elect. Diacatholicon, Lætificans: vel à parte cui conveniunt, ut pilulæ arthetice, stomachicum laxativum, vel à præstantia, ut Hieræ, Benedicta laxat. loch sanum, &c. vel ab inventore, ut Mithridatium. Philonium. confectio Hammech: vel à loco, ut Syrupus Bizantinus: vel à colore, ut emplastrum citrinum, unguentum album, De singulis compositorum formis peculiari tractatu, Deo favente, dicemus. Debita componendi ratio, ut supra dictum est, requirit aptam omnium & singulorum præparationem. Consistit autem præparatio medicamenti partim in inutilibus, aut non necess-

necessariis, removendis, partim in qualitatibus corrigendis, partim ut usui melius serviant, & cum aliis componantur.

CAP. XI.

De præparatione medicamentorum.

Præparatio alia in simplicium tantum sine mixtione, alia in mixtione, aut propter mixtionem.

Utraque præsupponit omnium simplicium, quæ præparanda sunt, exactam cognitionem, item effectuum, omniumque operationum naturalium. Verum præter hæc præparatio compositorum exigit, ut non solum proportionem omnium facultatum & effectuum cognoscamus, sed etiam, si fieri queat, omnes mixturarum rationes; quid, quantum, & quale oriatur, si hoc cum illo jungatur, item fermentationum vires: ut supra dictum est.

De præparatione medicamentorum.

Modi præparationum alii communes, & usitati sunt, alii chymici. Illi numero definiti non sunt, verum præcipui existimantur infusio sive maceratio, elixatio, affatio, ustio, calinatio, liquatio, dissolutio, tritura sive pulverisatio, & lævigatio. Ad duntur his expressio, percolatio, despumatio, putrefactio, extractio, humectatio, exiccatio, sectio, &c.

Communes præparationes.

Chymicæ præparationes magis efficaces sunt, magisque laboriosæ & ingeniosæ. Perficiuntur enim instrumento caloris, artificiosa manuum operatione sive *cœxegia*, in eum finem, ut per artificiosam quandam transmutationem portio substantiæ medicamentosa vi prædita à terrena facie, omnibusque impuris & alienis separetur, viresque melius consociantur. Absolvuntur enim omnes operationes

Chymicæ operationes.

X I.

gyricæ quadam transmutatione vi caloris potissimum, aliquando frigoris.

*Caloris ino-
perationib.
chymicis
quatuor
gradus.*

Caloris autem in operationibus quatuor statuuntur gradus: quorum primus est in vapore balnei, cui correspondet calor in fimo equino: Secundus in cineribus: tertius in arena aut scobe ferri: quartus in aperto igne, cui correspondent aquæ corrosivæ: Deinde quilibet gradus pro intensione & remissione suas partes habet.

*Operationū
chymicarū
7. gradus.*

Transmutationum sive operationum modi complures sunt, à Paracelsi *lib. de Transmutat. rerum natural.* septem enumerantur.

*1. Gradus
calcinatio.*

Primus gradus transmutationis Calcinatio communi nomine à Paracelsi dicitur, transmutatio scilicet substantiæ in calcis aut cineris formam per summum caloris gradum. Differt autem Calx & Cinis, quia in cinere plus siccitatis est, quàm in calce; & calx metallorum in metallum reduci potest, Cinis verò non. Ex cineribus cum aqua fiunt lixivia, unde eliciuntur sales. Sub calcinatione continetur calcinatio simpliciter dicta: deinde Reverberatio, quæ est calcinatio in furno reverberii: Tertio Cementatio calcinatio metalli per cementum, quando metalla illita aqua corrosiva vel strata pulvere corrosivo reverberatione in calcem transmutantur. Quarto Precipitatio, nimirum calcinatio per resolutionem in aqua corrosiva: his additur Amalgamatio calcinatio per mixtionem Mercurii vivi in unam massam cum metallo.

*Reverbe-
ratio.
Cementa-
tio.*

*Precipita-
tio.
Amalga-
matio,*

*2. Gradus
sublimatio.*

Secundus gradus transmutationis est Sublimatio, quæ à nonnullis latè sumitur pro omni vaporum in sublime elevatione. Vapores autem alii sicci sunt, qui in aquam non resolvuntur, sed in materiam siccam solidam adhaerentem operculo aut laliteribus vasis; alii humidi, qui frigiditate postea in aquam convertuntur. Elevatio autem vaporum sic-

co.

serum adhaerentium operculo aut lateribus vasorum sublimato propriè dicitur: at elevatio vaporum humidorum, qui postea in liquorem resolvuntur, Destillatio vocatur.

Nam sublimatio propriè dicta est segregatio partis spiritualis & volatilis, à corpore concretiscentis in lateribus aut operculo vasis: Per sublimationem in mineralibus aliena multa separantur, variæque virtutes eliciuntur.

Verùm quia multa calcinantur & sublimantur, 3. *Gradus* quæ postea solutione quadam indigent, tertius *gradus* à Paracelso statuitur. Solutio, nimirum substantiæ solidæ in fluidam aut liquidam mutatio. Perficitur ista mutatio aliquando per separationem partis crassioris; propriè verò sine ulla separatione vi caloris & frigoris. Nè quæ coagulantur calore, ut sales, calcinata & sublimata omnia, ea solvuntur frigore in aquam aut oleum. Contra quæ coagulantur frigore, ut pinguis, solvuntur calore.

Huc referri poterit fusio, liquefactio, item *Ceratio*, in mineralibus & metallis Ceratio, quæ à Gebro definitur mollicatio ad liquefactionem rei duræ, aut succi non fusilis, quæ per iteratas sublimationes imprimis perficitur. Destillatio partes liquidas separat, quæ separatio, ut perfectè fieri queat, requiritur prius quædam materiæ præparatio maturatio sive putrefactio, quæ à Paracelso quartus gradus statuitur.

Est autem putrefactio in genere resolutio 4. *Gradus* aliqua corporis mixti vi caloris humidi in vase idoneo, ut partes discrepantes, aut purum ab impuro melius separari omniaque contemperari & corrigi queant. *Putrefactio*

Sub hac continetur primum putrefactio propriè dicta, quæ fit in fimo equino: deinde simplex Digestio, à calore tepido materiæ humidæ aut infusæ *Digestio*

X I.

Circulatio.

sive macerata cum idoneo menstruo ut aqua vitæ &c. in vase diligenter clauso ex infusione fiunt Tincturæ & magisteria, atq; hinc post menstrui evaporationem Extracta. Tertio Circulatio digestio in pellis cano aut vase ad in constructo, ut continuo vapores sursum ascendentes in aquam concresecunt, iterumq; defluant: quare circulatio mixta videtur actio ex digestionem & destillatione.

Fermentatio.

Per digestionem oriuntur fermentationes nimis mirum virium consociationes in medicamentis, unde multæ novæ virtutes emergunt Verum differt ista fermentatio ab illa, quæ fit interdum per commixtionem fermenti propriè dicti materiam penetrantis ut melius digeri & resolvi queat; aut per admixtionem proprii salis in extractis, cujus vi tota massa effervesceat, partesque omnes melius consociantur.

*Gradus destillatio.**Filtratio.*

Post materiæ præparationem sequitur Quintus gradus Destillatio, materiæ liquidæ à corpore segregatio; Segregatur autem pars liquida duobus modis, uno sine igne per clepsydrum aut filtrum, quæ Filtratio dicitur: alio per certum caloris gradum in vase idoneo pro materiæ quæ destillatur tenuitate & crassitie. Quo enim materia tenuior fuerit, eò remissio rem caloris gradum exigit, quo crassior densiorque vehementiorem, semper autem subtilior est destillatio: quæ fit per remissio rem caloris gradum. Per destillationem elicitur è medicamentis aqua, spiritus, olea, &c. verum alio atque alio modo & forma, pro materiæ ratione & illius, quod destillatione elicitur; in quem usum multæ instrumentorum & vasorum formæ excogitatae sunt.

Triplex destillatio. Per ascensum.

Formæ autem & modi destillationum tres primario sunt, triplexque destillatio. Una per alembicum sive per ascensum vaporum directè ascendentium

tium in cucurbita crecta cum alembico: altera ad la-
 tus per retortam: tertia per descensum accenso igne
 supra caput vasis in imo pertusi alteriq; impositi. Sub
 destillatione continetur: i. Rectificatio nimirum li-
 quoris destillati nondum satis perfecti in puriorem
 substantiam aut præstantiorem naturam reductio
 per repetitam liquorum destillationem: Deinde Im-
 bibitio affusio liquoris destillati facibus aut capiti
 mortuo. Tertio Cohobatio, id est, post imbibitionem
 & digestionem nova quædam destillatio sive destilla-
 tionis repetitio: per cohobationem destillando mul-
 ta figuntur & exalantur, multæq; arcanæ virtutes ex
 mineralibus potissimum eliciuntur.

*Per descen-
sum.*

Ad latus.

Rectificatio

Imbibitio

Cohobatio.

Fixio autem juxta Geberum est rei fugientis
 ignem ad ipsum conveniens aptatio. Figuntur au-
 tem metalla imperfecta per calcinationem spiritus:
 ut Arsenicum, sulphur & argentum vivum per sub-
 limationis repetitionem. Vitriolum & sales per co-
 hobationem. Ad destillationem referri quoq; po-
 terit Exhalatio, nimirum evaporatio liquoris in a-
 perto vase.

Sextus gradus operationum solutioni oppo-
 nitur Coagulatio, quæ est rei fluidæ in solidam for-
 mam transmutatio, Reducitur autem fluidum in so-
 lidam formam interdum separatione sive exhalatio-
 ne partis liquidioris: propriè verò sine ulla partis se-
 paratione vi caloris & frigoris. Nam quæ solvuntur
 frigore: coagulantur calore & contra. Huc referri po-
 terit fixio, coadunatio, &c.

*6. Gradus
Coagulatio.*

Ultimus gradus Paracelso est Tinctura non
 illa vulgaris per menstrui affusionem & digestio-
 nem, sed supremus omnium operationum gra-
 dus, cui ceteræ subserviunt, unde elicitur tin-
 ctura illa, qua tinguntur & perficiuntur metalla &
 humana corpora, cujus usus primarius putatur in
 transmutationibus metallorum: Atque hi sunt in ge-

*7. Gradus
Tinctura.*

nere operationum & transmutationum chymicarum modi. Verum Paracelsus in *Archidoxia*, in præparationibus medicamentorum tres primarias operationes ponit, nimirum Calcinationem, Sublimationem & Destillationem, ad quas cæteræ referuntur, aut quibus subserviunt. Per has medicamenta præparantur variæque medicamentorum formæ eliciuntur; ut Liquores, Spiritus, Olea Destillata, & Balsami, Tincturæ, Magisteria, Extracta, Essentia, Sales, Flores, &c. Verum quæ Specifica Elixeria, & Arcana, communiter vocantur, magis sunt facultatumquàm formarum nomina. De his omnibus præparationibus, deque singulis compositionibus alibi Deo volente latius agamus.

CAP. XII.

Quid purgatio, qua ratione & quibus perficitur.

Cum Medicina (Hippocrat. lib. de Flatibus) adjectio, subtractioque sit: Adjectio quidem deficientium, subtractio verò redundantium; & Medici officium, ut sanitatem amissam restituat, præsentem conservet, quod deest in corpore humano supplere, quod redundat, subtrahere (Nam causæ, quarum consideratione locum potissimum habet, ad inanitionem, vel repletionem reduci poterunt.) Igitur in curationibus requiritur, ut Medicus Instrumenta illa cognoscat, quibus omnis defectus suppleatur, & redundantia detrahatur. Impletur autem id, quod exhaustum est in corpore, resicientibus & nutrientibus, de quibus hoc loco non dicemus: Detrahatur redundantia evacuantibus.

Verum

Verum cum redundantiz non una sit ratio: XII.

(nam alia in toto corpore, omnibus tribus corporis regionibus continetur, alia in una regione potissimum, aut unius regionis parte, ut in Liene, Jecore, Cerebro, &c. item alia humorum qualitate nocentium, quæ Caco-chymia: alia quantitate lædentium, quæ plethora proprie dicitur:) non erit omnium una evacuationis forma, nec ratio. Prima autem regio corporis, quæ à gula ad medias Iecoris partes extenditur, & sentina corporis dicitur: præter fœces, omnis generis excrementitios humores suscipit & gignit; unde ex erudis corruptis, aliisque vitiosis humoribus caco-chymia. Deinde secunda regio, quæ à medio Iecoris ad tenues singularum partium venas pertingit, peculiariter plethora infestatur, simulque in ea varia caco-chymia gignitur, pituitosa biliosa, melancholica, serosa, cum, aut sine putredine, &c.

Tertia regio, quæ propagines venarum, totumque corporis habitum comprehendit, ea vitia potissimum suscipit, quæ à majoribus venis derivantur.

*Evacuatio-
nis species
universales
& particu-
lares.*

Redundantia autem in vasis humorum quantitate nocentium phlebotomiâ: qualitate nocentium Cathartice evacuatur. Redundantia verò humorum extra vasa in habitu corporis, sudoribus & insensibili perspiratu. Atque hæ universales evacuationes vocantur, quia, non unâ aliquâ peculiari parte materiam vitiosam subtrahunt: at quæ ab una aliqua parte evacuant, ut à capite Errhina, à pectore Bechica, à viis urinæ Diuretica, &c. Particularia purgantia proprie nominantur. Nos hoc loco non de omni evacuatione, sed de ea potissimum, quæ est humorum quantitate nocentium, & ad dapo: si purgatio proprie dicitur, agemus. Nam vocabulum purgationis interdum late sumitur pro omni evacuatione humorum, sive

ca

XII.

Quid pur-
gatio,

Que consi-
derantur in
purgatione,

ea sponte fiat, five ope medicamentorum, vomitum aut alvi dejectiones moventium. Verum cum Gal. comm. 2. Aph. 17. Aph. 2. καὶ ὁ ἄριστος propriè definimus evacuationem humoris qualitate peccantis, factam à natura ope & efficaciam pharmaci cathartici, administratam medico in eum finem, ut sanitas præsens conservetur, aut amissa restituatur. Nam propriè purgare est, per superiora & inferiora medicamento evacuare: licet in angustissimâ significatione κατ' ἐξοχήν purgare dicatur, per inferiora tantum educere.

In purgatione propriè dictâ duo potissimum considerantur: primum id quod expurgatur, aut expurgati debet, & ipsam purgationem potissimum indicat: nimirum humor qualitate peccans, five Cacochymia, quæ multiplex & varia est, ut jam diximus. Indicat enim Cacochymia purgationem, si vires ferant, constitutio corporis, aer ambiens: cæteraque consentiant: Deinde in purgatione consideratur id, quod expurgat. Expurgat quidem natura five facultas expultrix corporis non per se sola, sed vi & efficacia medicamenti humorem moventis & facultatem concitantis, ut aut per superiora vomitu, aut per inferiora dejectione superflua expellat. Talia medicamenta duplicia sunt: quædam enim manifesta qualitate quemvis obviū humorem evacuant, nimirum ἰσχυρὰ, quæ quadruplicia sunt lubricantia, abluentia, detergentia & comprimentia, de quibus supra in cap. 6. huius libri dictum est, alia quæ unum certum determinatum humorem educunt, & propriè καθαρὰ appellantur, & interdum per excellentiam, communi nomine pharmaca, unde Παχυαρόλιον 22. Aph. 1. idem significat, quod electivè purgare seu unum peculiarem humorem educere. Nam medicamenta, quæ cathar-

cathartica vocantur, primùm substantiæ peculiari quadam proprietate in certos determinatos humores agunt, eosque separant & eliciunt, deinde facultate & manifesta & occulta naturam ad eos expellēdos irritant. Expultrix autem vis vasorum irritata, partim à pharmaco, partim ab humoribus vi pharmici secretis aut concentratis eos in ventrem detrudit, per inferiora aut superiora expellit. Quare cathartica per se tantum humores non trahūt, & evacuant, sed vi facultatis expultricis calorisque nativi, aut quia certos humores determinant & eliciunt, & ad eos expellendos naturam stimulant. Proxima igitur causa purgationis per inferiora & superiora non tam penes pharmacum est, quàm facultatem expultricē, quatenus à pharmaco dirigitur, ac peculiare humores vi pharmaci cōcitatos & secretos extra corpus exigit & propellit. Quod si purgatio tantum fieret, quia pharmaca humores determinatos ad se trahūt: Unguenta & Cataplasmata umbilico imposita ventrem non moverent, sed ad se versus superficiem movendo potius sisterent. Præterea experiētiā constat multis alvum turbari, dum validè purgantia manibus versant: nonnullis, dum tantum olfaciunt; quod pharmaca naturam ad expulsionem excitent. Igitur natura purgat, impulsā & directā à medicamento purgante. Verum antequam impellatur, boni Medici erit, inclinationem naturæ spectare, & pharmacis ad expulsionem nunquam violenter cogere, sed si propensa sit, & ad expulsionem insurgat, juvare: Si pigra, excitare, rectaque ratione subvenire, semperque ubi natura se ducem præstat, sub signis naturæ contra morbum pugnare, nihil temerè, nihilque negligenter facere.

Quæ omnia ut ritè fiant, totam de purgandī
ratione

*Partes
doctrinae
de purgandi
ratione*

*Purganti-
um facul-
tates.*

ratione doctrinam tribus comprehendemus. 1. erit de ipsis medicamentis, quibus perficitur purgatio: 2. De modo utendi, sive de methodo purgandi: 3. De accidentibus purgationem consequentibus, sive de iis, quæ faciendæ sunt assumpto pharmaco. In legitima methodo purgandi quinque observanda veniunt: Primum an & quibus purgatio conveniat: Secundo quæ & qualia purgare oporteat. Tertio, quantum quousque & quoties: Quarto, quod tempore potissimum: Quinto, per quas vias sive loca. In his quoque consistit legitimus medicamentorum purgantium usus: nam his intentionibus purgantia accommodare decet.

Ac ut ab ipsis purgantibus initium faciamus, evacuant pharmaca, alia manifestâ qualitate quemcunque humorem, lubricando, abluendo, extergendo, aut comprimendo: alia peculiarem humorem, aut ex peculiari parte. Et licet pharmaca teste Gal 5. *Simpl. c. 10.* caliditatis ratione humorem plerumque attrahant tamen huic aut illum humorem familiarem eligere, non à qualitate manifesta provenit, sed ab occulta aliqua proprietate, ut Aphrodisiensis voluit: sive à specifica forma, aut totius substantiæ proprietate, ut Paulus *lib. 7. cap. 4.* Gal 3. *Meth. cap. 6.* quæ illi innascitur à virtute cœlesti, ut sentit Mesue: vel à proprietate, quæ est inter pharmacum & humorem ob qualitatum convenientiam, aut substantiæ similitudinem, ut Hipp. *de natura humana*, Gal 3. *de Simpl. cap. 24.* ac proinde sola experientia cognoscuntur, ut de *Facult. medic.* dictum est. Nihilominus quæcum illa substantiæ similitudine & proprietate evidentiorum calorem habent, plerumque determinatum humorem vehementius expurgant. Quod si pharmaca manifesta qualitate tantum agerent, ut cucurbita ritu humorem promiscuè attraherent: primum tenuiores & ad fluxio-

fluxionem aptiores, deinde crassiores educerent. At experientia constat, nonnulla tenues tantum, reli-
ctis crassioribus. Igitur actio illa erit non ab eviden-
tibus qualitatibus, sed à substantiæ certa p roprieta-
la, cujus vi pharmacum humorem appropriatum
præ cæteris educit, nisi proprio frustretur. Nam tum
demum pro proprio quemvis obvium, & ad fluen-
dum paratissimum aggreditur, & naturam ad eum
expellendum stimulant.

*Differentia
purgantium
medicame-
torum.*

Deinde evacuant singula penè pharmaca u.
num humorum potissimum: aliquando duos, rarò
plures, nunquam omnes: nisi natura à violentia &
effrenata vi purgantis ita proprietur, aut tam lāgui-
da sit, ut nec violentiam pharmaci coercere, nec im-
pitum humorum fluentium cohibere queat; tū non
solum determinatum humores, sed etiam reliquos
educit: verum primum tenuiores & ad fluxionem ap-
tiores, deinde crassiores, omnium ultimò sanguinem
naturæ thesaurum. Ac proinde hæ immodicæ pur-
gationes, quia utilia cum inutilibus educunt, vires-
que deiciunt, *εὐεχάτατοι*, Græc. dicuntur, de quibus
latius suo loco.

In pharmcis, quæ occultâ substantiæ proprieta-
te evacuant: 4. potissimum considerantur. 1. quem
humorem proprium evacuare debeant. 2. per quas
vias. 3. à parte potissimum. 4. quo modo; Ab
his omnibus distinguuntur purgantia. Nam humo-
res quatuor purgandi sunt, nimirum, bilis utraq;, pi-
tuita & serum. Proinde medicamenta elective pur-
gantia quadruplicia erunt: Cholagoga, Melanago-
ga, Phlegmagoga, Hydragoga. Secundò alia per
superiora vomitu, alia per inferiora dejectione e-
vacuant. Tertiò alia à ventre magis, alia lecore,
Splene, Cerebro, &c. Quartò alia blādè, leniterq; al-
vū subducunt, alia validè alio medio modo se habēt:

Beni-

*Quatuor
conside-
rande in
pharmaco
1.*

2.

3.

4.

XII.

*Purgantia
singulos
humores
blande,
modice,
& valide*

Benignè, leniterque bilem evacuant per inferiora, manna, tamarindi, cassia, infusio & succus rosarum, myrobolani citrini &c. Modicè aloe, Rhabarbarum: validè, Scammonium. Melancholiam blandè evacuant, Epithymus, thymus, polypodium myrobolani Indi &c. Validius, folia senæ: validissimè helleborus niger, lapis armenius, lazuli, &c. Fitum tam crassiorem leviter evacuat: Carthamus, polypodium, myrobolani Chebuli &c. Validius, agaricus, turbith, hermodactylus: Validissimè, colocynthis, Euphorbium, &c. Aquosos, serososque humores leniter purgant, Ebulus, sambucus &c. Validius, Iridis succus, Soldonella &c. Validissimè elaterium, mezerion, lathyrus, &c.

Vomitiva.

Deinde vomitum leniter provocant, aqua hordei, syrupus acetosus, hydromel, oxymel, ficus recentes &c. validius, succus raphani, decoctum radicis betonicæ, raphani. seminis atriplicis, anethi. Item pulvis asari, radix peponis: validissimè, gratiola, helleborus albus, antimonium.

*Purgantia
à determi-
natis parti-
bus.*

Quamquam autem validè purgantia iusta dosi exhibita, magna vi è distantioribus locis superflua expurgare soleant, benigna è propinquis locis leniter alvum subducant, mediocria medio modo se habeant: Tamen substantiæ proprietate, agaricus & colocynthis potentius à capite trahunt; Aloe à ventre; Rhabarbarum à Jecore; Cassia à pectore; folia senæ à Liene; hermodactyli ab articulis &c. Validissimè purgantia ob malignitatem, quia naturam plurimum conturbant, gravissimaque symptomata inducere soleant, simpliciter data, aut non ritè correctâ, aut non debitè præparata: vel prorsus vitanda, vel diligenti ratione utenda; ne, ut scribit *Plin. lib. 29. hist. natural. cap. 1.* animas negociari, & experimenta per mortes agere dicamur.

Lenien-

DE PURGANDI RATIONE. 753 C A P.

XII.

Lenientia verò, benigneque purgantia (quia *Quomodo*
alvum resistentem leviter subducunt,) communia *utendum*
excrementa evacuant, cætera quæ in venis sunt, ma- *purgantib.*
gis præparant, à veteribus præparantibus magis an- *valide,*
numerantur, quàm illis purgantibus, quæ materiam *blande &*
morbificam perfectè evacuant. Maligna, valideque *mediocri-*
purgantia permissione benigniorum obtunduntur *ter.*
& corriguntur: Purgantia ignava & imbecilla acri-
oris permixtione excitantur. Verùm de his omni-
bus, deque medicamentorum præparationibus su-
perius egimus.

Ex his aliisque simplicibus purgantibus com- *Forma.*
posita sunt, variæque compositorum formæ; qua- *purganti-*
rum omnium non est una ratio. Alia enim pur- *um medica-*
gantia composita interna dicuntur, quæ per os assu- *mentorum.*
muntur aut per anum immittuntur: alia externa,
quæ corpori extrinsecus admoventur. Communiter
autem purgationes sunt medicamentis in debita
forma assumptis, aut per anum immissis. Quæ au-
tem per os assumuntur, triplicia potissimum sunt;
Alia liquida, ut potiones ex purgantium decoctis,
Infusis, syrupis, electuariis, pulveribus & similibus: A-
lia solida, duraque sunt, ut pilulæ, item electuaria so-
lida; Alia mollia, ut boli purgantes. Per anum ve-
rò immittuntur, ut facultatem expultricem stimu-
lent, humores purgant, Clysteres & glandes. Ve-
rùm si æger nequeat his uti, aut renuat, cogimur
aliqua ratione supplere per linimenta, aut malagma-
ta ventri imposita: ut sunt Epithemata, & unguen-
ta Aetii lib. 1. Serm. 3. cap. 135. Item per pomâ Rha-
sis, ex scammonio, aloe, myrrha, diu manibus a-
gitata, donec incalescant; per odora menta ex vali-
dè purgantibus & similia. Cum autem nihil te-
merè medico agendum sit, primùm longa experi-
entia vires omnes medic. simpl. & compositorum
cognoscere oportet. Tutius enim utimur vñtatis, &

Bbb

expertis

expertis à peritissimis Medicis, quàm inexpertis: licet novitas & varietas multos delectet. Laudant nonnulli medicamentis simplicioribus uti: aliqui vernaculis & propriis cuiusque regionis potius, quàm extraneis: nisi extra plurimum fuerint experientia comprobata. Tantum in genere de medicamentis, quibus perficitur purgatio. De quantitate medicamenti infra dicemus.

*Purgationis
differentia.*

Ex jam dictis manifestum est, quod purgationes alia lenientibus perficiatur, alia electivè purgantibus, quæ determinatum humorem evacuat. Purgatio autem determinati humoris est, alia perfecta plenave, qua tota materia morbifica simul evacuatur: alia imperfecta & paulatina, qua tota non simul educitur. Sub hac continetur primò purgatio minorativa, qua materia morbi minor tantum redditur, quod plerumque in initis morborum fieri solet: Deinde purgatio, quæ per *exiguiorem* dicitur, qua id, quod vitiosum est, paulatim evacuatur, & pro eo quod salubre est, reponitur.

Verum hæc composita operatio est, ex evacuatione quæ paulatim fit, & refectione sive nutritione, ut latius in progressu dicemus.

CAP. XIII.

Quæ Natura purgationes ferant, & quos humores purgare oporteat.

*An & qui
bus purga-
tio convale-
scat.*

Consequens nunc est, ut ipsam purgandi methodum eo, quo diximus, ordine proponamus. Ac primùm purgari debent corpora cacochymica, nimirum, quæ pravis succis, sive humoribus qualitate peccantibus redundant: potissimum

potissimum, si humores tam copiosi aut vitiosi sint, ut à natura facile superari, aut in utiliore substantiam converti nequeant. Proinde purgatio propriè sanis non convenit, sed neutris, ægris, in quibus pravorum succorum redundantia. Nam purgantia, præcipuè validiora assumpta, cum prave humores in corpore non reperiant, sanos conturbant, sanamque carnem colliquant, variaque symptomata inducunt, ut testatur Hipp. & Gal. 36. Aph. 2. Lenientia, benigneque purgantia, quæ alvum leniter subducunt, & humores nullo modo conturbant, hic excipimus, & ubi cum veteribus de purgatione materie morbigicæ loquimur, præparantibus magis annumeramus: Hæc enim ritè administrata omnibus convenire poterunt, ut alvum resistentem subducant, communiaque excrementa evacuent, & simul materiam morbigicam præparent. Purganda quidem sunt corpora cacochymica, si actu morbo laborent, ut corpora ægræ aut futurum metuant, ut neutra. Verùm non semper, sed primùm si vires ferant, corporis constitutio, aer ambiens, cæteraque permittant. Deinde purgare non decet, ubi aliis & levioribus curare licet. Tertiò, ubi natura per se sufficit, ad morbigicam causam depellendam, aut ubi natura se ducem non præstat. Quartò, si humor ad purgationem planè ineptus & inidoneus sit.

*Quando
purgandum
vel non
purgandū.*

Indicatio

Nam in purgatione, prima indicatio semper sumitur à causa morbigica, id est, humore peccante, qui sua natura evacuationem desiderat: Secunda à viribus ægri, quatenus evacuationem illam permittunt aut impediunt. Per se enim vires conservationem semper indicant. Accedit tertiò partis affectus & conditio: item aer ambiens, sub quo tempus anni, regio & constitutio cœli continentur. Cum causa morbigica conjunguntur ipse morbus & symptomata urgentia. Vires demonstrat,

*nes pur-
gativæ.*

Bbb 2

arias

ætas, sexus, temperamentum, naturæ proprietas, habitus corporis, consuetudo, & similia. Partis affectus consideratio dependet ex ipsius temperamento, usu, figura, situ & sensu.

Observan.

da in purgationibus.

1. Morbus.

Hæc omnia Medico considerata veniunt, simulque in ægris observanda erunt, qualis morbus, an acutus, vel diurnus, an cum alio morbo, ut febris, conjunctus. Deinde ex qua materia, an quæta vel furenti: an cruda aut concocta. Si cruda, an concoctio sit expectanda, an sola præparatio, an sine his evacuatio aliquæ molienda. Item quamdiu æger laborarit: tandem quæ naturæ proprietates, an validis medicamentis apti & assueti sint. Hæc aliaque Medicum diligenter expendere oportet, ne nobis usu veniat, quod in nonnullis reprehendit Hippocr. lib. de Articulis: qui exhibitio pharmaco, velut manu sua ægros jugularunt.

Unde idem Hipp. bonum, inquit, medicamentum aliquando est, nullum medicamentum adhibere. Quare nil temerè, nil negligenter medico agendum est, sed singulis consideratis, ubi expedit evacuare oportet: ubi non expedit, naturæ potius relinquere, aut alia ratione naturæ subvenire.

2. Ætas.

Ac primum, ut ab iis incipiamus, quæ vires demonstrant: ætas media omnium optima purgationes sustinet: pessimè ætas senilis & Infantia, ob virium debilitatem. Proinde pueris & senibus purgantia exhibere non convenit: nisi vires constent, & magna necessitas exigat, sive magnus morbus ex cacochymia urgeat; à validis omninò abstinendum. Nam validè purgantia, rara puerorum corpora dissolvunt & colliquant: debilia senum corpora, ob boni sanguinis & spirituum defectum prosterunt. Nihilominus senibus multò validiora conveniunt, quàm pueris. Deinde pueri, quod insitam sibi à natura quasi per poros cutis evacuationem

tionem habeant, non levem pravorum succorum copiam sine ullâ aliâ evacuatione discutiunt. Verùm in magnâ pravorum succorum redundantia si puer adhuc lactans sit, purgari Hipp. teste. 6. Epid. poterit, Cathartico nutrici exhibito, quod lac purgantium vires contrahat; verùm nutrici sanæ validum pharmacum exhibere non decet, sed dilutum Rhabarbari, foliosum Senæ &c. At ipsi puero, si alvus non respondeat, manna, mel rosarum &c. tutè propinari poterunt: grandioribus dilutum Rhabarbari, syrupus diascoreos, & similia.

Deinde viri plerumque purgationibus magis idonei sunt, validioraque purgantia ferunt, quam mulieres: licet contrarium interdum accidat. Mulieribus menstruorum fluxu laborantibus purgatio non convenit. Virginibus, & viduis castis, ob seminis retentionem & uteri suffocationem, valida purgantia exhibere non oportet: quia uterus acerbis facillè irritatur. Præterea mulieres uterum gerentes purgationes difficulter ferunt: Nihilominus in acutis morbis, si materia turgat, ut præcipit Hippoc. 1. Aph. 4. prægnantes quadrimestres usque ad septimum mensem purgabis; sed has parcius, ne violentiâ fœtus ligamenta rumpantur. Fœtus verò minores & grandiores vitare oportet. Nam primis mensibus ligamenta tenera sunt, facileque ab externis causis disrumpuntur: postremis verò mensibus pondus ipsius fœtus majus est. Purgationes exhibemus prægnantibus, in morbis acutis, periculo urgente, & humoribus turgentibus, ut majus malum evitemus. Nam si mater ex acuto morbo evaserit, spes aliqua salutis erit ipsius fœtus: si mater pereat, ambo perire necesse est. Tentare igitur debet Medicus, ut ambo liberentur: sed si fieri nequeat, ut mater saltem.

XIII.

*4. Tempera-
mentum &
habitus cor-
poris.*

Temperamentum & constitutio corporis purgationes prohibent, vel permittunt. Nam temperamentum & constitutio media purgationibus maximè opportuna est: Corpora verò sicca, frigida, macilentia, laxa, rara, mollia, aut nimis obæsa purgationes ægrius ferunt; contra robusta, carnosa laboribus assueta &c. Proinde in his præceptum Aetii lib. I. *Serm. 3. cap. 23.* observandum erit: scilicet utendū est purgantibus in his, in quibus vires validæ sunt, & voluntas prompta est, & qui stomachum robustum habent, & multam inutilem materiam in corpore colligunt.

At pingues & graciles ad purgationem inepti sunt. Insuper, qui multo sanguine abundant, qui assiduo animo liguuntur, & ægrè revocantur, & qui ex levissimâ occasione citò vomunt: pueri item, ac senes, & mulieres, quibus menstrua validè fluunt: & qui valdè purum habent corpus, & qui certam habent victus rationem, & quibus alvus est naturâ adstricta, & qui dysenteriam, celiacâ passione faciliè corripuntur, omnes hi ad purgationem inepti sunt.

*5. Idiosyn-
crasia &
consuetudo.*

Additur Temperamento *idiosyncrasia*, & consuetudo. Nam ob peculiarem substantiæ proprietatem nonnulli valida purgantia faciliè sustinent, alii levibus multum offendentur: alii his, alii illis magis delectantur.

Consuetudo verò purgandi, validè purgantia minus infesta reddit; Ideò eos validioribus purgare non oportet, qui purgationibus assueti non sunt: nisi naturâ robusti fuerint.

*6. Aeris &
temporum
constitutio.*

Insuper constitutio aeris, temporis, & regionis temperata, (primò tempus vernum, deinde autumnale, item Zona temperata &c.) purgationibus maximè accomodata est: Deinde aer calidus, humidus. Nam aeris aut regionis constitutio frigida, hyema-

hyemalis, borea, humores nimium cogit, corpus condensat: Calida verò humores commover, & ad cutem evocat, viresq; corporis exhaurit. Proinde sub cane & ante canem difficiles sunt purgationes. Eadem est ratio in febribus ardentibus, si materia non turgeat, & similibus, ut infra dicemus.

Validè purgantia, teste Hipp. lib. de Hellebori usu, non conveniunt decoloratis, striculis, flatuosis, siccum tussientibus, raucedine laborantibus, & hæmorrhagiâ: qui præcordia distenta habent &c. Item iis, qui prava victus ratione utuntur. Sed de his alijsq; in progressu dicemus. Tandem in morbis symptomata urgentia vires debilitantia, ut vehemens dolor, vigiliæ, morsus circa orificium ventriculi &c. purgationes prohibent.

Secundò, Cacochymia; sive humor qualitate peccans, qui evacuationem indicat, est bilis utraque, pituita, & serum. Hi humores pluribus modis redundant, varijsq; affectiones inducunt. Redundat autem vel unus humor, vel duo, vel plures, semperq; speciei humoris aptanda est species purgationis; & humor redundans sive simplex, sive compositus, appropriato medicamento expurgandus erit: biliosus cholagogis pituitosus phlegmagogis &c.

Deinde humor vitiosus, ratione qualitatis consideretur, vel est crudus, vel concoctus: item consistentiæ tenuis, crassæ, mediæ. Præterea quietus, impactus, aut furens, turgidus & mobilis.

Semper autem tam in purgationibus, quam in spontaneis evacuationibus, si qualia oportet, purgentur, conferunt, & facile ferunt: sin minus, difficile. Nam (ut Hipp. 2. Aph. 4.) in purgationibus talia è corpore educere, qualia sponte prodeunt, utile est: quæ verò contrario modo prodeunt, cohibere oportet. Facile autem purgantur humores cocti, deinde turgidi, consistentiæ tenuis,

7. Morbi &
symptoma-
ta urgentia

Quis hu-
mor sit pur-
gandus.
& qualis.

aut mediocritas: difficulter humores crudi, quieti, aut impacti crassi & visci di.

*Norma in
omnib. pur-
gationibus.*

Igitur præcipit Hipp. 22. *Aph.* 1. quæ concocta sunt, medicamento purgare, non autem cruda, nec per initia: nisi materia turgeat, quod per accidere solet. Si verò in morbis acutis materia turgeat, ut monet Hipp. 10. *Aph.* 4 eodem die purgare convenit. Tardare in talibus, malum est: ne vires dissolvantur, & humor, qui suo opte impetu huc illuc movetur, in partem principem tandem irrumpat, & mortem repentinam inducat. Deinde crassi & viscosi humores, licet concocti, pharmaco non cedunt, sed sibi, aliisque vias præcludunt; similiter humores impacti. Igitur crudus humor primum omnium concoquendus erit: deinde, si ad expulsionem minimè idoneus, (nimirum crassus aut viscidus,) præparandus, ut facilius & commodius expellatur.

*Præparatio
humorum
duplex.*

Quare in nobis duplex præparatio humorum ante purgationem locum habet: una propter concoctionem, quando humores medicamentis disponuntur, ut promptius & facilius à naturâ concoquantur, quæ maturatio humorum dicitur: Altera est propter purgationem, quando humores evacuationi apti redduntur, quæ præparatio simpliciter vocatur. Verum ut hæc omnia intelligantur, primum determinare oportet, qualis sit illa cruditas in morbis, cujus concoctio expectanda erit: deinde quomodo perficiatur.

*Cruditas
quot modis
sumatur.*

Crudus autem humor variis modis dicitur. Nam, qui à calore nativo ad mediocritatem perditus non est, ut pituita, præcipè verò vitrea, crudus humor dicitur: Item alimentum inconfectum in ventriculo, Jecore, & venis, crudum vocatur. Deinde, quæ concoctionis mediocritatem prætergressa sunt, ut bilis flava, & atra: Item excrementa
alvi

alvi & vesicæ, cruda interdum dicitur; sed minus propriè. Præter redundantia humorum frigidorum, calidorum, crassorum, tenuium, &c. cruda quoque dicitur. Verùm talis cruditas hoc loco propriè non consideratur, nec talium crudorum humorum concoctio semper expectanda erit in morbis: sed præmissa, si opus fuerit, præparatione, citra concoctionem purgari poterunt; cum eorum vitia concoctione non emendentur, ut vitreæ pituitæ in colicâ, serosi humoris in hydrope, pravorum succorum redundantia in ventriculo, & primis venis. Præterea concoctio, quæ in morbis expectari solet, non est humorum propter nutritionem; sed ut natura humoribus dominetur, & inutilia ab utilibus secernat.

Propriè verò cruditas, quæ hoc loco juxta *Cruditatis in morbis.* Hipp. & Gal. considerata venit, est humorum putrefactio, aut corruptio in venis potissimum: dum sc. humores sibi dissimiles in substantiâ & qualitatibus, redduntur ad eam similitudinem ferè, ut in tumoribus præter naturam. Nam concoctio, *Quæ concoctionem potestulat.* assimilatio quædam est, & siccum cum humido unit: Contra cruditas, dissimilitudo. Deinde in concoctione natura dominatur materiæ, & causa concoctionis est robor naturæ, & caloris nativi: ac teste Galeno ipsa concoctio est, quæ putredinem cessare facit, manente substantiâ. Per concoctionem enim ipsa natura ea quæ putrescunt, aut in utiliorrem substantiam convertit, aut utilia ab inutilibus separat, & tandem è corpore expellit. At in cruditate & corruptione non dominatur natura, aut nativus calor; sed externus, cum debilitate innati caloris, qui inutilia utilibus confundit, & humidum à suo nativo sicco separat. Igitur in ejusmodi morbis, in quibus humores putrescunt, aut corrumpuntur in vasis, & natura eis non dominatur, pur-

gare non convenit in initio, sed concoctionem expectare, quæ inutilia ab utilibus separat. Post concoctionem verò, quicquid putrefacti, aut noxii humoris in vasis est, qui crisi non evacuatur, pharmaco utiliter expurgari solet. Nam materia jam corrupta & putrefacta, quæ ad utiliore naturam reduci nequit, statim, si fieri possit, evacuari debet: cum humores perfectè putridi nulla concoctione emendari queant sed tantùm putrescentes, Putrescentes autem in multis utilibus permixti sunt, & concoctio utilia ab inutilibus separat, totumq; illud, quod ab utilibus separari potest, excrementum facit & aut per se, aut adjuvata medicamento facilè & commode expellit.

Quare non sine causâ præcipit Gal. humores illos, in quibus accensa est putredo, primum concoquere, deinde evacuare. Fit quidem concoctio à naturâ adminiculo caloris nativi.

Verùm si natura debilis sit, & calor non proportionatus, Medici erit, certis instrumentis illi opem ferre.

Opem autem fert, dum vel impedimenta tollit, ipsosque humores ad concoctionem præparat: vel dum vires naturæ reficit, & calorem nativum auget.

Preparatio propter concoctionem. Ac primum perficitur concoctio, dum natura vincit & assimilât materiam, quæ renitebatur & dissimilis erat.

Cum autem dissimilitudinis & repugnantiae non una sit ratio, unicum remedii genus non erit, quod ipsos humores ad concoctionem idoneos reddat, sive præparat. Nam repugnat humor qualitate, aut modo substantiæ non naturali: scil. intemperie, crassitie, visciditate, &c. aliquando nimia suâ quantitate, nonnunquam si impactus fuerit. Unde Hipp. 6. Epid. 2. concoctionem fieri dicit per contrariâ; & concoctionem juvare nunc calida, nunc frigida; nunc sicca, nunc humida, nunc extenuantia, nunc

nunc incrassantia; nunc quietem, nunc inedia, aliaque complura. Intemperies autem omnis, humorum concoctionem impediens, ad naturalem temperiem contrariis revocatur: scilicet calida frigidis &c. tenuia incrassantibus, crassities attenuantibus &c. impacta, obstructions aperientibus. Crassa autem extenuamus, & viscida incidimus, sumptâ indicatione ab operibus naturæ: licet juxta Aristot. quæ concoquuntur, seipsis crassiora reddantur. Nam natura, dum difficilia concoquit, prius crassa comminuit, attenuat, & fundit, quàm in convenientem substantiam convertat; ut in nutritione apparet.

Attenuata enim facilius calori nostro cedunt. Unde Gal 4 de Sanit. tuend. Oportet, inquit, primò humores incidere & attenuare deinde concoquere.

Pituitosus autem, crassus, frigidusque humor concoctioni aptus redditur: calefacientibus. extenuantibus, incidentibus: ut Syr. de betonicâ, capilli Veneris, hyssopi &c. Melancholici humores humectantibus, modiceque calefacientibus Syrupus de pomis, borraginis &c. Biliosi acresque humores, refrigerantibus, humectantibus, (ut Syr. violarum nymphææ, granatorum dulcium &c.) ad motus effrenes compescendos; ut contemperati, facilius à naturâ vincantur. Item malignitas contemperanda Syr. acetosir. citri, limonum, &c. Obstructions; aperientibus; humoresque impacti attenuantibus, pro naturâ humorum. Nihilominus validè irritantibus, & extenuantibus urendum non erit, quæ humorum concoctionem perturbant. Verum ubi tanta est humorum copia, ut eam natura facile superare nequeat, sed vires premat, & eventilationem caloris nativi impediatur ante omnia, propter eventilationem caloris nativi, (quæ concoctioni potissimum servit,) utile est, statim in initiis mor.

*Preparan-
tia singulis
humoribus
accommo-
data, gratia
concoctio-
nis.*

morborum illam materiam, copiam venarum sectione, aut leui purgatione imminuere; ut reliquam materiam partem natura facilius vincat. Vires autem & nativum calorem augemus in concoctione alimentis potissimum: aliquando medicamentis, quæ spiritus reficiunt. In tumoribus, pro maturitate utimur quidem emplastris, quæ calorem nativum perspirare non sinunt: sed hæc ratio, ubi humores in vasibus continentur, locum non habet, nec etiam purgationibus servit. Concoctos humores purgare oportet, non crudos, nec initio: nisi turgant.

*Turgere
quid proprie*

Turgere autem dicuntur non solum humores, qui huc illuc in corpore inordinato motu feruntur, & dolores, anxietates & similes excitant: sed etiam ipsa natura proprie, quando fervet desiderio expellendi id, quod noxium est. Igitur quando natura excitata, excretionem appetit, tum evacuare convenit & non tardare, ut diximus: licet ipsa materia cruda sit. Verum cum perspicuum sit, multis humoribus purgationem convenire, quibus nulla concoctio: Item ad purgationem non sufficere, humores concoctos, & à naturâ superatos esse; nisi faciliè cedant, & ipsa corpora purgationibus idonea sint. Proinde ubi idonea non sunt, præparatione necessaria videtur propter evacuationem.

*Præparatio
propter concoctionem,
& evacuationem
modo differant.*

Sed differt hæc præparatio à priori, quæ concoctionis gratiâ fit. Nam quæ concoquantur, ut diximus, quietem magis requirunt, & ante concoctionem commovenda aut turbanda non sunt. At præparatio hæc non solum ipsos humores commovet, sed etiam facultatem expultricem ante debitum tempus ad expulsionem irritat, & ipsam concoctionem conturbat. Quare cum priori confundi non debet. Nam, quo tempore natura concoctioni intenta est, ei servire oportet, non irritare & commovere: peracta verò concoctione, quod redun-

redundat, expulsionem aptum reddere. Igitur, quæ ad expulsionem requiruntur, magis expultricem facultatem irritant: quæ verò ad concoctionem, sive maturationem, magis facultati assimilatrici serviunt.

Præcipit Hipp. corpora si quis purgare voluerit, fluida facere. Fluida autem redduntur, quando humores ad expulsionem idonei & prompti sunt: deinde viæ, per quas purgantur, liberæ & patentes. Humores autem ad fluxionem idonei sunt tenues, calide, turgentes & mobiles: Inepti verò sunt crassi, viscosi, impacti &c. Viæ præcipuæ sunt, ventriculus, intestina & venæ. Nam si intestina duris fecibus, aut humoribus crassis effarcta fuerint, aut venæ obstructæ: purgatio, & humoris fluxio prohibetur.

Quare præparatio propter purgationem requirit primum, ut viæ liberæ & patentes reddantur: clysteribus, jussulis emollientibus, & similibus alvum subducentibus: osculaque venarum aperiantur. Deinde, si materia crassa sit, extenuantibus attenuetur: Si viscida, incidentibus dissecetur, pronatura & qualitate humoris peccantis.

Ut si pituita: decocto hyssopi, origani, pulegii, betonicæ, centaurii minoris, quinque radic. aperientium &c. cum oxymelite, syr. betonicæ, &c. Si melancholia: decocto radic. capparorum, tamariisci, thymi, cuscuthæ, polypodii, fumarizæ, buglossæ, cum syr. scolopendriæ, fumarizæ, &c. Si bilis crassa: decocto cichorii, endiviæ, radic. acetosæ, graminis, 4. sem. frigidorum &c. cum syr. de cichoreo, acetosa &c. Tenues vero humores, qui facile cedunt, fluuntque, talem apparatus non requirunt; licet ea, quæ ex pectore tussi evacuantur, non tenuem, sed mediocrem consistentiam requirant. Nam in purgationibus his nullus ænixus, nullavé

*Præparan-
tia singulis
humoribus
accommo-
data, pur-
gationis
gratia.*

nullave crassities requiritur: sed quantò tenuior, tantò facilius cedit, & educitur. Cum autem purgationis non unica sit ratio, nec unica via per quam, sed alia per alvum, alia per superiora: non erit per omnia una præparandi ratio. Nam in purgationibus per alvum requiritur, ut intestina, primaque venae pateant, ut jam diximus: at in vomitu à valido medicamento, præter humorum attenuationem codicem venit, (teste Hipp 43. Aph 4.) prius corpora relaxare fomentis, inunctione, balneis dulcibus, pleniori cibo & quiete, ut humores facilius fluant. Verum dum vomitum movemus, his uti convenit, quae leviter irritant, humores fundunt, levioresque reddunt & ad superiores ventriculi partes eliciunt.

CAP. XIV.

*De Dosi siue quantitate medicamenti
purgantis, & quoties purgan-
dum.*

*Quanti-
tas & do-
sis medi-
camenti
purgantis.*

Quantitas siue dosis medicamenti purgantis non facile determinatur (nam alij vehementius, alij parcius eadem quantitate ejusdem medicamenti purgantur:) Deinde quantum humoris, quousque & quoties purgandum sit, exactè sciri nequit. Nihilominus artificiosa quondam conjunctura aliquo modo deprehenditur, & simul quantitas medicamenti ad quantitatem humoris peccantis: habita ratione virium ipsius ægri; deinde naturæ & situs humoris peccantis, interdum aeris ambientis.

Genus quidem medicamenti ex humoris specie æstimatur, ut diximus: at quàm validum esse debeatur, non tam ex natura, quàm ex situ humoris peccantis.

peccantis. Nam, ut dictum est, benigna medicamen-
 ta à prima regione corporis mediocriter à medià re-
 gione; validissima à tercia evacuunt. Verum qua
 dosi sive quantitate offerri debeant, ex viribus acri-
 potissimum colligitur. Proinde Medici unicuique
 ferè purganti triplices doses assignant, comparatio-
 ne facta ad vires: nimirum robustis, maximam; debi-
 lioribus, minimam; medio modo se habentibus,
 mediam: ac quantitatem determinatam purgantis
 medicamenti intra amplitudinem minimæ & maxi-
 mæ comprehendunt plerumque. Infantes puerosque
 hic excipimus, quibus ne minima quidem dosis usi-
 tata debetur.

Ut plurimum lenientia blandeque evacuantia
 unciarum pondere exhibentur; mediocriter pur-
 gantia, drachmarum; validissimè granorum: vel
 uti Manna. ℥j ferè ad ℥ij (ut Syr. rosatus solutivus) in
 juscule pulli, vel prunorum ex bibita bilem blande
 subducit, alvumque lenit, ac infantibus etiam dua-
 rum drachmarum pondere, grandioribus ℥ss. datur.
 Pulpa cassiæ fistulæ correctæ cum semine anisi, aut
 alliis, quæ flatu discutiunt, ab ℥j. ad ℥ij. alvum e-
 molliit, bilem retorridam subducit, ardorès renum &
 vesicæ, pectorisque affectus lenit. Eadem vere dosis
 est pulpæ tamarindorum, quæ bilis fervorem con-
 temperat, vomitumq; sistit. Cortices myrobalani ci-
 trini, ac cæterorum ferè omnium præparati oleo a-
 mygdalarum dulci in substantia ad ℥ss. lente tan-
 tum purgant, & post se astrictionem relinquunt; in
 diluto aut decocto cum sero lactis, aqua fumaris
 &c. ad 3x. dantur. Rhabarbari correcti spica, cina-
 momo, aut schænantho dosis in substantia est, à
 3j. ad 3ij. in infuso à 3jss. ad 3ij. concoctio-
 nem non sustinet; infunditur aut aquæ endi-
 viæ cum modico vini; aut decocto endiviæ
 cichor-

Unde co-
 gnoscatur
 genus, via
 & quan-
 titas me-
 dicamenti.

Dosis sin-
 gulorum
 purganti-
 um.

Dosis cho-
 lagogon.

XIV.

cichōrei, tamarindorum, &c. dilutum bilem magis
 tenuem, substantiā magis crassam subducit, & astric-
 tionem post se relinquit, & peculiariter jecur ex-
 purgat & confortat, ejusque obstructions aperit.
 Aloe Zocoterina, deinde hepatica ꝓ pondere fecerit
 quidē evacuat, sed bilē ab ꝓj ꝓij ꝓ. ad illota acrimo-
 niam obtinet, venas vellicat, hæmorrhoides aperit
 ac proindē calidis siccis naturis, pueris prægnantibus
 sanguinem reiicientibus non convenit, lavatur
 succo rosarum &c. Ignavia ejus corrigitur attenuan-
 tibus, ut in hiera picra Gal. cujus dosis est à ꝓj ad ꝓij
 qualis fere est pil. alephang. Assaïret. de tribus. Scam-
 monium biliosos humores confertim citoque ex
 remotis partibus evacuat, cum vehementi corporis
 ris & humorum perturbatione; quare se per non
 datur, sed præparatum veluti in diagridio à g. 6. ad g.
 12. in Elect. diaprūno sol. de psyllio. de succo rosarum,
 quarum dosis usitata est ꝓ ꝓ similiter ut pillul. aurea-
 rum, sine quibus drach. i. Additur etiam purganti-
 bus ignavioribus diagridium ut vim eorum acuat &
 acceleret.

*Milana-
 goga eo-
 rumque
 doses*

Secundō epithymus in substantia ad drach. ꝓ
 in diluto drach. i. datur, longam concoctionem non
 fert, corrigitur floribus violarum buggloss. ac adu-
 stos humores blandē subducit. Folia senæ humo-
 res primū melancholicos, deinde pituitosos cru-
 dosque è liene, hypochondriis, ac etiam remotiori-
 bus partibus evacuant, sanguinem mundificant, sed
 ventriculo gravia sunt torminaque nonnullis exci-
 rant, corriguntur Zinzibere, sem. anisi &c. veluti in
 pulvere senæ Montagnanæ, &c. ac in substantia exhi-
 bentur à drach. i. ad drach. 2. Helleborus uterque va-
 lidē atram bilem pituitamque crassam à remotis
 partibus detrahit, ac proinde melancholiæ, febribus
 quartanis, elephantiasi, epilepsiæ cōvenit. Verū albu
 maligna

maligna qualitate præditus est, & per superna violentissimè cum periculo suffocationis evacuat; ac proinde in substantia non datur, sed interdum valdè robustis in diluto ex radícula aut vino aromatico ad drach. j. fere. Hellebori nigri radix multò minori periculo exhibetur præparata aceto sem. dauci &c. in substantia fere ad drach. j. in diluto aut decocto appropriato ad drach. ij. Lapis Armenius illotus drachmæ unius ferè pondere, lotus aqua bugloss. & vino ad drach. ij. melancholicos humores subducit, sanguinem mundificat, tetros vapores à corde avertit; Item efficacius multò sed minori quantitate præstat lapis lazuli; Melangogon ex his compositum, ut pilularum indarum, de lapide lazuli & Armenio, Dosis est ad ℥ iij. in elect. diasena ad unc. j. confect. Hamech ad drach. 5.

Tertiò ex phlegmagogis primum est, sem. *Phlegma-*
catthami ejusque pulpa, quæ correctæ cum galanga *goga, eo-*
&c. datur eadem quantitate ferè qua cassia extracta, *rumque do-*
sæpè cum rad. polypodii in decocto veteris galli. Te- *ses.*
rebinthina à drach. iij. ad drach. vij. pituitam à iecore, renibus, viisque urinariis expurgant. Agaricus correctus zinzibere aut sale gemmæ in substantia datur à drach. j. ad drach. ij. in diluto aut decocto à drach. iij. ad drach. 2j. pituitam deinde crassam bilem non solum ex ventriculo primisque venis, sed etiam à capite, pectore & articulis evacuant. Eadem ferè dosi in substantia datur mechoacana cum modico cinamomi, aut galangæ, ut pituitam tenuem, serolos, biliososque humores subducant.

In decocto tamen vis ejus ferè evanescit. Turbith album gummosum correctum Zinzibere, pipere longo &c. paulo minore dosi quam agaricus evacuat, præcipuè pituitam crassam, lentam ex remotioribus partibus. Idem quoque præstat hermodactylus albus correctus gariophyllis; sem. cimini. Nam

C c c

peculia-

peculiariter ab articulis ducit pari ferè pondere, ut
turbith, sed lente nisi validiorum commixtione ex-
stimuletur, ut in diacaryocostino & pilulis de her-
modactilis Validior aliquantò vis est, gummi, Saga-
peni, opopanacis &c. licet acriori stimulo indigeant,
in pilulis Mesuæ.

Colocynthidis pulpa à remotis partibus cras-
sam pituitam aquamque citrinam validissimè ducit,
& robustis, morbo diuturno laborantibus tantum
convenit, præparata ut in Trochiscis Alhandel, quo-
rum dosis est à ℥j. ad drach. ℥. ignavioribus quoque
phlegmagegis permiscetur ut eorū vim acuat Com-
posita, in quibus præpollet vis horum phlegmago-
gorum, sunt primū pil. mahichinæ, de aloë lota,
hieræ cum agarico, &c. quæ à drach. j. ultra ij. exhi-
bentur, deinde pilulæ cochicæ, de agarico, de hermo-
dactilis ad drach. j. tertio scetidæ, de opopanaco, de
sagapeno parum ultra drach. j.

Præterea El. benedictæ laxat: datur ℥ss. paulo
minore quantitate, hiera diacolocint. Verum Elect.
indum diaphanicon, diaturbith ad drach. vi. ali-
quando ad drach. vij.

Ad quas evacuandas, radicis vel corticis me-
diani sambuci aut ebuli succus, uncia unius pondere
in decocto passularum ac cinamomi datur aut pul-
veris granorum drach. j. vel Corticis mediani drach.
ij. aut diluti unc. ss. ac mechoacana, horum ut aliorum
quoque vis decoctione perit. Validius aquas citrinas
primū, deinde pituitam purgat pul. rad. Iridis pur-
pureæ à drach. i. ad drach. aut succus ab unc. ss. ad
unci. in decocto passularum spicæ & cinamomi. Ex
his quæ vehementissimè aquas sursum deorsumq; e-
vacuant, est cucumeris asinini radix & succus, qui e-
laterium dicitur. Dos. radicis est à gr. ss. ad drach. ss.
succus post sextum mensem primum a ℥ss. ad ℥j.

Eodem

Eodem ferè pondere Cortic. Esulæ, laurcola, ac thy-
nelea aceto & stomachicis præparata, primū aquo-
sos humores, deinde pituitam crassam evacuant, ut in
bilulis de mezereo. Euphorbium omnium violentissi-
mum, calidissimumque, post primū annum præpara-
um oleo amygdalarum dulc. succo endiviæ, citri &c.
à gr. v. ad scrup. ß. vehementissimè primum aquas, de-
inde crassos lentos humores ab extremis partibus e-
ducit; in quem usum quoque serviunt pil. Meluæ de
euphorbio pondere scrup. j. aut drach. ß. non dissimi-
li vi ferè pollent gr. lathyridis & ricini: Hæc sursum
deorsumque summo cum periculo evacuant.

Vomitum provocant nonnulla evidenti qualitate,
ut pingua, quæ os ventriculi relaxant, deinde acria,
quæ stimulat, ut raphanus, sem. urticæ, crucæ, staphi-
lagriæ, caparum, atriplicis, radix betonicæ &c, tertio,
quæ levitate sursum feruntur ut agaricus tritus in
oxymelite, aut, mulla ad scrup. iij. cum decocto sem.
anethi, atriplicis, rad betonicæ & similibus: ac quæ
flatus movent, ut mel crudum &c. peculiariter per
superiora purgant succustadiceis raphani ad unc. ij.
vel seminis ejusdem drach. iij. triti in hydromelite,
aut oxymelite cum aqua hordei. Idem vehementius
præstat pul. radicum peponis, aut juglandum, aut
sem. urticæ; aut radicum asari à drach. ß. ad drach.
j. in infuso ad drach. iij. ferè; pari quoque pon-
dere exhibetur, medulla balani mitepsicæ exiccata
aut pul. gratiolæ cum cinamomo &c. decoctione
horum omnium vis ferè evanescit. Violentissimè
per superiora purgant Helleborus albus, ut diximus,
nec minori ferè periculo vitrum & regulus Antimo-
nii, ac Mercurius præcipitatus, nisi dextriè præpa-
rentur, corriganturque; dantur hæc plerumque à
g. ij. ad g. iij. aut v. Composita purgantia polychrosta
ex simplicibus intelliguntur & æstimantur, vel ut elect
diacatholicon & elect lenitivū datur unc. j. Eleosof.

Vomitoria.

Ccc 2

drach vj.

drach. vi. hiera logadii ferè ad unc. ſ. pil. aggregati
ad drach. iſſ. eademque in cæteris ratio eſt.

*De uſu ex-
tractorum.*

Per extractiones ſpagyricas qualitas veneranda
noſtræ naturæ inimica malignorum vehementer
umque pharmacorum corrigitur, ſed ipſa vis cathartica
una minuitur, & benignorum nonnullorum
rè exolvitur. Quare requiritur non ſolum in ſingulis
rum pharmacorum extractis præparandis diligens
exercitatio, ſed etiam in viribus, doſique eorum inven-
nienda, & exploranda, certa experientia. Conſtat
nim nec extractum Hellebori nigri Quercitani nec
Rhabarbari ſcrupuli unius pondere humores ap-
propriatos expurgare, niſi diagridii, Extracti ſcam-
monii, aut alterius validioris permixtione adju-
terentur, vel eſtimulentur. Deinde extracti ſcam-
monii pari pondere, quo diagridium, clementium
multo, & ex minus remotis locis bilem evacuar-
Præterea ex Rhabarbari ſemuncia plus extracti feri
elici poſſe, quàm ex uncia integrâ mechoacanæ, aut
hermodactylorum, vel ſeſquiuncia agarici, cum ta-
men extractum Rhabarbari minori doſi, quam ul-
lum cæterorum alvum ſubducatur, ſed de his latius ali-
bi, Deo volente, dicetur.

In uſu horum omnium medicamentorum quan-
titatem & doſim determinare oportet in comparatio-
ne ad vires, & quantitatem augere vel minuire pro
ratione virium. Cognoscuntur autem vires, ut dixi-
mus, ex ætate, ſexu, temperamento, corporis conſti-
tutione conſuetudine & cæteris. Augetur quoque &
minuitur doſis pro ratione aeris ambiētis, de quibus
omnibus ſupra dictum eſt: Item pro conditione
humoris peccantis. Nam reſues fluxilesque humo-
ris levi medicamento facilè cedunt: Contra, craſſi,
viſcoſi aut impacti vix majori & validiori. Tandem
pro modo purgationis. Purgatio enim plena,
copioſa aut ex remotis locis, majori validiori que
phar-

pharmaco indiget: contra purgatio, quæ pervices
Semper autem nimis parva, aut magna purgan-
um quantitas vitanda erit. Nam nimis parva quan-
tas non solum parum, aut nihil evacuat: sed et-
iam humores plerumq; perturbat, ventris tormina,
anxietates, aliaque symptomata inducit. At multò
raviosa mala excitat vehemens medicamentum
nimis magna quantitate.

Nam non solum appropriatum humorem co-
iosè educit, sed etiam cum vehementi perturbatio-
e alios quoque humores; primùm tenuiores, deinde
rassiores, tandem sanguinem; unde anxietates,
nimis deliquia, convulsiones incurabiles, aliaq; per-
iculosissima symptomata. Proinde in hoc casu obser-
andum erit, quod monet Hipp. l. b. i. de locis in Homi-
e: pharmaca fortia naturâ, in morbis debilioribus,
anda non esse: sed fortibus natura, fortia: debili-
ous, non fortia. Deinde, ut jam diximus, artificiosâ
onjecturâ quantitas cujusque pharmaci definienda
erit: tandem æstimandum, quantum, quoties & quo-
usque evacuandum.

Ipsa autem purgatio ex copiâ & multitudine
orum, quæ evacuantur, judicari non debet, ut mo-
net Hipp. 23. Aph. 1. sed si ea quæ oportet, evacu-
entur, & æger facillè ferat; quæ duo signa sunt bo-
næ purgationis. Nihilominus magna pravorum
humorum redundantia majores evacuationes indi-
cat, si vires ferant, cæteraque consentiant. Purgatio-
nes autem aliæ unâ vice totam materiam educunt,
quæ plenæ, perfectævè dicuntur: aliæ pluribus vici-
bus per partes, ut suprâ dictum est. Medicamen-
tum plenam purgationem faciens, sine summâ
consideratione exhiberi non debet, & tantum ubi
vires ferunt, & natura seipsam ducem præstat: ni-
mirum in morbis, humoribus jam concoctis potis-
simum, aut turgentibus. Tum enim naturam

*Quantum
purgandum
& quoties.*

Ccc 3 ad-

adminiculantem habemus, & minori negotio noxi
evacuamus.

*Quando
paulatim
aut copiose
vacuandū.*

Evacuatur quidem materia cocta unâ vice, vires facile ferant: sed præcipuâ, si tota simul sit, aut parata ad expulsionem; alioqui paulatim pluribus cibis, initio facto à levioribus, præmissis præparantibus, si necessitas exigit.

Sumitur enim indicatio in purgationibus, quæ paulatim fieri debent, à naturâ ipsius humoris peccantis; à situ ejusdem: à conditione partis affectæ; à viribus ægri. Nam sæpè tota materia morbifica simul non est, nec eodem modo in toto corpore, omnibusq; vasis, sed in varias partes distributa; una ventriculo contenta, quæ vomitu evacuatur: alia in Intestinis, quæ clysteribus: quædam in venis, quæ potionibus aliqua in capite, quæ pilulis facilius educitur. Deinde non rarò una pars materiæ cocta, alia cruda: una tenuis alia crassa vel viscida: una quiesca, altera turgida & in motu. Quæ omnia nec uno tempore, nec unâ vice evacuari debent: sed materia concocta, tenuis aut turgida, fluxioni idonea, prius semper exurgenda, idque unâ vice, si vires ferant: alioqui melius est in partes dividere & purgationem iterare. Verum si materia cruda sit, concoquenda erit; crassa, extenuanda &c. deinde per intervalla evacuanda. Unde ob qualitatem humoris, præcipit Gal. in quartanis & quotidianis febribus purgationes sæpiùs iterare. Et Hipp. 1. de morbis, in spleneticis & melancholicis sæpè modicum exhibere, quod multum educit: At in acutis, 24. Aph. 1. rarò purgare & id facere, diligenti adhibito judicio. Deinde modum purgandi variat conditio partis affectæ. Nam pars communis, & acuti sensus, copiosas & subitas evacuationes non sustinet. Similiter quæ à ventre longè distata est, aut cum ventre per angustas tenuisque vias communionem habet: confertim evacuari nequit, sed

sed paulatim, & per vices: ut in morbis pectoris, & articularum. Item pars, quæ ob debilitatem continuè nova excrementa generat, crebras evacuationes desiderat. Virium autem consideratio prima, & præcipua in omni curatione esse debet: nam vires & modum purgandi, & vim purgantis medicamenti non rarò præscribunt. Et licet humoris natura, copia, & situs validum purgans, requirat: tamen, si vires debiles sint, cogimur benigniora, & per vices exhibere. Eadem ratio locum habet in senibus, in pueris & prægnantibus, in iis, qui stomachum debilem habent, & lævi occasione animo deficiunt, & similibus ut supra. Igitur si vires satis robustæ non sint, siue cachochymia sit multa, siue pauca, nunquam confertim, sed sensim & per partes evacuanda erit; maximè, si in ventriculo, aut primis venis non sit, sed diffusa per totum corpus, quod in cachexiâ evenit. Deinde, qui pravâ utuntur victus ratione, & pauca fruuntur bono succo, multisque scatent vitiosis humoribus, si assatim validis purgentur, statim exsolvuntur, ut testatur Hipp 36. Aph. 2.

Tales ergò ἐπιχειροῦν paulatim evacuare convenit, & pro eo, quod salubre est, reponere. Nam in his copia humoris indicat, multum esse evacuandum: sed quia vires non ferunt, sæpius purgamus, ut vitio humorum frequentia satisfaciamus. Unde, quod semel validum medicamentum vix, ac non sine detrimento aliquo evacuare poterat: id tutò, & sine omni incommodo perficit purgatio per vices. Melius autem est tutò, quàm citò & cum periculo purgare: plurimum verò, & repenti, aut evacuare, aut replere, periculosum est, teste Hipp.

Verùm in purgationibus, quemadmodum Quo ordine purgandū.
in phlebotomiâ, refectione, cæterisque operationibus, ordinis quædam ratio habenda est; quid in curatione primum, quid secundum aut tertium esse

debeat. Sæpè enim necessaria tam phlebotomia, motu
quàm purgatio: non rarò præter purgationem requiritur
refectio aut confortatio; Ubi haud facillè est hoc
determinare, quid primùm, quid secundum fieri con-
veniat. Nihilominus legitimum administrandorum
remediorum ordinem indicat ordo causarum & id
semper, quod maximè urget. Incipiendum quidem
est ab eâ operatione, quæ alteri conducit, tollendo
id, quod causa est consequentium: sed ei, quod maxi-
mè urget, omnium primò occurrendum erit. Veluti
in morbis, ubi cum cacochymia adest magna virium
debilitas, omnium primò reficiendum, cum virium
summa sit dignitas: & sine viribus ipsa remedia nihil
conferant.

*Quando
purgatione
phlebotomia
a præce-
dere debeat:*

Similiratione, si in venis sit magna humorum
redundantia: primùm venam secare, deinde purga-
re ex venis convenit, tandem quod reliquum est, con-
temperare. Nam, ubi venæ copiam distendunt, post
phlebotomiam purgatio ex venis facilius succedit:
Verùm si impuritas aliqua sit in primâ corporis regi-
one, ante phlebotomiam consultum erit, levi phar-
maco evacuare, ne in venas rapiatur, & suâ labe
sanguinem inficiat. Attamen si mittendi sangui-
nis necessitas plurimum urgeat, & omninò tutum
non sit differre, (ut in lapsu & casu ex alto, in angina
& phrenitide, interceptionibus jugularium & si-
milibus:) citra moram secare venam expedit, quia
subitò auxilium adfert. De ordine purgationis &
præparationis suprà diximus: De ordine verò cæ-
terorum medicamentorum ad purgantia
suprà de methodo me-
dendi.

C A P. XV.

*Quo tempore, & per quas vias purgatio
institui debet.*

Consequens est, ut de tempore oportuno purgationis nunc agamus. In genere de anni temporibus supra dictum est: diei verò tempora, correspondent quatuor anni temporibus.

In ægris autem peculiaris ratio temporis locum habet, quo motus morbi mensuratur & determinatur. Nam si ipsum motum causarum morbificarum respicias, tempora morborum quatuor erunt: principium scilicet cum materia morbifica adhuc cruda est: augmentum, quum manifestè incipit concoctio: Status, quando maximè vigent concoctiones: declinatio, quando peracta est. Deinde dividitur tota illa duratio in dies criticos, indices & intercidentes. Verum distinguendi hoc loco sunt morbi, orti ab humoribus putrescentibus, & qui concoctione emendantur: ab iis, qui ab humoribus jam corruptis gignuntur, & concoctione emendari nequeunt.

His observatis, si humor vitiosus sit in ventriculo primisque venis tantum, statim expurgari poterit: præmissis duntaxat præparantibus, si lentus, crassusque sit, viæque obstructæ. Similiter humor jam corruptus, & qui concoctione emendari nequit, quacunque parte aut regione corporis contineatur, protinus, si fieri queat, evacuandus erit: at si humor adhuc sit putrescens, in vasis conclusus, licet viæ per ventrem liberæ & patentes sint, statim purgare non convenit, sed tempus opportunum expectare.

Ccc 5 Tempus

*De tempore
purgationis.*

*Quando
initio sta-*

*tim purgan-
dum, quã-
do non?*

Tempus autem opportunum, (autore Gal. *lib. 4. Acur. comm. 76.*) æstimatur non certo dierum numero, sed ex signis concoctionis in urinâ & similibus: ex humorum turgentia, quando periculum apparet, ne in partem principem irruant.

Plena purgatio quâdo locum habeat.

Plena autem evacuatio humorum putrescentium, ante concoctionem tentanda non est: deinde, (ut præcipit Hipp. *lib. 3. de Morb.*) quo tempore cum impetu fertur morbus, Medicum & ægrum à curatione quiescere oportet, ne quid mali inducatur. Igitur initio morborum, quo omnia cruda sunt, purgare non convenit, nisi materia turgeat: nec in augmento perfectè, neque etiam in statu; quo tempore concoctiones maximè vigent, & cum impetu fertur morbus. Quare si materia non turgeat, purgatio perfecta plenavè differenda erit ad finem vigoris, quando omnis concoctio peracta est. Tum enim materia secreta est, & beneficio naturæ facilè evacuat. Nam Medicus naturæ motum impedire non debet, sed, ubi necessitas exigit, juvare. Quod si natura per se satis valida sit ad morbum, causamq; morbificam perfectâ crisi expellendam; Medici erit, tantum se operum naturæ spectatorem exhibere; Et: ut Hipp. 20. *Aph. 1.* quæ judicantur, & judicata sunt integrè, non movere neque novare vel purgantibus, vel aliis irritamentis, sed sinere: atque hic iterum bonum medicamentum est, nulum medicamentum adhibere. Verum, si natura tam potens non sit: tum demum necesse erit, motum naturæ juvare, & in fine vigoris, si quid post crisis relictum sit, purganti medicamento educere. Nam, ut testatur Hipp. 12. *Aph. 2.* quæ relinquuntur in morbis post crisis, recidivam facere consueverunt. Igitur cum universa materia non nisi concocta radicitus exturbari queat, ante finem vigoris plena perfectaque purgatio molienda non erit.

At-

Attamen minorativa aliqua locum habere potest, quâ materia morbifica minor tantum redditur, in initiis morborum potissimum. Nam primum, si *Minorati-* humorum crudorum, putrescentiumve tanta sit co- *vapurgatio* pia, ut metus sit, ne natura ante integram conco- *ubi locum* ctionem deficiat necessitas exigit, partem aliquam *habeat?* materiæ levi pharmaco subducere, ut natura supra residuum potentior reddatur, faciliusq; dominetur. Similiter ubi humores malignâ, aut venenatâ qualitate inquinati sunt, qui subito interitum adferre solent: statim purgari debent, neglecto incommodo, quod crudorum humorum purgationem cōsequitur. Præterea præcipit Hippocr. 4 *Acut.* purgandum esse aut initio morbi, priusquam humores confirmentur in parte aliqua, aut postquam ad maturitatem perducti sunt.

Nam in morbis ab influxu, (ut sunt pleuritis, angina &c.) initio statim purgantibus, cæterisq; instrumentis humorem influentem à parte affecta revellere & avertere decet: quemadmodum in luxatis, vulneratis & similibus, ne humor in partem affectam decambat. Quod autem in parte jam confirmatum est, ante maturationem educinequit. Idem faciendum, si materia præcipuam partem obruat, viresque opprimat: quod in apoplexiâ, catharro suffocante & similibus accidere solet. Verum in acutis morbis raro, & non nisi necessitate urgente, purgare convenit: In diuturnis sæpius, & nonnunquam, ubi nullum adest periculum; modo adsint signa quadam concoctionis. Nam in diuturnis, quia humores crassi, lenti & impacti sunt, ante concoctionem utile est, minorativo vias ductusq; aperire: Deinde ob inæqualitatem materiæ, quia natura in æqualiter movetur, sæpè concoctiones occultantur, igitur in talibus, utile erit id, quod concoctum est, & excrementi factum, è corpore evacuare, & initium concoctionis

tan.

tantum expectare: aut, ut monet Trallianus *lib. 12. cap. 7.* nunquam permittere, humores in vetustatem abire. Attamen, ut diximus: ante concoctionem totius materiae morbificae, finemque vigoris, perfecta plenaeque purgatio tentanda non est.

Quibus diebus maxime purgandum.

Ad tempus determinatum quod attinet, quando cum impetu fertur morbus, ab omni purgatione abstinere convenit: praesertim in continuis & acutis morbis. Quare in pharmaci exhibitione monet Hipp. *lib. 4. de Morbis* cavere à diebus imparibus sive criticis, quibus humores maximè turbantur. Et subjungit, *in febribus continuis, qui paribus, sive non criticis pharmaco usi sunt, nunquam nimium purgati fuerunt: qui verò diebus imparibus forti medicamento usi sunt nimium purgati fuerunt, multique nimia purgatione perierunt.*

Eadem ratio est temporis paroxysmi in febribus intermittentibus si vires debiles sint. Igitur tutior purgatio dieb. paribus sive intercidentibus, quam imparibus aut criticis. At si vires validae fuerint: in quartanis & similibus febribus intermittentibus, in quibus humores suam naturam aegrè commoventur, expedit interdum ipso die paroxysmi, quo humores maximè turbantur, purgare. Quo enim die exasperetur morbus, & materia in motu est, facilius detrahitur: alioqui, si vires debiles sint, convenientissimum est in morbis, qui paroxysmum habent, tempus intermissionis expectare.

Quibus horis purgandum?

In morbis, qui carent paroxysmis, astate temporibusque calidis, horae matutinae potissimum conveniunt: frigidis verò temporibus, tempus meridianum magis. Proinde decet medicamenta sumere tanto ante tempore; quanto ipsa egent, ut in actum deducantur, & praedictis horis purgationem perficiant. Deinde tempore tranquillo & temperato purgatio tutior & commodior est: tempore calido & hu-

humido copiosior. Dantur interdum purgationes CAP. XV.
vespertinis horis: ut pilulæ lenes una hora ante cœ-
nam, ad evacuationem à ventre: aut tribus horis à
cœnâ, ad evacuationem à capite. Verùm validè pur-
gantia assumenda non sunt, nisi ieiuno ventriculo:
levia vero, ut ecoprotica, dantur & ante cibum, &
cum cibo interdum.

Restat nunc, ut ostendamus, per quas vias *De viis,*
purgatio commodissimè institui debeat, & quibus *per quas*
remediorum formis. Via autem, supra diximus, *institui*
est vel per superiora vomitu, vel inferiora alvi deie- *debeat*
ctione. Indicat viam partim locus, quem humor *purgatio.*
peccans nunc occupat vel occupaturus est: partim
inclinatio humoris, & motus ipsius naturæ. In viis,
per quas expurgatur humor, considerantur quatu-
or: an consuetæ: an patentēs & liberæ: an vicinæ
loco, quem occupat noxius humor, & cum eo
communione habeat: an naturaliter dispositæ
sint, nec ne.

Ipsa purgatio respectu loci, cuius gratia hu- *Purgatio*
moreducitur, aut est evacnans tantum, aut revel- *triplex.*
lens, aut derivans: ut supra diximus. *Humor*

Locum autem affectum occupat humor *purgandus*
quando actu in eo continetur: Occupaturus verò *vel actu*
est, quando aliunde influit. Deinde à loco, quem *continetur*
actu occupat, evacuari aut derivari debet: à loco *in parte*
verò affecto, quem influxu suo occupaturus est, *affecta, vel*
revelli. *influit.*

Occupat autem humor noxius vel totum cor- *Per quas*
pus, omnesque ejus regiones: vel unam regionem, *vias pur-*
aut unius regionis partem, ut ventriculum, caput, *gandum*
&c. Semper autem aptanda est via per quam, illi lo- *ubi actu*
co potissimum, quem humor proximè occupat. *in parte*
Nam commodissimè evacuantur humor per vias *affecta hu-*
proximas, patentēs, consuetas & naturaliter dispo- *mor conti-*
sitas. Quare quod ventriculo continetur, vomitu: *nitur.*
quod

quod intestinis, dejectione: quod in toto corpore, utraque via evacuari solet. Sed maximè eligenda est via consueta, per quam facilè purgatur æger, si naturaliter disposita sit. Eadem ratio est in particularibus evacuationibus: ut anterioris cerebri, per palatum & nares: renum & vesicæ, per urinas &c. Forma quoque medicamenti aptari debet loco, à quo, & per quem. Nam quod in capite continetur pilulis: quod in ventre & venis, potione: quod in intestinis clystere commodissimè detrahitur.

*Per quas
vias pur-
gandum, u-
bi humor in
partem
affectam.*

At ubi materia adhuc in fluxu est ad partem affectam, Medici erit omnibus remediis avertere, & longissimè à parte affecta revellere. Quare oculis & cerebro laborantibus, (nisi ex consensu ventriculi,) purgationes per superiora non conveniunt, sed per inferiora: Contra ubi fluxus ad cæcæ, aut inferiores partes decubitat per superiora magis, si natura & consuetudo ferat, & viæ naturaliter dispositæ sint. Nam, quādo pars, per quā ducitur humor noxius, naturaliter affecta nō est: transitu illo humorū, qui ab aliis ab aliis partibus expelluntur, vehementer labef. ctatur. Quare intestinis laborantibus, humores in aliis partibus existentes educere per intestina non licet: nec ventriculo affecto per superiora. Attamen quod in ipsis intestinis, in dysenteria & similibus continetur, per inferiora: quod in ventriculo pravè disposito, per superiora evacuari poterit.

*Via confe-
rentes ad
purgandū.*

Quod si aliundè ad partem non naturaliter affectam inclinet humor, Medici erit, omnibus remediis avertere, & nunquam per partem affectam corpus purgare.

Deinde, ut præcipit. Hipp. 21 Aph. 1 cō mo- lienda purgatio, quò à natura humores potissimum vergere videntur, per vias conferentes. Viæ autem maximè conferentes sunt, per quas solet se natura utiliter evacuare. Inclinat autem humor bi-
liofus

biliosus levitate sua ad superiora magis, quemadmodum etiam humores in paroxysmis: pituitosus vero & melancholicus humor ad inferiora magis decumbit. Ergo æstate, (4. Aph 4) quo tempore in corporibus maxime dominatur bilis, & in istis paroxysmorum, per superiora magis purgare convenit: hyeme, magis per inferiora. Item graciles, quia biliosi, facileque vomentes, per superiora: difficulter vero vomentes, obesos & melancholicos, per inferiora. Per superiora quidem æstate bilem hyeme per inferiora pituitam purgare convenit: si totum corpus sit evacuandum. At si humor pituitosus & melancholicus tantum in ventriculo contineatur, aut ad superiora feratur, (quod in accessionibus febris quotidianæ & quartanæ accidit) vel brumalibus mensibus; per superiora privatim & melancholiam purgare decet, ut testatur Gal cum Hipp. lib. 1. de *sal. bri. diata.* Verum plena & perfecta evacuatio pituitæ & melancholiæ, per inferiora tantum perficitur: paulatina per superiora plerumque, & potissimum pituitæ.

De vomitu.

Difficulter vomentes, & qui non consueverunt sponte sua vomere, ad vomitum nullo modo cogendi sunt. Igitur primum videndum est, quid consuetudo ferat: deinde, quo natura & humoris inclinatio viam affectet.

Nam alii his; alii illis evacuationibus idonei sunt: Ut qui angusto sunt pectore, longo collo, sive phthisi obnoxii, teste Hipp. 8. Aph. 4. Item qui pravè dispositum ventriculum habent, debile cerebrum: mulieres; quæ suffocatione uteri afficiantur &c. purgationes per superiora non ferunt. Attamen in multis diuturnis affectibus sæpe tollit vomitus, quod purgatio per alvum non potuit. Verum vomitus, evacuatio minus naturalis, magisque suspecta est, quàm alvi dejectio: cùm ipsa intestina susceptioni excrementorum
sine

*Quibus non
conveniat
vomitum.*

sint destinata, non ventriculus, & vomitus robustior rem naturam requirat. Unde præcipit Hipp. robustos supra, debiles infra purgare: cum vomitus omnium naturalium operationum sit vehementissima. Nam fit vomitus, quando ventriculus remolesta irritatus, compresso fundo, totus impetu sursum fertur; ut id, quod noxium est, per os rejiciat & excutiat. Hoc motu non solum ventriculus à sua sede dimoveretur: sed etiam vicinæ partes, quibus annexatur, magna vi concutiuntur. Proinde vomitus violentia non caret, sed aliis faciliior, aliis difficilior est, ut diximus. In his igitur, qui difficulter vomunt, ut potius convenit medicamentis, quæ per internam purgant, quàm corpus frustra torquere: In his vero qui facile vomunt, (nisi adsit virium robur, & summa necessitas exigat,) valida vomitoria vitare, præsertim veterum, quæ periculo non carent. Præcipiunt veteres duobus aut tribus diebus continuis, singulis mensibus vomere: rarius tamen natura siccos, quàm humidos. Verùm, ut testatur Galen. recessit hæc consuetudo: corpora continuis illis evacuationibus plurimum læduntur, & malam consuetudinem acquirunt.

*Quibus
affectibus
prodest
vomitus?*

Evacuat autem vomitus primum ventriculum, primasque venas: deinde, si validior, Iecur, lienem, majoresque venas, ac tandem totum corpus; revellit verò fluxum humorum à ventriculo, aut ab inferioribus partibus. Proinde, (16. Aph 6.) alvi profluvio laborantibus vomitus superveniens, bonum est. Auxiliatur eodem modo Ischiaticis, podagricis, nephriticis, vesicæ & aliis affectibus, &c. Derivat vomitus humores à partibus vicinis ad ventriculum. Unde hypochondriacis hydropicis, aliisque melerei, jecoris & lienis affectibus interdum confert: potissimum si materia sursum ad ventriculum feratur, quod ex amaris mæstibus, dolore, morfu,

morfu aut gravitate præcordiorum deprehenditur. De præparatione corporis ad vomitum, aut alvi dejectionem supra dictum est.

Formæ medicamenti ratio habenda est, præsertim in alvi dejectionibus. Nam forma liquida altius faciliusque penetrat, promptius agit, potius detergit, obstructionsque aperit: forma verò solida, (ut pilularum,) contra, diutius in ventriculo hæret, tardius operatur, & à superioribus partibus melius trahit. Sed naturis aut morbis siccis calidis, quæ tempore calido minus convenit. Deinde medicamenta valida, forma liquida, debili, puro quæ ventriculo non conveniunt, nisi distantis alicujus partis affectus exigit: quia ventriculum vehementer debilitant. Danda tamen sunt, mixta odoratis suavisque jejunio quidem ventre, sed eo potissimum tempore, quo cibus concoctus descendit. At si robustus impurusque sit ventriculus, expedit simpliciter dare, idque longissimè à cibis: ut altius ad remotiores corporis partes penetrant. Hactenus de methodo purgandi.

Superest nunc, ut paucis consideremus, quid agendum potissimum sit, assumpto pharmaco. Assumpto medicamento per alvum purgante, licet a quam hordei, nullam aut simile quid pauca quantitate statim bibere: ut reliquæ à faucibus & gula detergantur, & facilius descendant. Deinde corpus in quiete primum continere: & si timeatur vomitus, paululum mali acidi aut cidonii, vel mixtæ cidoniorum & simile degustare; naribus acetum rosaceum, aut cum tosta panis admove, summos manuum digitos in aquam frigidam immergere, faciem aqua frigida subito aspergere. Pilulis autem assumptis, ægris somnum aliquandiu permittimus, ut vires earum citius in actum deducantur: à portione, aut bolo non item. Incipiente verò purgatione per alvum,

D d d

vum,

vum, ab omni cibo & somno, ac etiam ab omnibus animi perturbationibus abstinere oportet, ad consummatam usque purgationem: nam cibus & somnus vires medicamentorum obtundunt. Assumpto vomitorio convenit corpus movere, cibum aliquando exhibere, aut aquam calidam cum oleo, & similia, ut facilius secedat evacuatio. deinde fauces irritare, cæteraque facere, ut præcipit Avicen. & Gal. lib. de Salubritate diata, Paulus lib. 7. cap. 10. A vomitu faciem & os abluere aqua ex aceto temperata, cibum non subito dare: sed necessitas exigat, paululum facilis digestionis, bonique succi & saporis. At in purgationibus per inferiora, evacuato corpore utile erit aquam hordei, jus pulli aut simile quid exhibere: ut id, quod in ventre adhuc hæret, facilius descendat. Deinde sensim ad cibos accedere, sed non statim copiose assumere, nec quam diu ventriculus ex purgationibus languidus est.

*Vitæ &
perfecta
purgatio,
inde di-
gnoscatur.*

Dignoscimus purgationem utilem finitam esse, siti, somno, mutatione dejectionum, & si seipso æger levior appareat; appetentia redeat, symptomata evanescant. Siti quidem, nisi vim purgantis pharmaci consequatur, aut si sitis illa præcesserit.

Nam vehemens sitis, subtracta materia calida, plerumque à purgatione mitescit. In cæteris, (ut præcipit Hippocr. 19. Aphor. 4.) qui purgati non fiunt: non quiescant, donec sitiverint. Verum excipiunt nonnulli eos, qui humidam ventriculi dispositionem habent. Somnus verò superveniens non ex virium debilitate, aut turbulentus, nec etiam in omnibus, sed in his potissimum, qui vigiliis infestantur ab acerbis humoribus, perfectam, bonamque purgationem designat. Præterea dejectionum mutatio cum tolerantia ægri completam purgationem illius humoris potissimum arguit, quem purgare intendimus. Uade Hipp. 14. Aph. 2. In
profus,

profluviiis alvi, mutationes dejectionum juvant: nisi ad malum fiat mutatio; significant enim corpus perfecte purgari. Verū, ut supra diximus, bona utilisque purgatio non est æstimanda ex copia eorum, quæ evacuantur: sed si purgentur, qualia oportet, & æger facile ferat.

Mala igitur, & incommoda est illa purgatio, *Mala purgatio quod triplex.* quæ movet quidem humores, sed non expellit: aut expellit, sed non legitime, nec determinatum humorem, verū cum molestia, gravibus symptomatibus &c. aut quia expellit plus, quàm expellere debet, & utilia cum inutilibus: unde superpurgatio, de qua supra. Horum omnium causa est incompetencia, siue vitium primò sumentis, ob facultatis debilitatem, aut quia humores præparati nō sint, aut viæ obstruæ: Secundò, ipsius medicamenti, quia vehemens, realignum, debile, non correctum; Tertiò, ob errorem in victus ratione. His malis omnibus & singulis Medicum subvenire decet, ut luculenter ostendit Mesue in *Cano: Intent. 3. Avic. lib. 1. Fen. 4. doctr. 1. Paulus lib. 8.* quæ brevitatis causa nunc omitto.

Hactenus de universalibus purgationibus, *Particularia purgantia.* quæ publicis nostri corporis regionibus destinantur. Superfunt particulares, quibus è privatis sedibus, vel peculiaribus corporis partibus humor noxius medicamento educitur. Hæ variantur pro varietate partis, à qua & per quam evacuatio perficitur.

Perficitur autem evacuatio à capite, à pectore & pulmonibus: à renibus & vesica, & à matrice potissimum. A capite verò, vel per palatum apophlegmatismis, vel per nares erihinis & pharmicis, vel per aures *ὀτρυγγας*: à pectore verò & pulmonibus per os ruffi, bechicis siue arteriacis. A renibus & viis urinæ, diureticis: ab utero, hystericis

Ddd 2 illis;

illis, quæ *μεινέχουται* dicuntur. De quorum omnium natura & viribus dictum supra. In omni particulari evacuatione, duo potissimum attendenda sunt: Primo ne corpori non vacuo adhibeantur: Præmittenda enim est semper evacuatio universalis. Deinde ne humoribus influentibus aut fluere paratis admoveantur, sed quiescentibus morbo tendente ad declinationem, post debitas revulsiones; Nam si fluente adhuc humore adhibeantur ad partem affectam attrahent.

CAP. XVI.

Quid phlebotomia, quibus affectibus conveniat & quotuplex?

Cum medicus naturæ minister & imitator sit, naturæ opera ante omnia cognoscere debet, simulque definire, quæ natura integrè & perfectè propriis conatibus incitata, & quæ morbois causis præpedita diminutè agat: Nam ejusmodi ratio teste Galeno adversus Erasistratum libro de Phlebotomia viam ad invenienda remedia suppeditat.

Phlebotomia

*evacuatio-
nis sangui-
nis.*

Ipsa autem natura per se multos morbos sanare solet, & à multis præservare, sola sanguinis evacuatione.

Nam foeminae, quibus menstrua bene fluunt, & viri, quibus pro consuetudine superfluous sanguis per hæmorrhoides evacuat, affectibus à plenitudine raro aut nunquam infestantur. Quare evacuationis sanguinis magna utilitas est. Verùm cum natura impedita fuerit, aut defecerit in sanguinis evacuatione, medici erit naturæ opera imitari, naturæque laboranti subvenire, & si ipsa nihil per se moveat impedita causis morbificis, totum illud supplere

supplere, si in aliquo deficiat, superaddere. Præstat medicus hæc omnia phlebotomia sive venæ sectione, quæ evacuationibus universalibus annumeratur, ut alibi diximus.

Definiri autem poterit phlebotomia (ut est instrumentum medicum) evacuatio humorum quantitate nocentium arte facta per apertionem venæ aut arteriæ, in eum finem, ut vasa multitudine distenta, aut vires onere gravatæ, leventur; vel ut materia noxia, à parte affecta avertatur. Convenit phlebotomia & purgatio, quod utraque evacuatio universalis sit, & magnum remedium, ac morbis magnis conveniat. Differunt non solum instrumentis, quibus perficiuntur, sed etiam formâ modoque, & quod purgatio certos selectos humores qualitate distinctos educat: phlebotomia verò qualitatis rationem non habeat, sed quantitatis tantum. Nam simul quemcunque humorem venis contentum detrahit, non eligendo certum aliquem: & quamvis è toto corpore detrahat, immediatè tamen à venis proximis & à propinquiore parte, secundariò à toto corpore. Nam venæ sibi invicem continuæ sunt. Deinde cum secatur vena, in nostra potestate est, quantum detrahimus, & evacuationem sistere, quando volumus: quod minimè evenit in purgatione. Cum autem magis remediis hoc commune sit teste Gal. Com. 47. Aph. 6. quod ritè aut tempestivè adhibita magnam brevè tempore utilitatem afferant; intempestivè verò adhibita magnorum malorum causa sint: ut igitur tempestiva ratio instituendæ phlebotomiam intelligatur, totam de venæ sectione considerationem 5. partibus præcipuis comprehendemus, 1. erit quibus corporis affectibus phlebotomia conveniat & quoruplex, 2. ex quibus venis & arteriis potissimum, ac quomodo, 3. quæ corpora sustinere vel non sustinere phlebotomiam queant, 4. quan-

D d d 31

4. quan-

Quid phlebotomia.

4. quantum quousq; aut quoties sanguinis evacuatio institui debeat. 5. quo tempore potissimum.

*Scipi in ve-
na sectione.*

Ac primum cum morbi magni magnum expo-
scant remedium: phlebotomiam quidem magnus
aliquis morbus indicabit, præsens vel imminens,
modò vires ferant, ætas cæteraque consentiant, unde
Galen *libr. de Cur. per vena sect.* Hipp. *lib. 4. de Rat. vict.*
acut. tres præcipuos scopos mittendi sanguinis con-
stituant: magnitudinem morbi, virium robur, & æta-
tem florentem. Verum non omnis morbus magnus
statim venæ sectionem indicat (sola enim phleboto-
mia magnum remedium non est.) sed tantum mor-
bus magnus qui ex plenitudine ortum habet, pro
modo plenitudinis, ut infra apparebit, cum phlebo-
tomia propriè sit evacuatio humorum quantitate
nocentium.

*Plenitudo
quid &
quotuplex.*

Dispositio autem humorum quantitate no-
centium plethora dicitur. Plethora enim propriè di-
cta est redundantia boni succi, ut *καρχυρία* pra-
vi. Verum nihil impedit manente plethorica disposi-
tione vitium in qualitate esse, sicut in *καρχυρία*
vitium aliquod in quantitate. Est autem plethora
primariò affectio venosi generis à redundantia san-
guinis, secundariò habitus corporis. Sanguis enim
primùm in venis & arteriis redundat, ab his dein-
de in habitu corporis. Afficit autem plenitudo dupli-
ci modo potissimum, unde duplex plethora, una quò
ad vasa sive capacitatem vasorum, quando ob ni-
miam sanguinis redundantiam ipsa vasa ita tument;
ut maximum tensionis sensum inferant; metusque sit
ne vasa disrumpantur, aut ægri subito suffocentur.
Alter a plenitudo quò ad vires vocatur, quando tan-
ta adest sanguinis redundantia, ut natura eam guber-
nare nequeat, sed vires premar, sensumque gravitatis
inferat. Nam non rarò exigua plenitudo, quæ vasa
non

non distendit, debili naturæ & viribus gravis est. Vires autem intelligo non solum animales, sed etiam naturales ac vitales, licet sensus tensionis & gravitatis à facultate animali propriè percipiatur. Utraque plenitudo non solum ægris, sed etiam sanis (plerumque cum lassitudine tensiva aut phlegmonosa) accidit. Verum in sanis diu consistere nequit: nam spatio tēporis humores vel putrescunt, vel vasa disrumpuntur, vel fluxiones concitantur, unde varia morborum genera. Deinde omnis plenitudo ratione cōtentorum vel est exquisita, & simplex, ex solius boni succi redundantia; vel notha quando cum bono succo aliquid vitiosi accumulatur, quæ ob id plethora cacochymica dici solet, sicut quando cum parvo succo redundat nonnihil boni, cacochymia plethorica: simplex autem plethora duplex vicissim est, una propriissime dicta, quando omnes 4. humores servata ad invicem proportionē augentur, alia sanguinea dicta, quando solus sanguis purior redundat. Præterea plethora ratione corporis affecti, aut est universalis, quæ per totum corpus diffusa est, aut particularis, quando in determinata parte redundantia consistit. Item alia in solis vasis, alia simul in habitu corporis: Tandem alia in actu, quæ totum corpus aut partem aliquam nunc occupat, alia potestate, quæ occupatura est, ut cum ex suppressa consueta sanguinis evacuatione, plenitudinem in toto timemus, vel quando, ex fluxu humorem ad determinatam partem, partis inflammationem, putredinem, dolorem, &c. Evacuat plenitudinē vel in toto, vel in parte, vena sectio morbo magno præsentē vel imminente. Morbū autē magnū hic intelligo nō solum ob ipsius affectus magnitudinē, ut magna inflammatio aut vulnus, sed etiam ob partis præstantiam aut malignitatem. Parva enim inflammatio in ignobili parte licet ex redundantia sanguinis ortum habeat, phlebo-

tomiam aut magnum remedium non exigit: sed levi-
oribus curatur, nimirum medicamentis digerenti-
bus; diæta & similibus: Ac parva inflammatio in no-
bili parte ut in jecore, quia magnus morbus est, non
ex affectus magnitudine, sed ex partis præstantia,
venæ sectionem requirit. Cum autem auctore Galie-
ni *lib. ad Erasistrat. de Sectione venæ*, multi sectione venæ
indigeant, qui actu plenitudine carent, velut in initi-
is inflammationum, in dolore, ictu, vulnere & simili-
bus, non erit unus phlebotomiæ scopus.

*Finis du-
plex in phle-
botomia.*

Utimur enim venæ sectione non unius finis
gratiâ: plerumque, ut per se proſit, quando plenu-
tudinem evacuamus, aut avertimus, nonnunquam pro-
pter aliud, aut alterius finis gratia, quando aliquid
præſtare cupimus, quod ſine ſanguinis evacuatione
fieri nequit, ut quando initiis morborum, venam ſe-
camus eventationis gratia, ut concoctio melius pro-
cedat, putredo reſtinguatur, cæteraq; remedia com-
modius exhibeantur, ut ſupra diximus.

Per ſe ſuique operis gratiâ, phlebotomiâ dupli-
ci ratione utimur (ut ex definitione apparet) primò ut
vaſa multitudine diſtenta, aut vires onere gravatæ le-
ventur, ſive ut plenitudo jam facta in toto, aut par-
te evacuetur. Deinde, ut humor à parte affecta aver-
tatur, ſive ut plenitudo particularis futura prohibea-
tur. Avertitur autem humor duplici modo, ſcilicet quando
cum imperu confertim inſluit, ſi à parte affecta in
contrariam retrahatur. Deinde, cum ſine impetu fluit
aut plenitudo partim in facto, partim in fieri, ſi ad
proxima derivetur.

*Phleboto-
mia triplex.*

Proinde phlebotomia propriè triplex erit, una
evacuans, altera revellens, tertia derivans. Evacu-
ans autem alia ſimpliciter ex toto corpore, alia ex
determinata tantum parte, ſi parti inhæreat hu-
mor citra affluxionem. Verum, ſi aliquid ſimul affluat
auxilium poſtulat ex revulſione aut derivatione
con;

conjuncta cum vacuatione. Vacuatio simpliciter dicta, ut vult Galen. 13. Method. humorem respicit, non qui movetur aut influit, sed cum, qui jam permanet, aut in parte firmatus est.

Phlebotomia verò simpliciter à toto corpore *Phlebotomia simpliciter evacuans*, respicit solos humores in toto corpore ad-*ans, quid* auctos, citra alicujus particulæ affectæ consideratio-*morbi con-* nem, & propriè morbis universalibus à plenitudine *veniat.* convenit, secundum plenitudinis modum; sanis verò, & quibus quibus morbis universalis à plenitudine imminet, aut singulis annis aut certis temporibus in universa-
les morbos decidunt, non particulares.

Nam qui in proprios partis alicujus morbos *Phlebot. à toto evacuans.* decidunt, sanguinis missione indigent, non tam propter simplicem evacuationem quam revulsionem. Secamus etiam venam in plethoricis adhuc sanis, licet nullum determinatum morbum designet ut (3. Aph. 1.) in athletarum habitu ubi vires aut vasa periclitantur, magnumque imminet discrimen. Secatur quoque vena, si vires satis validæ intensiva affectione potissimum magna, magis autem in phlegmonode. Plethora simplex puravè venæ sectione tutissimè sanatur, notha non æque tuto: quò enim plethora impuriore est, eò minorem sanguinis detractionem desiderat. Verùm calida biliosaque plethora tutius quàm melancholica venæ sectione evacuatur, & melancholica, quàm pituitosa, quia phlebotomia non solum plenitudinem detrahit, sed etiam refrigerat. Proinde si notha fuerit plethora potissimum ab humoribus frigidis, aut a natura sanguinis plurimum distantibus, & vires debiles fuerint, à venæ sectione temperandum erit: similiter ubi sanguis bonus in venis fuerit paucus, humores autem mali multi. Semper autem in plenitudine si vires ferant, detrahi debet aliqua sanguinis pars, quo natura premitur, ut vires onere leventur, tan-

tumq; relinquatur, quantum natura faciliè gubernare queat. Unde præcipit Galen. *Com. 29. Aph. 2.* in principiis febrium putridarum venam secare, ad demolendam multitudinem, ut felicius fiat concoctio.

Phlebotomia

evacuans à parte.

Simplex evacuatio à parte affecta in particulari plenitudine locum habet. Particularis autè plenitudo, si in fieri, aversionem, si in facto, evacuatio nem simpliciter indicat: quod enim parti affectæ inhæret, citra ullam fluxionem per partem ipsam aut maximè vicinam evacuari debet. Verum si per vicinam, plerumq; derivatio dicitur: si per ipsam partem, simpliciter evacuatio. Unde simplex evacuatio interdum pro derivatione sumitur, sæpè sub derivatione ista evacuatio continetur. Nam evacuatio particularis propriè debetur ei, quod per partis substantiam dispersum est: derivatio potissimum, quod in venis partis affectæ aut vicinis continetur. Evacuatur autem, quod per partis substantiam dispersum est, effluu vel insensibili medicamentis attenuantibus, discutientibus; vel sensibili, scarificationibus potissimum aliquando sectione venæ præcipue post revulsionem, aut derivationem, in inflammationibus, ubi majus malum imminet, quam suppuratio, veluti si pars in gangrænam degenerare videatur; unde in carbunculis, pestilentialibus tumoribus, & similibus, sæpe id, quod parti impactum est, scarificatione evacuamus, aliquando venæ sectione sed rarius, dum iterum in venas remeare cogitur. Igitur phlebotomia simpliciter à parte affecta evacuans, affectus remedium est non fluxionis: contra revulsio & derivatio magis fluxionis quam affectus. Nam si vim vocis spectes tam revulsio quàm derivatio, ipsos humores fluentes respicit: revelli enim dicuntur, quæ eadem, qua moventur, via retrocedere coguntur, sive ad fontem remeare, unde fluxio oritur. Derivatio verò idem est, quod rivos in alias partes ducere.

Artic.

Αντισπασις revulsio generaliter sumpta omnem
versionem humorum sive in partem contrariam si-
e vicinam continet. Unde Gal *Epid. Sect. 2. Com. 31.*
luxiones oculorum ad nares vel palatum revelli pos-
e scribit, ubi derivationem intelligit.

*Plebotomia
revollens.
quid & qui
bus morbis
debeatur.*

Proprie verò revulsio Gal. 3. & 13. *Method.* est
illabentis humoris in contrarium tractus, sive aver-
sio humorum cum impetu fluentium, aut qui fluxu-
i sunt in partem contrariam, ut impetus fluxionis
quàm citissimè cohibeatur: per contrarium hîc in-
telligimus non solum ad contrariam partem ei quæ
aborat, sed etiam ad contrarium motum sive ver-
sus terminum, à quo fluunt humores κατὰ τὴν ser-
vata rectitudine & venarum communione quan-
tum fieri queat. Contrariæ autem partes omnes il-
læ dici poterunt, quæ sufficientem à parte affecta
distantiam habent, contrarietas verò in motu est
sursum, deorsum, dextrum, sinistrum, ante, re-
trò, intus, extra. Verum in revulsione æstiman-
da est contrarietas secundum motum humorum
fluentium per venas in partes affectas. Influunt au-
tem in partem affectam nonnunquam à toto cor-
pore omnibusq; vasis, plerumq; à parte aliqua man-
dante, aliquando una parte potissimum & simul à
toto. Nam accidit non rarò, ut ad partem debilem
aut affectam, omnes partes sua excremēta deponant.
Hæc omnia in revulsione considerata erunt, &
semper secundum quam rectitudinem sit influxio,
eadem via in contrarium instituat revulsio: pro-
inde, si fluxio sit à toto, revulsio fiat ad partes maxi-
mè distantes, si à parte mandante, recursus ad ori-
ginem fiat, aut ad partem ei proximam, evacuando
primum transmittentem: Nam revulsio primum
partem mandantem respicit: deinde recipientem
aut affectum: contra derivatio. Cætera de modo
& ratione revellendi infra proponemus. Convenit

revul-

revulsio potissimum affectibus illis, in quibus fluxiones vehementes & humorum copia magna, u inflammationibus initiò potissimum. Proinde in angina, ophthalmia, phrenitide, hepatitide & similibus affectibus, quos sanguis aut eruptio calidorum humorum progenit. Convenit etiam non solum humoribus cum impetu fluentibus, sed etiam præservationis gratia, quando fluere in partem aliam quam solent, præterea vulneratis, luxatis, fractis &c. respicientes ad id quod futurum est, si metus inflammationis partis affectæ. Item in profluvio sanguinis ex naribus, utero; hæmorrhoidibus &c. in sputo sanguinis, ne copia confluat ad locum affectum.

*Phleb. deri-
vans quid,
& quib. af-
fectib. con-
veniat?*

Derivatio propriè est humorum citra impetum in partem affectam defluentium, aut qui defluerunt, sed nondum impacti sunt, adversio ad locum vicinum, ut pars affecta à noxio humore liberetur. Nam derivatio partem affectam primo respicit, & à revulsione & vacuatione differt, quia derivamus (test Gal. 6. Epid. tex. 7. Com. 2.) humores fluentes, aut non impactos, nec per partes remotas, ut in revulsione, nec per partem affectam, ut in simplici evacuatione, sed per propinquas ad latera ex venis vicinæ partis: Ejusmodi venæ necessariò communicationem habere debent cum parte affecta, nam optima derivatio fit à venis deductis ab his, quæ in ipsis partibus affectis sunt, ut infra dicemus. Utimur phlebotomia derivante in affectibus ortis à debili aut diuturna fluxione: item post evacuationem à toto ad revulsionem, in magnis inflammationibus cessante impetu fluxionis: præterea in affectibus, qui aliis evacuationibus non cedunt, duplici modo: uno ut id, quod in venis affectæ partis continetur, per eas detrahatur, alio ut id, quod in mandante aggregatum est, per ei vicinas extrahatur. Tandem in

sanis convenit derivatio, humoribus quiescentibus, sed fluere assuetis in partem aliquam debilem, quando cum impetu fluere non solent. Ex his omnibus apparet, quibus affectionibus phlebotomia conveniat, & quæ qualisque.

CAP. XVI I.

*Ex quibus venis phlebotomia institui debeat ;
quomodo, ac qui sectionem venæ sustinere, vel non sustinere possint.*

Consequens est, ut consideremus ex quibus venis in quolibet affectu sanguinis missio fieri debeat, & quomodo. Ubi primum observandum est venarum nomine duo vasorum genera ab Hipp. 2. Epid. Ex quibus sect. 5. comprehendi, nimirum quas propriè venas vocamus, & ipsas arterias. Venæ autem quæ secantur certo numero definitæ non sunt, nec in omnibus eodem modo perspicuæ, unde alii plures alii pauciores enumerant. Maximè verò conspicuæ sunt venæ cubiti, deinde crurum, manus, pedum & capitis, Arteries verò Galenus in somnio admonitus secare non dubitavit, hodiè verò pauci arterias, quia grandes secare periculo non vacat, & minores conspicuæ non semper sunt: secantur tamen nonnullæ, ut infra dicemus, in certis affectibus, ubi materia calida & spirituosâ est aut dolor diuturnus aut pulsatorius.

Ac primum ubi requiritur phlebotomia simpliciter à toto evacuans, quavis vena secta effunditur sanguis. Commodissimè tamen plenitudo in toto detrahatur, sectis cubiti venis, præcipuè in superiore vena cubiti dextri lateris, quæ à cava plurimum, à jecore validissimè prolicat: maximè si plenitudo

*Phlebot. à
toto eva-
cuans ex
quibus ve-
nis institui
debeat.*

nitudo simplex aut biliosa fuerit, quod si melancholica, interior sinistri cubiti potius secari debet. Evacuatur interior cubiti vena quæ basilica dicitur, non solum à toto corpore, sed etiam à partibus infra colulum & renes cito valideque revellit: tardius & segnius ejus propago, quæ salvatella dicitur inter minimum digitum & auricularem. Eodem modo evacuat simulque cito & valide revellit à partibus supra claviculas vena cubiti exterior sive humeraria, unde cephalica dicitur: tardius verò & debilius vena illa brachii quæ funiculus dicitur. Item vena, quæ inter indicem pollicemque excurrit. At venæ communis ex basilica & cephalica, in, aut, circa mediam juncturæ flexuram deducta, quia ab utrisque derivata est, partim à superioribus, partim ab inferioribus, evacuat & revellit. Sub renibus si affectus constitit, secata vena crurum citius & perfectius evacuatio efficitur, tardius sectis venis malleoli: Renes medii quodammodo ponuntur inter partes superiores & inferiores ob initium & productionem venarum. Proinde de Gal. *de Compos. fac. loc. cap. 2.* renibus inflammatis à cubito & cruribus venam secare jubet. Semper autem à superioribus, ad inferiora convertitur humor secta vena crurum & pedum, contra ab inferioribus ad superiora secta vena brachii. Proinde fluxus menstruorum aut hæmorrhoidum sistuntur, sursumque retrahuntur secta vena cubiti: contra sanguis deorsum convertitur mensesque suppressi moventur, secta vena in poplite aut in talo interiore, quæ saphena dicitur: potissimum instante tempore menstruæ purgationis. In ischiade secatur vena cruris aut exterioris malleoli &c. Verùm ubi causa partis alicujus detrahatur sanguis, secanda vena illa erit, parti affectæ maxime congruit. Nam optima evacuatio partis fit, per venas vel ipsius partis, vel deductas ab his, quæ in partibus sunt.

Revulso

*Revulsio
ex quibus
venis fieri
debeat.*

Revulsio verò humotis fluenris à parte affecta contrarium fieri debet, servata quantum fieri que-
rectitudine, & communione venarum: Rectitudo
item venarum est secundum longitudinem potis-
simum. Nam à dextris ad sinistra & contra non est
ita venarum rectitudo, nec etiam communio, quā-
dextorum cum dextris, aut sinistris. Communi-
ant quidem omnes venæ primæ communione, at
privata communione partes communicant per pro-
ximas venarum divisiones, quæ sunt uni trunco
communes, quo modo basilica dextra brachii cum
minibus venis & partibus dextri lateris, basilica si-
nistri cum omnibus sinistri lateris communicat. Ma-
is adhuc proprie venæ illæ communicant, quæ ab
no eodemque trunco deductæ sunt, ut vena hume-
aria cum venis capitis.

Communicant quoque venæ superiores &
inferiores per sua orificia, ob quam communionem
um rectitudine in pleuritide ejusdem lateris venam
ecamus, licet utrumque latus à vena sine pari reci-
iat alimentum. Verum quia defluxiones potis-
imum à locis communibus fiunt, sectio communis
venæ revulsiones rite complet, licet non satis per-
fectè à qualibet parte, ut infra apparebit. Rectitu-
do autem in omni phlebotomia temere negligē-
la non est, licet nonnullis casibus solam commu-
nionem observemus: sicuti contra corporis rectitu-
dinem non habita ratione privaræ alicujus com-
munionis: cum rectitudinis magna vis sit.

Nam partes, quæ secundum rectitudinem fi-
ræ sunt, plurimum communicant, & recte Galen.
lib. de Curat. per phlebot. eruptiones sanguinis, quæ
per rectitudinem fiunt, magnum emolumentum
adferunt; quæ contra, nullum aut exiguum. Et in
pleuritide phlebotomia, quæ contrario latere fit,
obscuram utilitatem aut longo tempore adfert: nā
sinistræ

sinistræ in sinistras, dextræ in dextras, sese facilius exonerant ob rectitudinem vasorum, sive attractio ista intelligitur fieri secundum rectitudinem fibrarum, ut Fernellius arbitratur, sive potius consecutione a id, quod evacuetur, ut plerique volunt, cum ipsæ fibræ rectæ evacuationem non perficiant.

*Revulsio
simplex
aut localis.*

Nihilominus ubi humores à toto corpore cum impetu in partem affectam irruunt: utile erit ut præcipit Gal. lib. de Fract. cap. 10. & lib. 1. de Humo-
ribus cap. 11. ad contrarias & distantissimas partes, imò ad opposita latera concitatas fluxiones retrahere, atque hæc revulsio simplex dici poterit. Ubi verò fluxio à certo fonte aut determinata parte defluit spectanda est ipsa origo, & laborandum, ut reducat-
tur ad originem aut ad partem proximam, unde localis revulsio à nonnullis dicitur.

Ubi verò pars mittens per se debilis est, aut proprio affectu laborat, aut simul fluxio à toto sit, nunquā ad originem fluxionis revellendum erit, sed ut impetus fluxionis sistatur, ad partē ei proximam. In omni quidem phlebotomia rectitudo quædā observari debet: verum in derivatione, evacuare debet per directum ex venis deductis ab iis, quæ in parte affecta sunt; non habito respectu partis mandantis: at revulsio contra, partem mandantem primò respicit, deinde recipientem, requiritur enim in revulsione, ut illam venam secemus, quæ transmittentem proximè evacuate queat, & partem mandantem evacuantem, secundariò à parte affecta abducamus. Quare in revulsione locali tria requiruntur: 1. ut per venas fiat, quæ communionem & rectitudinem habent, primum cum demandante, & propter demandantem cum recipiente. Deinde ut vena sufficientem distantiam habeat à parte affecta 3. ut in contrariam partem humorum retractio fiat, aut contrario motu agitentur, ut impetus fluxionis sistatur.

sistatur. Nam ad contraria retractio in omni revul-
sione necessaria est, & unice utilis ad cohibendos im-
petus fluxionis, licet magis sit fluxionis quàm affe-
ctus remedium. Verùm nec retractio ad remotis-
simas partes, nec ad originem recursus, in omni re-
vulsione necessarius est, sed retractio ad partes distā-
tes his potissimum affectibus ex usus est, qui fomen-
tum ex toto suscipiunt: at recursus ad originem iis,
qui ex aliqua certa parte fontem trahunt. Plerumque
autem recursus ad originem non fit ad partes remo-
tissimas, sed interdum ad propinquas.

Quare quando pars fluxione periclitatur ob
humores motos aut moveri solitos, revulsio triplici
modo fieri poterit. Primò retractione humorum ad
partes contrarias, maximeque distantes secta vena
in opposito latere: ut excitato contrario motu impe-
tus fluxionis tandem cohibeatur, 2. recursus ad ori-
ginem fluxionis secta vena, quæ in partem mandan-
tem inseritur aut vicinam, ut inde recurrant humo-
res unde prodeunt: 3. retractione in directum secta
vena communi servata rectitudine cum parte mit-
tente & affecta, ut non solum humores influentes re-
vellantur, sed etiam aliquid à parte affecta evacue-
tur. Optimè enim venæ communes, ut supra di-
ctum est, ab eodem latere revellunt, simulque evacua-
nt, quia de fluxus à communibus locis per directum
ut plurimum fiunt. Hæc non solum fluxioni, sed et-
iam affectui aliquid confert, at retractio ad partes
maximè distantes aut opposita latera etsi fluxionis
idoneum remedium sit, longius tamen distat, quàm
ut affectui gratiam aliquam præstare queat.

*Revulsio
tribus mo-
du in se suo
solet.*

Quapropter una horum trium modorum *servanda*
ratio in omnibus non est. Nam quando magna flu- *in revul-*
xionis causa adest, ut vulnus, ictus, magna plenitu- *sione.*
do &c. aut à toto confluunt humores: secatur ve-
na non solum in recto, sed etiam in distantī situ,
Ecc & ali-

Regula ob-

servanda

in revul-

sione.

Ecc

& ali-

& aliquando in opposito latere. Deinde tibi copiosa evacuatio sanguinis fieri nequit, ex vicino loco venæ sectio institui nunquam debet, sed ex maximè distant: quia insufficiens loci vicini vacuatio maiorem concitat fluxionem ad partem affectam. Quare fluxiones, quas citius aut tutius avertere conamur, per proximè distantes partes revellimus. Quas verò citius quàm secutius per propiores partes, & ex venis communibus servata rectitudine: citius autem revellimus, quo magis urget affectus. Igitur in pleuritide, quæ vehementissimè plerumque urget, secamus venam ab eodem latere contenti rectitudine & communione venarum; ut non solum influxus humorum revellatur, sed etiam ab affectâ parte quàm plurimùm extrahatur: licet interdum ex usu sit, potissimum si humor ex toto confluat, aut in annua plenitudine præservationis causa, ex contrario latere sanguinem mittere.

Verum ex contrario latere venæ sectio tantum revellit, ipsam inflammationem non immittit, nec à parte inflammata evacuat. Præcautionis verò gratia monet Hipp *lib. 2. de Natura Humana*, sectiones quàm longissimè à locis illis facere, ubi dolores fieri, & sanguis coacervari solet. Eadem est ratio in inflammationibus oculorum, aurium, &c. Verum, quando datur pars mandans, communitas venarum cum mandante observanda erit: deinde ubi fluxio intra corpus cum magno impetu in partem affectam irruit, ut in inflammationibus, quia cito subvenire oportet, utile est majores venas secare, si partis affectæ conditio ferat: Vbi verò extra erumpit, ut in hæmorrhagiâ, satius erit minores venas eligere, potissimum si vires debiles sint, ut minus spirituum dissolvatur: & sæpius missionem sanguinis repetere, ut natura assueta crebris motibus revulsoribus locum affectum deserat.

Derivatio

Derivatio propriè fit, secta ea vena, quæ in partem affectam inseritur, aut secta vena deducta ab his, quæ in parte affecta sunt. Utimur ut diximus aliquando derivatione per se, aliquando post revulsio- nem aut evacuationem à toto, cessante impetu fluxionis. Itaque in morbis capitis ex plenitudine, vena cubiti exterior revellit, at derivat fluxus sanguinis narium, in dolore anterioris capitis, stupore &c. sectio venæ frontis derivat: verum revellit in dolore posterioris capitis: derivat quoque in inflammationibus oculorum, sectio venæ in angulis oculorum: In angina orisque affectibus sectio venæ sub lingua, item in vehementi angina, peripneumonia, cathastro suffocante sectio jugularium: in lienis affectibus a- pertio hæmorrhoidum: In inflammationibus sub renibus primo secatur cubiti vena interior, deinde pedis ejusdem lateris non tam ob derivationem, quam ut id, quod superat, exhauriatur, & deorsum conver- tatur.

*Deriva-
tio, ex qui-
bus venis
perficiatur.*

Eadem propemodum ratio est in arteriarum sectione, ut in venarum: licet arteriarum sectio peri- culo non careat, potissimum si majores fuerint. Galenus tamen in somnio admonitus in diuturnis laterum doloribus arteriam dextræ manus inter in- dicem & pollicem secuit. Secantur arteriæ juxta au- res, ut in vertigine, in diuturnis capitis doloribus, in rubore faciei &c. licet Hippocrati suspectæ sint. Se- cantur quoque arteriæ juxta malleolos in antiquis coxendicium doloribus &c. Verum in his omnibus magno judicio utendum erit.

*Arteria-
rum sectio*

Perficitur venæ sectio, ut plurimum phleboto- mo sive scalpello: tutissimè lancetta sive gladiolo; interdum ad mota hirudine ipsi venæ.

*Modus ob-
servandus
in vena*

Venæ tres cubiti supra flexuram potissimum sectione, secari debent, ne tangantur arteriæ & nervi, quæ sunt propiores in ipsa junctura, quàm supra. Deinde dum

Ecc 2

tundi-

tunditur phlebotomo basilica, periculum est propter arteriam potissimum, aliquando nervum: dum mediana propter nervum, quare pro verâ mediana, alii ramum basilicæ, alii ramum cephalicæ secant, paulò supramedianam, quæ ab utrisque derivata est. In cephalicæ sectione tantum periculi non est, sed tamen observandum est, ne sectio fiat in initio musculi, ubi tendo sub digitis durus sentitur. Quando venæ confusæ sunt, aut una non satis conspicua, ut Cephalica, aut Basilica, secetur proxima nimirum ramus proximus unde derivata est mediana, & altera remotior digito arctè comprimatur. Venæ minores aliquandiu in calida aqua mergantur ut intumescant antequam secantur, deinde in calida iterum detineantur. Si vires non satis firmæ sint, aut sanguis tenuior, sectio angusta fieri debet, ut paulatim sanguis exeat, & pauci spiritus exhalent. Idem quoque in revulsionibus fieri convenit, aut ubi reiteratio ex usu est. Unde nonnulli foramini digitorum aliquandiu admovent, ut retractio à parte affecta quasi per vices melius procedat, verum amplior sectio magis accommodata est evacuationi, & crassum sanguinem facilius educit.

*Qui sectio
nem vene
sustinere
vel non su
tinere possint.*

Consequens est, ut demonstremus, quibus sanguinis missio conveniat. Nam in ægris non statim, quicquid affectus requirit, faciendum est, sed primum videndum, an sustinere aut non sustinere queant. Ostensum supra est morbum magnum præsentem aut imminens phlebotomiam indicare si vires ferant, ætas, anni tempus, cæteraque consentiant. Nam vires validæ sufficientem sanguinis missionem permittunt: mediocres mediam: debiles aut planè dejectæ exiguam aut nullam. Verum non omnia virium debilitas sanguinis missionem prohibet.

*Virium du
plex debi
litas.*

Nam debilitantur vires duobus potissimum modis, dum opprimuntur, aut dissolvuntur. Vires autem

utem oppressæ sive afflictæ in sua substantia nihil
atiuntur, nec evacuationem semper prohibent, sed
issolutæ sive languidæ.

Opprimuntur autem vires ab humorum mul- *Quomodo*
titudine, aut infarctu, ut in plethorica dispositione *oppriman-*
thlerarum, interceptionibus venarum, vehementissima *tur vires*
ynocho &c.

Dissolvuntur verò dissolutione substantiæ spi- *Causa dis-*
rituum, partium carnosarum & spermaticarum, aut *solutionis*
abestactato eorum omnium temperamento; quod *virium.*
ccidit in phthisi, atrophia, hectica, febribus malignis,
magnis cruditatibus & similibus.

Nam consistunt vires in temperamento spiri- *Virium de-*
uum, substantiæ carnosæ & spermaticæ; ac æstima- *bilitas unde*
tur ex facultatibus, vel insitis singulis partibus, vel in- *cognoscatur*
fluentibus à corde, cerebro, & jecore. Vires autem
cordis sive virtus vitalis, quæ maximè necessaria est,
ex pulsu judicatur: Vires animales, ex functionibus
sensus & motus: vires naturales ex signis concoctio-
nis & cruditatis, ut in Prognosticis demonstratum
est.

Galenus solius virtutis vitalis in sanguinis mis-
sione mentionem fecit, quod reliquarum facultatum
fundamentum sit, & ea dejecta cæteræ facillè collabā-
tur. Verum in singulis morbis, qui evacuatione indi-
gent, considerare oportet, quæ facultas morbum de-
bellare & finire potissimum debeat, ut ejus robur cō-
serveretur, nec immodicis evacuationibus succumbat;
sed virtus vitalis imprimis spectanda erit, an sibi &
cæteris sufficere queat.

Vires variant res naturales, non naturales & *Demonstrat*
præternaturales. Nam primum temperamentum *virium robur*
calidum habitu denso solido firmoque præditum *I. tem-*
cum latis venis, copiosissimas evacuationes sustinet: *peramentū*
contraria constitutio, aut nullas aut exiguas. Dein- *habitusque*
de corpus calidum humidumq; molli raroq; habitu *corporis.*

Ecc 3 præ-

XVII.

præditum, ex quo continuo plurimum dissipatur, validas evacuationes nullo modo sustinet. Calidum verò modice siccum cum latis venis, liberalius quam corpus frigidum humidum, aut frigidum & siccum evacuari potest, quia utraque constitutio angustas venas habet. Semper autem corpora, quæ tenuium sunt venarum & pauci sanguinis, aut nihil, aut quæ minimum extrahi sinunt. Plerumque autem in pingui habitu venæ angustæ sunt, quod si latæ fuerint, facilius evacuationes sustinent, quam graciles.

2. *Ætas.*

Deinde cuique ætati suum robur à natura est. Nam media sive florens ætas, naturaliter vires omnes robustas, spirituum & sanguinis copiam habet; & copiosas sanguinis evacuationes sustinet. Contra, ætas decrepita ob virium debilitatem omnem sanguinis evacuationem metuit. At ætas puerilis (ante annum 14.) licet substantiâ virium abundet; tamen quia corpore humido, molli & tenello prædita est, ex quo continuo plurimum dissipatur propter insitam à natura evacuationem, respiciendo non tam ad vires præsentis quam futuras, sanguinis evacuationes aut nullas aut exiguas sustinet. Verum ex ætate non absolute virium robur conicere oportet, sed juxta cuiusque corporis naturam & conditionem. Nam eadem ætate aliis corpus robustum, aliis debile est. Quare ut præcipit Celsus *lib. 2. cap. 9.* si juvenis imbecillis est, aut mulier non gravida parum valet, malè sanguis emittitur: emoritur enim vis, & quæ supererat hoc modo erepta est. At firmus puer & robustus senex, & mulier gravida valens, tuto curatur. Puer autem firmus præcipue non lactans, habitus densi & multi sanguinis, si gravi morbo laboret, ut interiturus videatur nisi hoc modo adjutus fuerit, non erit cunctandum sanguinem mittere: condonantes aliquid ætati, tempori, &c. Quare Avenzoar filio

termo

Primo utiliter in tali casu venam secuit. Eadem est ratio in robustis senib. gravi morbo à plenitudine laborantibus, ut longa experientia demonstrat Rasis.

Viri plerumque sanguinis missionem melius ferunt, quàm mulieres, præcipuè quæ habitu molli laxo & raro præditæ sunt cum venis angustis. Quando autem menstrua naturaliter fluunt à phlebotoomia abstinere convenit. Mulieres quidem gravidæ teste Hipp. 31. Aph. 5. si sanguis mittatur abortum faciunt: attamen si magnus morbus urgeat aut imminet à plenitudine, cum virium robore, medici erit potius anceps auxilium eligere quàm nullum. Verùm minus extrahere, quàm vires tolerare, potissimum primis & ultimis mensibus; ut dictum est supra.

Præterea aër ambiens temperatus, evacuationes feliciores reddit; contra intemperatus difficiliores. Nam caliditas vires & corpora dissolvit, frigiditas coërcet. Proinde ver omnibus evacuationibus magis accommodatum est, deinde autumnus: minus accommodata est æstas, deinde hyems. Quæ ratio est in anni temporibus, eadem in regionibus & locis ac cœli tempestatibus.

Præterea qui non assueti sunt venæ sectionibus, & qui parsimonia vitæ usi sunt, & multis curis & laboribus torquentur, minus sanguinis evacuationem sustinent. Contra qui assueti sunt venæ sectionibus, & liberalius pleniusque vivunt.

Tandem res contra naturam quatenus vires debilitant aut dissolvunt, evacuationem sanguinis prohibent, ut morbi ab humoribus pravis aut crudis sine plenitudine, ut hydrops, &c. magnæ intemperies partis principis, gravissima vulnera, &c. Item nervorum distensiones, morsus aut dolor in orificio ventriculi, syncope, diurnæ vigiliæ, fluxus alvi immodicus, spontanea sanguinis evacuatio,

cuatio; quatenus vires dissolvit, aut materiam morbi
sufficienter demit, &c. Oportet autem non solum in
aëris vires præsentis observare, sed etiam futuras
prospicere. Ex his omnibus judicamus non solum,
quibus vena secanda sit, sed etiam aliquo modo,
quantum sanguinis extrahendum, sive quousque sit
evacuandum & quoties

CAP. XVIII.

*Quantum, quousque, ac quoties sanguis de-
trahendus, & quo tem-
pore.*

*Quantum
evacuandum,
quousque, &
quoties.*

Quantitas autem sanguinis evacuandi correspon-
dere debet quantitati illius, quod multitudine
ne peccat, modo feratur à viribus. Verum cum
nec multitudinis nec virium sit certa mensura, neque
etiam perspectum sit, qualis sit futura aëris constitu-
tio &c. quantitas sanguinis mittendi incerta erit. Ni-
hilominus, quia cum secatur vena, in manu nostra
est; quantum detrahamus; si comparatio fiat virium
cum magnitudine morbi aut plenitudine, ex utriusque;
propriis signis, non prorsus difficile erit, artificiosa
conjectura ad justam quantitatem quam proximè
accedere. Verum si res adhuc incerta videatur, sa-
tius erit in defectu peccare, & sectionem reperere,
quàm in periculum agrum abducere subito & ino-
pinato virium lapsu. Vires autem validæ copiosam
sanguinis detractionem facillè sustinent, & simul
causas morbificas facillè excutiunt; at si vires defi-
ciant, relicto morbo viribus subvenire oportet;
nam auxilia per se morbos extirpare nequeunt, sed

na-

naturæ auxilium requirunt: Verùm si vires nec satis firmæ, nec prorsus debiles sint, ita curatio instituenda erit, ut nec vires nec morbum contempsisse videamur. Proinde quantitatem exacuationis semper æstimare oportet ex quantitate requirentium & tolerantium missionem; requirit enim morbus, tolerant vires.

Ex mutua autem comparatione morborum requirentium & virium tollerantium ipsa sanguinis missio triplicem differentiam admittit, alia enim phlebotomia perfecta magnæ est, quæ totam aut maximam materiæ morbificæ partem detrahit; alia utilis sed imperfecta, quæ portione aliqua detracta, reliquam leviolem facit, ut à natura facilius regatur: tertia non solum imperfecta, sed etiam tam exigua est, ut inutilis videatur, & nihil laborantem levet.

Quemadmodum phlebotomia, ita vires & morbi dividuntur. Vires autem in integras sive robustas, mediocres, & debiles sive prostratas. Vires robustæ perfectam, mediocres imperfectam sed utilem, dejectæ autem exiguam, aut prorsus nullam sanguinis detractionem sustinent. Morbi verò alii magni, alii parvi, alii mediocres sunt. Semper autem morbi magnitudo cum virium robore conferenda est, si tutam curationem exequi velimus. Parvi morbi licet à plenitudine, levioribus remediis curantur, nec sanguinis detractionem requirunt, ut supra diximus.

Morbi verò magni à plenitudine, magna remedia, scilicet, phlebotomiam indicant, sed pro modo magnitudinis & virium robore. Nam si morbus extremus fuerit cum virium robore; quia vehementissimè urget, citò subvenire oportet, plena integraque sanguinis detractione: at si morbus minor fuerit, & vires integræ, plena evacuatio necessaria non est, sed utilis sufficere videtur, ut tutò

Ecc 5 ma-

magis quàm citò curemus. Nam semel & universum evacuare periculo non caret. Sin vires debiles fuerint, sed non planè prostratæ & morbus vehemens, consultum erit per vices sanguinem extrahere, & intermedio tempore antequam fiat reïteratio, vires semper reficere. In acutis verò morbis quia periculum magis urget, sanguinem paulò liberalius mittere oportet, modò vires ferant.

Nam, si prostratæ fuerint omninò abstinendum erit, si magis oppressæ, quàm languidæ, nequaquam sanguinis missionem omittere decet, sed iterato sanguinem detrahere, per & vices reficere, qualis phlebotomia per *πινγαστιν* dicitur. In chronicis verò quanto morbus diuturnior, tanto minus sanguinis detrahere oportet, ne subtractione sanguinis natura in via deficiat. Nam in chronicis potissimum, non tantum vires præsentis, sed etiam futuras considerare oportet.

Deinde in phlebotomia gratia præcautionis imminente morbo à plenitudine necessitas nondum exigit, ut tantum sanguinis detrahamus, quantum plenitudo postulat, quemadmodum in phlebotomia gratia curationis. Num urgente morbo & plenitudine, utile est quàm plurimum evacuare.

Mensura

unde sumatur.

Præcipit Hipp. in talibus usque ad animi deliquium ducere, si æger perferre queat. Verum simpliciter ad animi deliquium sanguinem detrahere, nec certa nec tuta mensura est. Nam nec omnibus, qui animo deficiunt, sat sanguinis detractum neque si plurimum detrahatur, omnes statim animo delinquant, sed nonnulli interdum post minus copiosam sanguinis detractionem, in subitum & inopinatum virium lapsum incidunt. Deinde satis certa detractionis mensura non est, quæ sumitur à mutatione caloris sanguinis, si pars aliqua inflammata fuerit: aut in cæteris, mutatione coloris faciei

faciei & oculorum: neque etiam ex fluxionis impetu, si subsederit, licet nulla harum contemnenda sit; sed potissimum ex conferentia & ægri tolerantia. Confert enim evacuatio, quæ morbum manifestè minuit, toleratur, si viribus molesta non sit. Et licet non videatur phlebotomia morbum statim imminuere: tamen si viribus molesta non sit, proderit semel aut iterum potius reiterare, quam ad extremum evacuationes ducere. Nam ut consulti Celsus, parcendum semper est remediis, quæ & vitæ custodes vires demunt, & medico pro gloria dedecus conciliant.

Verum in desperatis, ubi nulla superest spes, nisi in sanguinis missione, jubet Aetius usque ad experimentum procedere. Tolerantiam æstimat Gal. ex pulsu, qui vitalis roboris signum est, cujus consensu servato vitali robore certam aliquam quantitatem extrahere licebit. Verum ut supra monuimus, cum vitalis consideratione conjungere oportet æstimationem illius facultatis, quæ morbum debellare debeat; caventes, ne immodicis vacuationibus robur illius succumbat. Nam præter robur virtutis vitalis, quidam morbi postulant robur virtutis animalis, aliqui naturalis, nonnulli utriusque: veluti in pleuritide omnium facultatum robur desideratur, ut vitalis propter dissolutionem spirituum vitalium à dolore, febre, &c. naturalis ob concoctionem materiæ in pectore animalis ob expulsionem sive expectorationem. Cum viribus conjungere oportet considerationem temperamenti, ætatis, loci, temporis, & cætera, ut supra dictum est. Nam quantitatem debitam non sinunt evacuare, ætas puerilis, aut senilis, sexus fœmineus, regio, aut tempus nimis calidum, aut frigidum, vigilia, inedia, cruditas, morbus ad syncopen inclinans, orificii ventriculi debilitas, aut nimis exquisitus sensus.

Ex

*Quoties
phlebotomia institu-
enda sit.*

Ex quantitate requirentium & tolerantium æstimatur non solum, quantum & quousque sit evacuandum sed etiam quoties, scilicet an simul & semel, an interatò sive per vices & partes. Ubicunque enim semel missio sanguine, omnibus necessitatibus requirentium satisfactum non est, iteratio convenit. Requiritur autem phlebotomia gratia evacuationis simpliciter, aut revulsionis, aut derivationis, quæ omnia nec simul & semel, nec ex una eademque vena perfici possunt, ut ex supradictis patet. Deinde ubi vires periclitantur tam revulsiones & derivationes, quam evacuationes partiri decet, imò teste Galen. lib. de Cur. per vena sect. cap. 12. quanto majorem in numerum particulares detractiones auxeris, tantò efficacior revulsionem effeceris. Præterea ubi vires periclitantur, ut in debilibus convalescentibus, qui recidivam patiuntur, aut qui facilè animo deficiunt, optimum est detractiones iterare, & per ἐπίκρυσιν evacuationes instituere: idem aliquando requiritur in gravi angina & affectibus suffocantibus, &c. Item si sanguis simplex non fuerit aut in plures partes divisus, aut partim in vasis, partim extra. Verum in ratione si necessitas plurimum non urgeat & vires ægri nondum expertas habeamus, melius est à pauca quantitate incipere, at si urgeat necessitas, & constet de viribus, satius est prima vice plus detrahere, quam secunda, & secunda, quàm tertia.

*Quo tempore
institui
debeat phlebotomia.*

Superest, ut de tempore opportuno agamus, quo phlebotomia instituti debeat. Tempus autem opportunum præscribit necessitasurgens, & virtus tolerans. Necessitas alia maxima est, quæ sanguinis missionem tardare non sinit, sed ob imminens periculum statim venam secare cogit: alia minor, quæ non tantopere urget, sed diem aut saltem horam

ram

nam diei accommodatam eligere finit; unde alia XVIII.
phlebotomia coacta dicitur, alia electa.

Instituitur phlebotomia aut gratia curationis, *Phlebotomia electa*
ut in ægris, aut præservationis, in sanis. In ægris au-
tem considerantur morborum tempora non solum *quando in-*
universalia, sed etiam particularia: in sanis & ægris *stitui de-*
anni tempora dies & horæ, quibus securior phlebo- *beat.*
tomia. De temporibus anni supra dictum est. Ubi
necessitas magna non urget, ut in præservatione, ver
maximè opportunum phlebotomiæ, deinde autum-
nus; dies nec magni caloris, nec magni frigoris, hora
diei temperatissima præcipuè matutina. Commodis-
simè enim instituitur phlebotomia manè, una aut
altera hora à somno post levem deambulationem.
stomacho vacuo, concoctione celebrata, & eductis
excrementis in intestinis primisque venis, ne vasa
exinanita aliquid vitiosi fugant, correctæ etiam si o-
pus fuerit nimia orificii ventriculi sensibilitate aut
debilitate, &c.

In morbis verò si necessitas vehementer urge- *Phlebotomia coacta*
at (ut in vehementi syncho aut interceptionibus *quando.*
venarum) & vires ferant, sanguinis missio tardari
non debet, sed statim non habita ratione diei & ho-
ræ, aut præparationis corporis venam secare oportet; cum in mora periculum sit. Nam in sectione
venæ tempus morbi aut numerus dierum non sem-
per observandus est, sed necessitas urgens, & virtus
tolerans. Quo enim die teste Galen. hos scopos
in ægrotante inveneris, in eo auxilium illud adhi-
beto, etiam si 20. is ab initio morbi extiterit. Igi-
tur cum necessitas urget, quam celerrimè sangui-
nem mittere convenit, modo vires ferant. Ferunt
autem vires, quo tempore minus exhaustæ sunt.
Exhauriuntur verò in morbis duobus modis. Nam
primum in plerisque morbis exsolvitur virtus tractu
temporis, quare mittendi sanguinis occasio dierum
nume-

numero deperditur, & differenda in talibus non est
ob virium dissolutionem sed ut monet Hipp. in he-
antibus morbis si quid movendum sit, move; cum
consistunt melius est quiescere. Igitur, si quando ve-
secundo die ab initio morbi vires exsolvi videantur,
phlebotomia abstinemus Deinde in morbis, qui
certis quibusdam periodis moventur, & exacerba-
tiones, remissionesque habent, exsolvitur vi-
tus in accessionibus, quo tempore agri maximè affi-
guntur. Proinde in febribus continuis differtur
phlebotomia, ad remissionem; in intermittentibus
ad intermissionem, quacunque hora diei aut noctis
e venerit: nam hoc tēpore maxima morbi tranqui-
litas est, vires facilius ferunt. Verum, ubi propter
dolores, inflammationes aliosque affectus citra fe-
brem hoc auxilio opus est, non oportet remissionem
aliquam expectare, sed magnitudinem doloris aut
affectus tantum intueri, & in ipsa vehementia san-
guinem detrahē, (sed quantū vires ferre queant,
ut à parte affecta sanguis retrahatur: quia ad partes
dolentes ceteræ spiritum cum sanguine transmi-
tunt, doloresque vehementiores excitant.

Quando
institui
debeat
phleboto-
mia eva-
cuans, re-
vellens
aut deri-
vans.

Quoties
instr. vi
debeat
phleboto-
mia.

Phlebotomia simpliciter evacuans à toto, in principio morbi adhibetur, ut multitudine detrahitur & corpora liberalius transpirent: unde consiliū Galenus *9. Method. med.* initio febrium putridarum venam secare. At revulsio & derivatio affectibus rheumaticis conveniunt, sed revulsio initio potissimum, aut quamdiu cum impetu fluunt humores. Derivatio verò post revulsionem aut evacuationem à toto, cessante impetu fluxionis &c. ut supra dictum est.

Valida existente virtute tantum sanguinis
evacuare oportet, quantum postulat morbus,
Sin minus repetitione utamur. Repetitio verò
in quibus simpliciter evacuare conamur magis eo-
dem

dem die esto, si vires sufficere queant, sin minus sequente die, donec tota illa sanguinis copia, quæ supra mediocritatem est, fuerit prope evacuata.

At reiteratio gratia revulsionis, melius iudicatur, si duobus diebus deinceps fiat & frequenter. *Tempus reiteratio*

Nam vena pluries aperta vehementius revellit, quia *na.*

natura assueta crebris motibus revulsoribus, eo humores mittit, & locum affectum deserit. In inflammationibus laterum aliarumque partium, quando materia è vasis ad locum confluit, repetitio commodè in diem sequentem aut ultra deferitur, ut materia violentiosa interim ex affecta sede in venas exhaustas subeat. Verùm in pestilentialibus tumoribus ne violenta contagio diutius inhæreat, aut latius serpat, reiteratio procrastinanda nullo modo est, si vires ferant.

In omni verò sectione vires ægri semper observare convenit, manu arteriis illius admota; ut suadet Galenus, & si confertim evacuationem ferre nequeat, primo die tantum reficere expedit, secundo detractionem reiterare. Tantum de phlebotomia. Cætera de forma & modo apertionis venarum: de regimine à sectione venæ; de sanguinis emissi observatione, brevitatis causa omitto.

CAP. XIX.

De hirudinibus, scarificatione, & cucurbitulis.

Quia verò sanguis, qui parti affectæ inhæret, non semper venæ sectione detrahii potest, non enim facile venas subit aut in venas exhaustas remeare solet: Proinde magis particulari evacuatione indiget, si tanta ejus copia sit, ut insensibili evacuatione discuti neque-

*Particula
res sangui
nis eva
cationes.*

*De Hiru-
dinibus.*

nequeat. Particularis autem sanguinis evacuatio est
quæ ab ipsa parte affecta sanguinem manifestè educit.

Manifestè autem educitur vel per hirudines
vel per scarificationem sine aut cum cucurbitulis.
Hirudines autem eligere oportet non nigras, aut vi-
rides, aut quæ magna capita habent, & in aquis pu-
tridis & cænosis degunt &c. ut docet Avicenna &
Rases. Deinde statim ut captæ & ablutæ sunt, ut o-
mnem virulentiam deponant, aqualimpidissimam
mergantur, sæpeque aqua permutetur, addito inter-
dum pauxillo sacchari. Hirudo præparata parti que
admota, morfu suo tridum vulnus primum infligit,
deinde sanguinem à vicinis partibus sugit, donec co-
pia turgescens decidat, Anthyllus jubet forcipe cau-
das earum incidere. Nam effluente sanguine trahere
non desinunt, quousque sal aut nitrum osculis ea-
rum inspergatur. Hirudo in calamum utrinque per-
foratum demissa, & venæ legitima ratione admota,
ita plerumque attrahit, ut post suctionem sanguis
confertim erumpat. Proinde universalis sanguinis
evacuatio per hirudinem fit affixam venis majori-
bus, ut supra diximus. Revellunt autem in pluri-
bus affectibus hirudines, si brachiis adhibeantur,
venæ salvatellæ &c. Derivant verò à liene, melereo
& utero, simulque melancholiam evacuant, si ve-
nis hæmorrhoidalibus admoveantur, nam præcæ-
teris auxiliis putantur optimè melancholiam de-
trahere. Item venæ frontis affixæ à capite derivant.
Verùm cuti aut parti admotæ, cui venæ amplæ non
sunt, eam potissimum exhauriunt, & à remota parti-
bus nihil alliciunt. Proinde cutis vitiiis conveniunt,
ut scabiei, lepræ &c.

*De Scar-
ificatione.*

Deinde Scarificatio cutis pro ratione loci,
& prout magis minusque alte scalpellus adigitur,
magis aut minus copiosam sanguinis detractionem
facit: utilitatem autem interdum non minorem
præstat

præstat, quam ipsa venæ sectio: Evacuat enim non solum humorem parti in hærentem efficacius multo quàm phlebotomia, sed etiam redundantiam à toto quodammodo. Item revellit & derivat, tutius quidem quàm phlebotomia: verùm segnius, tardiusque & citra minorem corporis commotionem, aut virium jacturam etiam in vigore morbi: licet in pueris tam vehemens auxilium sit, quàm in grandioribus venæ sectio. Utimur autem in tollenda plenitudine scarificatione brachiorum & crurum, cum cucurbitulis plerumque, quando tutum non est venam secare. Ita Oribasius, sibi aliisque in peste Asiatica crus scarificavit, duasque libras sanguinis fere detraxit, atque ob eam causam periculum vitavit.

Nonnulli in talibus affectibus nates scarificant. Conducit potissimum scarificatio crurum in plenitudine à suppressione menstruum aut hæmorrhoidum. Revellit quoque scarificatio & ad partes distantes servata rectitudine aut communione: veluti in inflammatione cruris dextri, scarificatio manus dextræ, aut cruris sinistri. Item ab interioribus ad exteriora revellit, & simul deorsum movet scarificatio crurum. Derivat verò in suppressione menstruum, scarificatio femoris aut surarum. At humorem parti in hærentem, qui aliis remediis non cedit, efficacissimè evacuat, scarificatio partis affectæ, ut diximus.

Proinde cutis sceditatibus convenit, item scirrhis inveteratis, inflammationibus, gangrænis, tumoribus pestilentialibus, morsibus venenatorum &c. Verùm in ipsa scarificatione distinctio quædam adhibenda est; magna enim profundæque scarificationes, multum evacuant, & è longinquo facilius trahunt, meliusque duris corporibus crassoque sanguini cōveniunt; contra tennes & superficialiæ. Semper autem scarificatio largius & è distantioribus penitioribus

Fff

ribus

*De cucur-
bitulis.*

ribus partibus sanguinem evacuabit, si statim adhi-
beatur cucurbitula: attrahit enim cucurbitula po-
tissimum cum multa flamma, pro sui magnitudine
& forma, ut describit Gal. Avic. &c.

Utimur autem scarificatione aut sine cucur-
bitulis, aut cum cucurbitulis: & vicissim cucurbitu-
lis, aut siccis sine scarificatione, aut cum scarificatio-
ne. Scarificatione autem sine cucurbitulis utimur, ubi
bi attractione magna opus non est, nec copiosa eva-
cuatione, & potissimum in pueris & corporibus mol-
libus raris &c. Cucurbitulæ verò magnum ulum præ-
stant, non solum cum scarificatione, sed etiam siccæ
sine scarificatione: utroque enim modo evacuant,
attrahunt, loco materiam movent, revellunt, alte-
rant, dolores mitigant. Evacuant autem siccæ tan-
tum insensibiliter, & flatuosos spiritus discutunt,
proinde colo intestino aut ventriculo propter flatus
dolente, teste Galen. 12. *Method.* cucurbitula magna
cum multa flamma admotæ incantamenti instar ju-
vat. Deinde sistit quoque vomitum & singultum,
ventriculo imposita: ac menses fluentes, mammis.
Præterea cucurbitulæ destillationes in stomachum
suspendunt: sanguinem attrahunt, & profluentem
rursum sistunt, objectis partibus admotæ, sed ut mo-
net Paulus cum scarificatione efficacior per spira-
tum præbent. Nam cum scarificatione sensibiliter
sanguinem cæterosque humores evacuant, & à re-
motioribus altioribusque partibus eliciunt.

Quare in nonnullis locum phlebotomiæ
implent cucurbitulæ, cum scarificatione cruribus,
natibus, aut brachiis admotæ. Revellunt etiam
ad longissimas partes, & in febribus mali-
gnis ab internis ad externa humores evocant.

Verum authore Gal. purgatis in primis corpori-
bus utiles potissimum sunt, non plethoricis. Nam ubi
bi tam cucurbitulis, quàm venæ sectione aut purga-
tio ne

DE CUCURBITULIS.

819

CAP.
XX.

one opus est; semper venæ sectio aut purgatio præ-
cedat. Deinde initio inflammationis, parti affectæ
nunquam admovendæ erunt, sed partibus distanti-
us laboranti in directum conjunctis, revulsionis
causa. Ipsi verò parti affectæ aut vicinæ tum cucur-
bitulas admovere convenit, cum nihil amplius afflu-
erit, totumque corpus exinanitum fuerit, ut inflam-
mationis materia è loco moveatur, vel à parte no-
bili ad ignobilem transferatur, vel evacuatione
sensibili aut insensibili amoliat, vel ab interioribus
ad exteriora trahatur, sed de his aliisque legendus es-
t Orbasius lib. 7. & 8. & Paulus lib. 6. cap. 11. Celsus
lib. 2. Avicen. lib. 1. Fen. 4. Doct. 5.

CAP. XX.

*De victus ratione in sanis & agris, deque
differentiis & facultatibus ali-
mentorum.*

Quæcunque adhibentur à Medico sive ad cor-
pus humanum curandum, sive ad sanitatem
conservandam, sub triplici genere comprehen-
duntur, diæta, medicamentis & cheirurgia, inter quæ
omnium vetustissima est cheirurgia, postrema excul-
ta fuit victus ratio: nam ut testatur Platon 3. de Rep.
eteres Asclepiadæ nulla facta mentione victus, chei-
urgia & medicamentis utebantur, deinde repre-
henduntur ab Hipp. Gnidii Medici, qui contenti
medicamentis omitterent victus rationem, cujus
primus autor fuisse videtur, juxta Galen.
tamen incredibile non est veteres illos nullam

Fff 2

prorsus

prorsus victus rationem habuisse, sed ab iis minime
excultam fuisse; nam consideratio diætæ sanis necesse
est, deinde in omni curatione morborum, quia vires morborum medicatrices tuetur: quare sine
idonea victus ratione nullus morbus curari poterit
at sine medicamentis & Chirurgiâ multi persanantur
sola diætâ: De diætâ igitur seorsum nunc age-
mus.

*Quid diætâ
communiter.*

Ipsam autem vocabulum diætæ in eadem si-
gnificatione non semper sumitur: nam apud Aristotelem 3. *Polit.* diætâ pro consilio judicium ac-
cipitur: verum Hippocrati cæterisque Medicis idem
est, quod latinis victus ratio. Est autem diætâ sive vi-
ctus ratio, recta administratio, sive legitimus usus se-
rerum non naturalium, gratia sanitatis conservandæ
& amissæ restaurandæ: sex illæ res non naturales sunt
sine quibus vitam ducere impossibile est, nimirum
cibus, potus, aer, motus, quies, excreta, retenta, so-
mnus, vigilia, animi pathemata, quæ ob id non na-
turales dicuntur, quia per se nec secundum, nec præ-
ter naturam humani corporis sunt, sed naturæ utiles
aut noxiæ efficiuntur, pro ratione bene malè ve uten-
tium: nam illarum dextro usu & administratione sa-
nitas conservatur, morbiq; à natura facilius de-
pelluntur, contra minus dextro usu sanitas corrumpi-
tur, variiq; morbi excitantur & augentur.

*Quid proprie
diætâ.*

Verum ab Hipp. 1. *Aph.* 6. *Epid.* diætâ in
maxime propria & speciali significatione accipitur,
pro legitimâ alimentorum administratione gratia
sanitatis.

*De vero ali-
mento-
rum usu.*

Nos verò de victus ratione prout usum 6. re-
rum non naturalium comprehendit, agemus, initio
facto à recta alimentorum administratione, quæ
propriissimè diætâ dicitur, cujus consideratio o-
mnium latissimè patet, & cuius ad vitam confer-
vandam

nam summa necessitas est: Nam substantia corporum animatorum duplicem transmutationem subiicit: quarum una omnibus mixtis communis est propter alterationem, ob contraria, ex quibus generantur elementa: altera verò est, quæ animatis propriè accidit, substantiæ fluor sive dissolutio, quam calor natus continuò excitat & depascit: cum igitur tota moles substantiæ animatorum in assiduo fluxu sit, nisi loco ejus quod defluxit, alia similis specie substantia restituatur, necesse est corpora quam citissimè desiccari & interire: quare omnibus animatis à natura insitæ sunt vires rei deficientis & desideratæ semper appetentes, id autem quod desideratur ad reparandum assiduum substantiæ defluxum, alimentum vocatur.

Verùm alimentum αὐτὸ ἐνὸς καὶ πρὸς ἑνὶ dicitur: *Alimentum* nam triplex Hippocrati est: unum futurum alimentum, quod ab ore in ventriculū excipitur, aliud quasi alimentum, nimirum sanguis in venis: tertium verè alimentum, quod appositum partibus agglutinatur & assimilatur: Verùm hoc loco per alimentum non id intelligitur, quod verè alimentum est, nec quasi alimentum, sed futurum alimentum, quod per os propriè assumitur, ex quo actione facultatis naturalis, primum in ventriculo chylus, deinde in venis sanguis, tandem in habitu corporis verum alimentum generatur, quo restauratur similis specie substantia illi quod defluxit.

Igitur alimentum omne substantiæ corporis nostri simile esse debet, aut aptum, ut similem substantiæ speciem ei, quæ defluxit, reparare queat: nam alimenta ex 4. Elementis componuntur, & idcirco conficere possunt, quod à corpore nostro abscedit: Quare propriè alimentum erit, quod in substantiam corporis nostri conueratur, & à corpore nostro alteratur.

ratur, non alterat; quo nomine à medicamentis distinguitur, ut supra cap. 4. hujus libri dictum est. Assumuntur autem virium restaurandarum gratiæ quæ comeduntur & bibuntur; verum cibis, id est alimentis, quæ comeduntur, quicquid substantiæ siccioris defluxit, imprimis restituimus, & famem compleremus; potione verò sive alimentis, quæ tantum bibuntur, quod humidioris substantiæ est: reficimus, sitim restinguimus, & ciborum distributionem juvamus; sorbitiones mediam naturam plerumque obtinent; additur alimentis, à Galen. 1. de San. tuend. cap. 2. respiratio, quæ aeris inspiratione & expiratione perficitur, qua aeris igneæque substantiæ modum & Symmetriam, ac arteriarum pulsationem tuemur.

Materia alimentorum.

Materia alimentorum sumitur potissimum ex animalibus & stirpibus: Ex animalibus nimirum terrestribus, volatilibus & aquatilibus: Ex stirpibus, ut ex cerealibus, leguminibus, fructibus, oleribus, radicibus, seminibus, succis, &c. de quorum omnium facultatibus & præparationibus in specie non est, hujus loci peculiarem tractationem instituere.

Differentia alimentorum.

Sanitatis autem studiosos, si quid aliud, alimentorum omnium facultates, & facultatum differentias nosse oportet, quæ variæ sunt: nam primum omne alimentum sive cibus, potus, aut sorbitio duplex est.

Alimenta simpliciter & alia.

Aliud simpliciter tale, quod tantum virium restaurandarum & tuendarum gratia exhibetur, aut in substantiam corporis convertitur, & nihil per se ac curationem confert, nec qualitate aliqua morbo, aut morbi causæ resistit aut juvat, ut caro, at juscula pullorum gallinæ, &c. Aliud medicinale, quod non tantum substantiam virium restituit, sed simul etiam morbo, & causæ morbi causæ resistit, ut in febribus aqua hordei, juscula pullorum gallinæ, alterata lactuca, endivia, succo citri, &c.

Quæ

Quæ alimenta medicamentosa dicuntur, sub quibus continentur victus, aut alimenta calefacientia, refrigerantia, attenuantia, &c. item obsonia, quæ cum cibis assumuntur, ut gustum excitent; ac condimenta, quæ miscentur cibis, ut eorum vim excitent, ut sal, acetum, aromata; aut ut leniant & contemperent, ut butyrum, oleum, saccharum, &c.

Alimenta medicamentosa.

Alimenta calefacientia sunt, cibi, potusque conditi aromatibus, aut medicamentis calefacientibus, vinum flavum aut fulvum, cerevisia potens, cœpa, allium, raphanus, sinapi, aliaq; acris; caseus verus, &c.

Alimenta calefacientia.

Refrigerantia, panis aut prisana ex hordeo, milium, panicum, lactuca, portulaca, endivia, &c. acida & austera omnia, ut acetum, vinum austereum aut album dilutum, cerevisia tenuis, aqua hordei, carnes aut pisces decocti cum lactuca, portulaca, limonibus, &c.

Refrigerantia.

Humectant hordei prisana, & panes, lactuca, malva, pepones, cucumeres, fabæ virides, &c.

Humectantia.

Exiccant panis biscoctus præcipuè conditus semine anisi, fœniculi, &c. lens, brassica, sina, nasturtium, &c. assata & fricta siccus alimentum præbent, elixa in aqua magis humidum.

Siccantia.

Alimenta attenuantia, quæ succum tenuem præbent, sunt panes triticei fermentati in clibano cocti, deinde loti aut biscocti, prisana, panesque ex hordeo, pisces saxatiles, & qui mollem carnem habent, conditi aceto mulso aut attenuantibus medicamentis, aviculæ montanæ, pulli columbarum, gallinarum, turdi, perdices non recens mactatæ, sed ad unum aut alterum diem servatæ, aromata, olera, radices & semina attenuandi vi prædita, ut piper, zinziber, garyophylli, sinapi, nasturtium, allium, cœpæ, porrum, hyssopus, origanum, &c.

Attenuantia.

XX.

menta, satureia, apium, petroselinum, beta, anethum
 semina calida majora & minora, rutæ, &c. Cappare
 sale conditi, amygdalæ amaræ, herbæ quæ virides ex
 hibentur, alimenti vim aliquam habent; cætera fer
 tantum condimenti aut medicamenti; his addunt
 vinum album tenue, hydromel, acerum, serum lactis
 &c. hæc humores crassos glutinosos incidunt & at
 tenuant, & obstructions vasorum expediunt, se
 frequens eorum usus sanguinem seorsum aut bilio
 sum, & tractu temporis atrabilarium reddit: quæ vero
 valide exiccant sensim humores incrassant & topha
 ceos renum calculos gignunt.

*Incrassan
 tia.*

Alimenta incrassantia, quæ crassum viscidum
 succum gignunt, sunt, primum panes triticei aut se
 calini, non fermentati, aut non probè cocti, placen
 tæ ex similagine sine fermento, triticum integrum
 elixum, aut secale, milium, oriza, lentes, fabæ frictæ,
 caseus, & lac caseosum, ova dura, aut in sartagine
 fricta, caro porcina, bubula, cervina, caprina, præci
 puè animalium senescentium, & non castratorum
 carnes fumo indurata, renes, jecur, cor, lingua, mam
 mæ, tendines, partesque nervosæ, pisces testacei ac
 crustacei, anguillæ, fungi, rapæ crudæ, castanæ da
 ctyli, vina nigra, deinde rubra crassa, aut dulcia cras
 sa, mustum &c. verum ex alimentis crassi succi, alia
 tantum crassi sunt, ut lentes, alia simul crassi & visci
 di, ut caro testaceorum, caro porcina, tendines, par
 tesque nerveæ &c. horum frequens usus præter æta
 tem & consuetudinem in iis, qui angustas venas ob
 tinent, & se plurimum exercere somnumque pro li
 bitu capere nequeunt; obstructions jecoris vena
 rumque meseraicarum, renumque pariunt &c.

*Alimenta
 mediocris
 natura.*

Tutissima itaque sunt illa alimenta, quæ media
 naturæ sunt inter attenuantia, & incrassantia, velut
 panis triticeus fermentatus, beneque in clibano co
 ctus, caro columbarum, gallinarum, phasianorum
 vitu

vitulina, hœdina, caro animalium castratorum, juniorum potissimum, quæ carnem nec duram nec viscosam habent: pisces saxatiles, littorales & pelagici, qui viscositatem aut graveolentiam non repræsentant, ova recentia tremula, vina fulva dulcia: Ex fructibus ficus, uvæ passæ dulces, pistacia, amygdalæ dulces, nuces juglandes, pisa, avena &c. Alimenta in pari copia considerata secundum substantiam sive vim & efficaciam ad nutriendum, vel multi alimenti sunt, quæ validè nutriunt, plurimumque sanguinis gignunt, vel pauci, vel pravi; Vel medio-cris alimenti, quæ medio modo se habent.

Multum autem nutriunt præcipue, quæ substantiæ solidioris crassi bonique succi sunt, si probè conficiantur, ut panes siliginei ex purissima farinæ optimi tritici parte, deinde similaginei ex minus pura parte, aut non laudatissimi tritici fermentati benè cocti, panes quoq; secalini, carnes animalium castratorum boni habitus, primùm porci domestici mediæ ætatis, deinde bubula & junioris vervecis, alæ anserum, ventres volucrum, testes gallinarum, ova gallinarum recentia, paulò duriora præcipuè vitella, caseus, lac caseosum.

*Alimenta
multum
nutrientia.*

Semper autem terrestria, volucrum generi comparata, magis alunt, & caro animalium augefcentium, magis semper quàm senio confectorum; & quæ boni habitus & obœsiora sunt, magis quam graciliora & macilenta duræ nervosæque carnis. Ex piscibus plurimum alunt testacea & crustacea, ut cancri, astaci, &c. item limaces, cochleæ ex fructibus potissimum castaneæ & nuces pineæ, &c. vina dulcia crassa, aut rubra, crassaquè cerevisia potens.

Pauci nutrimenti sunt parumquè nutriunt, for-
bitiones primùm tenuiores ex jure pulli, hordei cre-
more, seu ptisana non colata, pane loto, hinc panes

*Parum nu-
trientia.*

FFF 5

hor-

hordeacei aut triticei loti, aut furfuracei, olera ferè omnia, & fructus exceptis paucis; magis adhuc nutriunt pisces boni odoris & saporis, qui vel mollem carnem habent, ut aselli, funduli, vel mollem friabilem, quales sunt saxatiles, ut perca, turdus, &c. aviculæ montanæ, pulli gallinacei, columbini; extremæ animalium partes præcipuè nervosæ, ventriculus, intestina, aures, adeps, sed hæc non boni succi sunt, item vinum album tenue, seu aquosum, cerevisia tenuis, aqua hordei, &c.

Mediocriter nutrienda.

Mediocriter nutriunt, quæ nec crassi nec tenuis succi sunt, ut panis triticeus, *ἀντίρυγος* ex toto tritico, aut cui parum furfuris ademptum est, præcipuè fermentatus benè coctus, sorbitiones ex avena excorticata, ova recentia sorbilia: lac animalium bonæ habitudinis, mediæ consistentiæ: ex piscibus lucius, carpio, rhombus, passer, &c. carnes gallinarum, columbarum, phasianorum, gallinarum indicarum, &c. caro vitulina, hœdina, agnina, ex fructibus ficus, & uvæ passæ dulces, ex leguminibus fabæ & pisa, &c. sed hæc carnem laxam efficiunt, ex plantis potissimum lactuca, spinachia, endivia sativa, tandem vinum fulvum, cerevisia media, meliceratum, &c.

Alimenta facilis concoctionis.

Deinde alimenta, quatenus alterantur in corpore, facilis concoctionis aut difficilis sunt, itemque facile in ventriculo corrumpuntur, aut non corrumpuntur: Præterea boni aut mali succi sunt. Facilis concoctionis sunt panes triticei, cum iusta fermenti & salis quantitate, benè cocti potissimum loti, ova tremula, sorbitiones ex hordeaceo pane loto, cum iure pulli; exoleribus præcipuè lactuca, spinachia, asparagi, cucurbita cocta si non corrumpatur in ventriculo, pisces petrosi mollis & friabilis carnis, caro agnina, vitulina, hœdina, alæ anserum saginatorum, caro volucrum magis quàm animalium terre.

terrestrium, & omnium augescentium magis quàm senescentium, & animalium in siccis locis degentium magis quàm in humidis paludosis, & vina dulcia magis, quàm austera.

Difficuler concoquantur panis non fermentatus aut non benè coctus, farina crassior, & panes ex ea facti, triticum elixum, itria, caro hircina, cervina, arietina, bubula, porcina præcipuè, animalium annosorum & gracilium, anserina, exceptis alis, & omnium volucrum, quæ duram aut viscosam carnem obtinent, animalium terrestrium venter, intestina, jecur, renes, partesque nervosæ & exangues, pisces cetacei, testacei & crustacei, qui duram viscosam carnem habent, caseus vetus, lac acidum, ova dura, aut in sartagine fricta, pisces carnesque salis aut fumo indurata, fabæ frictæ, milium, panicum, oriza, lupini, lentres, pyra, rapa crudior, castanea, carus, pastinaca omniaque ferè olera excepta lactuca, &c. vinum novum crassum, aut austerum, mustum, cerevisia recens, aut non benè defsecata aut cocta.

Facile corrumpuntur fructus horarij ut pepones, melones, cucurbitæ, mora, fraga, cerasa, mala persica, &c. Si non probè concoquantur, nec citò alvum subierint, diuque in ventriculo retenta fuerint, proinde talia omnia in prima mensa præ aliis cibis cedere oportet. Difficuler corrumpuntur pisces testacei, ac crustacei, ut chamulæ cancri, gammarii, &c. pyra, cydonia, castaneæ, & cætera, quæ in vltima mensa post alios cibos dantur, & astringentium virium sunt, crassiorumque partium.

Boni succi sunt, & in bonum sanguinem permuratur panes siliginei aut similaginei, deinde autopyri hinc ex optimi secalis puriore farina, benè fermentati, saliti coctiq; in clibano, ptisana hordei, ova recens, carnes quadrupedum præcipue castratorum & augescentium, si propè concoquantur volucres & pisces.

*Alimenta
difficilis con-
coctionis.*

*Alimenta
qua facile
vel difficile
corrumpū-
tur.*

*Alimenta
boni succi,*

X X.

scies ferè omnes, qui mollem & friabilem carnem habent (exceptis iis, qui in paludibus, fluminibus limosis degunt, malè olent insuavisque saporis & mucosi sunt, facileque putrescunt) potissimum pisces saxatiles, perca, merula, item lucius, asellus, rhombus, passer &c. lac animalium bonæ habitudinis, nuges pineæ, pistacæ; amygdalæ dulces, castaneæ, uvæ passæ dulces, caricæ; verum caricæ, si copiosè sumantur, carnem laxam gignunt, sæpeque pediculos.

*Alimenta**pravi succi.*

In prævum succum convertuntur panis ex seminibus corruptis, ac ex lolio, oryza, panico, item panes subcineritii, lens, cicer &c. fructus horæi & quæcunque citò in ventriculo corrumpuntur. Olera ferè omnia excepta lactuca, quæ in medio est boni malique succi, deinde endivia spinachia, malva, atriplex, portulaca; mali quoque succi, sunt radices olereæ exceptis radicibus rapi, cari, pessimi, olera sylvestria.

Item carnes animalium non castratorum & seniorum In genere animalium caro porcina, si benè concoquatur, multum boni succi præbet, bubula magis crassum, agnina humidum pituitosum; ovilla excrementitium; his omnibus deteriores sunt caprinæ, pessima hircina, deinde arietina, taurina.

Est autem cervina & leporina crassi, sed non satis probi succi, ferè ut bubula; melioris tamen à Galeno leporina existimatur, sed paucioris nutrimenti ferè, ut caro cuniculi sylvestris. At vulpium, luporum, & similium ferarum, quæ ex carnibus aliorum animalium vivunt, planè dampnatur. Mali succi sunt testes exceptis gallinaceorum, spinalis medulla, partes nervosæ & exangues, adeps &c. Deinde ova in sartagine fricta, casei veteres, fungi, pisces cetacei, & qui locis palustribus immundis, & sordidis degunt.

Peculiariter succi excrementitii prorsus sunt, seu

scu multos excrementitios humores minimum boni sanguinis gignunt panes furfuracei, fabæ virides, olera, viscera animalium ferè omnia: ac fructus hortæ, caro agni, porcelli, ac omnium propè animalium recens natorum aut in otio degentium, carnes anserinæ, exceptis alis, anatinæ, omniumque volucrum palustriū, ac etiam piscium, qui in limo, aquis cœnosis, & putridis degunt, quales ut plurimum sunt anguillæ, carpiones, item pisces cetacei.

*Alimenta
que super-
fluitatibus
abundant.*

Succos crudos simul & viscidos gignunt panes non fermentati, nec probè cocti, placentæ in sartagine frictæ, tendines partesque nervæ animalium, intestina, ventriculi, caro testaceorum, quæ duræ viscosæ sunt substantiæ, pisces cetacei, casei, dactyli &c.

*Alimenta
que crassos
crudo suc-
cos gignunt*

Humorem absolute pituitosum procreant, nervæ animalium partes, cerebrum, medulla, spinæ, pulmo, caro agnina, ac vituli recenter nati, aut paucorum dierum, poma immatura, pisces testacei molles carnis, fungi, lac acidum &c.

*Quæ pitui-
tosos humo-
res gene-
rant.*

In melancholicum succum facilè permutantur panes furfuracei & subcineritii, & qui ex corruptis aut viscosis seminibus, typha, lolio &c. conficiuntur, lentes, vicia, ciceres, brassica, caseus antiquus, cochleæ, pisces cetacei, carnes bubulæ, leporelinæ, cervinæ, caprinæ, hircinæ, taurinæ, vulpinæ, item carnes omnium animalium non castratorum & seniorum, lienes quadrupedum, pisces carnesque pleræque fumo induræ ac salæ, vina crassa nigra &c.

*Alimenta
melancho-
licos humo-
res gignen-
tia.*

Succum biliosum pariunt, siliquæ, poma dulcia, cynara, cynaræque succus, mel omniaque dulcia tenuium partium in naturis calidis, aromata calidiora, aqua mulsa, vinum dulce &c. prorsus corruptos humores efficiunt boleti, allium, cœpa, porrum, raphanus, ova in sartagine fricta &c.

*Alimenta
biliosa.*

Flatus

*Alimenta
flatu gi-
gaentia.*

Flatus aut flatulentos humores, pleraque legumina præcipue fabæ, lupini, milium, item rapæ, napi, pastinacæ crudiores, pma dulcia, dactyli recentes, ficus, itria & placentæ ex polenta, mel non probè coctum, lac in ventriculo frigido, mustum, vina dulcia & austera, cerevisia potissimum recens, non bene cocta aut defecata &c.

*Alvum sub-
ducentia.*

Alvum subducunt panes fursuracei, jus decocti brassicæ aut lentis cum butyro, nam corpus ipsorum alvum cohibet, eodem modo jus veteris galli & testaceorum, lac serosum, ipsumque serum addito melle vel saccharo vel modico salis, item malva, atriplex beta, uvæ dulces sine acinis, ficus, nuges recentes ac pruna dulcia recentia, aut sicca materata in aqua mulsa: ipsa aqua mulsa, parum aut nihil cocta, mel non coctum, mustum, vinum dulce &c.

*Alvum
sistentia.*

Sistunt alvum panes similaginei non fermentati, nec benè cocti, oriza, milium, panicum, cæro crustaceorum, ac testaceorum deposito humore salso, lès & brassica bis cocta, carnes leporing, caseus lac caseosû aut excoctû, ova dura aut fricta, vina austera &c. Itē, quæ vi astringendi prædita, ut pyra cydonia, pruna sylvestria, palmulæ austera, si ante alios cibos sumantur, alvum cohibent, si post, os ventriculi roborant, & comprimendo alvum laxant.

*Alimenta
quæ diffi-
culty tar-
deque distri-
buuntur.*

Difficuly in corpus distribuuntur panes purè filiginei, itria, & quæ ex farina sive fermento saccharo, melle & simil. parantur, febæ faictæ, lens detracto cortice, pisa, lupini, castaneæ, siliquæ, pyra immatuta &c triticum elixum, carnes fumo indurata, duræ nervosæque, caseus vetus, jecur, cor, carnes assæ aut frictæ, magis quam elixæ &c. Ex his simplicibus alimentorum fecultatibus compositæ intelliguntur & judicantur. Nam ex alimentis tã boni, quam mali succi, quædam tenuem, quædam crassum succum

succum præstant; & quædam multum, quædam pa-
rum nutriunt. Boni tenuis & multi alimenti sunt
ova tremula, succus expressus ex decoctis carnibus
allinæ, &c. Boni tenuis pauci alimenti, cremor
cordei, jus pulli, vinum album tenue, &c. Boni crassi
multi, caro suilla, cancerorum, ova gallinacia tece-
nia ad duritiem elixa, &c. Boni crassi pauci, vinum
nigrum: at mali crassi & multi, caro ceruina, capri-
na, &c. mali crassi pauci caro salita: mali tenuis
pauci, raphanus, omniaque ferè olera, allium, &c. In
genere, quæ crassæ sunt substantiæ magis nutriunt,
& substantiam solidarum reficiunt, liquida verò spi-
rituum refectioni subitæque virium dejectioni ma-
gis inserviunt.

Cum autem finis nutritionis sit virium sub-
stantiam reparare & conservare, proinde victus ra-
tio, quatenus legitimum alimentorum usum præ-
scribit, una indicatio per se erit, unumque propri-
um indicans, virium substantiam conservare; ex acci-
dente verò in ægris, morbo aut causæ morbificæ re-
sistere, sive ita vires morborum medicatrices debi-
tis alimentis rueri, ut morbus non augeatur: nam
virium gratiâ nutrimus, sive legitimum alimento-
rum usum præscribimus, non morbi, nisi ex acciden-
te, quatenus permittit ac prohibet, quod vires infi-
nuant, ut infra apparebit.

Considerantur autem in legitima victus ratio *Quinque*
ne quinque: Primo, substantia & forma alimentorum. *in victus ra-*
2. quantitas. 3. qualitas. 4. tempus & occasio. 5. mo- *tione consti-*
dus exhibendi, quæ omnia metiri debemus in sanis *deranda.*
penes virtutem & exigentiam virium; in ægris penes
collationem virtutis ad morbum: nam ut monet
Hipp 9. Aph. 1. conjectari oportet, an æger cum eo
victu sufficiat perdurare ad vigotem usque morbi, an
prius deficiat, & cum tali victu succumbat & hebe-
scat morbus.

De

*De debita forma & quantitate victus in
sanis & aegris.*

Substantia aut forma victus consideratur secundum alimentorum vim & efficaciam maiorem aut minorem, ad corpus nutriendum, & proprium est ea victus ratio, qua vires conservantur, juxta diversam ipsarum virium rationem. Substantiæ autem virium, quæ alimentis reficitur, triplex ratio est: nam studemus in nutritione, vel plus substantiæ apponere, quàm deperditum est, atque ita vires corporis augere; vel tantum apponere, quantum deperditum est, & vires in eodem statu conservare: vel minus apponere, atque ita substantiam virium imminuere. Quare victus forma triplex primum erit; una augens sive exactè plena, crassaque victus ratio, alimentis plenissimè nutrientibus, quæ substantiam virium adauget, & plus apponit, quàm deperditum est: alia media simpliciter plena, quæ tantam præstat refectiorem, quanta est dissipatio: tertia tenuis victus, quæ minorem præstat refectiorem, quanta est satisfactio pro eo restaurando, quod amissum est: atque eo respectu victus, minuens vocatur; tenuis vero victus, juxta Galenum. *comm. 4. Aph. 1.* in tennem & tenuissimum dividitur, quorum uterque, vel simpliciter talis est, vel exquisitè.

Quare in universum sex erunt victus formæ, nimirum exactè plena, simpliciter plena, tenuis simpliciter, tenuis exquisitè, tenuissima simpliciter, tenuissima exquisitè: quare singulæ suam debitam alimentorum administrationem requirunt: Hipp.

lib. de

lib. de Prisca medicina, victus formam ratione alimentorum dividit in ea, quæ comeduntur, quæ sorbentur, & quæ bibuntur; quibus quartam addit Gal. ex Hipp. *comm. in lib. 1. Aph.* nimirum omnimodam abstinentiam. Sub victu per ea quæ comeduntur contineri poterit exactè & simpliciter plena victus forma: Per ea quæ sorbentur victus tenuis simpliciter & exquisitè: nam sorbitiones duplices sunt: aliæ, tenuiores, qualis est cremor aut succ^{us} hordei, jus pulli cum modico panis: aliæ crassæ ut prisani hordei non colata, panatella crassior ex jure pulli &c. Victus simpliciter tenuis per crassas sorbitiones: victus exactè tenuis per tennes sorbitiones perficitur. Sub victu, per ea, quæ bibuntur, ut sunt aqua hordei, aqua panata, jus prunorum, aqua mulsa &c. simpliciter tenuissimus victus continetur; sub inedia extremè tenuissimus. Verum quia hoc tempore & in his locis septentrionalibus potissimum homines pleniori & frequentiori victu utuntur, quàm veteres illi medici, ac ob consuetudinem has victuum materias difficilimè ferunt:

Proinde pro extrema tenuissima diæta loco inediæ cogimur aquam hordei, aut melicraton exhibere & aliquando ad sorbitiones tennes transire, ac pro simpliciter tenui loco crassarum sorbitionem, ea, quæ comeduntur, & non multum nutriunt, ut pisces saxatiles, aviculas montanas, interdum carnes pullorum, gallinæ, columbæ, turturis, aut pro consuetudine aliquid validioris alimenti præbere, ut carnem vitulinam &c. Alimenta considerata secundum efficaciam & vim, quam habent ad nutriendum triplicia sunt, ut in præcedente capite dictum est, alia enim plurimum alimenti corpori præbent, seu multum nutriunt, alia parum, cætera medio modo se habent: igitur victus exactè plenus fit alimentis plurimum nutrientibus, simpliciter plenus medio-

Ggg

criter

criter nutrientibus: tenuis communiter, parum nutrientibus, cujus quatuor species sunt, ut jam dictum. In quovis genere eligenda sunt semper alimenta boni succi facilis concoctionis & digestionis.

Ratio constituendi formam victus primam in sanis.

Ut autem idonea victus forma constituatur tam in sanis, quam in ægris, vires primum intueri oportet: nam vires alimentum propriè indicant, & non tantum genus, formamque alimenti, sed etiam quantitatem & modum; verum non eodem modo in sanis ut in ægris, aut neutris: sed in sanis simpliciter pro modo virium, in ægris curandis, aut in sanis, qui ad morbos inclinant, habita ratione morbi, aut causæ morbificæ. Nam in sanis potissimum decet vires roburque corporis augere exactè plena, aut in eodem statu conservare media victus forma. Deinde quoniam sanorum vires majores sunt, eo plenius nutrire, & copiosius nutrimentum exhibere convenit: quo minores, eo minus plenè, quare juvenes, qui plurimum habent caloris nativi, juxta Hipp. 14. Aph. 1. plurimò egent alimento, pleniorique victus forma, alioquin corpus absumitur, senes vero contra. Demonstrant autem vires, ætas, temperamentum, corporis habitus, consuetudo, vitæ institutio, aer ambiens, ut infra de quantitate deinceps dicemus. Nam plena crassaque victus ratio debetur sanis, bene valentibus, assuetis, robustis, qui exercitiis dediti sunt, beneque dormiunt, temporibus primam frigidis, deinde temperatis.

Ratio constituendi formam victus in neutris primam deinde in ægris.

Verum in iis, qui ad morbos inclinant, aut in ægris, ut forma victus constituatur, vires oportet cum morbo & causis morbificis conferre, & videndum, an id permittat & prohibeat morbus, aut morbifica causa, quod vires insinuant, veluti pro sanitate conservanda in sanis, non bene valentibus rarissime & non nisi post evacuationes vires debilitantes, licet vires corporis pleniori victu augere. fed

sed aut eodem statu conservare, aut minus exhibere tenuiorque victus ratione uti, quam vires insinuant, potissimum in dispositione plethorica aut caco-chymica, aut in iis, qui cruditatibus infestantur, & non benè concoquunt, nec consueto modo dormiunt, aut à solitis exercitiis desistunt. Similiter in ægris rarissimè morbus permittit substantiam corporis majorem reddere, quam accepimus pleniusque nutrire, sed aut in eodem statu vires conservare media victus forma, ut in morbis chronicis, aut nonnihil debilitatas tueri ad statum usque tenui victus ratione, ut in morbis acutis; nam in morbis plerisque, si tantum exhiberemus, quantum vires insinuāt, distraheretur natura à concoctione materiæ morbificæ, & pugna cum morbo, & causis morbificis, simulq; augeretur morbus, & causæ morbificæ, nimirum humorū cruditas, plethora, caco-chymia, & eo magis copiam alimentorum distraheretur, quo acutior est morbus; & humoribus concoquendis magis incumbit, si vè quo magis morbo resistit, aut major est pugna naturæ & morbi. Quare in ægris victus formam indicant pro constitutione & modo morbi, quæ constitutio intelligenda est secundum dispositionem, quoad symptomata, & prout morbus tardius aut velocius movetur cū magnis symptomatibus, an acutus, peracutus, aut chronicus: nam quod acutior morbus est, celeriusve movetur, & symptomata magis vigent, eò tenuiori diæta utendum erit; quod minus acutus, eò pleniori, ut natura diuturnæ obeundæ concoctioni sufficiat, & non planè succumbat; cum enim in peracutis citò futurus sit vigor, & symptomata vehementissimè urgeant, ut necesse sit in pugna aut naturam succumbere, aut morbum, laborandum erit, ut dum natura tantam vim patitur, pleniori victu à pugna nullo modo distrahatur, sed omnibus viribus resistat; & concoctioni materiæ morbificæ incubat.

Ggg 2

Proinde

Victus forma in singulis morbis.

Proinde in morbis extremè acutis, qui intra 4 diem judicantur, exactè tenuissimus victus requiritur: in simpliciter peracutis, qui intra 7. desinunt, simpliciter tenuissimus: in exquisitè acutis, qui intra 14., exactè tenuis: in simpliciter acutis qui intra 20. aut 21. terminantur, simpliciter tenuis victus: in morbis chronicis pro longitudine, plenior victus ratio convenit, tribuendo temper aliquid, non solum ætati & temperamento, sed etiam consuetudini, tempore anni, regioni & similibus. Nam norma victus in ægris est status morbi, quo tempore gravissima symptomata sæviunt, & error maximus in victus ratione committitur: igitur in victus ratione constituenda temper oculos ad statum dirigere oportet, & conicere, an cum tali victus forma vires ægri ad summum vigorem perdurare queant, an prius deficient, ut statim tenuiorem victum corrigamus, atque ita unum oculum ad vires, alterum ad morbum dirigere, ut utriusque vi perspecta, eam victus formam constitua-
mus, quæ vires conservet, & morbum non augeat.

Verum in his oportet non solum vires præ-
sentes considerare, & potissimum vitales ex pulsu, sed etiam imminentes sive futuras ex temperamento, ætate, consuetudine, inedia facili aut difficili tolerantia, sanguinis tenuitate & paucitate, & similibus: nam ætas puerilis, habitus rarus, laxus, temperatura calida, sanguinis tenuitas & paucitas, consuetudo multi alimenti, plenius quàm pro morbi ratione conveniat, præbere cogunt: accedit his immodica evacuatio, vigiliæ, mortuus officii ventriculi, lumbrici & similia, quæ vires vehementer dissolvunt. Igitur cum propter ea, quæ vires debilitant & exsolvunt, dubitamus, an æger ad statum cum tali victu perdurare queat: ab ea recedemus ad magis plenam victus formam, cum virium prima sit dignitas, & scopus in victus ratione viri-

ne, virium defectui occurrere. Debilitas autem viriū dupliciter accidit: uno ob virium oppressionem, ob morbi aut symptomatum vehementiam: alio ob dissolutionem substantiæ virium ex utilis alimenti defectu. Si debilitas virium oriatur propter oppressionem ob morbi aut symptomatum vehementiam, humorum cruditatem, copiam, &c. victus plenior concedendus non est, sed potius tenuior: sin ob defectum substantiæ virium, ex utilis alimenti defectu, victus augendus erit.

Constat autem substantia corporis nostri immediate triplici substantia, spirituosæ nimirum, carnosa & solida, quarum singulæ per sui similia restorationem insinuant: igitur ubi virtus incipit deficere ex defectu spirituum, quod confertim accidere solet, sui refectioem indicat per respirationem, transpirationem, & per eum, qui ex sanguine transmittitur vaporem: sed ut vapor utilis transmittatur, refectio fieri debet per alimentum spirituosum, id est, tenue, acreum, humidum, qualia sunt liquida reficientia, ut vinum, jura reficientia cum aqua cinamomi & similibus: si ratione substantiæ solide virtus deficiat, ut in phthisicis, indicant custodiā per nutrimentum solidum, ut caro caponis, vituli, cancrorum, morsulæ ex pineis, pistaceis, amygdalis & similibus: sin ratione carnosæ substantiæ, per nutrimentum, quod in medio humidorum & solidorum corporum est, pro modo affectus, & prout morbus magis minusve urgeat, celeriusque moveatur. Nam in victu ægrotorum constituendo conferendæ sunt vires cum morbo, & observandum, utrum morbus an vires magis urgeant, ut ei, quod maxime urgeat, primū occurramus, altero non neglecto.

Virium defectus alimentum indicat, & quod

Ggg; debilio-

Tria refectioe indigent, & alimentum reficientia triplicia sunt.

XXI.

*Modus con-
stituendi
formam vi-
tus in agris
ex collatio-
ne virium
agricum
morbo.*

debiliores ex defectu boni alimenti, eo magis ur-
gent, siue maiorem refectionem requirunt: morbus
quidem alimentum non indicat, sed parvus id per-
mittit, quod vires præscribunt, magnus prohibet, &
eo magis, quò magis urget, & vehementius sævit: qua-
re in agris virtute maximè urgente ob virium dispo-
sitionem, sed morbo non urgente, confestim plenior
victus ratio convenit, quò vires deficientes refici-
queant: contra virtute nõ urgente, morbo vehemen-
tissimè urgente, ut in exquisitè peracutis, victus ex-
actè tenuissimus: at nec morbo, nec virtute urgente,
ut si morbus parvus sit, & vires validæ, media victus
forma; morbo & virtute mediocriter urgente, victus
simpliciter tenuis: morbo mediocriter urgente, vir-
tute non urgente, victus exquisitè tenuis: morbo ve-
hementissimè urgente, virtute paululum, victus sim-
pliciter tenuissimus: eadem in cæteris ratio. Sed in
his omnibus declinare oportet potius ad excessum
quam defectum, quia virium est præcipua dignitas,
& ægri defectum gravius ferunt, potissimum in prin-
cipio & augmento. Status autem morbi à Gal. tripli-
citer sumitur: 1. in *libris Crisium*, quoad concoctiones,
nam in statu viget concoctio, quo tempore potissi-
mum fiunt criles, in principio omnia crudiora sunt:
Deinde *libro de morborum temporibus*, quoad disposi-
tionem affectus, ut quando inflammatio distingui-
tur secundum magnitudinis incrementum: Tertiò
comm. in. 1. Aph. quoad symptomata, & symptoma-
tum sævitiam.

*A quo sta-
tu sumenda
sit victus
forma.*

Verùm status si sumatur pro materiæ morbi-
ficæ concoctione, quia nullum certum definitum
tempus habet, ob materiæ diversitatem & virium
inæqualitatem, ac varium motum in morbis, ab eo
non poterit sumi mensura victus: eadem ratio est,
si status pro crisi sumatur: Nec etiam à statu, quoad
affectus dispositionem sumi poterit victus forma:
nam

nam dispositio per se nullum præbet indicium, nisi quatenus actiones lædat; relinquitur igitur, quod vi-
 A us norma sumenda potissimum sit à statu, quoad
 symptomatum sævitiam, quo tempore maximè sævit
 morbus; & id prohibet, quod vires insinuant: circa
 principia enim & finem, teste Hipp. & Gal. omnia
 imbecilliora sunt; circa statum symptomata maximè
 vigent, quo vero tempore maxima vis morbi est, vi-
 ctu tenuissimo utendum erit: verum cum statu quo-
 ad symptomata utile erit conjungere consideratio-
 nem concoctionum & dispositionum morbi, ut fa-
 cta ex omnibus collatione facilius certiusque quæ-
 mus debitam victus formam præscribere.

Status autem quoad symptomatum sævitiam *Triplex ratio*
 accidit non solum, quando vigent concoctiones, *tio morbo-*
 sed etiam in principio, quando materia cruda & co- *rum quoad*
 piofa est, ac etiam in progressu morbi, quando in- *symptoma-*
 cipit concoctio: nam ut Hipp. *lib. 1. Epid. sect. 3. mor-*
 borum triplex est ratio, quoad symptomata: qui-
 dam statim vigent, id est, cum grauissimis sympto- *1. Morbi*
 matibus incipiunt, qui deinde paulò post incipiente *cum grauis-*
 concoctione minuuntur, quod accidit in pleuritide *simis sympt.*
 & peripneumonia, & plerisque inflammationibus *incipientes*
 nervosarum partium, in febribus nonnullis tertianis *qui sensim*
 &c. ob summam materiæ copiam, cruditatem, cras- *minuuntur*
 sitiem, acrimoniam, &c. In initio morbi, quæ incipi-
 ente concoctione paulo post mitescunt: veluti in
 pleuritide & peripneumonia, dolores sensim desinunt,
 ubi sputa apparere, & aliquid effatu dignum expur-
 gare cœperint: nec alia est causa, quod mors in prin-
 cipio accessionum interdum accadat, ut testatur Gal.
3. de Crisib. c. 9. mors verò in deteriori parte paroxys-
 mi evenire solet.

Deinde alii morbi contra leniter incipiunt,

Ggg 4

paula.

XXI.

2. Morbi,
quibus sym-
ptomata
paulatim
augentur
ad crisin
usq.

3 Morbi,
quibus
symptoma-
ta sese re-
mittunt an-
te crisin.

paulatim augentur, aut sub, ac in crisi maximè vi-
gent, nimirum quorum materia ad vnā criticā
excretionem reservatur, ut plerūque febres conti-
nuæ; unde quo tempore complentur concoctiones,
maximè vigent symptomata, tum ob materiæ pu-
tredinem, tum ob maximum certamen naturæ cum
morbo.

Tertiò aliqui morbi mediā naturam habent,
leniter incipiunt, augentur, ut ubi ad vigorem sym-
ptomata devenerint, rursus ante crisin paulatim sese
remittunt; quod evenire consuevit in morbis, ubi
mali humores cum bonis commixti sunt, ex com-
motione humorum: nam in progressu sæpe vi mor-
bi concitatis humoribus vehementissima sympto-
mata oriuntur, quæ circa crisin sedantur aut miti-
gantur.

In singulis
horum mor-
borum, quo
modo vi-
ctus forma
institui de-
beat?

Cum autem authore Hipp. *Aph. 8. lib. 1.* te-
nuissimo victu utendum semper sit eo tempore, quo
morbi maxima vis est, igitur in morbis, qui cum ve-
hementissimis symptomatibus incipiunt, quæ postea
sese remittunt, victus statim initio tenuissimus esse
debet, & remissis symptomatibus nonnihil augen-
dus, ut vires reficiantur, & concoctio melius proce-
dat: contra in morbis, quorum materia ad unam cri-
ticā excretionem reservatur, aut qui circa crisin
maximè sæviunt: nam in principiis alere convenit,
in, aut circa statum parcius multò. At quando in pro-
gressu sævit morbus, & circa crisin symptomata sese
nonnihil remittunt, in principio plenius: in progres-
su, ubi sæviant symptomata, tenuissimè: circa crisin,
medio modo ægri alendi sunt.

2 De quan-
titate ali-
menti.

Secundo, quantitas alimenti in victus ratione
sæpe sumitur pro forma victus, sive efficacia alimen-
ti majori aut minori ad nutriendum: propriè pro
copia

copia majori vel minori alimenti cuiuscunque forma, non raro pro forma victus & copia.

Norma autem quantitatis propriè dictæ est virium robur, in sanis absolutè In ægris, prout permittit aut prohibet morbus & morbifica causa: semper enim in sanis, quo virtus robustior, & vis caloris nativi major, non solum plenior victus, sed etiam major ciborum copia exhibenda erit.

Æstimatur virium robur ex ætate, temperamento, habitu corporis, consuetudine, vitæ instituto, æris constitutione, tempore anni, regione, &c. Nam qui crescunt, ut pueri & adolescentes, plurimum habent calidi innati, & corporis habitu rarum, ideo plurimo egenti alimento, & potissimum, qui natura vividiores, sunt, alioqui corpus absumitur: sensibus contra parum caloris nativi inest, ideo mediam facile sustinent, & paucis fomentis indigent: à multis enim calor natus obruitur. Qui mediæ ætatis sunt inter senes, & eos, qui crescunt, medio modo se habent, & quo magis ad ætatem senilem, eò minori; quò ad juvenilem, eò maiori alimentorum copia indigent, si temperamentum, consuetudo & similia concurrant: nam in qualibet ætate, qui vividiores sunt, temperamenti calidioris, difficilius inopiam alimenti ferunt: eodem modo, qui pluribus alimentis assueti sunt, aut multis laboribus & exercitiis dediti: nam ubi fames, ibi laborandum non est. In temporibus anni & regionibus eadem ratio est, sicut in ætatibus; nam hyeme primum ventres naturâ calidissimi sunt, & somni longissimi, ideo eo tempore alimenta copiosissimè exhibenda erunt; secundò verè; pauciora autumnò; paucissima æstate, comparatione aliorum temporum: similis ratio in regionibus; Nam in regionibus frigidis homines maiorem copiam cibi requirunt, quam in temperatis; & in temperatis, quàm in calidis.

Vnde cognoscitur virium robur.

Ggg s

Com.

*Quantitas
alimenti in
sanis.*

Commune præceptum in sanis est, eam cibicopiam ingerere, quæ gravitatem ventriculo non inferat, nec respirationis parvitatem; cum sanitatis studium sit, non sariari cibus, & ad labores impigrum esse; cibi verò tantum ingeratur, quantum par laboribus, quare peccant, qui vitam sedentariam & in ocio literarum agentes, plurimam variorum ciborum copiam ingerunt, idque præter consuetudinem; qui enim parum laborat, minus comedat: verum in iis, qui naturaliter frigido sunt ventriculo, minus concedendum erit, quam appetitus postulat, quia plus appetunt, quam concoquunt: At si quis pravâ consuetudine aut ciborum illectamentis plusculum ingerat, optimum existimatur unica die in septimana, aut à meridie in meridiem à cibo penitus abstinere, simulque somno, & quieti indulgere: verum ubi ex copia aut pravitate alimenti cruditas oritur, satius putatur parum alimenti, sed boni succi concedere, quam à pristina consuetudine multum recedere; imò in robustis assuetis post crapulam vespertinam manè vinum indulgere. Verum sani benè valentes non tenentur, ita exactam victus rationem servare, sed ægri aut valetudinarii.

*Quantitas
in ægris.*

In ægris aut sanis non benè valentibus debita quantitas alimenti æstimari debet non ex solis viribus, sed ex comparatione virium cum morbo, & morbificis causis: & quanquam virtus, quo robustior, eo majorem quantitatem indicat, tamen eam quantitatem magnitudo morbi minuit, & eò magis, quo magis urget morbus, & morbifica causa. Forma autem victus in morbis, manente eadem constitutione, mutanda statim non est, sed potissimum quantitas prout morbus incrementum suscipit; ut enim se habet victus tenuior & crassior, ad morbum magis minusve acutum; ita se habere debet quantitas major minorque ejusdem formæ; ad diversas

diversas ejusdem morbi dispositiones: nam major quantitas ejusdem forme, minus gravi ejusdem morbi dispositioni convenit; minor quantitas magis gravi; igitur virtus valida cum parvo morbo magnam alimenti copiam, cum magno morbo parvam indicat: debilis verò virtus, licet parvam quantitatem indicare videatur, tamen quia cum tali victu vires in certamine ad extremum morbi perduare nequeant, igitur ut defectui virium occurramus, cogimur majorem copiam exhibere, aut sæpè parumque; Impura verò corpora, sive in ægris, sive neutris plenius nutrienda non sunt.

CAP. XXII.

De legitima qualitate alimentorum, ac debito tempore & modo, deque usu potus.

Qualitas victus sumitur ex qualitate sive proprietate alimentorum: alimenta autem ut supra diximus, alia tantum alimenti rationem habent, alia alimenta simul sunt & medicamenta, quæ calefaciunt, refrigerant, crassum aut tenuem succum gignunt, &c. Idonea qualitas in victus ratione sumitur in sanis, ab ipsa natura, quæ vel ingenta est, & dignoscitur ex temperamenuo & ætate; vel acquisita potissimum longa consuetudine; cum his conjungere regionem, anni tempus, & cœli statum, quorum omnium eadem ratio non est, nam regio & cœli status, si temperata, similia indicant: si temperata, semper contraria: at ætas & temperamentum, licet intemperata, non statim indicant contraria, nisi mediante consuetudine; si enim puer fuerit tem-
pera-

*Qualitas
victus.*

temperamento humidus ac humidis assuetus, humidum victum concedemus; at si vir sit sicci temperamenti, sed assuetus humido victui, siccum non dabimus, sed potius humidum; quia consuetudinis, ut demonstrat Gal. cap. ult. lib 8 Meth. tanta vis est, ut indicatio sumpta à consuetudine, potior multo sit indicatione sumpta à temperamento & ætate: consueta enim alimenta licet non satis boni succi minus molestant, faciliusque vincuntur, & jucundiora sunt; jucundiora autem, sed paulo deteriora melioribus sed ingratis preferenda esse censet Hipp. 3. Aph. 2. quia suaviora ventriculus melius complectitur & concoquit.

*Quibus at-
tenuans &
incrassans
victus con-
veniat?*

In non benè valentibus, qui pituitam aut crudos humores coacervare solent, securior est diæta attenuans, quàm incrassans, nam obstructiones aperit, crassa excenuat, viscosa incidit & expurgat, sed modicè alit & firmitatem corporibus non addit, quare ab attenuantium ciborum usu biliosos abstinere convenit, quia serosa & biliosa coacervant, tandemque sanguinem atrabilarium: Cibi verò incrassantes multum alunt, si in ventriculo & jecore probè concoquantur, verùm diuturnitate temporis jecur & lienem obstruunt, tamen illi crassa diæta tutissimè uti poterunt, qui latas venas habent, probè concoquunt, exercitiis dediti sunt, benè dormiunt, talique victu uti consueverunt: qui verò ante cibum sese exercere nequeunt, alimenta crassi succi vitare debent; optima igitur sunt alimenta, quæ inter attenuantia & incrassantia medium locum obtinent, ut supra dictum est. verum à cibis pravi succi, & à magna varietate ciborum diversæ naturæ, quorum alia celerius, alia tardius conficiuntur, abstinendum erit, unde multæ corruptelæ cruditas oritur. Malum quoque est tempus coenæ aut prandii ad multas

multas horas extendere, ut primus cibus digeratur, quàm advenierit ultimus.

Præterea in cibis ordo observandus, est, ut ea *Ordo in*
præcedât, quæ facilius superantur, nec longa mora in *cibis, &*
ventriculo corrumpuntur, citiusque descendunt, un- *an liquida*
de præcipit Gal. 2. de Aliment. fac. mala persica, cerasa, & tenuia
& similes fructus horareos, quia facile descendunt, & semper præ
facile corrumpuntur, in prima mensa offerre: nam in *cedere debe*
anis, quibus ventriculus temperatus, beneque con- *ant.*
stitutus est, consultissimum videtur, liquida aut te-
quia solidis præmittere: verum iis, quibus ventriculus
laxior est, præstiterit in prima mensa solida & astring-
gentia exhibere. Deinde robustis, assuetis crassiori-
bus alimentis initio prandii aut cœnæ (ut passim in
Saxonia) cogimur aliquid consuetudini in-
dulgere: ac præterea in iis, quibus stomachus cali-
dus est, & biliosis humoribus refertus, aut alimentâ
in bilum aut fumosos vapores corrumpunt, præmit-
tere solida tenuibus, aut similis naturæ cibos exhibe-
re, qui non facile corrumpuntur, & calori nativo
non nihil resistunt.

In ægris indicatio qualitatis victus à tribus *Qualitas*
potissimum sumitur, à morbo, à consuetudine, & à *victus in*
naturali temperamento: quibus additur aer ambi- *ægris.*
ens; morbus contraria, consuetudo & naturale tem-
peramentum similia indicant, aer, si morbus contra-
rius, è præsidiorum numero unus est; si similem in-
temperiem habeat, contraria ut morbus exigit.

Quod innuit Hipp. 16. Aph. lib. 1. victus humi-
dus febricitantibus accommodatus est, maximè verò
pueris, & aliis, qui tali victu uti consueverunt. Hæc
indiciantia interdum consentiunt in unum, aliquan-
do dissentiunt potissimum morbus & consuetudo,
nam naturale temperamentum semper coindicat
morbo, qui sui ablationem indicat, unde reducitur
æger ad pristinum temperamentum: ubi autem in
unum

unum conspirant indicantia, statim exhibendum erit; si dissentiant morbus & consuetudo, veluti si morbus calidus & siccus sit, qui exposcit victum frigidum humidum, & æger calido sicco assuetus, considerandum erit an tali victui assuetus sit, quod frigidorum humidorum usu malè haberet, aut deterius, quam calidis siccis, aut à frigido humido nihil incommodi percipiens; si prius contingat medio aut temperato victu uti debet, si secundum, morbo contrario victu occurrendum erit, sed simul aliquid dandum consuetudini, minus tamen, quam in tertio casu. Consultit. *lib. de Morbis.* laborantes tali victu uti, quali tempore sanitatis uti consueverunt, sed primum adhibita concoctione, juxta affectus naturam, deinde quia fortiora sunt, detracto nonnihil ipsorum vigore pro magnitudine affectus, unde Celsus monet; cavendum esse ne in secunda valetudine adversa præsidia consumantur, quod evenire consuevit, ubi sani nimis molli & delicatâ victus ratione utuntur. Tandem in morbis ubi ardet appetitus cupiditate alicujus cibi etiam si non satis boni succi, razissimè denegandum erit: nam cibus quo magis appetitur, melius concoquitur, & minus excrementa relinquit.

4. *Tempus
victus in
sanis.*

Quarto tempus offerendi cibi sumitur à præsentia virtutis consueto tempore potissimum urgentis, quæ semper conservanda est, si nihil ejus actionem impediat; impedit in ægris morbus, in sanis & ægris cibus prius exhibitus nondum concoctus, aut excrementa, quæ nondum excreta sunt, nec descenderint, quibus dum natura intentâ est, novos cibos perfectè concoquere nequit; quare in sanis tempus cibandi optimum est hora consueta sanitatis priori cibo confecto & ventriculo exonerato, fameque nonnihil urgente; nam ut horam illam antevertere cruditatis causa est, ita tempus protrahere, & diu famem

mem tolerare ventriculum pravis humoribus re-
let: at si consueta hora oportuna non sit, & ob vitæ
institutum & negotia vacare nequeant, consultif-
mum erit, consuetudinem sensim pro vitæ institu-
tione mutare, veluti qui variis reip. negotiis interdum
impediuntur, mane levi ingesto cibo, vespere plenius
cenare, & à prandio potius abstinere, quam nunc
circa meridiem nunc posthoram 2 aut 3. pomeridia-
m prandere. Dandus autem cibus non est quo
tempora à natura elaborari nequit, ideo anhelanti-
us ab exercitiis cibus aut potus offeri non debet sed
sedata prius turbatione corporis.

In ægris tempus cibandi æstimatur ex virium præ-
sentiâ juxta ægri consuetudinem tempore sanitatis, *Tempus cibandi in ægri.*
& virium tolerantiam, tolerant vires ægri facili-
ter cibum quo tempore minus à morbo gravantur, pro-
inde in morbis, qui typos non habent, tempus su-
mendi cibi sit hora consueta tempore sanitatis: In
continuis hora minoris afflictionis: in intermitten-
tibus tempus declinationis, aut hora quæ longissime
recedit à paroxysmorum in cursu; nam in paroxysmis
cibos præbere noxium est, semper autem, si quis cer-
to vivendi genere quamplurimo tempore sanus per-
manserit, ad aliam consuetudinem nullo modo redu-
cendus est, quia si illa victus consuetudo naturæ con-
veniens non fuisset, eam tolerare nullo modo potuif-
set: at in ægris mala consuetudo & naturæ intempe-
ratæ (ut monet Gal. 5. de Sanit. tuend.) mutanda non
sunt tempore ægritudinis, sed sensim tempore sanitas,

Tandem modus cibandi, an raro aut sæpe, & *Modus ci-
bandi in ægri.*
singulis vicibus, an parum aut multum exhibendum
sit æstimatur in sanis ex viribus tantum pro modo
indigentia, in ægris habita ratione morbi; ac in u-
trisque condonantes semper aliquid tempori, regio-
ni, ætati, & consuetudini, ut præscribit Hipp. 17
Aph. 1. Verum sani bene valentes, ut monet Celsus
nullis

nullis obligare se legibus debent, nullum genus cibi fugere, quo populus utatur, interdum in convivio esse, interdum ab eo se retrahere, & bis in die potius quàm semel in die cibum capere, & se nper quàm plurimum, dummodo id concoquat, benè dormiant seseque frequentius exercere queant: verum robustis plus semper exhibere convenit, debilibus parum sæpeque, & hyeme, aut in regionibus septentrionalibus, plusquam æstate & in meridionalibus offerre, & juvenes plenius sæpiusque quàm senes, & assuetos, quàm non assuetos nutrire.

*Modus cibi
bandi in
aegris.*

In ægris verò comparandæ sunt vires cum morbo: Vires aut sunt debiles, mediocres aut robustæ, morbus verò, aut cum humorum defectu, copia, aut corruptela: vires robustæ copiosa; debiles paucæ; mediocres mediocria exigunt; humorum defectus copiosa indicat, ut deperditum reficiatur, humorum copia, paucæ: corruptela, ut malignitas omnis contemperetur, copiosa alimenta: quare in morbis, si virtus sit valida cum humorum copia, ut in plethoricis, rarò paucis nutriemus. Sin vires validæ cum humorum defectu aut corruptione, sæpe multumque, modo paroxysmi & symptomata non prohibeant; tum enim parum sæpeque dare convenit; at si vires debiles fuerint cum humorum copia aut mediocritate aliqua, raro & paucæ offeremus, & eò minus quo major copia: sin vires debiles cum humorum defectu aut corruptione, parum sæpeque exhibere decet, & in corruptione humorum epictasi aliqua uti, sive paulatim evacuare, & paulatim reficere: nam impura corpora, quando magis nutries, tanto magis lædes, verum in his dandum aliquid tempori, regioni, ætati, & consuetudini.

Modus exhibendi ci-

Ad tempora quod attinent, æstate pauciora offerre convenit, quia vires debiles sunt ex defectu innatæ

innati caloris, sed sæpe, quia corpora plurimum
dissolvuntur: contra hyeme in sanis, multa,
ob vim caloris nativi, & raro, quia corpora pa-
rum diffillantur: in ægris verò licet posita mor-
borum inæqualitate virtus hyeme robustior sit,
quàm in æstate, tamen, quia virtus naturalis
membrorum non ita operatur in sanis, ut in æ-
gris, vincet indicatio ab ægritudine, indicatio-
nem sumptam à viribus, ideo Avicenna in ægris
hyeme minus exhibet quàm æstate: & Galen.
Commen. 44 libr. 1. Acut. minus exhibet tempo-
ribus minus calidis, ubi ex proportionem defluxus,
cib' quantitatem desinit; vere medio aut æstati
proximo, pauca & raro offeremus, quia eo tem-
pore ægri aut plethorici sunt, aut ad plethori-
cam dispositionem proximè accedunt, ob flu-
xionem aut resoltionem humorum, qui hyeme
concreverunt. Autumnalis constitutio assimila-
tur morbis ex corruptione humorum, ideo si
vires validæ sint, multum & sæpe cibandum erit,
sin debiles parum sæpeque, verum savi æstate &
autumno cibos difficillimè ferunt, hyeme facili-
mè, vere medio modo. Eadem propemodum
ratio est in regionibus, ætatibus, & consuetudine
sumpta indicatione à viribus & corporis disposi-
tione; nam singula aut fortes aut debiles vires
& vim caloris nativi efficiunt vel arguunt. De-
inde ipsum corpus disponunt vel ad humorum
copiam, vel ad corruptionem, vel ad utilis ali-
menti defectum; quare juvenibus ob robur viri-
um & multam corporis diffilationem plus, sæpe-
que dandum quàm senibus; & septentrionalibus,
ob vim caloris innati, quàm meridionalibus; &
assuetis ob robur virium, quàm non assuetis; &
exercitatis ob multam diffilationem, quam non ex-
ercitatis.

H h h

Tempo-

C A P.
XXII.

Temporum intervalla in sanis dependent potissimum à consuetudine: In aëgis magis incerta sunt: ut supra demonstratum est. Deinde certa quantitas singulis vicibus accuratè determinari nequit, sed à viribus dependet, pro varietate concoctionis & distributionis alimenti per corpus, ac dispositionis corporum & humorum in ventriculo aut venis: concoctio autem quiete perficitur, & potissimum calore nativo ad interiora retracto, ut in somno, digestio verò melius motu corporis & exercitatione: corpora autem alia melius comparata sunt ad concoctionem, quàm distributionem, alia magis ad distributionem, ut calida sicca, rari habitus, quæ latas venas habent, multisque laboribus dedita sunt, multumque dissilantur; proinde qui melius alimenta concoquunt, quàm digerunt, ut distributio melior fiat, plus cibi in prandio quàm in cœna assumere deberent; contra, qui melius digerunt quàm concoquunt, ut melius concoctio procedat plus in cœna.

*Prandium
an cœna
largius esse
debeat.*

Qui æqualiter digerunt & concoquunt, tantum in cœna, quantum in prandio, aut paulo plus, quia plus temporis intercedit inter cœnam & prandium, plus etiam in cœna assumant bene valentes, assueti plus vesperti ingerere, ac qui multis negotiis interdiu occupati sunt: Verùm dispositiones partium & humorum in ventriculo & venis, contrarium interdum fieri suadent: nam qui catarrhis, epilepsia & similibus morbis capitis obnoxii sunt, quia somnus caput replet, imprimis si adsit redundantia crudi humoris in ventriculo, tales à copiosa cœna abstinere debent; & plus in prandio assumere. In convalescentibus aut extenuatis, qui longo tempore extenuati sunt, lentè reficere oportet imprimis alimentis solidis: qui brevi breviter, alimentis magis humidis. Hipp 7. Aph. 2.

Exhi-

Exhibetur autem potus, ut ex supra dictis constat, primum pro siti naturali restringenda; Secundo ciborum gratia, (licet ex usu ciborum sitis etiam naturalis resultet) ut in ventriculo commisceantur; deinde elixantur, tandem ut chylus ad iecur per venas deferatur; tertio pro siti ~~non~~ naturali vel morbosa.

Potus pro siti naturali, quæ ex humidæ substantiæ defectu procedit, multi & citissimi nutrimenti esse debet, quale est vinum, cerevisia benè cocta, aliquando succi ex cibariis confecti: si sitis sit ex naturali marcore, exhibetur potus iste quocunque tempore, siti urgente in paulo maiori quantitate quam pro consuetudine; sed si vires debiles fuerint, satius erit parum sæpeque bibere.

Deinde potus pro descensu & commixtione aut elixatione alimentorum in ventriculo commodissime exhibetur, dum cibus assumitur, pro quantitate ciborum, itaque, qui copiosum cibum assumit, copioso etiam eger potu, sed non confertim, aut si minus quam plurimum, nisi virtus valida fuerit: nam qui robusti non sunt, & parum per ambitum corporis dissipant, largum potum vitare debent, nè vis ventriculi lædatur, & fluctuationes oriantur: In calidis biliosis nativis, aut dum alimenta levia sumuntur, quæ in calore facile dissipantur aut corrumpuntur, potus sit vinum tenuissimum, cerevisia tenuis &c. quæ sua qualitate calorem temperant: contra in frigidis naturis, aut dum assumuntur alimenta, quæ difficulter superantur, potus sit vinum, aut cerevisia potentior, quæ calorem nativum excitat: Pueris cerevisia aut vinum tenuius, senibus meracius convenit: Hyeme plus edere expedit, minus sed meracius, bibere: At vere paululum cibo demendum, adijciendum porioni, sed dilutius bibendam potissimum æstate.

Hhh 2

Verum

C A
XXII.De potu.
Potus tri-
plex usus.1. Potus
pro siti
naturalis.2. Potus pro
distribu-
tione &
contactione
ciborum
in ventri-
culo.

C A P.
XXII.

*Potus pro
distributio-
ne alimen-
torum per
venas.*

85²

LIBER QUINTUS

Verum post concoctionem ciborum in ventriculo, ut alimentum ad jecur per venas deferatur, aliqui potu nullo indigent, quia amplius meatus habent, & satis validam vim expultricem ventriculi, & attracticem venosi generis, aut alimentum suam naturam satis liquidum: alii, quia contrario modo se habent, potu aliquo indigent, qualis tenuium partium esse debet; ut secum facilius alimenta devehant; exhibetur talis potus potissimum post integram concoctionem in ventriculo, ubi rictus nullam qualitatem ciborum referunt, ad minimum post 4. horas aut 5. a cibo, quo tempore si sibi molestantur, & gravitatem circa ventriculum senserint, bibere commodissime poterunt; dum vero elixatur cibus in ventriculo, aut abstinere, aut parum assumere potus consuevit, ne cibi in ventriculo fluctuent, & ea minime amplecti queat.

*Potus actu
frigidi &
calidi quib.
convenient*

An vero actu calidiores an frigidiores potus convenient, dubitatur? nam actu calidiores teste Galen. 3. de San. tuend. appetitum ciborum minuunt, fastidium pariunt, vires viscerum obtundunt, torporem mentis inducunt, &c. nimis frigidus spirandi difficultatem, tussis, hæmorrhagiam, &c. Nihilominus in sanis corporibus potus actu frigidior præferendus semper videtur, & potissimum in illis, qui calidum spirant; qui vero calidum spirant, magis frigidum appetunt, qui frigidum spirant, ad mensuram frigiditatis calidum desiderant: actu vero frigidus potus melius sitim restinguit, appetitum excitat, viscera roborat, nativum calorem auget; quare sanis porrigendus erit, potissimum juvenibus, robustis, exercitatis, sedata potius turbatione corporis, ac calidis temporibus, parcius senibus, pueris, debilibus,

ibus, & qui viscera imbecilla habent, ac etiam frigidissimis temporibus, nunquam pleuritide inflammatione visceris alicuius laborantibus, nam calidus potus tepidus, aut actu calidus debetur; attamen nimia potus frigiditas sanis interdum obest, potissimum, si confertim & subito ingeratur, læduntur etiam frigida aqua potu, qui assueti non sunt, aut parum sanguinis & carnis habent, quibus ventriculus & nervosum genus debilia sunt, aut multis cruditatibus referri, ac tumore, inflammatione, aut obstructione visceris laborant, item exercitati nondum sedata perturbatione corporis; laudatur tamen potus aqua gelida dulcis optimæ qualitatis in vigore febrium acutarum, apparentibus signis concoctionis; in assuetis, natura robustis, qui viscera firma habent & succi plena.

Potus pro siti non naturali, vel morbosâ variè administratur, pro varietate causarum: nam si sitis oriatur ex ariditate ventriculi, potus sit confectus tenuior magisque humectans, ut vivum dilutum, aqua hordei, &c. paulatim sæpiusque bibant: si à caloris copia sine ulla inflammatione visceris, aut acri materia contenta in ventriculo, primum cibi & labores consueti detrahantur, & actu frigidum bibant: si à totius corporis calore, potius sit potestate frigidus, simulque tenuium partium, ut per totum corpus celeriter permeare queat: si à biliosis acris humoribus in ventriculo, potus actu frigidus potestate calidos: si à falsis humoribus, potus nonnihil tepidos sæpius & paulatim assumant, qualitas acris contemperetur. In morbis autem potus, præter quod sitim restinguat, & vehiculi vicem gerat, non solum vires tucri, sed etiam morbum, eiusque cau-

3. Potus pro
siti non na-
turali aut
morbosa.

Hhh 3. sam

C A P.
XXIII.

nam destruere aut saltem nulla tenus adaugere debet : unde potus alius simpliciter corroborans sive nutriendus, ut potus consueti sanis, alius curans sive medicatus, qui morbo aut causæ morbificæ contrarius est, quales sunt aqua hordei in feb. acutis, vinum aut cerevisia ex ligno sancto in morbo gallico, &c. Verum sanis benè valentibus non ita conveniunt vina medicata, sed neutris gratia præcautionis; nec ægris in acutis, sed in diuturnis morbis.

C A P. XXIII.

*De aeris, quietis & modus, seu exercitiorum moderato usu.**De aere.*

INter res non naturales numeratur aër, cujus præ cæteris ferè rationem habere oportet, siquidem aërem continenter attrahimus & mittimus ad spiritus generationem, & caloris nativi contemperationem, præterea contractu suo corpora nostra afficit.

Considerantur in aere substantia & qualitas.

Considerantur in aëre substantia & qualitas : substantiâ autem sua aër purus, tenuis, nitidusque esse debet, nullis impuritatibus inquinatus : qualitate verò pro sanis corporibus aër temperatus utilissimus est, pro ægris aut naturis intemperatis, aër ad contrariam qualitatem declinans, aut à naturalis, aut arte præparatus : aër purus nitidus tam sanis quàm ægris convenit; ac crassus, impurus, inquinatus, omnibus inimicus; inquinatur, crassiorque redditur à pravis exhalationibus ex terra vel aquis, ex cadaverum corruptione, prava cœli dispositione, &c. putrescit, ubi concluditur, caretque per-
fate

flatu sive privatur ventis. Qualitas vero aëris oritur ex dispositione cœli, & potissimum ex motu solis: deinde ex positu & natura regionis: nam sol motu suo 4. anni tempora, diem & noctem constituit: vernum tempus & imprimis medium, naturâ calidum humidum est: æstas calida sicca: autumnus inæqualis, sed ad siccitatem & frigiditatem vergens: hyems frigida humida: Eadem ratio in partibus diæi, sicut in temporibus anni: nam tempus matutinum respondet veri, meridies æstati, vespertinum tempus autumnus, nox hyemi. Assimilantur etiam 4. septimanæ mensis lunaris, 4. anni temporibus. Hæc omnia tempora, qualitates suas aliquo modo mutant pro natura & positu regionis; frigidiores enim sunt, quæ sub zona frigida sunt; & ad zonam frigidam declinant, calidæque magis ad zonam calidam, temperatæ in medio sunt. Deinde montes & loca montosa frigida sicca sunt, valles calidi humidi, planities temperatæ, maritimæ regiones calidiores, mediterraneæ frigidiores: similiter & loca, quæ ad septentrionem spectant, & perflantur ventis septentrionalibus, frigida sunt; quæ ad meridiem, calidiora, &c.

Decet autem medicum aerem accommodatum præscribere, aut vitia in substantia & qualitate corrigere. Corrigitur aëris corruptio & inquinatio, per filtrationem ventorum; & mutationem loci: venenata qualitas, ut in peste, vapore aceti, aut fumo ex bacis junci, myrrha &c. similiter frigiditas foco & similibus calefacientibus; caliditas refrigerantibus, veluti ad nimiam caliditatem æstivam contemperandam, ægri domos frigidiores elegant, quales sunt subterraneæ, aut ad terram versus septentrionem sitæ & perflatæ, extra radios solis, & pavimenta assiduo conspergant aceto cum aqua

C A P. XXIII. rosarum, aut sternant foliis salicis, vitis, rosarum, &c. præcipit Galen. *Comm. 4. in 6. Epid.* calidos loco frigido dormire, ut frigidum aërem inspirent, sed con-
rectos stragulis calefacientibus, ut calor ab interio-
ribus ad cutem revellatur. In aëre calido concluso,
vel in vaporariis dormire, nec sanis nec ægris satis
expedit, &c.

**3. De motu
& quiete.**

Tertiò electa commoda aëris temperie decet
hominem sanum & ægrum in motu & quiete mo-
dum servare. Sub motu continentur primum mo-
tus leviores, ut levis deambulatio, vectio, &c. deinde
validiores scilicet exercitationes, quæ anhelitum
mutant, & tandem crebram respirationem indu-
cunt.

**Exercita-
tionum dif-
ferentie.**

Exercitationes autem aliæ simpliciter tales
sunt, ut cursus, saltus, &c. aliæ exercitationes simul
& opera aut labores in usus vitæ, ut cum quis fodit,
remigat, onus portat, venatur, &c. Deinde exercita-
tiones aliæ fiunt cum robore sive contentione &
connixu; aliæ sine robore, item aliæ celeriter, aliæ
lentè; Exercitatio cum robore, sine celeritate valida
dicitur, ut si quis magno onere sublato in eodem
loco consistat, vel paululum procedat: at exercita-
tio robusta cum celeritate, vehemens vocatur, ut
gravi armatura pugnare, remigare, ac in summa o-
mnis valida exercitatio, si accedat celeritas motus.
Exercitationes, quæ celeriter fiunt sine robore, sunt
cursus, parvæ pilæ lusus, &c.

Tandem exercitationes aliæ cum intermissio-
ne fiunt, quædam brevi tempore; aliæ longo, &
quædam totum corpus æqualiter exercent, ut par-
væ pilæ lusus; aliæ peculiare partes potissimum, ut
saltus & cursus crura & lumbos, remigatio brachia
& manus magna respiratio & vociferatio pectus &
pulmones, &c.,

Exer-

Exercitationes veterum quædam antecede- C A P.
re solebant, quædam subsequi, antecabant fri. XXIII.
tio præparatoria, sequebantur *ἀποδερατρία*, id *De frictio-*
ne, *frictio* reparatoria; aliquando balnea, licet *nibus*.
frictio & balnea sine exercitiis utiliter adhiberi
possunt.

Frictionis differentia præcipua sumuntur à *Frictionum*
quantitate & qualitate: ratione qualitas frictio *differentia*
omnis vel dura, vel mollis, vel media ratione *et* *scu-*
quantitatis, multa, pauca, aut mediocris; *ex* *usq.*
his simplicibus novem conjugationes oriuntur:
Dura autem frictio corpus indurat, cogit, den-
sat: mollis contra emollit, laxat, solvit: media
mediam rationem obtinet: at multa carnem mi-
nuit, dissolvit, & gracilitatem inducit: pauca ea-
dem quantitate relinquit: mediocris carnem auget:
quare dura mediocris carnem duram auget: mollis
mediocris carnem mollem auget: multa dura car-
nem minuit & indurat, &c.

Ex his facile erit æstimare, qualis frictio uni- *Qualis fri-*
cunque corpori conveniat: nam si quis sanus me- *ctio unius-*
diocri corporis habitu præditus sit, ei nec qua- *que conve-*
litate dura aut mollis, nec quantitate multa aut *niat.*
mediocris convenit, sed pauca & qualitate medio-
cris, at si corpus molle, & supra modum resolu-
tum sit, duriter fricare oportet: si corpus durum
siccumvé, molliter: si gracile, sine qualitatibus
alteratione decet reficere, & augere adhibita me-
diocri frictione in quantitate & qualitate: si cras-
sius emaciare, frictione multa & simul mediocri
in qualitate, si corpus mediæ aequalitatis, alio-
qui, si durius multa & molli, si mollius multa &
dura, &c.

Instituatur frictio potissimum mane post
communium superfluitatum excretionem, ali-
quant-

Hhh 5

C A P.
XXIII.

quando vesperi ante cibos: reficcat is autem, & qui lassitudinis sensum habent, & quibus cutis densitatem corrigere volumus, mollis frictio sit cum largo oleo dulci; at in raritate cutis ex balneis usuque venieris, &c. paucis quidem siccis frictionibus utemur primò, post cum oleo adstringente: in sola cutis humiditate, solis siccis duris frictionibus cum linteo. Vespertina frictio lassatis, reficcat is, & alimentis non sentientibus commoda est, post parcum prandium, perfecta concoctione & subductis cibis è ventre fricentur cum oleo dulci, ventre non contacto, sed prius tantum perfuso oleo nardino aut absynthii: initio autem corpus omne frictione intumescit, postea si pergas, gracile redditur & contrahitur: quare macilentis corpus ad tumorem tantum fricandum erit, sed si exercendi sint, prius desistendum, & potissimum in tenellis, contra in obesis.

Frictio præparatoria.

Cum autem non liceat ex improvviso validos motus aggredi, ideo veteres ante exercitationem usu sunt frictione præparatoria, ut partes solidæ emolliantur, humida solvantur, & meatus corporis relaxentur, alioqui metus erit, ne violento motu aliqua partium solidarum rumpatur, aut convellatur, aut meatus obstruantur: fricant autem corpus linteo primùm blandius, deinde sensim paulo fortius, donec incalasciat. & cutis rubore suffundatur: tandem manibus medio modo adhibito oleo tepido: mensura statim accuratè definiri nequit, nisi experientiam aliquam naturæ illius adeptus fueris, cum alii sint ad exercitationem alacriores, alii segniores, &c.

Ufus exercitationis.

Servit exercitatio ad excrementorum inanitionem & *ἐνέργειαν* sive bonum corporis habitum comparandum: Nam in exercitando corpore tria perfici-

perficiuntur, nimirum augmentum insiti caloris, spirituum citatio motus, & membrorum durities, & robur ex mutuo attritu; hinc cetera sequuntur alimentorum melior attractio, concoctio, & nutritio: excrementorum expulsio ob sortem spiritus motum, tam sensiles quam obscuros meatus expurgantem, actionum omnium robur, &c. Nam ocium nativum calorem obtundit, vires corporis enervat, excrementorum copiam gignit, &c.

Verum motus & labores immodici biliosum gracileque corpus reddunt; remissi & pauci ignavum; celer motus corpus attenuat & dissolvit, tardus rarefacit & auget; robustus indurat, & musculos validiores reddit; imbecillis emollit, vehemens extenuat simul & indurat: & quia exercitati distributioni alimentorum per venas opitulatur, tempus oportuno exercendi corpora erit ante cibos peracta confectione depositis alvi & vesicæ excrementis, ubi notæ bonæ concoctionis in urina apparuerint: quare qui crapula laborant, crudis humoribus referti sunt, aut cibi inconcocti copiam in ventriculo habent, aut alvi & vesicæ excrementa non deposuerunt, ab exercitationibus abstinere debent.

Exercendum corpus donec in molem elevetur, & floridum evadat, motusque exquisitè validi & æquales existant, sudor calidus vapor permixtus per totum corpus erumpat, cessandum statim, si unum horum remittere videatur, scilicet moles corporis contrahatur, floriditas contabescat, vigor motus sese remittat, sudor frigidior pauciorque erumpat, ac etiam, si respiratio ad magnam celeritatem & densitatem ascendat.

Quo tempore veteres prædorribæ è vestigio oleo inunxerunt, & apotherapia, id est, recuratoria frictio.

*Tempus
exercitationis.*

*Terminus
exercitationis.*

Apothepia.

CAP.
XXIII.

frictione usi fuerunt, quæ postrema pars est exercitationis probe peractæ, in eum finem, ut lassitudo, quæ exercitiis succedere solet, prohibeatur, & nonnulla sub cute excrementa expurgentur, cui usui subservit calor & mollis frictio, manibus potissimum affuso copioso oleo: deinde magna exspiratio, spiritusque cohibitio.

Nam spiritus cohibitione, tensis qui in thorace sunt musculis remissis que in abdomine, jecur, ventriculus, lien, &c. à spiritu attolluntur, & excrementa facilius descendunt, ut latius Galen. capit. 2. libr. 3. de San. tuend. Exercitatio licet ad sanitatem conservandam necessaria sit, tamen omnibus eadem non debetur: assuetis primum, deinde robustis validiores & vehementiores conveniunt; nam teste Hippoc. *Abhor. 49. lib. 2.* assueti solidos labores ferre, etsi imbecilles & senes, non consuetis, quanquam robustis & juvenibus facilius ferunt: consueti enim licet deteriora minus molesta sunt, at tamen ut Hipp. præcipit, utile est sanis ad inconsuetam transire: ac ut monet Celsus, nullis certis legibus obstrictum esse, interdum quiescere, frequentius se exercere, modo in urbe, sæpius in agro esse, navigare, venari, &c.

Verum frigida humidæ naturæ magis exerceri debent, quàm temperatæ, & temperatæ magis, quàm calidæ; qui verò in otio vivunt, aut propter certum vitæ genus exercitiis yacare nequeunt, victu tenuiori utantur, & ut præcipit Hipp. 1. de Diata, alimenti tantum offerendum, quantum par sit laboribus, & labores cibos præcedant.

De balneis,
& differen-
tiis balneo-
rum.

Adhibetur quoque balneum post exercitia, ut apotherapeia pars, ad partes duras densas relaxandas, excrementa discutienda, sudorem aut pulverem detergendum. Balneum autem omne fit,

it, aut ex liquoribus, aut ex vapore, aut ex solida substantia, ut calida arena, sale, vinacis: liquor potissimum est aqua dulcis, aut ex medicatis fontibus; sulphureis, nitrosis &c. aliquando ex decoctis herbis, ex oleo, lacte, aut vino; &c. quorum omnium usus est, vel corpus evacuare per sudores, vel habitum corporis implere, ut in gracilibus, vel inemperiem alterare sive contemperare. Temporis mora in balneis est breve, longum aut mediocre.

Verum balneorum apud veteres 4. præcipua partes fuerunt: I. hypocaustum sive laconicum aut sudatorium balneum, in aere calido à vaporibus ex igne succensis: Deinde triplex solium in vase; primum ex aqua calida, alterum ex aqua frigida, tertium ex aqua modicè temperata pro detergendis sordibus: additur his quinta pars, quæ à vestibulis exuendis vocatur.

Aer balnei, præcipue, ex vaporibus aquæ dulcis, primum calefaciendi, humectandi, & relaxandi vim habet, deinde, liquores concretos liquandi, & sudores eliciendi; tandem si diutius in commorentur, exiccandi: aquæ ex medicatis fontibus pro sua qualitate partes alterant, ut sulphureæ exsiccant, calefaciunt, resolvunt: nitrosæ exsiccant, sordes abstergunt, &c. Aqua calida dulcis per se quidem humectandi vim habet, sed primum adhibita calefacit, deinde expirantibus calidis vaporibus, refrigerat, attenuat, & exsiccat: Aqua tepida sive modice calida calefactos refrigerat, refrigeratos calefacit, simulque relaxat, & mediocri tempore adhibita impinguat, & excrementa sub cute coquit, longiori temporis morâ resolvit & discutit; quare naturis gracilibus calidis, & quibus calor mordax est, mediocri temporis mora, conuo-

*Balnea veterum eo-
rumque partes.*

Vires singulorum balneorum.

C A P. XXIII. convenit; item melancholicis, heceticis, ac febribus
 ficcis, sitientibus: præterea lassitudines arcet, dolores
 res mitigat, cutaneis affectibus convenit: Aqua frigida
 refrigerat, sed simul meatus constipat, densam
 duramque cutim efficit, totumque corpus roborat
 calorem ad interiora revocat, unde concoctionem
 iuvat, & bonum prædium est contra læsiones atque
 externis causis, si modicè rectaque ratione utamur
 verum qui augentur, & bona victus ratione ac exerci-
 citiis non utuntur, aut cruditatibus & constipationibus
 oportuni sunt, & aëres vapores gignunt,
 à frigida lavatione abstinere debent, potissimum frigidis
 temporibus: oportet autem iuvenes robustos
 non assuetos ad frigidam lavationem paulatim as-
 suetacere, primum æstate modicè frigidam ingre-
 di, deinde paulatim ad frigidiorē accedere, semper
 præmittere frictiones; deinde post egressum cor-
 pus oleo fricare, donec cutis incalescat.

*Modus bal-
 neandi:*

Verum hoc nostro tempore in plurimis re-
 gionibus balneorum non tam frequens usus ut o-
 lim, nam qui assueti sunt, ægre ab usu balneo-
 rum desistere possunt; deinde frequens balneorum
 calidorum usus corpora enervat, sive molliora &
 debiliora reddit: attrahunt tam sanis quam agris non
 raro conferunt, sed post ciborum concoctionem,
 subductis communibus excrementis: sani autem
 evacuato corpore balneum ingrediantur, & in eo
 tamdiu commorari debent, donec non amplius
 delectationem sentiant, crassiores & obæsiore iei-
 iuno stomacho potissimum post levem exercitatio-
 nem, & primum corpus debito modo fricetur, post
 in vapore sudor eliciatur; deinde solum aquæ ca-
 lidæ ingrediantur ad quartam fere horæ partem;
 hinc linteis amicti ad lectum deducantur, ubi ite-
 rum

rum dormire & sudare poterunt; tandemque sudorem lintheis detergere, & si visum fuerit, oleo inungi. In gracilibus vero: pthificis, aut hecticis sudorem vitabis, & post balneum aquæ dulcis tepidæ in aquam nonnihil frigidam merges, si vires ferant, tandemque; eductos oleo violarum aut amygdalarum inunges, talibus etiam convenit balneum lactis dulcis, item ut Galen 2. *Simpl. c. 15* testatur, balneum aquæ dulcis cum oleo: Artificialia balnea conficiuntur ex decoctis variorum medicamentorum in aqua, pro variis usibus, ut calefacientes ex decocto origani, hyssopi, pulegii, calaminthæ, flor camomillini, &c. emollientes ex decocto malvæ, althææ Sem. Lini foenugraci, &c.

C A P. XXIV.

De excretorum & retentorum, somni & vigiliarum, ac affectuum animi moderatione.

Quarto excreta nonnulla & retenta ad communem vitam omnium animalium pertinent, ut enim omnia aluntur, ita in omnibus retineri debet, quo alantur, & aliquid expelli, vel quod toto genere præter naturam, vel multitudine tantum alienum sit: triplex autem alimenti concoctio in nobis est, & quælibet sua excrementa habet, ergo in qualibet erit quod retinere & expellere oportet: in prima concoctione retinetur chylus, expelluntur feces: in secunda retinetur sanguinis massa, expellitur serum, & separatur ad lienem melancholia; ad vesiculam fellis & duodenam intestinum flavabilis: in tertia concoctione

*De excretis
& retentis.*

dum

C A P.
XXIV.

dum sanguis convertitur in verum alimentum, expellitur naturaliter primum materia crassior, unde sordes, & dissipatur tenuior in vapores, vel efficitur fudor; adduntur his nonnullæ consuetae evacuationes materiae quantitatem excedentis ut menses, seminis, lactis, hæmorrhoidum, sputi, &c.

*Retenta &
excreta qui-
bus modis
peccant &
quomodo
occurren-
dum sit.*

Si secundum naturæ modum, quæ accom-
modata sunt, ad alendum retineantur, & quæ ex-
pelli debent, debito modo excernantur, sanitas
conversatur; si retenta à naturæ modo discedant,
veluti sanguis in quantitate aut qualitate peccarit,
aut consuetae evacuationes supprimantur, pletho-
ra, cacochymia, obstructions, constipationes, a-
liaque mala oriuntur, unde sanitas labefactatur: Si-
mili modo læditur sanitas si humores expellantur,
qui retineri debeant, aut inutiles cum utilibus; aut
inutiles non naturali via, quantitate, modo & tem-
pore, quibus modis variæ concitantur fluxiones,
vel intra corpus manentes, unde arthritis, angina,
& vel extra prorumpentes, ut in alvi, urinæ,
menstruorum, seminis profluvio, hæmorrhagiâ,
&c. vel partim intra, partim extra, ut in coryza,
rancedine, catharrho ad pectus, &c. Medici igitur
erit his omnibus malis subvenire, & primum
plethoram phlebotomia; cacochymiam purgatione;
cæteraque retenta præter naturæ modum de-
bita ratione evacuare, ut urinas diureticis; men-
ses, medicamentis eos moventibus; sudores, bal-
neis, exercitiis, frictionibus, medicamentis dia-
phoreticis, & decocto ligni sancti, sassafras, &c.
Semen tempestivo veneris usu, &c. cibi absten-
tiam imperare, omnes consuetae evacuationes re-
vocare, obstructions aperire, ut in superioribus
capitibus magna ex parte demonstratum fuit, si-
militer fluxiones præter naturam concitatas legi-
timo

ultimo modo compescere convenit, ut in genere demonstratum fuit in cap 3. libri hujus, & suo loco latius in specie, Deo volente, dicemus.

In Veneris usu, quemadmodum in ceteris excretis & retentis, modum servare oportet, retentum enim semen corruptum, varia inducit symptomata, quæ viduæ nonnullæ interdum experiuntur; verum in multis nimia abstinencia continentiam parit, dum humorem, ex quo generatur semen in alias partes transmittit unde meatus seminarii atrescunt, membra genitalia ad suum munus inepta redduntur: Nam moderatus veneriorum usus, vegetas illas partes reddit, immodicus usus mares magis quam fœminas lædit, & spiritus dissolvit, corpus refrigerat, caput, nervos, oculos & articulos potissimum debilitat, cruditates parit, mentem sensusque obtundit, oris fœtorem, sanguinis mictum, phthisin renalem & similia parit: moderatus & tempestivus usus multis prodest; nam non solum ad prolis meliorem procreationem servit, sed etiam plenitudinem coacervare non sinit, calorem nativum & spiritus excitat, corpus agile reddit, cor confortat, &c. Ætas veneri aptissima est juvenilis & virilis, reliquis nocet, potissimum senibus & naturis fœccis & debilibus. Ad tempus quod attinet, vere Venus tutissima; deinde hyeme, minus autumno; omnium minime æstate, quo tempore, si fieri potest, abstinendum: Oportune venus instituitur mane aut post primum somnum, peracta concoctione ciborum in ventriculo, non statim post cibum, crapulam, exercitia valida, nec tempore inedia, aut post immodicas evacuationes, nec temporibus nimis calidis & frigidis. Ordo modusque ille observandus est, quem Hipp. 6. Epid. præscribit, labor, cibus, potus, somnus, venus, omnia mediocritate: præcedant exercitia cibum & potum, hæc somnum, somnus venerem, & ista omnia fiant moderate,

non supra naturæ vires, sed ut alacriores & vividiores reddantur.

*De somno
& vigilia
et utrumque
legitimo
usu.*

Quinto, vigilia & somnus animalibus secundum naturam conveniunt: vigilia perficitur functione animalis facultatis, somnus quiete, ut vires multis laboribus defatigatæ reficiantur, deinde vigilia ad distributionem alimenti per corpus, somnus magis ad concoctionem confert: præterea vigilia ad expulsionem excrementorum, somnus magis ad retentionem: nam cunctæ excretiones naturales somno magna ex parte retinentur, excepto sudore; verum in utroque modum observare convenit, nam immodicæ vigiliæ corpora exsiccant & attenuant, vires evacuant & debilitant &c. immoderatus somnus nimium humectat, calorem nativum obruit, excrementorum copiam gignit, mentem sensuque obtundit. Somnus maxime naturalis, est nocturnus; verum ut ab exercitatione cibus statim sumendus non est, sed prius sedatâ corporisurbatione, ita non statim in cœna, dormiendum est, sed interjecto tempore, nimirum post horam unam ad minimum, præmissa levi deambulatione, ut cibus ad inferiora descendat; dormire a prandio minus consultum est, quia tempus diurnum non complet concoctiones; proinde à somno fluctuant cibi in ventriculo, veluti & aliis à somno nocturno intempestivè expergefactis: non assueris à prandio dormire noxium est, imprimis qui catarrho, epilepsia, & similibus capitis affectibus laborant. Spacium temporis nocturni somni sit, quo compleatur concoctio ciborum in jecore & ventriculo, verum cum actiones omnes pari tempore non perficiantur, non erit idem dormiendi tempus in omnibus: in sanis bene valentibus terminus dormiendi definiri solet spacio 7 horarum: Super dorsum dormire non expedit, præcipuè initio somni, sed super latus: an supra dextrum aut sinistrum

strum, parum referre videtur, nisi assueti fuerint, aut partis affectus impediens, licet satius esse videatur, initio somni supra dextrum dormire, deinde sub finem concoctionis in sinistrum sese convertere: Verum, cum vigiliæ exiccent, somnus humectet, ægris laborantibus calidis aut siccis affectibus, somnus paulò longior confert, nisi adsit visceris alicujus inflammatio, quæ initio per somnum longiorem plerumque augetur: in frigidis humidis affectibus præcipue cerebri, quia ægri ad somnum immodicum proclives sunt, somnus sit solito brevior, & à somno diurno prorsus arceantur, ac somnus nocturnus tantus concedatur, quantus virium restaurandarum gratia requiritur: Deinde initio paroxysmi febrilis, quando calor natus ad interiora refugit, decet ægros à somno abstinere, & in declinatione, aut sub finem vigoris tantum dormire.

Postremo inter res non naturales numeratur perturbatio & tranquillitas animi, quæ motui & quieti corporis comparantur, ac non minus quam illa corpus afficiunt: nam animi tranquillitas otio & quieti correspondet, quæ aptissima est ad concoctiones perficiendas: perturbationes vero animi calidum innatum cum spiritu & sanguine variè mouent, corpusque afficiunt, ut in præcedenti libro dictum fuit: nam ira in corde calorem nativum vehementer accendit, & proinde totum corpus calefacit: metus & mæstitia calorem ad interiora retrahunt, & marcescere sinunt, & externas partes frigidas relinquunt. contra gaudium profusum calorem cum spiritu in summa corporis ita effundit, ut partes externæ calefiant; internæ refrigerentur &c. Hæ perturbationes, si vehementiores fuerint, morbos, aliquando mortem inducere possunt: nem non pauci gravi mæstitia paulatim; multi pusillanimes confertim valido timore, & nimis perfuso gaudio, extincti sunt:

VI.

*Affectus
animi, eo-
rumque mor-
deratio.*

per solam iram, nullo interueniente morbo, licet ne-
mo extinctus sit, tamen quia ita vehementer calorem
in corde accendit, & in corpus effundit, humores con-
turbat &c. varios morbos excitare solet, quare tam
sani, quam ægri immodicas animi perturbationes
vitare debent, sed qui calidis morbis laborant, aut ad
calidos morbos inclinant, iram, vt hostem potissimum
fugere, animoq; tranquillo esse: verum in soporiferis
actibus, & in aliis omnibus, in quibus calor natus
elanguescit, utile est ægros ad iram concitare: in me-
lancholicis à metu & incertitiâ animum ad hilarita-
tem & gaudium convertere, &c.

Hactenus de legitimo usu sex rerum non natura-
lium, in quibus consistit universa victus ratio, cujus
observatio sanis & ægris necessaria est. Nam qui vi-
tioso corporis habitu à natura producti sunt, mode-
rato victu in alimentis, exercitiis, &c. multa naturæ
vitia corrigunt: contra multi licentiori & negligen-
tiori victu bonas naturas corruerunt. Plerumq; ta-
men corpus sanum optimeq; constitutum omnia si-
bi ipsi excogitat naturæ motibus impulsam, seu in o-
mnibus quicquid agendum fuerit, naturæ quadam
promptitudine sui ipsius mensuram, modumq; inve-
nit, præsertim si animus ipsius probe à puero fuerit
institutus. Non enim tales multo plus, vel minus ju-
sto appetunt, ingeruntque, nec vehementioribus la-
boribus, vigiliis, curis & affectibus facile indulgent;
in quibus minus semper metuendum est, ne in vi-

ctus ratione delinquant, aut levioribus

erratis cito offendan-
tur.

INDEX

INDEX RERVM MEMO- RABILIVM.

A.

A Bdomen eiusq ³ partes	87	Affectuum differentia	174
Abortus quid	533	Affecta sedis signa	545
Abortus causa	534	Albuginei humoris vitia	393
Abortus signa	536	Agonia	208
Absorbentia medicamēta	690	Alchymia vide Spagyrica.	
Acerbus & austerus sapor	706	Alexipharmaca	701
Acidus sapor	707	Alimentum quid	88
Acris sapor	709	Alimentum triplex	ibid.
Amarus sapor	709	Alimenti & medicamenti dif-	
Accretio quid	88	ferentia	661
Actionum differentia	245	Alimenti concoctio triplex	89
Actiones naturales quid	ibi.	Alimentorum differentia	821
Actionum lasarum differentia		Alimentorum facultates	822
	243	Alimenta medicamentosa	823
Adeps	66	Alimentorum materia	822
Adipis temperamentum	49	Alimenti crassi & tenuis succi	
Aegylops	300	&c.	824
Aër quibus modis corpus afficit		Alvi excrementa	90
	203	Alphus	446
Aëris elementum	32	Augūptōis	292
Aëris legitimus usus	854	Amalgamatio	742
Affectus & affectio quomodo		Amentia	272
differunt	179	Anasarca 436. eius causa	438
Affectus præter naturam &		Anginae differentia & causa	
contra naturam	181		232
Affectuum sedes	173	Angustia mearum species	188

Iii 3 Am

I N D E X.

<i>Ani affectus</i>	411	<i>Ani affectus cause</i>	378
<i>Anima definitio</i>	59	<i>Apoplexia definitio</i>	276
<i>Anima cognoscendi ratio</i>	57	<i>Apoplexia causa</i>	ib.
<i>Anima facultates prima tres</i>		<i>Aqua</i>	33
64		<i>Aqua principium frigidorum</i>	
<i>Animalis facultatis symptom.</i>	33		
245		<i>Aranea tunica vitia</i>	293
<i>Animalis facultatis sedes cere-</i>		<i>Arthritidis definitio</i>	313
<i>brum</i>	141	<i>Arthritidis causa</i>	314
<i>Animalis facultatis differen-</i>		<i>Aristotelis opinio de anima</i>	57
<i>tia</i>	139.243	<i>Aristotelis opinio de corde</i>	62.
<i>Anima sedes</i>	62	& 86	
<i>Animatorum genera</i>	60	<i>Aristotelis opinio de semine</i>	118
<i>Animi affectus</i>	174	<i>Argenterii opinio de causa co-</i>	
<i>Animi affectus quando causa</i>		<i>tinente</i>	211
<i>morborum</i>	208	<i>Arterie</i>	132
<i>Animi affectuum moderatio</i>		<i>Arteriarum sectio</i>	803
867		<i>Arteria vulnerata signa</i>	547
<i>Anni tempora, eorumq; tem-</i>		<i>Artuum differentia</i>	176
<i>peramentum</i>	53	<i>Atrophia</i>	443. &c.
<i>Avogigia</i>	376	<i>Attrahentia medicamenta</i>	
<i>Antidota</i>	701	684	
<i>Apertionis meatuum causa</i>	232	<i>Ascites</i>	436.438
<i>Apothepia</i>	859	<i>Ascarides</i>	396
<i>Appetitus</i>	172	<i>Asthmatis definitio</i>	347
<i>Appetitu moventes cause</i>	173	<i>Auditus quid</i>	151
<i>Appetitus animalis quid</i>	374	<i>Auditus obiectum</i>	151
<i>Appetitus canini definitio</i>	378	<i>Auditus organum</i>	153
<i>Appetitus cibi symptomat.</i>	375	<i>Auditus symptomata</i>	302
<i>Appetitus potus symptom.</i>	376	<i>Aurium dolor</i>	313
		<i>Aurium</i>	

I N D E X.

<i>Aarium tinnitus causa</i>	303	<i>Calculi vesicae causa & signa</i>	
<i>Audrix facultas</i>	96	464	
B.		<i>Canina appetentia</i>	377
<i>Balnea</i>	860	<i>Cancer</i>	229
<i>Balneorum partes & vires</i>	861	<i>Capitis partes</i>	141
<i>Bechica medicamenta</i>	698	<i>Capitis dolor, eiusq₃ differen-</i>	
<i>Bilis atra species</i>	108	<i>tie & causa</i>	311
<i>Bilis quid</i>	107	<i>Carbunculus</i>	229
<i>Bilis non naturalis species</i>	107	<i>Carliaca</i>	310
<i>Bilis redundantia causa</i>	215	<i>Καρδιαλγία</i>	311
<i>Βότρυον</i>	297	<i>Εαζαλγία</i>	281
<i>Βελάμε</i>	378	<i>Καζιφορα</i>	282
<i>Βογίλ</i>	288	<i>Καζαρρ</i>	287
<i>Βεγδυπεψία</i>	384	<i>Cathartica medicamenta</i>	
<i>Βεγχοκλήη</i>	479	700. & 748	
<i>Bubo</i>	230	<i>Catheretica</i>	693
C.		<i>Catoche</i>	281
<i>Cachexia definitio</i>	433	<i>Causa quid</i>	199
<i>Cachexiae cause</i>	ibid.	<i>Causarum differentia</i>	199
<i>Cacochymia</i>	214	<i>Causa continens</i>	210
<i>Cacitas</i>	292	<i>Cause internae earumq₃ diffe-</i>	
<i>Cœliaca</i>	279	<i>rentia</i>	209
<i>Calcinatio</i>	740	<i>Causa procatartica earumq₃</i>	
<i>Calida intemperiei causa</i>	220	<i>differentia</i>	202
<i>Signa</i>	556	<i>Causarum morbificarum si-</i>	
<i>Calidum innatum</i>	77	<i>gna</i>	558
<i>Calidi innati fons</i>	78	<i>Ceratio</i>	743
<i>Calculi renum causa & signa</i>		<i>Cerebri morbi</i>	261
457 & c.		<i>Cerebri partes</i>	141
		<i>Cerebrum sedes animalis fa-</i>	
		<i>ci. ltatis</i>	141

I N D E X.

Cerebri ventriculi	141	Contagium	209
Κεφαλαλγία	311	Contenta quotuplicia	212
Cephalea	311	Contentorum vitia	213
Cholera	389	Convulsio	321
Chylificatio	30	Convulsio legitima	322
Cibandiratio.	659	Convulsio illegitima	324
Cibi quantitas	842	Cordis figura	32
Cibi sumendi tempus & modus		Cordis substantia	32
660.847		Cordis morbi	36
Cibus & potus quid	375	Cordis palpitatio	364
Cibus quomodo nos laedit	204	Cordis symptomata	360
Circulatio	744	Cornæ tunica affectus	297
Κίρξ	378	Corporis humani diuisio	65
Cogitatio	162	Corporis totius temperamen-	
Cognitio quid	140	tum	49
Cohobatio	743	Corruptionis humorum cause	
Colica	399	Crisis quid	609 (217
Colorum differentie	148	Κρίσις	301
Colorum causa in urinis	581	Crisis optima & absoluta	610
Columelle affectus	351	Crisis causa & differentie	611
Coma	283	Crisis qualis futura sit	620
Composita medicamenta	739	Crisis eiusq; signa	624 &c.
Conceptio	123	Critica signa	611
Conceptus irriti	521	Critici dies	613
Concoctio alimenti triplex	89	Criticorum dierum cause	617
Concoctio prima chylosis	96	Cruditus	382
Concoctionis secundæ instru-		Cucurbitularum usus	818
menta	92	Curandiratio	636
Cōcoctio tertia & nutritio	93	Curatio ordinaria & extra-	
Condyloma	413	ordinaria	657
		Curatio	

I N D E X.

Curatiua indicatio & metho-	Digestio	743	
dus	639	Diuretica medicam.	695
Cutis temperamentum	48	Diata communiter & proprie	
Cystis fellis morbi & sympto-	quid		820
mata	428	Doctrina empiricorum	18
D.		Doctrina methodicorum	10
Declinatio morbi	193	Doctrina Paracelsistarum	5
Declinationis morborum si-		Dogmatica medicina	11
gna	596	Doloris subiectum	308
Deglutionis symptomata	380	Doloris cause	ibid.
Deiectionis tarda causa	402	Doloris definitio	ibid.
Deiectionis cita causa	4	Doloris distinctio	548
Deiectionis pauca causa	403	Dosis medicamentorum sim-	
Deiectionis assidue causa	ibid.	plicium	716
Deleterea medicamenta	701	Dosis singulorum purgantium	
Delirium	245 262. &c.	767	
Demonstratiua signa	544	Dulcis sapor	708
Demonstratio duplex	20	Durities & mollities	680
Dentium dolor	313	Δυσερχιασις	301
Desipientia quid & quotuplex		Δυσπεψιας causa	383
262		Dysenteria vera	407
Destillatio	288	Dysenteriae nothae tres species	
Diabetis	470	409	
Diarrhaea	405	Dysuria	473
Diaphoretica medicamenta		Dispnoea quid & quotuplex	
682		248.344	
Diafiole	132.564		
Disciplinarum diuifio	I	E.	
Diatetica	15	ἐφαρδισ	360
Dies critici & indices	613. &c.	ειλε	400
		lii	5
			ειπτι-

I N D E X.

ἐπιστομὴς	299	Evacuatio minorativa	77
ἐκτρώσιον	301	Excrementorū differentia	8
ἐκφραγλῆα medicamenta	687	Excretorum consideratio	54
Elementum quid	21	& 600	
Elementa mundi quatuor	29	Excretorum & retentorum	
Elementorum qualitates loco-		moderatio	86
motinae	24	Exercitiorum differentia	c
Elementorum qualitates alte-		usus	85
ratiue	27	Exercitationis tempus & mo-	
Elementi forma	26	dus	85
Elementorum mutua transf-		Exerientia	4.63
mutatio	34	Expultrix facultas	8
Elementorum mixtio	35	Extractorum medicam. pur-	
Elephantiasis cause & signa		gantium Dosis	76
448		F.	
Empirica secta	19	Facultates alimentorum	82
Empyema	356	Facultas animalis	140
ἐμπύημα	301	Facultates anime quid	60
Emplastrica medic.	680	Facultates animales gubernā-	
Enterocoele	398.479	tes prima tres	62
Epilepsia	277	Facultas generatrix	11
Epilepsia differentia cause &		Facultates medicamentorum	
signa	278	664	
Epiptoele	479	Facultatum medicamento-	
Epiphora	300	rum gradus quatuor	672
Erysipelas	228	Facultatum principum sede-	
Errhina	698	166	
Evacuatio vide vacuatio.		Facultas naturalis	83
Evacuationes universales	747	Facultas vitalis, eius sedes, &	
Evacuationes particulares	787	instrumenta	131
		Fames	

I N D E X.

mes	161	G.	
bris quid	161	Galenimedicina	12
brium differentie	162	Galenide anima opiniones	55
gura vitiata cause	239	Γάρυδιον	229
atum cause	38	Gaudii immoderati noxa	208
ior uterinus & muliebris		Gemellorum conceptus	129
516		Generatio hominis	112. &c.
uxionis præter naturã cau-		Generationis prima principia	
se	219.226.288	114	
uxus chylosus	707	Generationis organa in viris	
uxus hepaticus	409	118	
uxus purulentus	411	Generationis organa in fœmi-	
emina quid	114	nis	117
emina semen quid confert		Generationis modus	124
ad generationem	122	Generationis tempora	125
emina quando gignatur	129	Genitalium partium morbi &	
etus procreatio	124	symptomata	477. &c.
etus quando movetur	126	Glandula	229
actura	190	Glaucoma	293
ictiones earumq; differentia		Glutinantia medicamēta	695
& usus	857	Gonorrhœa in viris	489
igide intemperiei cause		Gradus facultatis medicamē-	
223		ti partes tres sunt	672
igide intemperiei signa		Grans'o	301
556		Gravidatio falsa	532
inctionum lesarum cause		Gule vitia	373
257		Gustus	155
ror uterinus	523	Gustus symptomatum cause	
irunculus	228	305	

Hallu-

I N D E X.

H.

761

Hallucinatio	293	Humores turgentes	761
Hæmorrhoides, earumq ³ differe- rentia	414-415	Hydrocele	47
Hæctica febris	362	Hydropis species	43
Hemicrania	311	Hydropis signa	43
Hepar	93	Hydrops	43
Hepatici morbi symptomata		Hydragoga	77
419		Hypochondriaca affectio	26
Hepatica affectio.	420	medicamenta	68
Hernia eiusq ³ differentia	479	Hysterica symptomata	51
Hemiplegia	319	I.	
Herpes	229	Icterus	43
Hippocratis medicina	12	idiotæ	18
Hirudinum usus	816	Iecoris morbi, vide hepatis	6
Horam mortis prædicere	633	Iecoris obstructions	42
Hora observanda in phlebotomia	813	Iecoris inflammatio	42
Horror	334	Iecoris abscessus	42
Humidum primogenium	75	Iecoris scirrhus.	42
Humor quid	101	Ignis elementum	30
Humorum differentia	102	Ileos	400
Humores secundarii	103	Imaginatio vide phantasia	
Humorum redundantium		Impotentia Veneris	48
causæ	215	Inanitio	21
Humorum redundantium si- gna	683 560	Incrassantia medicament	
Humores singulos purgantia		Incubus	27
767		Indicatio quid	64
Humores crudi an purgandi		Indicatio curativa	64
		Indicatio præservativa	65
		Indica	

I N D E X.

Indicationes à parte affecta Lepra	447
646 Lethargus	279
Indicatio conservativa 658 Leuce	446
Indurantia medicamenta 681 Leucomata	298
Insomnium 166 Lienis morbi	431
Instrumentariae partes 69 Lienis symptomata	429
Instrumenta medicatrix 15. Lienis usus	416
Intellectus 167 (& 637 Lienteria	406
Intellectus agēs & patiens 169 Linguae compositio & usus 152	
Intemperiei species 185 Loci affecti signa	545
Intemperies simplices & compositae 186 Loquela instrumenta	152
Intemperiei calida causa 220 Loquela vitia	338
Intemperiei calida signa 556 Lues venerea	449
Intemperiei frigida causa 222 Lumbrici	395
Intemperiei frigida signa 556 Lumbricorū symptomata 397	
Intemperiei sicca causa 224 Luxatio.	189
Intemperiei sicca signa 556	M.
Intemperiei humida causa 225 Macies	443
Intemperiei humida signa 556 Μαδείγωσις	301
Intestinorum usus 392 Μαλακία	378
Intestinorum symptomata ibi. Mania	267
Intestinorum morbi 393 Marasmus	362
Inventionis medicinae duo Mas	114
principia 638 Maris organa genitalia	115
Ischuria 467 Medicamenti & alimenti distinctio	661
ixias 313 Medicamenti definitio	663
L. Medicamentorū facultates	664
Lac generantia 697 Medicamentorum facultates	
Lasitudo 331 prima	670
	Medi-

I N D E X.

<i>Medicamentorum facultates</i>	<i>Melancholia</i>	265
<i>secunda</i>	680 <i>Memoria</i>	161
<i>Medicamentorum facultates</i>	<i>Memoria symptomata</i>	245
<i>tertia</i>	295 <i>Mens</i>	168
<i>Medicamentorum facultates</i>	<i>Mens agens & patiens</i>	169
<i>quarta</i>	699 <i>Menses decolores</i>	515
<i>Medicamenta simplicia</i>	715 <i>Menses moventia</i>	697
<i>Medicamenta composita</i>	738 <i>Menstruorum suppressio</i>	510
<i>Medicamentorum composito-</i>	<i>Menstruorum profluvium</i>	513
<i>rum tres cause</i>	717 <i>Menstruum quid</i>	119:476
<i>Medicamentorum componen-</i>	<i>Mesenterii affectus</i>	411
<i>dorum ratio</i>	725 <i>Methodus medendi quid</i>	639
<i>Medicamentorum composito-</i>	<i>Methodus quid</i>	16
<i>rum divisio</i>	717 <i>Methodus quoduplex</i>	17
<i>Medicamenta electivè purgan-</i>	<i>Mictus cruentus</i>	474
<i>tia</i>	767 <i>Mictus involuntarius</i>	471
<i>Medicamenti compositi partes</i>	<i>Mictus pilaris</i>	475
<i>basis corrigentia, dirigen-</i>	<i>Mictus purulentus</i>	ibid.
<i>tia</i>	726 <i>Miopia</i>	292
<i>Medicina subiectum</i>	2 <i>Mixtio</i>	35
<i>Medicina officium</i>	3 <i>Mola</i>	532
<i>Medicina principia</i>	3 <i>Monstrorum differentia</i>	530
<i>Medicina definitio</i>	4 <i>Monstrorum causa</i>	529
<i>Medicina partes</i>	5 <i>Morbi acuti & longi unde co-</i>	
<i>Medicorum secta, vide sectas</i>	5 <i>gnoscuntur</i>	594
<i>Melancholicus humor, eiu. que</i>	<i>Morbi compositionis</i>	187
<i>species</i>	107 <i>Morbi definitio</i>	181
<i>Melancholici humoris redun-</i>	<i>Morbi differentia</i>	184
<i>dantis causa</i>	216 <i>Morbi similes</i>	185
<i>Melancholici humoris signa</i>	<i>Morbi simplices & compositi</i>	190
561	<i>Morbo-</i>	

I N D E X.

16	Arborum causa	220	Nervorum patria cerebri	ib.
16	Arborum communium causa		Nervorum spinalis medullæ	
24	237		paria	143
16	Arborum signa	551	Nervi optici affectus	292
16	Arborum tempora	193	Nutritionis definitio	88
16	Arborum magnitudo, motus &		Nutritionis organa	86
69	mos unde dignoscitur	593	Nutrimentum, vide alimentum.	
16	Arbor quomodo futura sit	620	Nutritionis symptomata	418
16	Arboris diem & horam prædi-		Nux & λωπία	292
119	cere	633	Nympha	501
411	Arboris causa	621		
69	Arboris voluntarij principia	171	O.	
16	Arboris symptomata	246. 318		
17	Arboris & quietis legitimus usus		Obauditio	303
474	856		Oblivio	273
471	Arboris instrumentum vo-		Obmutescencia	339
475	luntarij motus	175	Oculi compositio	147
16			Oculorum affectus & sympto-	
192	N.		mata	290
35			Oedema	228
112	Arboris ulcus	305	οισόφας	91
110	Arboris medicamenta	683	οδο. & λωπία	313
119	Arboris similitudo triplex	129	Olfactus obiectum	154
110	Naturales facultates primariae		Olfactus definitio	154
191	tres	84	Olfactus symptomatum causa	
187	Naturales facultates mini-		304	
188	strantes quatuor	84	ορυξ	297
184	Nausea	384	Opiata	739
181	Nervorum affectus	290	Opistotonos	327
110	Nervorum structura	142	Oppressionis virium causa	804
			Ordinis definitio	17
			Ordo	

I N D E X.

Ordo triplex in disciplinis	18	Partis definitio	61
Ordo in assumendis cibis	845	Partis diuifio	66
Organus	70	Partiū ſimilariū numerus	68
Orificia vaſorum	aperientia	Pars diſſimularis	69
680		Pars organica	69
Orthopnæa	347	Partus difficilis	537
Oſcitatio	331	Partus naturalis tempus	127
ὀφθαλμία	299	Partes genitales	476
ὀζαίρα	305	Pathologica	13.178
ὠχλία	313	Pathos	179
P.		Penis vitia	485
Palpebrarum vitia	301	Peripneumonia	355
Palpitatio	328.365	Perturbationes animi ut mor-	
Pandiculatio	331	borum cauſe	208
Paraceliſtarum medicina	&	Perturbationum animi mo-	
principia	6.7	deratio	867
Paraceliſtarum de humorib.	Peruigilium		268
opinio refutatur	110	Phantafia	135
Paraceliſtarum opinio de ſa-	Phantafia ſymptomata		245
cultatibus medicam.	667	Φαρμακὸν τι	15
Paraceliſi gradus operationum	Philophorū de anima opinio		
chymicarum ſeptem	742	Phimofis uteri	494 (55)
Paraceliſi opinio de ſignaturis	Phlebotomia quid		789
714	Phlebotomia ſcopi		790
Paralyſis cauſe & differentie	Phlebotomia triplex, euacuās,		
319	reuellens, deriuans		793
Paroxyſmi	195	Phlebotomia ex quibus venis	
Pariendi modus	487	inſtitui debeat	797
Partes corporis humani	67	Plebotomia an cōueniat, quā-	
Partes medicine	12	do, quoties, quantum	808
		Phleg-	

I N D E X.

Phlegmone	228	πρωτοπείθεια	183
Phrenitis	263	Procreationis symptomata	522
Phthisis causa & signa	358	Pruritus	332
Physiologia	13.21	Pruritus definitio	447
Pituita naturalis	109	Pterygion	298
Pituita non naturalis species	109	Pulmonum substantia & usus	132
Pituita redundantis causa	216	Pulsus	135.564
Pituita redundantis signa	562	Pulsuum cause tres	568
Plethora	214	Pulsuum differentia decem	
Plethora differentia	ibid.	564. &c.	
Plethora signa	560	Pulsuum naturalium causa	572
Pleuritidis vera & notha causa		Pulsuum observandi ratio	564
& signa	332. &c.	Pupilla affectus	295
Podagra	313	Putredo	221
Pollutio nocturna	490	Purgatio quid	748
Polypus	305	Purgantium vires	750
Potus differentia	852	Purgantium singulorum dosis	767
Potus triplex usus	851	Purgationis differentia	750
Præcipitatio	742	Purgatio an conveniat, quibus	
Præparationes medicamento-	741	quantum, quo tempore	755
rum		Purgatio plena	778
Præparantia singulos humores	760	Purgatio minorativa	779
Pregnantium symptomata &		Purgantia particularia	787
signa	528		
Præfagitionis usus	591	Q.	
Præfagitio quid	592	Qualitates alterative	24
Priapismus	487	Qualitates locomotive	24
Prognostica signa	592	Qualitates medicamentorum	
		prima	670

Kkk

Qua-

I N D E X.

<i>Qualitates med secunda</i>	680	<i>Revulsio</i>	654.795
<i>Qualitatis vitia in humoribus</i>	213	<i>Rhagidis tunica affectus</i>	296
		<i>Rhagades ani</i>	413
<i>Quantitatis vitia in humoribus</i>	213	<i>Rhyas</i>	300
		<i>Rigor quid</i>	334
		<i>Rigoris causa</i>	333
<i>R. medicamenta</i>		<i>Robur virium & debilitatem,</i>	
	682	<i>qua demonstrent</i>	603
<i>Rationalis medicina</i>	11	<i>Ructus</i>	385
<i>Rectificatio</i>	745	<i>Rubrificantia medicamenta</i>	
<i>Redundantia humorum species</i>	693		
	213		
<i>Regiones corporis</i>	218	<i>S. Sanguinis evacuationes parti-</i>	
<i>Regionum temperamentum</i>	53	<i>culares</i>	815
<i>Remedia quid</i>	639	<i>Sanguinis generatio</i>	92
<i>Remediorum materia triplex</i>		<i>Sanguis menstruus</i>	119
	637	<i>Sanguinis missio, vide phlebo-</i>	
<i>Renam morbi</i>	453	<i>tomiam</i>	
<i>Renum symptomata</i>	454	<i>Sanguinis nomen quot modis</i>	
<i>Res naturales</i>	13	<i>sumitur</i>	100
<i>Res non naturales sex</i>	202	<i>Sanguinis redundantia causa</i>	
<i>Res praternaturales</i>	13		215
<i>Rerum non naturalium legiti-</i>		<i>Sanguinis redundantis signa</i>	
<i>mus usus</i>	820		560
<i>Respirationis definitio</i>	138	<i>Sanguinis sputum</i>	356
<i>Respirationis partes</i>	ib.	<i>Sanguinis temperamētum</i>	49
<i>Respirationis instrumenta</i>	ib.	<i>Sapor quid</i>	155
<i>Respirationis differentia</i>	343	<i>Saporum differentia</i>	155
<i>Respiratio quod modis leditur</i>		<i>Sapores quomodo ostendant vi-</i>	
	344	<i>res medicamentorum</i>	705
		<i>Sarco-</i>	

I N D E X.

Sarcocoele	479	Serofi humoris redundantis cau-	
Satyriasis	523	sa 217. Signa	562
Scabies	447	Sexus temperamentum	51
Sacrificationis usus	816	Signa causarum	558
Scurrhus	228	Signa critica	610
Scopi medici	640	Signa diagnostica quotuplicia	
Scorbutus	442	544	
Scroti affectus	478	Signa loci affecti	545
Secta definitio	5	Signa morborum	551
Secta Paracelsistica fundamen-		Signa prognostica	592
ta	6	Signa insalubria quotuplicia	
Secta quatuor medicorum	5	543	
Semen & maternus sanguis		Signum quid	542
principia fetus	118	Signorum divisio	543
Semen à tribus principibus par-		Signorum fontes	542
tib. præcipue secernitur	119	Simplicia medicamenta	714
Semen muliebre	121	Simplicium medicamentorum	
Seminaria vasa	115	divisio	715
Seminis definitio	119	Singultus	391
Seminis redundantis causa	482	Sitis	379
Seminis defectus causa	ib.	Solutionis continui causa	235
Sensuum symptomata	245	Somnus	165
Sensus	144	Somni immoderati noxa	207
Sensus exteriores quinque	146	Somni & vigiliarum moderatio	806
Sensus interiores	159		
Sensus communis	160	Sonus & sonorum differentia	
Sensibile differentia	145	152	
Sensuum obiecta	144	Spagyrica	5
Sentiens facultas	143	Spagyrica preparationes	741
Septica medicamenta	694		

Kkk 2

Spi-

I N D E X.

<i>Spirandi difficultas</i> , vide di-	<i>Symptomatis definitio</i>	246
<i>spnœam</i>	<i>Symptomatum genera</i>	242
<i>Spiritus quid & quotuplex</i>	<i>Symptomata sensuum</i>	245
<i>Spiritus innatus & insitus</i>	<i>Symptomata motus</i>	246
<i>Spiritus naturalis</i>	<i>Symptomata vocis</i>	247
<i>Spiritus vitalis</i>	<i>Symptomata respirationis</i>	248
<i>Spiritus animalis defectus cau-</i>	<i>Symptom. facultatis vitialis ib.</i>	
<i>se</i>	<i>Sympt facult. naturalis</i>	249
<i>Spiritus vitalis defectus causa</i>	<i>Symptomatum causa</i>	256
368	<i>Symptomatum voluntarij mo-</i>	
<i>Sterilitatis differentia</i>	<i>tus differentia</i>	318
<i>Sterilitatis signa</i>	<i>Euxalyxia medicamenta</i>	686
<i>Sterilitas</i>	<i>Syncope</i>	367
<i>Sternutatio</i>	<i>Syrupi</i>	753
<i>Stomachus, vide ventriculum.</i>	<i>Systole</i>	136
<i>Strabismus</i>	<i>Systoles celeritatis & tarditatis</i>	
<i>Stranguria</i>	<i>causa</i>	571
<i>Stultitia</i>	T.	
<i>Stupor</i>	<i>Tactus</i>	156
<i>Stupefacientia medicamenta</i>	<i>Tactus instrumentum</i>	556
683	<i>Tactiles qualitates</i>	556
<i>Sublimatio</i>	<i>Tactus symptomatũ causa</i>	306
<i>Sudores naturales vel sympto-</i>	<i>Temperamentum</i>	42
<i>matici</i>	<i>Temperamentorum differentia</i>	
<i>Sudores synoptici</i>	601 688 44	
<i>Suffocationis ab utero causa &</i>	<i>Temperamenta partium</i>	48
<i>signa</i>	<i>Temperatissimi hominis signa</i>	
<i>Suffusio</i>	294 49	
<i>Suppurantia medicamēta</i>	<i>Temperamenti totius corporis</i>	
<i>Surditas</i>	<i>signa</i>	50
	<i>Tempe-</i>	

I N D E X

Temperamenta humorum	ib. Vari	187
Temperamentum ad pondus &	Venarum exortus & divisio	93
iustitiam	44 Vegetationis definitio	86
Temperamentum sexus	51 Venæ sectio, vide phlebotomiā.	
Temperamentum ætatum	ib. Venenum quid	209
Temperamentum temporum	Venerea lues, eiusque causæ &	
anni	53 signa	449
Temperamentum regionum	55 Venus quibus conveniat	865
Tenesmus	408 Veneri aptum tempus	865
Terra naturæ	33 Ventriculus	91
Testiū conformatio & usus	115 Ventriculi morbi & symptom.	
Testium morbi	478 373. &c.	
Tetanus	326 Vertiginis causæ & signa	269
Thoracis partes cōtinentes	131 Vesiculæ fellis usus	452
Τετραπικα	301 Vesiculæ fellis morbi	428
Tremor	327 Vesicæ urinariæ usus	95
Tumorum præter naturam dif-	Vesicæ affectus	462
ferentiæ	225 Victus ratio	820
Tumorum causæ	226 Victus errores	205
Turgere quando dicuntur hu-	Victus forma	832
mores	764 Victus quantitas	842
Tussis	249 Victus qualitas	843
Tussis causæ	250 Victus tempus & modus	846
Tympanites	439 Victus materia	822
	Victum indicantiæ	838
V.	Vigilia	165
	Vigiliæ immodicæ noxa	207
Vacuationum differentiæ	653 Vigiliarū & somni moderatio	
Vacuationes generales & spe-	866	
ciales	747 Vigoris morbi dignotio	596
	Kkk 3	Vires

I N D E X.

<i>Vires agri nude æstimanda</i>	597	<i>Vrinarum considerandi ratio</i>	575
<i>Vires medicamenti quomodo</i>		<i>Vrinarum differentia</i>	576
<i>indagentur</i>	703	<i>Vrinarum singularum cause</i>	
<i>Virium debilitas duplex</i>	804		577
<i>Virium debilitas quæ evacua-</i>		<i>Vrinarum hypostasis</i>	585
<i>tiones prohibet</i>	805	<i>Vrinarum contenta eorumque</i>	
<i>Visus definitio</i>	146	<i>cause</i>	586
<i>Visus organum</i>	147	<i>Vrina optima quæ</i>	577
<i>Visus quomodo fiat</i>	149	<i>Vrina generatio & materia</i>	
<i>Visus symptomata</i>	246		574
<i>Vlcus</i>	190	<i>Vrina suppressio</i>	467
<i>Vnguenta</i>	739	<i>Vrina incontinentia</i>	471
<i>Vritatis solutio</i>	190	<i>Vrinæ moventia</i>	693
<i>Vritatis soluta causa</i>	235	<i>Vterus</i>	171
<i>Vocis vitia & causa</i>	340	<i>Vteri morbi</i>	492
<i>Vocis organa</i>	339	<i>Vteri tumorum signa</i>	497
<i>Vomitùs signa</i>	387	<i>Vteri hydrops</i>	498
<i>Vomitória medicamenta</i>	771	<i>Vteri procidentia</i>	503
<i>Vomitùs quibus & quando</i>		<i>Vteri ascensus</i>	504
<i>convenit</i>	783	<i>Vteri stillicidium</i>	516
<i>Vox</i>	338	<i>Vteri prefocatio</i>	518
<i>Vreterum morbi</i>	461	<i>Vteri furor</i>	523
<i>Vrgens affectus</i>	751	<i>Vteri ulcera</i>	506
<i>Vrina quid</i>	574	<i>Vulnus</i>	190
<i>Vrinaria fistula morbi</i>	466		

F I N I S.

infiltrandi rati

ferentia 576

regularum causae

quod 583

contra contrarium

586

577

et materia

467

471

693

471

492

497

498

503

504

506

508

513

506

510

